HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

920

Bought

December 11, 1931.

Substituted for copy previously enter

DEC 11 1931

MONOGRAPHIA
HELICEORUM
VIVENTIUM.

SISTENS

DESCRIPTIONES SYSTEMATICAS ET CRITICAS

OMNIUM HUIUS FAMILIAE GENERUM ET SPECIERUM

HODIE COGNITARUM.

AUCTORE

LUDOVICO PFEIFFER, Dr.

CASSELLANO.

VOLUMEN SECUNDUM.

LIPSIAE:

F. A. BROCKHAUS.

1848.

al 1848

MONOGRAPHIA

HELICEORUM VIVENTIUM.

VI. Bulimus Scopoli.

Conspectus specierum.

I. Peristomate expanso vel reflexo.
A. Imperforati,
1. abnormes.
a. Helicoidei . . . . . §. 1. Nr. 1—16.
b. Achatinoidei . . . . . §. 2. — 17—42.
c. Succinoidei . . . . . §. 3. — 43—48.
2. normales.
a. Ovati . . . . . §. 4. — 49—71.
b. Oblongi . . . . . §. 5. — 72—92.
B. Subperforati,
1. oblongi . . . . . §. 6. — 93—106.
2. ovati . . . . . §. 7. — 107—123.
3. fusiformes . . . . . §. 8. — 124—126.
C. Perforati vel umbilicati.
1. Perist. plane expanso vel incrassato, reflexo.
a. Normales,
α. spira brevi . . . . . §. 9. — 127—139.
β. spira elongata . . . . . §. 10. — 140—169.
b. Abnormes.
α. Partulae . . . . . §. 11. — 170—192.
β. Pupoidei,
* edentuli . . . . . §. 12. — 193—209.
** dentati . . . . . §. 13. — 210—222.
γ. Auriculacei . . . . . §. 14. — 223—230.
δ. Irregulares.

* Anfr. ultimo regulariter descendente,
† apertura ovali sinuata . . . §. 15. Nr. 231—235.
†† apertura oblonga angusta vel subtriangulari . . . . . §. 16. — 236—249.
** Anfr. ultimo antrorsum deviante §. 17. — 250—252.
2. Peristomate breviter vel vix expanso,
a. simplice . . . . . §. 18. — 253—305.
b. incrassato vel sublabiato.
α. Edentuli . . . . . §. 19. — 306—336.
β. Dentati . . . . . §. 20. — 337—358.
II. Peristomate recto,
A. incrassato . . . . . §. 21. — 359—371.
B. simplice.
1. Achatinoidei . . . . . §. 22. — 372—374.
2. Succinoidei
a. imperforati . . . . . §. 23. — 375—385.
b. perforati . . . . . §. 24. — 386—389.
3. Cylindraceo-turriti.
a. elongati
α. peristomate interrupto . . . . . §. 25. — 390—423.
β. peristomate continuo, soluto . . . §. 26. — 424—425.
b. abbreviati (pupoidei) . . . . . §. 27. — 426—437.
4. Normales,
a. imperforati . . . . . §. 28. — 438—455.
b. subperforati vel obtecte perforati . . §. 29. — 456—484.
c. perforati vel umbilicati.
α. Peristomate simplice.
* Apertura basi angulata . . . . . §. 30. — 485—495.
** Apertura basi rotundata.
† Apertura spiram aequante vel superante . . . . . §. 31. — 496—540.
†† Spira aperturam superante,
1) varii . . . . . §. 32. — 541—596.
2) unicolores cornei . . . . §. 33. — 597—604.
β. Peristomate labiato . . . . . §. 34. — 605—620.
III. Species dubiae . . . . . §. 35. — 621—632.

---

§. 1.

(Testa imperforata, turbinata, anfractu ultimo basi vix attenuato, apertura transverse subdilatata.)

1. B. Reevii (Helix) Broderip.

T. imperforata, conico-ovata, solida, nigricans, ad apicem pallescens, epidermide liberea fere omnino obducta vel varie

fasciata; anfr. 5½ convexi, ultimus spiram aequans; columella subrecta, lata, livida; apertura ovalis, basi subeffusa, intus coerulescens; perist. incrassatum, reflexum, livido-violaceum, marginibus callo nitido junctis, dextro superne dilatato. — R. a. = 11 : 20. — Long. 81, diam. 55 mill. Ap. 48 mill. longa, intus medio 30 lata. (Coll. Nr. 1.)

Helix Reevii Brod. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 34.
Bulimus Reevii Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 1.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 50.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

2. B. lignarius Pfr.

T. imperforata, conoideo-ovata, solida, oblique striata, sub epidermide lignaria nitide nigricans; spira conoidea, sursum pallescens, apice nitide fulva, obtusiuscula; anfr. 5 convexi, ultimus spira paulo brevior; columella subrecta, extrorsum late expansa, fusco-plumbea; apertura lunato-ovalis, intus nitide coerulescens; perist. simplex, reflexum, saturate plumbeum, margine dextro valde arcuato. — R. a. = 11 : 19. — Long. 75, diam. 51 mill. Ap. 40 mill. longa, 30 lata. (Coll. Nr. 2.)

Bulimus lignarius Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 88.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 47.

α. Fere unicolor, epidermide pallida, saturatius strigata, fascia unica angusta nigra supra, latiore albida infra medium anfractus ultimi.

β. Epidermide albo-strigata, fasciis pluribus angustis nigricanti-rufis, unica latiore albida infra medium anfractus ultimi.

γ. Minor, spira subelongata; color sicut in *α.* — Long. 65, diam. 40 mill.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

3. B. Woodianus Lea.

T. imperforata, ovato-conica, crassa, rufo-fusca; anfr. 5 convexi, ultimus spira brevior; columella incrassata, dilatata, superne canaliculata; apertura perobliqua, magna, ovalis, intus alba; perist. late expansum, ad insertionem marginis sinistri incrassato-tuberculatum. — Long. 3½, diam. 2 poll. (Lea.)

Bulimus Woodianus Lea in Philad. tr. VII. p. 457. t. 11. f. 5.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 53.

β. Testa alba, basi late rufo-fasciata. — R. a. = 3 : 5. — Long. 64, diam. 40 mill. Ap. intus 33 mill. longa, 23 lata. (Coll. Nr. 3.)

Habitat in insula Marinduque Philippinarum (Cuming).

4. B. Alberti Broderip.

T. imperforata, pyramidata, solida, rufa, ad apicem pallescens; anfr. 7 convexiusculi, supremi 4 unicolores, sequentes

epidermide lignea variegati, ultimus $^1/_3$ longitudinis non aequans, obtuse carinatus, infra carinam viridis; columella lata, subintorta; apertura perobliqua, subtetragona, intus lactea; perist. incrassatum, reflexum, intus nigricans. — R. a. = 9 : 13. — Long. 66, diam. 34 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 19 lata. (Coll. Nr. 4.)

Bulinus Alberti Brod. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 35.
Bulimus Alberti Pfr. Symb. II. p. 42.
— *bicoloratus Lea* in Philad. tr. VII. p. 459. t. 11. f. 8.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 172. f. 5. 6.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

Obs. Nomen Leaianum, etsi teste Reeve prioritate nonnullorum mensium gaudens, ob B. bicolorem Sow. anteponere nolui.

5. B. Pithogaster (Helix) Férussac.

T. imperforata, ovato-conoidea, solida, longitudinaliter subarcuatim striata, castanea, saepe epidermide hydrophana, saturate cinerea, nonnunquam pallide strigata obducta; spira pyramidata, apice acutiuscula, nuda, nitida; anfr. 6 convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella subverticalis, leviter arcuata, callo extrorsum diffuso, nitido, albo vel rubello munita; apertura perobliqua, lunato-rotundata, intus nitida, lactea; perist. brevissime expansum, intus nigricanti-limbatum. — Long. 66, diam. 44 mill. Ap. 34 mill. longa, 26 lata. (Coll. Nr. 5.)

Helix Pithogaster (Cochlostyla) *Fér.* pr. 324. Hist. t. 108. f. 3. t. 110. f. 1—3.
Bulimus Pythogaster Lam. 10. p. 119. ed. Dh. p. 226.
Orthostylus pythogaster Beck ind. p. 49. N. 5.

Habitat in insulis Philippinis.

Obs. Species pervariabilis quoad magnitudinem et colores.

6. B. Daphnis (Helix) Broderip.

T. imperforata, ovato-pyramidata, solida, coloribus maxime varia; spira pyramidata, acutiuscula; anfr. 5—6 vix convexi, ultimus spiram subaequans; columella subverticalis, callo extrorsum diffuso munita; apertura obliqua, oblonga; perist. subincrassatum, breviter expansum, extus nigricans, intus fusculo-limbatum. — Long. 66, diam. 40 mill. Ap. 35 mill. longa, 25 lata. (Coll. Nr. 6.)

Helix Daphnis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 180.
— — *Deless.* recueil t. 39. f. 13. 14.

α. Ochraceo-albida, anfr. 2 ultimis vittis angustis serie duplice dispositis, nigricantibus cinctis; fascia subbasali vittis albido-ochraceis interrupta nigricante; apertura coeruleo-albida.

β. Sordide albo-flava, vittis fuscis creberrime cincta; apertura albida.

γ. Subochracea, vittis raris distantibus rubro-nigricantibus ornata, anfractu basali fascia lata centrali rubro-castanea ochraceo-subinterrupta cincto; apertura subcoeruleo-albida.

δ. Sordide ochracea, lineis 3 fuscis, media maxima clariore, cincta; apertura albida.

ε. Albido-flava, strigis obliquis fulvis creberrimis ornata et fascia basali latiore cincta; apertura albida.

ζ. Albens, strigis obliquis creberrimis nigris ornata et maculis magnis nigris interdum fucata; fascia basali angusta, nigra; apertura coeruleo-albente.

η. Sordide ochracea, strigis obliquis raris castaneo-nigricantibus fucata; basi nigricante ochraceo sordide fucata; apertura purpurascente.

ϑ. Anfract. 2 primis albidis, tertio et quarto fuscis, ultimo sordide albido, strigis rarissimis obliquis nigricantibus vix notato; apertura rubro-purpurascente.

Habitat in insulis Philippinis, var. α — δ et η, ϑ in insula Zebu, ε et ζ in ins. Siquijor (Cuming).

Obs. Varietates a Cl. Broderip l. c. ita enumeratae sunt.

7. B. Faunus (Helix) Broderip.

T. imperforata, oblongo-pyramidata, solida, fusca, epidermide liberea obducta vel strigata, apice vix acutiusculo nuda; anfr. 6 convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, infra medium saturate castaneus; columella subverticalis, planulata, carneo-fusca; apertura truncato-ovalis, intus griseo-coerulescens; perist. subsimplex, brevissime reflexum, castaneo-limbatum, margine dextro superne antrorsum arcuato-dilatato. — Long. 56, diam. 32 mill. Ap. 28 mill. longa, medio 20 lata. (Coll. Nr. 7.)

Helix Faunus (Cochlostyla) *Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 180.

Habitat in insula Zebu.

Obs. Bul. Daphnis et Faunus ob formas intermedias varietatibus B. Pithogastri forsan melius adnumerandi forent.

8. B. leucophaeus (Helix) Sowerby.

T. imperforata, ovato-pyramidata, apice obtusa, crassiuscula, oblique striata, saturate rufa, sursum pallescens, epidermide hydrophana, cinerascente induta; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira multo brevior; columella subrecta, alba, dilatata; apertura subtrapeziformis, intus lactea; perist. subincrassatum, expansum, rufo-marginatum. — R. a. = 2 : 3. — Long. 44, diam. 28 mill. Ap. intus 21 mill. longa, 14½ lata. (Coll. Nr. 8.)

Helix leucophaea Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 18.

— — *Deless.* recueil t. 39. f. 1.

Bulimus leucophaeus Pfr. Symb. II. p. 47.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

9. B. rufogaster (Helix) Lesson.

T. imperforata, ovato-conica, solida, oblique striata, saturate castanea, luteo-unicingulata, epidermide fusca hydrophana, infra suturam saturatius fenestrata induta; spira conoidea, sursum pallescens, apice obtusiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram aequans; columella intorta, quasi truncata; apertura angulato-rotundata, intus lactea; perist. breviter reflexum, nigro-limbatum, margine basali cum columellari angulatim juncto. — Long. 82, diam. 49 mill. Ap. 46 mill. longa, 30 lata. (Coll. Nr. 9.)

Helix rufogaster Less. Illustr. de Zool. t. 42.
— — *Müll.* synops. p. 12.
Orthostylus rufogaster Beck ind. p. 49. N. 6.
Bulimus rufogaster Pfr. Symb. III. p. 87.

β. Anfractu ultimo fascia pallida hydrophana ornato.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

10. B. Philippinensis Pfr.

T. imperforata, ovato-turbinata, solida, nigricans, strigis obliquis epidermidis hydrophanae griseo-fuscae ornata; spira conica, obtusiuscula, nuda, pallida; anfr. 6 convexi, diametro celeriter accrescentes, ultimus spira paulo brevior; columella vix obliqua, subtorta, carnea; apertura lunato-rotundata, intus lactea; perist. subincrassatum, breviter reflexum, nigro-limbatum, margine dextro valde arcuato, columellari dilatato, expanso. — Long. 63, diam. 41 mill. Ap. intus 33 mill. longa, 25 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Philippinensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 42.

β. Testa epidermide fusca, saturatius strigata, fere omnino obducta, fasciis variis nigricantibus circumdata.

Habitat in insulis Luzon et Marinduque (Cuming).

11. B. Ticaonicus (Helix) Broderip.

T. imperforata, conoideo-ovata, solida, castanea, epidermide albida subhydrophana varie strigata, fasciata et marmorata; spira obtusa, pallescens; anfr. 5½ convexiusculi, supremi depressi, ultimus spira paulo brevior; columella subarcuata, violacescens, rosea, rarius alba; apertura lunato-ovalis, intus coerulescens vel albida; perist. subsimplex, breviter expansum, margine columellari dilatato, extus basi tuberculato. — R. a. = 9 : 13. — Long. 58, diam. 39 mill. Ap. intus 29 mill. longa, 22 lata. (Coll. Nr. 10.)

Helix Ticaonica (Cochlostyla) *Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 155.
Bulimus Ticaonicus Pfr. Symb. II. p. 52.

β. T. minor, lutea, oblique albo-strigata, columella et perist. rubello-limbatis. — Long. 46, diam. 32 mill. Ap. intus 24 mill. longa, 19 lata. (Spec.)

Habitat in insulis Philippinis: Ticao, Masbate (Cuming).

12. B. subglobosus Lea. †

T. globoso-turbinata, subtenuis, rufo-fusca, fasciata, imperforata; anfr. 5 ventricosi; apertura rotundata; labrum subreflexum, margine tenebroso; columella laevis. — Diam. 1,3, long. 1,7″. (Lea.) — Long. 42, diam. 31 mill. Ap. 19 mill. longa et lata. (ex ic.)

Bulimus subglobosus Lea in Philad. tr. VII. p. 455. t. 11. f. 1.

Habitat in insulis Philippinis.

Obs. An varietas B. Ticaonici? An potius sequentis?

13. B. gilvus Sowerby.

T. imperforata, ovata, solidula, striata, sub epidermide gilva rufescens; spira apice obtusa, nuda, pallida; anfr. 6 convexi, ultimus spira paulo brevior; columella strictiuscula, alba, subexcavata; apertura obliqua, lunato-ovalis, intus lactea; perist. subincrassatum, breviter reflexum, margine dextro arcuato, basali appresso. — Long. 54, diam. 38 mill. Ap. 33 mill. longa, intus medio 22 lata. (Coll. Nr. 11.)

Bulimus gilvus Sow. in sched. Cuming.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 45.

β. Epidermide tenuissima, saturate rufa.

Habitat in insulis Philippinis (Cuming).

14. B. juglans Pfr.

T. imperforata, elongato-globosa, apice obtusa, solidiuscula, oblique distincte striata, unicolor rufa; anfr. 5 convexi, ultimus spiram subaequans; columella lata, alba, introrsum arcuatim prominens; apertura magna, irregulariter subovalis, ad basin columellae sinuata, intus pallide livida; perist. vix reflexum, rufo-marginatum. — R. a. = 8 : 13. — Long. 53, diam. 35 mill. Ap. intus 28 mill. longa, 19 lata. (Coll. Nr. 12.)

Bulimus juglans Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 89.

— — *Pfr.* Symb. II. p. 47.

Habitat in montibus « Igarrotes » insulae Luzon (Cuming).

15. B. mus Broderip.

T. imperforata, ovata, apice obtusa, crassiuscula, laevigata, brunnea; anfr. 5 convexi, ultimus epidermide alba, hydrophana fere omnino tectus, rufo-strigatus, spiram vix superans; columella dilatata, alba, obliqua, subtruncata; apertura subovalis; perist. expansum, incrassatum, castaneo-marginatum. — Long. 44, diam. 30 mill. Ap. intus 23 mill. longa, medio 16 lata. (Coll. Nr. 13.)

Bulimus mus Brod. in sched. Cuming.

Bulimus mus Deless. recueil t. 39. f. 12.

Habitat in insulis Philippinis.

Obs. Differt a B. Ticaonico anfractu ultimo spiram paulo superante et columella.

16. **B. dilatatus Pfr.**

T. imperforata, ovato-conica, obtusiuscula, solida, oblique striata, subtilissime punctata, castanea, superne fulva; anfr. 6 planiusculi, ultimus ad suturam albo-unifasciatus, spira multo brevior; columella subrecta, callosa, alba, dilatata; apertura obliqua, late semiovalis, intus lactea; perist. subincrassatum, expansum, margine basali reflexo, appresso. — Long. 34, diam. 22 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 10 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus dilatatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 42.

Habitat in insula Luzon.

Obs. 1. Similis B. stabili (Nr. 88); differt testa basi non attenuata, anfractibus latis, etc.

Obs. 2. Hoc loco conf. Helicis species in §. 47 enumeratae.

§. 2.

17. **B. virens Pfr.**

T. imperforata, ovato-pyramidata, tenuis, laeviuscula, nitida, alba, anfractu ultimo pallide viridi; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans, obsolete angulatus; columella subrecta, prope basin subincrassata, alba; apertura obliqua, lunato-ovalis; perist. rectum, vix incrassatum. — R. a. = 15 : 22. — Long. 54, diam. 29 mill. Ap. 24 mill. longa, 15 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus virens Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 153.

Habitat in insula Bureas Philippinarum (Cuming).

18. **B. subcarinatus Pfr.**

T. imperforata, pyramidata, tenuis, striis obliquis et spiralibus confertissimis minutissime decussata, albida, diaphana, epidermide fuscescente, hydrophana irregulariter strigata, ad suturam fascia pallide fulvescente ornata; anfr. $6^1/_2$ planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, obsolete carinatus; columella recta, plana, angusta; apertura oblonga, subtetragona, intus alba; perist. simplex, parum expansum. — Long. 45, diam. 25 mill. Ap. 22 mill. longa, 14 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 14.)

Bulimus subcarinatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 153.

β. T. rufo-trifasciata, epidermide hydrophana decidua, liberea praesertim in fasciis maculata; apertura subovali: long. 48, diam. 23 mill.; ap. 22 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Romblonensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 152.

γ. Minor: long. 35, diam. 17 mill.; ap. 16 mill. longa, 9 lata. (Mus. Gruner.)

Habitat in insula Romblon Philippinarum (Cuming).

19. B. cincinnus (Helix) Sowerby.

T. ovato-pyramidalis, tenuis, laevis, nitida, interdum epidermide opaca, cinerascente, fusco-variegata partim vel omnino obducta; anfr. 6½ planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella subrecta, introrsum subincrassata; apertura lunato-ovalis; perist. subsimplex. — R. a. = 7 : 9. — Long. 45, diam. 25 mill. Ap. 19 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 15.)

Helix cincinnus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 98.
Bulimus labiozonalis Grat. Bord. XI. p. 419. t. 4. f. 13.
— *gracilis Lea* in Philad. tr. VII. p. 456. t. 11. f. 6.
— *cincinnus Pfr.* Symb. III. p. 53.
Achatina cincinnus Pfr. Symb. II. p. 58.

Habitat in insulis Philippinis: Romblon, Temple, Bureas (Cuming).

Obs. Varietates permultae ex coloribus: testa unicolor alba vel rosea vel rufa, anfractu ultimo saepe maculis et strigis flexuosis epidermidis deciduae fuscae ornato; area basalis vel concolor, vel rosea vel rufa. Rarius tota testa epidermide pallida, rufo-maculata induta, vel fascia rufa circumdata est.

20. B. cincinniformis (Helix) Sowerby.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuis, alba, unicolor vel fasciis rufis nigrisve ornata, apice obtusa; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram fere aequans; columella alba, recta, dilatata, oblique subtruncata; apertura lunato-ovalis; perist. simplex, expansiusculum. — R. a. = 7 : 10. — Long. 42, diam. 29 mill. Ap. 20 mill. longa, 15 lata. (Coll. Nr. 16.)

Helix cincinniformis Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 17.
Achatina cincinniformis Pfr. Symb. II. p. 57.
Bulimus cincinniformis Pfr. Symb. III. p. 53.

β. Anfractibus planioribus, fasciis 3 nigris, prima suturali, altera mediana albo-tessellatis, tertia lata, basali. — Long. 42, diam. 24 mill. Ap. 21 mill. longa, 14 lata. (Spec.)

Habitat in insula Luban Philippinarum (Cuming).

Obs. Ad suturam et in fasciis saepe epidermidis albae, deciduae vestigia adsunt.

21. B. Leai Pfr.

T. imperforata, ovato-conoidea, obtusa, solidula, oblique tenuiter striata, nitida, fulvescenti-alba; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spira brevior, basi subglobosus; columella strictiuscula, declivis, perdilatata, subplanata, basi subtruncata; apertura

obsolete subtetragono-rotundata, intus alba; perist. breviter expansum, subincrassatum. — Long. 37, diam. 24 mill. Ap. intus 18 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Leai Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 29.

Habitat in insulis Philippinis.

22. B. evanescens Broderip.

T. imperforata, ovato-conica, tenuis, albida, linea suturali et area basali castaneis ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus rotundatus, $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella recta, cinerea; apertura lunato-ovalis, intus lactea; perist. tenue, expansum, basi cum columella angulum formans. — Long. 33, diam. 19 mill. Ap. 16 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 17. Spec. min.)

Bulinus evanescens Brod. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 15.

β. T. unicolore alba.

γ. T. pallide fulva, fascia 1 saturatiore ad suturam, area basali et peristomate nigris.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

23. B. carneolus Grateloup. †

T. oblongo-conoidea, albido-carnea, fragilis, pellucida, nitidissima, subtilissime longitudinaliter striata; apertura semiovata, basi rotundata; columella subintorta; anfr. 6 convexiusculi. — Long. 35, diam. 25 mill. (Gr.)

Bulimus carneolus Grat. Bord. XI. p. 417. t. 3. f. 25.

Habitat prope Manila.

Obs. Affinis B. bullulae, sed magis conicus. — An B. cincinniformis var.?

24. Bulimus bullula Broderip.

T. imperforata, conico-ovata, apice obtusa, tenuis, diaphana, albida; sutura levis, albo-marginata; anfr. $4^1/_2$ convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella tenuis, arcuata; apertura ampla, ovalis; perist. simplex, margine columellari subincrassato. — R. a. = 11 : 18. — Long. 35, diam. 21 mill. Ap. 19 mill. longa. medio 14 lata. (Coll. Nr. 18.)

Bulinus bullula Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 159.

Bulimus albinus Grat. Bord. XI. p. 417. t. 3. f. 24.

— *virgineus Lea* Philad. tr. VII. p. 456. t. 11. f. 3.

— *bullula Pfr.* Symb. II. p. 44.

— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 53. Bul. t. 1. f. 1.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Cuming).

25. B. Cumingi Pfr.

T. imperforata, ovata, tenuissima, oblique striatula, pellucida, albido-viridis, ad suturam linea rufa circumdata; anfr. 4½ convexiusculi, ultimus obsolete angulatus, spiram paulo superans; columella plana, subexcavata, fusca; apertura lunato-ovalis; perist. simplex, margine dextro late expanso, basali subreflexo. — R. a. = 4 : 9. — Long. 32, diam. 21 mill. Ap. 19 mill. longa, 11 lata. (Coll. Nr. 19.)

Bulimus Cumingi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 88.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 44.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 55. Bul. t. 1. f. 7.

Habitat in insula Camiguing Philippinarum (Cuming).

26. B. simplex Jonas.

T. imperforata, ovato-conoidea, tenuis, diaphana, subtiliter striata, alba, epidermide tenuissima, viridi, superne evanescente; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans, obsolete angulatus; columella tenuis, strictiuscula; apertura ovalis; perist. acutum, subexpansum. — Long. 28, diam. 18½ mill. Ap. 16 mill. longa, intus medio 9½ lata. (Coll. Nr. 20.)

Bulimus simplex Jonas in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 189.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 53. t. 1. f. 2.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum.

27. B. Hindsi Pfr.

T. imperforata, ovato-conoidea, tenuis, striatula, nitidula, alba, fasciis variis badiis ornata; spira conoidea, obtusiuscula; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella recta, subplanata, introrsum subdilatato-truncata; apertura obliqua, lunato-ovalis, intus concolor; perist. simplex, vix expansiusculum, intus subincrassatum, margine basali cum columellari angulum obtusum formante. — Long. 28, diam. 18 mill. Ap. 16 mill. longa, 10 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Hindsi Pfr. Symb. III. p. 84.
Helix modesta Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 39.
β. Major, fasciis 2 et area basali rufis: long. 32, diam. 21 mill. Ap. 18 mill. longa, 12 lata.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

* * *

28. B. Calypso Broderip.

T. imperforata, ovato-pyramidalis, minutissime striata, diaphana, luteo-albida, taeniis variis virentibus et area basali castanea ornata; spira pyramidata, apice obtusa, purpureo-fusca; anfr.

6 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, medio subangulatus; columella incrassata, subtorta, carnea; apertura lunato-ovalis, intus lactea; perist. breviter expansum, castaneo marginatum. — Long. 40, diam. 21 mill. Ap. 21 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus Calypso Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 158.

Habitat in insula Negros Philippinarum (Cuming).

29. B. camelopardalis Broderip.

T. ovato-turrita, tenuis, fulva, epidermide hydrophana cinerascente irregulariter late strigata; spira elongata, apice obtuso nitide fulva; sutura parum impressa; anfr. 7 subplanulati, ultimus obsolete angulatus, ⅓ longitudinis subaequans; columella gracilis, subrecta; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, vix expansum, intus fusco-marginatum. — R. a. = 7 : 9. — Long. 48, diam. 18 mill. Ap. 19 mill. longa, 10½ lata. (Coll. Nr. 21.)

Bulinus camelopardalis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 157.
Bulimus camelopardalis Deless. recueil t. 39. f. 4.
Achatina camelopardalis Pfr. Symb. II. p. 57.

Habitat in insula Zebu Philippinarum (Cuming).

Obs. Differt a B. boholensi (Nr. 32.) spira turrita, anfractibus lente accrescentibus, ultimo brevi, etc.

30. B. Calista Broderip.

T. ovato-conica, sublaevis, non nitens, fulvido-flava, strigis albis ornata, apice obtusiusculo nitide cinnamomea vel rosea; sutura linearis; anfr. 6 plani, ultimus angulatus, ⅔ longitudinis subaequans; columella incrassata subtorta, subexcavata; apertura perobliqua, ovalis, intus nivea; perist. simplex, reflexiusculum, nigro-vel rufo-marginatum. — R. a. = 7 : 10. — Long. 50, diam. 22 mill. Ap. intus 21 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 22.)

Bulinus Calista Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 157.
Bulimus Calista Deless. recueil t. 39. f. 5.
Achatina Calista Pfr. Symb. II. p. 57.

Habitat in insula Negros Philippinarum (Cuming).

31. B. siquijorensis Pfr.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuis, fulva, epidermide pallide fusca elegantissime marmorata et flammata; spira conica, obtusa, apice nuda, rufescens; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spira vix brevior, subangulatus; columella subtorta, longitudinaliter biangulata, introrsum acuta; apertura oblongo-subpyriformis, intus albida; perist. tenue, breviter expansum, margine dextro deorsum dilatato, basali cum columellari angulum obsoletum

formante. — Long. 52, diam. 25 mill. Ap. 27 mill. longa, 15 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus siquijorensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 74.

Habitat in insula Siquijor Philippinarum (Cuming).

Obs. Apertura similis B. dactylo (Nr. 82); differt spira brevi, obtusa. A B. Calista differt apertura, columella etc.

32. B. boholensis Broderip.

T. imperforata, elongato-conica, oblique striata, fulva, subdiaphana, epidermide luteo-cinerascente, hydrophana elegantissime variegata et strigata: strigis rectis vel angulatis; apex obtusiusculus, nitide fulvus; anfr. 6½ subplanulati, ultimus ⅔ longitudinis subaequans; columella recte descendens, vix subtruncata, livida; apertura perobliqua, oblonga, intus lactea; perist. simplex, expansum, intus nigro-marginatum. — R. a. = 2 : 3. — Long. 47, diam. 19 mill. Ap. intus 20 mill. longa, 11 lata. (Coll. Nr. 23.)

Bulimus Boholensis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 158.

Bulimus Boholensis Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 3.

Achatina Boholensis Pfr. Symb. II. p. 57.

Habitat in insula Bohol Philippinarum (Cuming).

33. B. Nympha Pfr.

T. imperforata, ovato-turrita, solidiuscula, laevis, sulphurea, epidermide hydrophana lignea crebre et late strigata, linea suturali rufa et area columellari nigricante ornata, apice obtuso nitide rosea; anfr. 6—7 vix convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, obsolete angulatus; columella recta, plana, vix truncatula; apertura magna, ovalis, intus alba; perist. subsimplex, album, margine dextro arcuato, columellari vix dilatato. — R. a. = 7 : 10. — Long. 48, diam. 23 mill. Ap. 20 mill. longa, 12½ lata. (Coll. Nr. 24.)

Bulimus Nympha Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 89.

Achatina Nympha Pfr. Symb. II. p. 59.

β. T. rufa, sursum pallens, apice roseo, epidermide alba, perist. rufo.

γ. T. lutea, apice alba, anfractu ultimo epidermide fuscidula, ad basin saturatiore induta, linea suturali, area basali et perist. rufis. — Long. 41, diam. 22 mill. (Mus. Cuming. rariss.)

Habitat in insula Luzon (Cuming).

Obs. Differt a B. boholensi forma paulo ventrosiore, anfractu ultimo brevi, apertura lata, perist. non expanso etc.

34. B. Satyrus (Helix) Broderip.

T. imperforata, oblonga, solida, castanea, epidermide cinerea hydrophana fere omnino obducta; spira elongato-conica, apice obtusa, nuda, pallida; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spira paulo

brevior; columella subrecta, callosa, fuscidula; apertura lunato-ovalis, intus livescens; perist. subincrassatum, reflexum. — Long. 56, diam. 29 mill. Ap. 28 mill. longa, 17 lata. (Mus. Cuming.)

Helix (Cochlostyla) *Satyrus Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 181.
Bulimus Satyrus Pfr. Symb. II. p. 121.

Habitat in insula Tablas Philippinarum (Cuming).

35. **B. nebulosus Pfr.**

T. imperforata, ovato-turrita, oblique striata, albido-fulvescens; anfr. 6 convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis paulo superans, medio obsolete angulatus, albo-cingulatus; apertura oblonga; columella subtorta; perist. incrassatum, reflexiusculum, purpurascenti-brunneum. — Long. 40, diam. 19 mill. Ap. 17 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 25.)

Bulimus nebulosus Pfr. Symb. I. p. 42.
Achatina nebulosa Pfr. Symb. II. p. 134.

Habitat in insulis Philippinis.

36. **B. pyramidalis (Helix) Sowerby.**

T. imperforata, oblongo-pyramidata, crassiuscula, fulvida, saturate castaneo-fasciata, epidermide fusca, decidua strigatim obducta; spira elongata, apice obtusa; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis aequans; columella subtorta, subdilatata, alba; apertura lunato-ovalis, intus livida; perist. simplex, breviter expansum. — Long. 40, diam. 19 mill. Ap. 18 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 26.)

Helix pyramidalis Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 39.
Bulimus pyramidalis Pfr. Symb. III. p. 87.

Habitat in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

Obs. Peraffinis praecedenti.

37. **B. acuminatus (Helix) Sowerby.**

T. imperforata, ovato-pyramidata, apice obtusiuscula, solida, castanea, nigro-fasciata, epidermide hydrophana fuscescente irregulariter striata, superne coerulescens, apice pallida; anfr. 6 planiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans; columella recta, medio subincrassata, vix torta, alba; apertura ovalis, intus livescens, basi subeffusa; perist. simplex, intus brunneo-marginatum, expansiusculum. — Long. 36, diam. 20 mill. Ap. 18 mill. longa. 10 lata. (Mus. Cuming.)

Helix acuminata Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 39.
Bulimus acuminatus Pfr. Symb. II. p. 110.

β. T. tenuiore, fulva, fasciis 2 et area basali rufis.

Habitat in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

38. B. incomptus (Helix) Sowerby.

T. imperforata, ovata, tenuiuscula, pallide fuscescens, castaneo-bifasciata et epidermide fuscidula tenui obducta; spira conoidea, obtusa; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spira vix brevior; columella rectiuscula, subdilatata, basi subtruncata, area castanea circumdata; apertura late lunato-ovalis; perist. simplex, expansum, margine basali cum columella angulum obtusum formante. — Long. 29, diam. 18 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 10 lata. (Mus. Cuming.)

Helix incompta Sow. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 103.
Bulimus incomptus Pfr. Symb. III. p. 85.

Habitat in insula Tablas Philippinarum (Cuming).

39. B. concinnus (Helix) Sowerby.

T. imperforata, oblongo-pyramidata, tenuiuscula, pallide fusca, epidermide alba hydrophana marmorata; spira pyramidata, apice obtusa; anfr. 6 planiusculi, ultimus basi subangulatus, $\frac{1}{3}$ longitudinis subaequans; columella incrassata, alba, oblique truncata; apertura subtrapezoidalis; perist. subincrassatum, margine dextro sinuoso. — R. a. = 16 : 21. — Long. 33, diam. 18 mill. Ap. 13 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 27.)

Helix concinna Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 20.
— — *Deless.* recueil t. 39. f. 2.
Achatina concinna Pfr. Symb. II. p. 58.
Bulimus concinnus Pfr. Symb. III. p. 53.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

* * *

40. B. Downesii Gray.

T. imperforata, ovato-turrita, solida, longitudinaliter rugosa, nitida, alba, strigis obliquis castaneis picta, apice rosea, basi castanea; anfr. 8 planulati, ultimus $\frac{3}{8}$ longitudinis subaequans, basi obtuse angulatus; columella acuta, subintorta; apertura lunato-ovalis; perist. incrassatum, reflexiusculum, carneum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari tenuissimo, reflexo, appresso. — Long. 62, diam. 27 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 14 lata. (Coll. N. 28.)

Bulinus Downesii Gray in Sow. Conch. Ill. Bul. f. 99.
Achatina Downesii Pfr. Symb. I. p. 46.
— *Leaiana Grat.* Bord. XI. p. 416. t. 2. f. 7.
Helix crenata Valenc. in Mus. Paris.

Habitat in insula Fernando Po Africae occidentalis (Gray).

41. B. exaratus (Buccinum) Müller.

T. subperforata, ovato-pyramidata, tenuis, albida, diaphana, concentrice striata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spiram superans, peripheria angulatus; columella verticalis, recta; apertura ampla, truncato-ovalis; perist. simplex, tenue, margine columellari breviter reflexo. — Long. 50, diam. 29 mill. Ap. 30 mill. longa, 19 lata. (Mus. Cuming.)

Buccinum exaratum Müll. verm. II. p. 148. N. 337.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 37. t. 120. f. 1031. 32.
Bulla exarata Gmel. p. 3431. N. 28.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 493. N. 49.
Bulimus exaratus Brug. Enc. méth. I. p. 361. N. 106.
Helix exarata (Cochlitoma) *Fér.* pr. 339. Hist. t. 118. f. 1. 2.
Achatina exarata Gray in Ann. of Philos. New ser. IX. p. 414.
— — *Menke* syn. ed. II. p. 28.
— — *Lam.* ed. Dh. 32. p. 311.
— — *Küst.* in Chemn. ed. II. vol. I. 13. t. 3. f. 5. 6.
Limicolarius exaratus Beck ind. p. 60. N. 1.

Habitat in Guinea.

Obs. Species inter Bulimos et Achatinas intermedia, tamen, cum nulla vera Achatina perforata sit, ad Bulimos anomalos potius referenda.

42. B. Quoyi Pfr.

T. breviter rimata, ovato-pyramidata, striis obliquis et concentricis decussata, tenuiuscula, diaphana, albida; spira pyramidata, apice acuta; anfr. 6 planulati, ultimus spira paulo brevior, ad basin angulatus; columella subrecta, medio subtorto-dentata; apertura obliqua, lunato-ovalis; perist. undique late expansum, extus crenulatum. — Long. 42, diam. 29 mill. Ap. intus 21 mill. longa, 13 lata. (Coll. Saul.)

Bulimus Quoyi Pfr. Symb. I. p. 84. II. p 121.
Helix translucida Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 103. t. 8. f. 11—13.
— — *Lam.* ed. Dh. 196. p. 121.
— . . . . *Fér.* hist. t. 63 B. f. 5.

Habitat ad portum Dorey Novae Guineae.

§. 3.

43. B. floccosus (Achatina) Spix. †

T. imperforata, ovato-oblonga, profunde longitudinaliter striata, corneo-brunea, maculis floccosis irregularibus fuscis aspersa; apertura oblonga, margine incrassato, subreflexo. (Wagn.) — Long. 62, diam. 22 mill. Ap. 36 mill. longa, 16 lata. (ex ic.)

Achatina floccosa Spix test. bras. t. 9. f. 3. 4.

Bulimus floccosus Wagn. ibid. p. 10.
— — *Lam.* ed. Dh. 43. p. 241.

Habitat in Brasilia septentrionali.

44. B. Onça Orbigny.

T. imperforata, elongata, tenuiuscula, striatula, diaphana, fulvescens, maculis castaneis irregulariter aspersa; spira conica, apice obtuso; anfr. 5, ultimus spiram vix superans; columella vix plicata, oblique recedens, rosea; apertura oblongo-ovalis, intus carnea: perist. breviter expansum, marginibus callo tenui, roseo junctis. — Long. 58, diam. 22 mill. Ap. 31 mill. longa, medio 13 lata. (Mus. Gruner.)

Helix Onça (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 8.*)
Bulimus Onça Orb. voy. p. 295. t. 30. f. 1. 2.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t 173. f. 3.
Bulimus Onça Sow. Conch. Ill. f. 80.
Plectostylus Onça Beck ind. p. 58. N. 2.

Habitat in Peru.

45. B. pintadinus Orbigny. †

T. oblonga, ventrosa, tenuis, substriata, maculis fusco-rufis ornata; spira convexa, apice acuminata, obtusa; anfr. 5, ultimus obliquus, magnus; apertura ovalis, obliqua, fusco-violacea; columella crassa; labrum tenue, subreflexum. (O.) Long. 60, diam. 29 mill. Ap. 37 mill. longa, 18 lata. (ex ic.)

Helix pentadina (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 8.
Bulimus pintadinus Orb. voy. p. 296. t. 29. f. 11. 12.

Habitat prope Yuracares Boliviae.

46. B. piperitus Sowerby.

T. imperforata, ovato-acuminata, tenuis, striis longitudinalibus et concentricis minutissime decussata, fusco-straminea, punctis rufis undique aspersa; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus fere $^2/_3$ longitudinis aequans; sutura parum impressa, crenulata; columella levissime arcuata; apertura ovali-oblonga, intus nitida, livescens; perist. simplex, vix expansiusculum, margine columellari dilatato, reflexo, appresso. — Long. 53, diam. 25 mill. Ap. 31 mill. longa, 17 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus piperitus Sow. Conch. Ill. f. 93.
Bulimus piperitus Reeve Conch. syst. II. t. 174. f. 93.

Habitat prope Huallaga.

*) T. elongata subventricosa, tenui, diaphana, substriata, fulva vel brunneo-violacea, et irregulariter maculis fuscis ornata; spira elevata; apice obtuso; anfr. 5, ultimo magno; apertura ovali, elongata, obliqua, rubra; columella recta, acuta; labro tenui, subreflexo. — Long. 62, lat. 25 mill. (Orb. l. c.)

47. B. succinoides Petit.

T. imperforata, oblongo-ovata, tenuis, subtilissime granulata, fulva, flammis lutescentibus obliquis, fasciaque suturali castanea interrupta ornata; spira brevis, acutiuscula; anfr. 4 convexiusculi, ultimus $^2/_3$ longitudinis aequans; columella tenuis, arcuata; apertura amplissima, intus livido-fusca; perist. expansum, breviter reflexum. (Coll. Nr. 29.) — Long. 39, diam. 19 mill. Ap. 31 mill. longa, 18 lata. (Mus. Cuming. spec. max.)

Bulimus succinoides Petit in Revue zool. 1840. p. 75.
— — *Petit* in Guérin mag. 1841. t. 31.
Succinea bulimoides Pfr. Symb. II. p. 131.

Habitat ad Santa Fe di Bogota.

Obs. Conf. Bul. Loveni Nr. 66, coloratus Nr. 119, glandiformis Nr. 121, nucleus Nr. 122 et Veranyi Nr. 123.

48. B. quadricolor Pfr.

T. imperforata, succineaeformis, tenuis, striatula, lutea, strigis obliquis fulguratis confertis castaneis, nonnullisque latioribus stramineis, antrorsum serratis, infra medium evanescentibus, picta; spira conica, obtusiuscula; anfr. 4 subplani, ultimus parum convexus, $^2/_3$ longitudinis subaequans; columella filaris; perist. undique brevissime expansum, roseum, marginibus callo tenuissimo junctis. — Long. $30^1/_2$, diam. 14 mill. Ap. 21 mill. longa, medio 11 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus quadricolor Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 4.

Habitat in provincia Merida Novae Granadae, prope Chachopo (Funck).

§. 4.

49. B. Valenciennesii Pfr.

T. imperforata, ovata, solida, saturate fusca, strigis pallide flavis angulatis fulgurata; sutura profunda; anfr. 6 convexi, summi distanter costati, dein granulati, ultimus ventrosus, lineis elevatis obsolete longitudinalibus et transversis subreticulatus, spiram superans; columella vix intorta; apertura lata, ovalis, intus livida; perist. incrassatum, nitide album, subreflexum, marginibus callo albo, superne tuberculoso junctis, dextro arcuato. — Long. 140, diam. 80 mill. Ap. 78 mill. longa, medio intus 42 lata. (Coll. v. d. Busch.) — Long. 120, diam. 70 mill. Ap. 70 mill. longa, 40 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Valenciennesii Pfr. Symb. II. p. 52.
— — *Phil.* Icon. II. 13. p. 123. Bul. t. 5. f. 1.

Bulimus fulguratus Valenc. in Mus. Paris.
— — *Beck* ind. p. 53 N. 24.

Habitat in Brasiliae regionibus interioribus.

50. B. maximus Sowerby.

T. imperforata, ovato-elongata, solida, epidermide fusca induta; anfr. 6 convexiusculi, summi longitudinaliter confertim costulati, penultimus granulatus, ultimus spira multo brevior, irregulariter striatus et malleatus; columella subrecta; apertura ovalis; perist. crassum, breviter reflexum, flavescenti-album. — Long. 145, diam. 80 mill. Ap. intus 70 mill. longa, 40 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 30.)

Bulimus maximus Sow. in cat. coll. Tank. 1825.
— *kremnoicus Orb.* voy. p. 300. t. 35. f. 1—3.
— — *Beck* ind. p. 52. N. 12.
Bulinus maximus Sow. Conch. Ill. f. 63.
Helix kremnoica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 15.*)

β. Minor, tenuior, lineis spiralibus undique obsolete notatus, perist. vix incrassato. — Long. 98, diam. 52 mill. Ap. 47 mill. longa, 27 lata. (Mus. Cum.)

Habitat prope Yuracares Boliviae (Orbigny, Bridges).

51. B. ovatus (Helix) Müller.

T. subimperforata, ovata, ventricosa, irregulariter striato-rugosa et malleata, fulva, castaneo-strigata, apice purpurascens; anfr. 6 convexiusculi, summi remote costati, ultimus ventrosus, $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella basi subdentata, alba; apertura oblonga, basi dilatata, intus nitide lactea; perist. incrassatum, breviter expansum et reflexum, roseum, marginibus callo diffuso, crassiusculo, lacteo junctis, dextro strictiusculo, columellari brevi, valde dilatato, appresso. — Long. 130, diam. 73 mill. Ap. intus 73 mill. longa, medio 32 lata. (Coll. Nr. 31. Spec. max.)

Helix ovata Müll. verm. II. p. 85. N. 283.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 410. Hist. t. 146. t. 147. (c. anim.)
— *ovalis Gmel.* p. 3637. N. 86.
Bulla ovata Chemn. IX. P. 2. p. 128. t. 119. f. 1021. 22.
Bulimus ovatus Brug. Enc. méth. I. p. 318. N. 33.
— — *Lam.* 1. p. 116. ed. Dh. p. 221.
— — *Beck* ind. p. 53. N. 22.
— — *Küster* p. 4. t. 1. f. 1. 2.
— *haemastomus Swains.* Malac. p. 178. f. 26.

*) T. elongata ventricosa, crassa, laevigata vel striata, minutissime granulosa, fusco-rubescente, lineis fasciatis ornata; spira inflata; apice striato; anfr. 7; apertura elongata, peristomata, albida; labro crasso. — Long. 12, lat. 7 cent — Affinis ovata Linn. et christiana Fér. (Orb. l. c.)

Strophocheilus haemastomus Spix test. bras. t. 11. f. 1.

β. Juvenis:

Bulimus terrestris Spix test. bras. t. 6. f. 1.

— *corrugatus Wagn.* ibid. p. 5.

Habitat in Brasilia, prope Bahia, etc.

Obs. Variat rarior peristomate albo.

52. B. proximus Sowerby.

T. imperforata, globoso-ovata, fusca, ad suturam fascia pallida circumdata; anfr. 6—7 convexiusculi, summi costulati, sequentes minutissime granulosi, ultimus $^7/_{12}$ longitudinis subaequans, tumidus, leviter malleatus; columella vix plicata; apertura acuto-ovalis; perist. album, subincrassatum, reflexiusculum, marginibus callo crassiusculo junctis, dextro arcuato, columellari vix dilatato, appresso. — Long. 108, diam. 62 mill. Ap. intus 62 mill. longa, 33 lata. (Coll. Nr. 32.)

Bulinus proximus Sow. Conch. Ill. f. 102.

Habitat . . . ?

Obs. Constanter distingui potest a B. ovato praeter peristoma album forma ad globosam magis accedente, columella simplice et margine dextro arcuato.

53. B. Popelairianus Nyst. †

T. maxima, crassa, ovato-oblonga, ventricosa, subcompressa, subperforata, longitudinaliter striato-rugosa, fusca; anfr. 6 convexi, rapide crescentes, 3 supremi plicati, quartus et quintus transversim granulosi, ultimus obliquus, nitidus; sutura albo-marginata; apertura ovalis, intus albida, superne subedentula; columella et labrum alba, crassa, reflexa. — Long. 150, diam. 85 mill. (N.) — Ap. 80 mill. longa, 50 lata. (ex ic.)

Bulimus Popelairianus Nyst in Bull. Brux. XII. Extr. p. 10. t. 4. f. 5.

Habitat in America meridionali.

Obs. An forte B. proximi var. major?

54. B. cantagallanus (Helix) Rang. †

T. ovata, ventricosa, compressa, crassa, exile atque longitudinaliter striata, antice fulva, postice castanea, apice obtusa. albida; anfractus ultimus magnus, obliquus, postice transversim striatus; suturae fascia albida marginatae; apertura ovalis, intus alba, columella labroque albis, crassis, reflexis. (Rang.) — Long. 103, diam. 70 mill. (Orb.)

Helix cantagallana Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 50

— — *Orb.* synops. p. 15.

Bulimus cantagallanus Beck ind. p. 53. N. 20.

Bulimus cantagallanus Lam. ed. Dh. 35. p. 238.
— — *Orb.* voy. p. 300.

Habitat in Brasilia.

Obs. An var. B. ovati? (Desh.)

55. B. oblongus (Helix) Müller.

T. subimperforata, ovato-oblonga, subpellucida, magis minusve ruguloso-striata, albido-fulva, ad suturam albo-fasciata; anfr. 6 convexiusculi, summi regulariter et confertim costulato-striati, ultimus spiram paulo superans, laeviusculus vel subrugulosus; columella subrecta, rosea; apertura oblongo-ovalis, intus albida; perist. incrassatum, breviter reflexum, roseum, marginibus callo diffuso, roseo junctis, dextro arcuato, columellari late reflexo, appresso. — Long. 100, diam. 52 mill. Ap. 55 mill. longa, medio 26—27 lata. (Coll. Nr. 33.)

Helix oblonga Müll. verm. II. p. 86. N. 284.
— — *Born* test. p. 381. t. 15. f. 21. 22.
— — *Gmel.* p. 3637. N. 87.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 931. N. 103.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 411.
— *serpentina Molina* sagg. sulla stor. nat. del Chile 1782. p. 205. 348.
Bulla oblonga Chemn. IX. P. 2. p. 30. t. 119. f. 1022. 23.
Turbo haemastomus Gmel. p. 3597. N. 38.
Bulimus oblongus Brug. Enc. méth. I. p. 318. N. 34.
— — *Beck* ind. p. 52. N. 17.
— *roseus Montf.* p. 259. t. 65.
— *haemastomus Scop.* delic. flor. et faun. Insubr. p. 67. t. 25. f. 1. 2.
— — *Leach* Zool. Misc. I. t. 29. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 11. t. 4. f. 3.
— — *Lam.* 2. p. 117. ed. Dh. p. 222.
— — *Guild.* in Zool. Journ. II. p. 440. t. suppl. 16 bis. f. 1—4.
— — *Küster* Bul. p. 5. t. 1. f. 3. 4.

β. T. crassa, ponderosa, fulvida, distincte rugoso-striata; columella crassa et peristomate incrassato, late reflexo saturate roseis.

γ. Testa crassa, alba, apice obtusiuscula, rugosa, anfractu penultimo subgibbo, apertura parvula, columella et peristomate incrassatis, roseis. — Long. 76, diam. 43 mill. Ap. intus 36 mill. longa, 19 lata. (Spec.)
Bulimus haemastomus var. Sow. Conch. Ill. f. 101. 103. sinistr.
Bulimus oblongus var. Orb. voy. t. 37. f. 1.

δ. Minor: long. 54, diam. 34 mill. Ap. intus 33 mill. longa, 18 lata.
Bulimus haemastomus var. Sow. Conch. Ill. f. 103.

ε. Juvenilis:

Helix semilineata Menke syn. ed. I. p. 75.

Habitat in Guyana (Lam.), Paraguay, Bolivia (Orb.); var. γ in republica Argentina (Petit de la Saussaie).

Obs. 1. Var. γ habitu a forma typica valde differt; at varietates β et δ transitum formare videntur.

Obs. 2. Cl. Menke (syn. ed. II. p. 25.) Ampullariam roseam Spix huc refert, quam potius statum juvenilem Bul. planidentis esse suspicor.

56. B. Bronni Pfr.

T. imperforata, elliptico-ovata, tenuiuscula, striata, eleganter granulata, inter granulos sub lente angustissime reticulata, olivaceo-castanea, strigis nonnullis saturatioribus variegata; spira oblique conica, obtusiuscula; anfr. 5, supremi convexiusculi, remote et valide costati, ultimus convexior, $^3/_5$ longitudinis subaequans; columella tenuis, leviter arcuata, superne obsolete plicata; apertura oblongo-ovalis, intus livido-margaritacea; perist. breviter expansum, reflexiusculum, roseum, marginibus callo nitido, diffuso, albido junctis, dextro leviter arcuato. — Long. 90, diam. 43 mill. Ap. 55 mill. longa, intus media 26 lata. (Coll. Nr. 34.)

Bulimus Bronni Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 31.

Helix ovata var. Fér. hist. t. 145 B. f. 2.

β. Paulo minor, anfractu ultimo vix granulato, potius malleato-impresso.

Habitat in Brasilia.

Obs. Differt a B. ovato, cui proxime affinis, sculptura, peristomatis margine dextro arcuato (in illo strictiusculo), etc. — Specimina juniora facillime distinguuntur spira producta, elongata, in pullis B. ovati semper brevi, obtusa. — Beck figuram Ferussacianam citatam ad sequentis varietatem refert.

57. B. granulosus (Helix) Rang.

T. imperforata, oblongo-ovata, compressa, solidiuscula, striis incrementi confertis et lineis concentricis minutissime decussato-granulata, rubenti-fusca, epidermide olivaceo-cornea induta; spira conoidea, apice obtusa; anfr. 5 convexi, supremi costati, ultimus peroblique descendens, spiram paulo superans; columella complanata, plicato-torta, rosea; apertura ovalis, superne angustata, angulata, intus margaritacea; perist. incrassatum, breviter reflexum, roseum. — Long. 94, diam. 44 mill. Ap. intus 48 mill. longa, medio 22 lata. (Coll. Nr. 35.)

Helix granulosa Rang in Ann. d. sc. nat. XXIV. p. 53. t. 2.

— *oblonga Fér.* hist. t. 145 B. f. 1.

Bulimus granulosus Beck ind. p. 53. N. 18.

— — *Lam.* ed. Dh. 36. p. 238.

Bulimus haemastomus Lesson Cent. zool. 77.
— — *granulosus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 143.

Habitat in Brasilia.

Obs. Figura Ferussaciana citata evidenter ad hanc speciem, neque ad B. oblongum referenda est.

58. B. leucostomus Sowerby. †

T. ovata, ventricosa, antice latior, postice obtusa; anfr. 4' primi longitudinaliter subsulcati, ultimus maximus, laevis, omnes olivaceo-fusci; sutura pallidior, crenulata; apertura oblonga, postice acuminata; peritrema reflexum, album — Long. 2,6, lat. 1,4 poll. (Sow.)

Bulinus leucostoma Sow. in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 30.
— — *Müll.* synops. p. 30.
— — *Beck* ind. p. 53. N. 19.

Habitat in Peruviae provincia Xagua.

Obs. Cl. Gray arbitratur, hanc speciem esse B. granulosum Rang.

59. B. Santa-Cruzii Orbigny.

T. subimperforata, oblongo-ovata, tenuiuscula, sublaevigata vel obsolete rugoso-striata, fuscula, ad suturam pallide fasciata; spira conica, acutiuscula, purpurascenti-fusca; anfr. 6, supremi planulati, subremote plicati, penultimus convexior, ultimus antice subascendens, spiram subaequans; columella superne obsolete plicata; apertura oblongo-ovalis, intus albida; perist. incrassatum, breviter reflexum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, subappresso. — Long. 92, diam. 50 mill. Ap. intus 47 mill. longa, medio 23 lata. (Coll. Philippian. spec. Orb.)

Helix Santa Cruzii (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 15. *)
Bulimus Santa Cruzii Orb. voy. p. 302. t. 38. f. 1. 2.
— *St. Crucis Beck* ind. p. 52. N. 10.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

Obs. Specimen ab auctore ipso amico Philippi missum varietatibus B. oblongi adnumerandum mihi videtur.

60. B. Moritzianus Pfr.

T. imperforata, oblongo-ovata, ruditer malleata, sub epidermide olivaceo-fusca castaneo-strigata et marmorata; spira conica, apice plerumque detrita; anfr. 6 vix convexiusculi, supremi sublaevigati, ultimus ventrosior, $^4/_7$ longitudinis subaequans; colu-

*) T. elongata, subventricosa, tenui, laevigata vel substriata, brunnea; spira obtusa, apice striato fusco-purpurascente; anfr. 7; apertura albida, peristomata. — Long. 9, lat. 5 centim. (Orb. l. c.) — Long. 88, diam. 43 mill. Ap. 48 mill. longa, 21 lata. (ex ic.)

mella recedens, superne plicata; apertura oblongo-semiovalis, intus livida, nitida; perist. incrassatum, breviter expansum, fusco-aurantium, marginibus callo nitido junctis, dextro leviter arcuato, columellari brevi, superne dilatato-reflexo, undique adnato. — Long. 96, diam. 45 mill. Apert. 57 mill. longa, intus medio 21 lata. (Coll. Nr. 36.)

Bulimus Moritzianus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 66.

β. Major, gracilior: long. 120, diam. 50 mill. Ap. 64 mill. longa, intus 26 lata. (Mus. Cuming.)

γ. Minor, ovatus, anfr. 5, ultimo fere $^2/_3$ longitudinis aequante: long. 78, diam. 38 mill. Ap. 51 mill. longa, intus medio 20 lata. (Mus Berol.)

δ. Peristomate vix expansiusculo, incrassato, livido. (Mus. Cuming.)

ε. Minimus, crassus, ovatus, anfr. 5, ultimo $^3/_5$ longitudinis aequante, apertura latiore, margine columellari angustius reflexo, basi non recedente: long. 57, diam. 29 mill. Ap. 36 mill. longa, intus medio 17 lata. (Mus. Gruner.)

Habitat prope Caraccas (Moritz) et in Nova Granada (Funck), var. β in prov. Pamplona, var. δ in prov. Truzilla Novae Granadae.

Obs. Species statura, forma et coloribus pervariabilis, affinis B. pardali (conf. Nr. 93.), sed semper imperforata. Varietas ε habitu ad B. coloratum Nyst accedit, sed formis intermediis cum reliquis juncta est.

61. B. Mahogani Sowerby.

T. imperforata, oblongo-ovata, apice obtusa, saturate brunnea, lineis impresso-punctatis circumdata; anfr. 5 convexiusculi, supremi infra suturam foveolati, ultimus peroblique descendens, spiram superans; columella lata, alba, oblique subrecedens; apertura ovalis, supra acuminata, intus lilacea; perist. vix expansum, incrassatum, album. — Long. 72, diam. 35 mill. Ap. intus 35 mill. longa, medio 17 lata. (Coll. Nr. 37.)

Bulimus Mahogani Sow. Conch. Ill. f. 59.
Bulimus Mahogani Pfr. Symb. I. p. 42.
— — *Küster* p. 40. t. 13. f. 1. 2.

Habitat in Chile (Philippi).

Obs. Conf. Bul. Milleri Nr. 107.

62. B. macrostomus Pfr.

T. imperforata, ovata, solidiuscula, rufo-nigricans, apice pallidior, epidermide hydrophana, fusca induta, lineis nigris circumdata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella verticalis, dilatata, medio subincrassata; apertura lata, lunato-ovalis, intus alba; perist. expansum, subincrassatum, intus saturate fuscum, margine dextro valde arcuato. — R. a. = 3 : 5.

— Long. 61, diam. 39 mill. Ap. 38 mill. longa, 31 lata. (Coll. Nr. 38.)

Bulimus macrostomus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 152.

β. Anfractu ultimo medio bifasciato, fascia superiore angusta, nigra, altera adnata, latiore, albida. — Long. 68, diam. 45 mill.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

63. B. Matthewsii Orbigny. †

T. ovoidea, inflata, crassa, laevigata vel substriata, fusca, apice obtuso, purpurescente profunde striato; anfr. 6; sutura albicans; apertura ovalis, peristomata; labrum crassum. — Long. 65, latit. 35 mill. (O.) — Long. 65, diam. 31 mill. Ap. 38 mill. longa, 17 lata. (ex ic.)

Helix Mathiusii (Cochlogena) *Orb.* synops. p. 16.

Bulimus Mathiusii Orb. voy. p. 303. t. 38. f. 3. 4.

— *Matthewsii Beck* ind. p. 53. N. 21.

Habitat in republica Peruviana.

Obs. An H. ovata var. labro candido Rang Ann. sc. nat. 1831? (Beck l. c.)

64. B. auritus Sowerby. †

T. imperforata, ovata, solida, fusca, striis longitudinalibus saturatioribus ornata; anfr. 6 convexi, rapide accrescentes, ultimus spira brevior; columella subrecta, alba; apertura auriformis; perist. incrassatum, album, margine dextro introrsum prominente. — Long. 76, diam. 40 mill. Ap. 40 mill. longa, 16 lata. (ex ic.)

Bulimus auritus Sow. Conch. Ill. f. 76.

Habitat prope Bahia.

65. B. fulminans Nyst.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuiuscula, longitudinaliter rugoso-striata, plicisque obliquis undulatis granosa, rufo-fusca, strigis nigris, distantibus, fulminantibus ornata; spira conica, acuta; anfr. 5 planiusculi, ultimus magnus, peroblique descendens, antice $^3/_5$ longitudinis subaequans; sutura subcrispa, albo-marginata; columella oblique plicata; apertura oblongo-ovalis, intus saturate plumbea; perist. incrassatum, expansum et reflexum, saturate fuscum, marginibus lamina callosa, nitida junctis, columellari dilatato, appresso. — Long. 59, diam. 26 mill. Ap. intus 28 mill. longa, medio 13 lata. (Coll. Nr. 39.)

Bulimus fulminans Nyst in Bull. Liège I. 1843. p. 1. t. 7. f. 1.

— *bellulus Jonas* in Zeitschr. f. Malak. 1844. März p. 36.

— — *Phil.* Icon. II. 9. p. 9. Bul. t. 3. f. 3.

— — *Jonas* Mollusk. Beitr. p. 25. t. 11. f. 18.

β. Minor, fusco-luteus, strigis fulminantibus castaneis, perist. pallide lutescente. — Long. 50, diam. 23 mill. (Spec.)

Habitat in reipublicae Venezuelae provincia Cumana.

Obs. 1. Testae juveniles tenuissimae sunt, fere papyraceae.
Obs. 2. Conf. Bul. Blainvilleanus Nr. 109.

66. B. Lovéni Pfr.

T. imperforata, ovata, tenuis, longitudinaliter plicata, fusco-lutea, strigis castaneis fulguratis elegantissime picta; spira conica, obtusa, apice subimpressa; anfr. 4½ vix convexiusculi, supremi castanei, penultimus inter plicas subtilissime transverse striatus, ultimus subtiliter malleatus, 1/7 longitudinis aequans; columella castanea, superne leviter plicata; apertura oblongo-ovalis, subconcolor; perist. nigro-castaneum, undique expansum et reflexum, margine columellari superne dilatato, appresso. — Long. 42, diam. 20 mill. Ap. 25 mill. longa, intus medio 11 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Lovéni Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 6.

Habitat in Venezuela; in colonia Tovar legit D. Dyson.

* * *

67. B. uber Pfr.

T. imperforata, ovata, apice obtusa, tenuis, subdiaphana, lutescenti-albida, oblique regulariter et confertim striata; spira semiglobosa; sutura impressa, albo-marginata; anfr. 4 inflati, ultimus spiram superans; columella subrecta, prope basin subincrassata; apertura ovalis; perist. simplex, late expansum. — R. a. = 1 : 2. — Long. 45, diam. 29 mill. Ap. 29 mill. longa. 18 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus uber Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 153.

Habitat in insula Guimaras Philippinarum.

68. B. leopardus Pfr.

T. imperforata, ovata, solidiuscula, longitudinaliter confertim costulato-striata, fulva, strigis et maculis albidis epidermidis hydrophanae eleganter variegata; spira brevis, conoidea, sursum pellucens; anfr. 5 convexi, rapide accrescentes, ultimus spiram superans; columella elongata, introrsum acuta; apertura amplissima, rotundato-ovalis, intus alba; perist. late expansum, reflexiusculum, castaneo-limbatum. — Long. 47, diam. 30 mill. Ap. 30 mill. longa, 22 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus leopardus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 67.

Habitat in insulis Philippinis.

69. B. effusus Pfr.

T. imperforata, ovata, solidiuscula, oblique minutissime striata, nitida, alba; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spiram vix aequans; columella obliqua, dilatata; apertura perobliqua, lunato-ovalis; perist. simplex, valde expansum. — R. a. = 5 : 9. — Long. 44, diam. 27 mill. Ap. 25 mill. longa, intus 15 lata. (Coll. Nr. 40.)

Bulimus effusus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 152.

β. Minor, anfractu ultimo interdum subtus fascia 1 fulva ornato: long. 39, diam. 28 mill.

γ. Major, anfractu ultimo fasciis 4 angustis, castaneis ornato: long. 42, diam. 27 mill

Bulimus effusus var. Phil. Icon. II. 14. p. 154. Bul. t. 6. f. 8.

Habitat in insula Tablas Philippinarum (Cuming).

Obs. Species typica forma accedit ad Bul. Cumingi (Nr. 25.), saepe autem spira magis elongata faciem praebet B. ventricosi (Nr. 78.) varietatum nonnullarum.

70. B. Aegle Broderip.

T. imperforata, solida, rugoso-striata, fulva, saturatius bifasciata; spira brevis, conica, subacuta; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella verticalis, recta; apertura oblongo-ovalis, intus rubescenti-albida; perist. fusco-nigricans, expansum, vix reflexiusculum. — Long. 47, diam. 38 mill. Ap. 38 mill. longa, intus medio 15 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Aegle Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 181.

Habitat in insula Mindanao (Cuming).

* * *

71. B. Guerini Pfr.

T. imperforata, oblongo-ovata, tenuiuscula, irregulariter rugoso-striata, fulvo-fusca; spira conica, obtusa, pallidior, strigis et maculis rufis ornata; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spira paulo longior; columella lutescens, arcuata, superne subtorta; apertura acuto-ovalis, intus nitidissima, plumbea; perist. breviter reflexum, lutescens, basi cum columella angulum indistinctum formans. — Long. 41, diam. 18½ mill. Ap. 23 mill. longa, medio 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Guerini Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 40.

Habitat in Nova Granada.

Obs. Primo aspectu similis Bulimo Goudoti Nr. 442.

§. 5.

72. B. Crichtoni Broderip.

T. imperforata, ovato-turrita, apice obtusata, longitudinaliter valide costato-plicata, flavida, sordide viridi variegata; anfr. 6 convexiusculi; ultimus spiram subaequans; columella subtorta, verticalis; apertura oblonga, basi sinuoso-effusa, intus rubescens; perist. incrassatum, late expansum, roseum, marginibus callo lato, saturate roseo junctis, columellari basi recedente, quasi truncato. — Long. 70, diam. 29 mill. Ap. intus 30 mill. longa, 12 lata. (Spec. unicum Mus. Brit.)

Bulinus Crichtoni Brod. in Proc. Zool. Soc. 1836. p. 44. *)

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 60.

Bulimus Crichtoni Reeve Conch. syst. II. t. 173. f. 4.

Habitat ad Ambo juxta Huanuco Peruviae (Crichton).

* * *

73. B. lacunosus Orbigny.

T. imperforata, oblongo-acuta, solidula, striata et undique punctato-granulata, brunnea, ad suturam pallide fasciata; anfr. 6, supremi distincte costulati, omnes vix convexi, ultimus spiram aequans; columella vix torta; apertura oblongo-ovalis; perist. incrassatum, breviter reflexum, album, marginibus subparallelis. — Long. 87, diam. 38 mill. Ap. 45 mill. longa, 20 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 41.)

Helix lacunosa (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 15.**)

Bulimus lacunosus Orb. voy. p. 302. t. 38. f. 5. 6.

— — *Beck* ind. p. 52. N. 11.

Habitat in Bolivia, prope Tutulima prov. Cochabambacensi.

74. B. solidus Pfr.

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, oblique striata, saturate rufa, epidermide fusco-alba irregulariter strigata; spira conica, sursum pallescens; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella recta, basi subintorta; apertura auriformis, lateraliter subeffusa, intus albida; perist. crassiusculum, breviter expansum, intus rufo-nigricans, marginibus callo lato, tenui

---

*) T. fusiformi, longitudinaliter costata et corrugata, costis rugisque validis, subalbida, maculis spadiceis notata; labio rosaceo-violaceo, labro pallidiore, expanso, subreflexo. — Long. 3 (circiter), lat. 1 1/8 poll. (Brod. l. c.)

**) T. elongatissima, crassa, transversim minutissime granulosa, brunneo-rufa, lineis fasciatis longitudinaliter ornata; spira acuminata, apice obtuso, striato; anfr. 6; apertura elongata, albida, peristomata. — Long. 8 1/2, lat. 4 cent. (Orb. l. c.)

junctis. — R. a. = 4 : 7. — Long. 84, diam. 40 mill. Ap. 41 mill. longa, medio 25 lata. (Coll. Nr. 42.)

Bulimus solidus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 152.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 51.

β. Testa magis inflata, anfractu ultimo medio albo-fasciato. — Long. 78, diam. 45 mill.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

75. B. iostomus Sowerby.

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, laeviuscula, alba, maculis minutis et strigis parcis rufis vel griseo-violacescentibus ornata; sutura valide crenulata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella superne valde uniplicata, lilacea; apertura irregulariter oblonga, intus nitide alba; perist. incrassatum, reflexum, violaceum, marginibus callo tenui, ventri anfractus penultimi saturate castaneo imposito junctis, dextro repando, columellari strictiusculo, dilatato, appresso. — Long. 68, diam. 33 mill. Ap. intus 33 mill. longa, medio 17 lata. (Coll. Nr. 43.)

Bulimus iostoma Sow. Zool. Journ. I. (1824.) p. 58. t. 5. f. 1.
— *phasianella Val.* in Humb. obs. zool. II. 1833. p. 244. t. 55. f. 4.
— *phasianellus Lam.* ed Dh. 79. p. 259.
— *yostomus Villa* disp. syst. p. 20.
Helix phasianella (Cochlostyla) *Fér.* pr 336.
— — *Orb.* synops. p. 7.
Pachyotus iostoma Beck ind. p. 56. N. 5.

Habitat in Chile et Peru; Guayaquil (Orbigny).

Obs. Habitu universali huic speciei peraffinis apparet B. atricallosus Gould, inter varietates Bul. perversi L. (Nr. 95.) a me enumeratus, nec non aliae ejusdem speciei varietates imperforatae.

76. B. smaragdinus Reeve.

T. imperforata, ovato-oblonga, regulariter striata, nitida; sutura late albo-marginata; anfr. 6 convexiusculi, supremi atro-purpurei, dein rosei et virescentes, ultimus saturate smaragdinus, spira paulo brevior; columella recta, planata, introrsum subdilatata, alba; apertura ovalis; perist. breviter reflexum, album. — Long. 60, diam. 31 mill. Ap. intus 31 mill. longa, 20 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus smaragdinus Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 49.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 173. f. 6.

Habitat in insula Mindanao.

Obs. Variat apice albo, anfractu ultimo magis luteo-virente, interdum spiram aequante, et peristomate roseo.

77. B. nimbosus Broderip.

T. imperforata, ovato-pyramidata, solidula, oblique striata, haud nitens, fulva vel cinnamomea, epidermide cinerascente varie strigata et flammulata, apice rubello-fusca; sutura profunda; anfr. 6½ convexi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; columella subrecta, vix arcuata, angusta; apertura lunato-ovalis, intus alba; perist. vix incrassatum, parum expansum, brunneo-marginatum. — Long. 70, diam. 37 mill. Ap. intus 29 mill. longa, 21 lata. (Coll. Nr. 44.)

Bulinus nimbosus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 121.
Bulimus nimbosus Pfr. Symb. II. p. 48.

Habitat in insulis Negros et Panay Philippinarum (Cuming).

Obs. Varietates coloris conf. Brod. l. c.

78. B. ventricosus (Bulla) Chemnitz.

T. imperforata, ovato-conica, solidiuscula, laevigata, pallide fulva, fasciis saturatioribus et epidermide hydrophana, tenui, strigas fulminantes albidas hinc inde formante ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spira multo brevior; columella medio magis minusve subtruncato-torta; apertura obliqua, ovalis, intus lactea; perist. subincrassatum, breviter expansum, margine columellari vix dilatato. — Long. 58, diam. 30 mill. Ap. intus 25 mill. longa, 16 lata. (Coll. Nr. 45.)

Bulla ventricosa Chemn. IX. P. 2. p. 1. 16. t. 117. f. 1007. 8.
— *fasciata* ε *Gmel.* p. 3430. N. 25.
Bulimus ventricosus Brug. Enc. méth. I. p. 365. N. 108.
— — *Küster* t. 7. f. 10. 11.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 88.
— — *Phil.* Icon. III. 18. p. 31. Bul. t. 7. f. 9.
Helix ventricosa (Cochlostyla) *Fér.* pr. 325. Hist. t. 110. f. 4.
Orthostylus ventricosus Beck ind. p. 49. N. 4.
Bulinus fulgetrum var. Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 120.

β. Unicolor fulvescens:
Helix frater (Cochlostyla) *Fér.* pr. 326. Hist. t. 112. f. 1. 2.
Bulimus frater Pfr. Symb. II. p. 114.
— *ventricosus var. Phil.* Icon. III. 18. p. 31. t. 7. f. 1.

γ. Fasciatus, absque epidermide hydrophana:
Helix decorata (Cochlostyla) *Fér.* pr. 327. Hist. t. 112. f. 3. 4.
Bulimus decoratus Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
— *Guimarasensis Pfr.* Symb. II. p. 46.
ventricosus var. Phil. Icon. III. 18. t. 7. f. 5. 6.
Orthostylus decoratus Beck ind. p. 49. N. 7. (excl. synon.)
Bulinus Guimarasensis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 156.

δ. Elongatus, anfr. 6, ultimo lutescenti-olivaceo, reliquis albidis, omnibus fasciis 2 rufo-nigricantibus ornatus. (Mus Cuming. Rariss.)

ε Minor: long. 46, diam. 23 mill. Ap. intus 20 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus aplomorphus Jonas in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 189.

— — *Jonas* in Phil. Icon. II. 14. p. 153. Bul. t. 6. f. 1.

Habitat in insulis Philippinis, γ Guimaras, δ Negros (Cuming).

Obs. 1. Variat columella vix torta, leviter arcuata.

Obs. 2. Huic similes sunt formae nonnullae Bul. effusi Nr. 69, nec non luzonici Nr. 86.

79. **B. fulgetrum Broderip.**

T. imperforata, ovato-pyramidata, tenuiuscula, nitida, lutea vel cinnamomeo-fulvescens, epidermide alba varie strigata et fulgurata; anfr. 5½ subconvexi, ultimus parum convexus, spiram subaequans; sutura levis; columella subrecta, basi sinuosa; apertura ovalis, intus nitidissime lactea; perist. vix incrassatum, expansum, candidum. — R. a. = 8 : 13. — Long. 57, diam. 30 mill. Ap. intus 29 mill. longa, 17 lata. (Coll. Nr. 46.)

Bulinus fulgetrum Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 119.

Bulimus fulgetrum Deless. recueil t. 39. f. 6—10.

— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 172. f. 4.

— — *Pfr.* Symb. II. p. 46.

Habitat in insulis Philippinis: Guimaras, Negros, Panay (Cuming).

Obs. Varietates 10 a Cl. Broderip l. c. enumeratae sunt; varietates autem i et k excludendae et ad B. ventricosum referendae sunt.

80. **B. velatus Broderip.**

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, flavescens, fasciis 2 et area basali rufis ornata, epidermide hydrophana, albida velata; spira conica, apice obtusa; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^4/_7$ longitudinis subaequans; columella subrecta, vix dilatata, roseo-albida; apertura ovalis, intus lactea; perist. subincrassatum, breviter reflexum, fusco-marginatum. — Long. 44, diam. 21 mill. Ap. 21 mill. longa, 12 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus velatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 15.

Habitat in insula Camote Philippinarum (Cuming).

81. **B. pictor Broderip.**

T. imperforata, conico-ovata, tenuis, castanea, cinnamomea, fulva vel lutescens, epidermide alba fere omnino obducta vel interrupte strigata et flammulata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira brevior; columella gracilis, strictiuscula, alba; apertura lunato-ovalis, basi subeffusa, intus lactea; perist. simplex, reflexiusculum, purpureo-nigricans. — R. a. = 3 : 5. — Long. 48—

49, diam. 26—29 mill. Ap. 24 mill. longa, 16 lata. (Spec. plur. Coll. Nr. 47.)

Bulinus pictor Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 120.
Bulimus pictor Deless. recueil t. 39. f. 11.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 49.
— *labropurpureus Grat.* Bord. XI. p. 418. t. 4. f. 4.

Habitat in insula Panay Philippinarum (Cuming).

Obs. Species pervariabilis et magnitudine et coloribus.

82. **B. dactylus Broderip.**

T. imperforata, oblongo-fusiformis, solida, fulva, basi rufa, epidermide hydrophana, fusco-cinerea denticulato-strigata; spira valde producta, apice acutiuscula; anfr. 7½ vix convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis aequans, infra medium angulatus; columella recta, verticalis; apertura semiovalis, intus livescens, infra medium latissima; perist. incrassatum, late expansum, reflexum, nigro-marginatum. — Long. 73, diam. 28 mill. Ap. 33 mill. longa, 18 lata. (Coll. Nr. 48.)

Bulinus dactylus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 158.
Bulimus carinatus Lea in Philad. tr. VII. p. 458. t. 11. f. 7.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

Obs. Variat carina distinctiore et 2 — 3 obtusioribus supra illam. (In Coll. Albers.)

83. **B. onyx Broderip.**

T. imperforata, oblongo-subfusiformis, solida, striata, rufa, epidermide hydrophana, fusco-cinerea variegata et fasciata, basi sub epidermide decidua, viridi alba; spira elongato-conica, apice obtusiuscula, pallida; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis vix superans, angulatus, basi attenuatus; columella subverticalis, torta, introrsum dilatata; apertura obliqua, semiovalis, intus alba; perist. late expansum, breviter reflexum, nigricans. — Long. 60, diam. 27 mill. Ap. 29 mill. longa, intus medio 16 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus Onyx Brod. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 34.

Habitat in insula Luzon (Cuming).

Obs. Differt a Bul. Alberti (N. 4) anfractu ultimo attenuato, apertura elongata, etc.

84. **B. Diana Broderip.**

T. imperforata, ovato-pyramidata, tenuiuscula, virenti-flava unicolor vel strigis albis rectiusculis vel fulguratis ornata, apice alba; sutura levis; anfr. 7 subplanulati, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans, subangulatus; columella alba, incrassata, recta;

apertura ovalis, intus nivea; perist. simplex, expansum, album, cum columella angulum magis minusve distinctum formans. — R. a. = 7 : 10. — Long. 53, diam. 22 mill. Ap. intus 21 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 49.)

Bulinus Diana Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 157.
Bulimus Diana Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 2.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 44.

Habitat in insula Negros Philippinarum (Cuming).

85. **B. balanoides Jonas.**

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, fulva, fasciis 3 rufis aequalibus et area basali viridi ornata, epidermide hydrophana fuscescente variegata; spira conica, apice obtusa, pallida; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella verticalis, alba, dilatata; apertura ovalis, intus lactea; perist. incrassatum, expansum, reflexum, margine dextro arcuato, fusco-marginato. — Long. 40, diam. 21 mill. Ap. 21 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus balanoides Jonas in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 188.
— — *Phil.* Icon. II. 14. p. 153. Bul. t. 6. f. 2.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum.

86. **B. luzonicus Sowerby.**

T. imperforata, ovato-oblonga, minutissime striata, nitida, alba vel fulvescens, fasciis fuscis vel castaneis 1—3 varie ornata; spira conoidea, obtusa; anfr. 5 planiusculi, ultimus spira brevior, basi attenuatus; columella subrecta; apertura obliqua, ovalis, nitide lactea, fasciis perlucentibus; perist. breviter expansum, subincrassatum, album. — Long. et diam. pervariabiles. (Coll. Nr. 50.)

Bulinus luzonicus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 28.
— *ovoideus Sow.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 99.
Bulimus ovoideus Lam. 11. p. 120. ed. Dh. p. 226.
— *leuzonicus Jay* catal. 1839. p. 56.

α. Testa unicolor, alba, apice fulvescens: long. 37, diam. 18 mill. Ap. 19 mill. longa, intus 9½ lata.
Bulinus ovoideus Sow. Conch. Ill. f. 104.

β. Fascia 1 angusta, fusca vel nigricante: long. 41, diam. 20 mill.
Bulinus luzonicus Sow. Conch. Ill. f. 53.
Bulimus ovoideus Grat. Bord. XI. p. 420. t. 2. f. 11.
— *Costerii Eydoux* in Guér. mag. t. 116. f. 2.
— *luzonicus var. Phil.* Icon. II. 14. Bul. t. 6. f. 3.
Lister synops. t. 13. f. 8!

γ. Fasciis 3 latis castaneis, subaequalibus: long. 44, diam. 22 mill. (Coll. Jonas.)

Bulimus luzonicus var. Phil. Icon. II. 14. Bul. t. 6. f. 5.

δ. Major, subelongatus, fasciis 3 castaneis, media angustiore: long. 49, diam. 23 mill. (Spec.)

ε. Fasciis 3 castaneis, 2 infimis latis, supera lineari vel deficiente: long. 43, diam. 24 mill. (Spec.)

Bulinus ovoideus var. Sow. Conch. Ill. f. 105.

Bulimus luzonicus var. Phil. Icon. III. 18. Bul. t. 7. f. 3.

ζ. Epidermide lutescente, fasciis 3 castaneis, infima latiore: long. 33, diam. 17 mill. (Spec.)

Bulimus luzonicus var. Phil. Icon. III. 18. t. 7. f. 11.

η. Subelongatus, fulvidus, medio saturatius fasciatus, fascia lata ad suturam areaque columellari albis, perist. latius expanso: long. 44, diam. 21 mill. Ap. intus 19 mill. longa, 11 lata. (Spec.)

Bulinus ovoideus var. Sow. Conch. Ill. f. 106.

Bulimus luzonicus var. Phil. Icon. III. 18. t. 7. f. 2. 7.

Habitat in insulis Luzon, Ticao, Masbate (Cuming).

Obs. Varietates nonnullas ex multis descripsi, sed nullo modo constantes, excepta forsan var. η. — Conf. B. ovoideus Brug. Nr. 110.

87. **B. euryzonus Pfr.**

T. imperforata, ovato-oblonga, solidiuscula, subtiliter striata, nitida, albida vel pallide lutescens, fasciis 3 latis, subaequalibus, nigricanti-castaneis ornata; spira convexo-conica, apice obtusa; anfr. 5½ vix convexi, ultimus spira paulo brevior; columella torta, introrsum convexa, alba; apertura obverse auriformis, intus alba, fasciis pellucentibus; perist. simplex, undique breviter expansum, album. — Long. 35, diam. 20 mill. Ap. 19 mill. longa, intus medio 9 lata. (Coll. Nr. 51. Spec. max.)

Bulimus euryzonus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 147.

— — *Phil.* Ic. III. 18. p. 32. Bul. t. 7. f. 10.

Bulinus ovoideus var. Sow. Conch. Ill. f. 107.

Habitat in insula Luzon.

88. **B. stabilis (Helix) Sowerby.**

T. imperforata, oviformis, utrinque attenuata, solida, laevis, nitida, basi castanea, apice alba, anfractibus intermediis superne albis, inferne castaneis; anfr. 7 plani, angusti, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella incrassata, alba, dilatata, obliqua; apertura perobliqua, lunato-ovalis: perist. crassum, expansum. — Long. 36, diam. 19 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 52.)

Helix stabilis Sow. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 104.

Bulimus stabilis Pfr. Symb. II. p. 51.

— — *Phil.* Ic. III. 18. p. 32. t. 7. f. 4.

Habitat in insula Temple Philippinarum (Cuming).

89. B. breviculus Pfr.

T. imperforata, subovata, apice obtusa, oblique obsolete striata, nitida, alba, epidermide lutescente decidua obducta; anfr. 6 angusti, convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella subrecta, in laminam tenuem expansa; apertura perobliqua, transverse semiovalis; perist. simplex, expansum. — Long. 28, diam. 18 mill. Ap. intus 13 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 53.)

Bulimus breviculus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 88.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 43.
— — *Phil.* Ic. III. 18. p. 33. t. 7. f. 8.

Habitat in insula Romblon Philippinarum (Cuming).

Obs. Differt a B. stabili forma abbreviata, anfractibus convexioribus et apertura.

* * *

90. B. linostoma Orbigny. †

T. elongata, ventricosa, haud umbilicata, tenuis, diaphana, laevigata vel transversaliter strigillata, albida et maculis obliquis fusco-violaceis irregulariter ornata; spira subelevata, apice obtuso; anfr. 6; apertura latissima, ovalis, obliqua, purpureo-fulgida vel rosea; columella inflata, torta; labrum latum, reflexum. — Long. 26—31 mill., latit. 12—14 mill. (O.) – Long. 31, diam. 12 mill. Ap. 16 mill. longa, 8 lata. (ex ic.)

Helix linostoma (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 19.
Bulimus linostoma Orb. voy. p. 314. t. 40. f. 9—11.
Bulimulus linostoma Beck ind. p. 63. N. 4.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

91. B. Pealianus Lea. †

T. ovato-conica, imperforata, laevis, nitida, cinerea, subcrassa, flammulis purpureis longitudinaliter picta; anfr. 6; apertura patula, purpurea; labrum acutum, reflexum. (Maculae frequentiores in anfractu penultimo, prope orificium nullae. Lea.) — Long. 31, diam. 10 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 8 lata. (ex ic.)

Bulimus Pealianus Lea obs. II. p. 65. t. 23. f. 105.

Habitat in Columbia.

Obs. Nonne eadem species ac praecedens?

92. B. Rocayanus Orbigny. †

T. elongata, pyramidalis, conica, imperforata, tenuis, diaphana, laevigata vel rugosa, albido-grisea, lineolis albis irregulariter longitudinalibus; spira elongata, apice acuto; anfr. 9; sutura profunda; apertura oblonga; columella contorta, acuta; labrum

tenue, acutum, subreflexum, intus albidum. — Long. 8, lat. 14 mill. (sic Orb.) — Long. 26, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (ex ic.)

Helix Rocayana (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 13.
Bulimus Rocayanus Orb. voy. p. 277. t. 33. f. 6. 7.
Bulimulus Rocayanus Beck ind. p. 67. N. 54.

Habitat in Boliviae prov. Sta Cruz de la Sierra.

§. 6.

93. B. pardalis (Helix) Férussac.

T. subperforata, ovato-oblonga, solidula, longitudinaliter striata et irregulariter malleata, corneo-lutescens, castaneo undatim strigata et maculata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram conicam subaequans; sutura subcrenulata, interdum marginata; columella leviter torto-plicata, alba; apertura oblongo-ovalis, intus livida; perist. subincrassatum, breviter reflexum, album vel nigricans. — Long. 90, diam. 40 mill. Ap. 47 mill. longa, 22 lata. (Coll. Nr. 54.)

Helix pardalis (Cochlostyla) *Fér.* pr. 332. Hist. t. 112. f. 7. 8.
Bulimus pardalis Pfr. Symb. III. p. 86.
— *astrapoides Jonas* in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 35.
— — *Phil.* Icon. I. 7. p. 157. Bul. t. 2. f. 3. 4.
— — *Jonas* Mollusk. Beitr. p. 23. t. 11. f. 17.
— *venezuelensis Nyst* in Bull. Brux. XII. N. 3. t. 1. f. 1.*)

β. Ventrosior, anfractu ultimo spiram superante:
Bulimus marmoratus Dunker in Phil. Icon. I. 7. p. 157. t. 2. f. 1. 2.

Habitat in provincia Cumana reipublicae Venezuelae (prope antrum Guacharos dictum).

Obs. 1. Species pervariabilis, cujus formam typicam ex specimine Musaei Cumingiani, iconi Ferussacianae maxime congruo, descripsi. — Spira anfractu ultimo paulo longior vel brevior, anfractus magis minusve convexi, sutura simplex vel marginata, perist. magis minusve incrassatum.

Obs. 2. Conf. Bul. Moritzianus Pfr. Nr. 60.

94. B. Funckii Nyst.

T. subperforata, ovato-elongata, subcrassa, spadicea, nitida; anfr. 6, summi planiusculi, striato-malleati, 2 ultimi convexi, ultimus spiram acutiusculam subaequans; sutura subcrispa, anguste albo-marginata; columella subrecta, dilatata; apertura ovalis,

*) T. ovato-oblonga, subventricosa, subperforata, solida, sublaevigata, rufa, apice obtusa; anfr. 6 tumidis, sutura undulata separatis; prioribus longitudinalibus striatis: ultimo spira breviore, flammulis longitudinalibus flexuosis notato, pallescente; apertura ovali, intus livida, labiis lamina callosa junctis; columella contorta; perist. crasso, reflexo, sordide albo. — Long. 98, lat. 45 mill. (Nyst l. c.)

intus nitide purpurascenti-livida; perist. crassum, late reflexum, fusco-aurantiacum, marginibus callo tenui, nitido junctis, dextro subsinuoso, columellari patente. — Long. 95, diam. 50 mill. Ap. intus 40 mill. longa, 19 lata. (Coll. Nr. 55.)

Bulimus Funckii Nyst in Bull. Liège I. 1843. p. 2. t. 7. f. 2.
— — *Phil.* Icon. II. 9. p. 9. Bul. t. 3. f. 1.
— *superbus Jonas* in Zeitschr. f. Malak. 1844. März p. 35.
— — *Jonas* Mollusk. Beitr. p. 24. t. 11. f. 16.

β. Peristomate albido, apertura intus livida.

Habitat in provincia Cumana Venezuelae.

Obs. Variat spira magis minusve elongata, gracili.

95. B. perversus (Helix) Linn.

T. subperforata (vel imperforata), ovato-oblonga, laevigata, unicolor vel varie strigata et maculata; spira conica, apice obtusiuscula; anfr. 6—7 convexiusculi, ultimus spiram subaequans, ventrosior; columella verticalis, strictiuscula; apertura elliptica, basi subangulata; perist. album, incrassatum, reflexum, margine columellari dilatato, magis minusve appresso. — Dimens. variabiles. (Coll. N. 56.)

A. Varietates callo aperturali concolore, sinistrorsae.

α. T. citrina, nitida, unicolore vel nigro-fusco irregulariter strigata: long. 41, diam. 18 mill. Ap. 20 mill. longa, medio 10 lata. (Spec.)

Helix perversa Linn. syst. ed. X. p. 772. N. 601.*) Ed. XII. N. 688. p. 1246.
— — *Chemn.* IX. P. 1. p. 95. t. 110. f. 928—31. t. 111. f. 934. 35.
— — *Gmel.* p. 3642. N. 94.
— *sinistra Müll.* verm. II. p. 90. N. 288.
— *aurea Dillw.* descr. cat. II. p. 936. N. 113.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 413. Hist. t. 148. f. 1. 2. 4. 6—9.
Limax aureus Martyn univ. Conch. III. t. 115. Ed. Chenu (Bibl. conch. II.) p. 28. t. 39. f. 2.
Bulimus citrinus Brug. Enc. méth. I. p. 313. N. 27.
— — *Lam.* 8. p. 119. ed. Dh. p. 224.
— — *Küster* t. 6. f. 4—7. t. 9. f. 1. 2.
Orthostylus perversus a Beck ind. p. 50. N. 12.
Lister t. 34. f. 33.

β. T. tenui, viridi:

Helix perversa Chemn. IX. P. 1. p. 100. t. 111. f. 936. 37.
Bulimus inversus Küst. t. 9. f. 3. 4.

γ. T. albido-grisea, fusco interrupte strigata et fasciata: long. 42, diam. 19 mill. (Spec.)

*) T. subumbilicata ovato-oblonga contraria sulphurea. (Linn. l. c.)

Helix contraria Müll. verm. II. p. 95. N. 292.
— — *Gmel.* p. 3644. N. 99.
— — *Fér.* in Voy. de Freyc. Zool. p. 474. t. 67. f. 8. 9.
— *interrupta Chemn.* IX. P. 1. p. 101. t. 111. f. 938. 39.
— — *var. Dillw.* descr. cat. II. p. 937.
Bulimus interruptus Lam. 12. p. 120. ed. Dh. p. 226.
— — *Küster* t. 9. f. 5. 6.
— — *β Brug.* Enc. méth. I. p. 316. N. 30.
— *contrarius Desh.* in Lam. p. 226.
Orthostylus contrarius Beck ind. p. 50. N. 14.

δ. T. albido-coerulea, fusco irregulariter strigata et nebulosa. — Long. 54, diam. 25 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 13 lata. (Spec.)
Helix inversa Müll. verm. II. p. 93. N. 290.
— — *Chemn.* IX. P. 1. p. 93. t. 110. f. 925. 26.
— — *Gmel.* p. 3644. N. 97.
Bulimus inversus Brug. Enc. méth. I. p. 315. N. 28.
— — *Lam.* 7. p. 118. ed. Dh. p. 224.
— — *Küst.* t. 6. f. 1. 2.
Orthostylus inversus α Beck ind. p. 50. N. 13.
Lister t. 35. f. 34.

ε. T. pallide fulvescente, spadiceo strigata, maculis albidis et fusco-spadiceis irregulariter guttata. — Long. 60, diam. 28 mill. Ap. intus 27 mill. longa, 14 lata. (Spec.)
Bulinus maculiferus Sow. Conch. Ill. f. 100.
— — *Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 14.

ζ. T. rubicunda, flammis rufis et fascia flava ornata:
Helix flammea Chemn. IX. P. 1. p. 94. t. 110. f. 927.
Bulimus inversus Küst. t. 6. f. 3.

η. T. ventrosiuscula, strigis rufis longitudinalibus angulatim flexuosis. — Long. 47, diam. 23 mill. Ap. intus 19 mill. longa, 11 lata. (ex ic. Deless.)
Bulimus sultanus Lam. 9. p. 119. ed. Dh. p. 225.
— — *Deless.* recueil t. 27. f. 6. 7.
Orthostylus inversus β Beck ind. p. 50.

B. Varietates callo aperturali concolore, dextrorsae.

ϑ. T. citrina unicolore vel fusco-strigata. — Long. 48, diam. 24 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 10 lata.
Helix dextra Müll. verm. II. p. 89. N. 287.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 153. t. 134. f. 1210—12.
— — *Gmel.* p. 3643. N. 95.
— — *Mawe* t. 29. f. 1.
— *aurea* (Cochlogena) *Fér.* hist. t. 148. f. 3. 5.
Bulimus citrinus Brug. Enc. méth. I. p. 314.
— — *β Lam.* 8. p. 119. ed. Dh. p. 225.
— — *Crouch* p. 18. t. 15. f. 4.
— — *Küster* t. 10. f. 1—3.

Bulimus aureus Swains. Zool. Ill. t. 47.
Orthostylus aureus Beck ind. p. 50. N. 11.

ι. Testa paulo crassiore, subrugata, pallide sulphurea: long. 43, diam. 20 mill. Ap. intus 18 mill. longa, 10 lata. (Spec.)
Bulimus palaceus v. d. Busch in litt.

ϰ. T. albido-grisea, interrupte fusco-strigata et fasciata: long. 47, diam. 21 mill. Ap. intus 19 mill. longa, 11 lata. (Spec.)
Helix interrupta Müll. verm. II. p. 94. N. 291.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 154. t. 134. f. 1213. 14.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 937. N. 115.
Bulimus interruptus α Brug. Enc. méth. I. p. 316. N. 30.
— — *Lam.* 12. p. 120. ed. Dh. p. 226.
— — *Küster* t. 10. f. 4. 5.
Bulinus javanicus Sow. Conch. Ill. f. 35.
Orthostylus interruptus a Beck ind. p. 50. N. 10.

λ. T. albida, fusco-fasciata et nebulosa: long. 60, diam. 28 mill.
Helix recta Müll. verm. II. p. 93. N. 289.
— — *Gmel.* p. 3643. N. 96.
— — *Dillw.* cat. II. p. 937. N. 114.
Orthostylus inversus b Beck ind. p. 50.

C. Callo margines peristomatis jungente nigro.

μ. T. imperforata, sinistrorsa, crassiuscula, virescenti-citrina, anfr. supra medium albis, strigis 1 vel pluribus nigris ornatis, perist. expanso, incrassato, albo. — Long. 53, diam. 24 mill. Ap. 28 mill. longa, intus medio 13 lata. (Spec.)

ν. T. dextrorsa, caeterum sicut var. μ.
Bulimus atricallosus Gould in Bost. journ. IV. p. 457. t. 24. f. 3.

Habitat in insulis Philippinis, Moluccis et Java, nec non in America meridionali; var. α in ins. Celebes, ins. principis (Martyn), in Guyana et Cayenne (Lam.), γ Java et Timor, δ et ε Mindanao (Cuming), η Java (Lam.), Bolivia (Orb.) ϑ Malacca (Cuming), ι et ϰ Java, λ Mindanao (Cuming), μ et ν in imperio birmano, Tavoy (Gould) et Mergui (Th. Phil.).

Obs. 1. Variat non solum colore et magnitudine, sed etiam testa magis minusve ventrosa vel gracili, nec non perforatione aperta vel omnino clausa; attamen characteres constantes diagnostici varietatum erui non possunt! (Conf. Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. Febr. p. 22.)

Obs. 2. In speciminibus junioribus varietatum μ et ν peristoma acutum, nigrum, serius strigas transversas anfractuum formans, in adultis peristoma omnino album, reflexum.

96. B. laevus (Helix) Müller.

T. perforata, sinistrorsa, ovato-turrita, solidiuscula, laevigata, nitida, alba vel citrina, fasciis variis ornata; spira elongato-conica; anfr. 6, supremi planulati, sequentes magis minusve convexi, ultimus spira brevior; columella subcontorta; apertura ovalis;

perist. album, reflexum, marginibus callo pellucido junctis, columellari dilatato, gibboso. — Long. 38, diam. 21 mill. Ap. 19 mill longa, 8 lata. (Coll. Nr. 57.)

Helix laeva Müll. verm. II. p. 95. N. 293.
— — *Chemn.* IX. P. 1. p. 103. t. 111. f. 940 -49.
— — *Gmel.* p. 3644. N. 100.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 935. N. 112.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 416.
— *perversa* ζ *Gmel.* p. 3643. (e fig. Kämm.)
Bulimus laevus Brug. Enc. méth. I. p. 317. N. 31.
— — *Quoy* et *Gaim.* Astrol. II. p. 120. t. 10. f. 4.
— — *Lam.* ed. Dh. 80. p. 260.
— — *Küster* p. 15. t. 9. f. 7—16.
Orthostylus laevus Beck ind. p. 50. N. 15.
Kämmerer p. 125. t. 10. f. 3.

Habitat in insulis Java, Amboina, Timor.

Obs. Variat colore albo, citrino, aurantiaco etc., fasciis spadiceis, purpureis, aurantiacis, interdum maculas quadratas formantibus.

97. B. Bataviae (Partula) Grateloup. †

T. perversa, ovato-ventricosa, imperforata, laevis, nitida, castanea, oblique fasciata; anfr. 6 convexi; apertura subovata; labrum albidum, reflexum; columella intorta. — Long. 30, diam. 18 mill. (Grat.)

Partula Bataviae Grat. Act. Bord. XI. p. 425. t. 2. f. 12.

Habitat in insula Java.

Obs. Ad varietates Bul. perversi referendus videtur.

98. B. virgatus Jay.

T. vix subperforata, ovato-turrita, subfusiformis, solidula, haud nitens, virenti-fulva vel laete castanea, saepe fasciis latis nigricantibus circumdata, epidermide lutea vel albida marmorata; sutura mediocris; anfr. 5½—6 vix convexiusculi, ultimus spiram fere aequans; columella subrecta; apertura ovali-oblonga, intus alba; perist. late expansum, subreflexum, cum columella angulum formans, margine columellari dilatato, appresso. — R. a. = 15 : 22. — Long. 52, diam. 22 mill. Tota apert. 27 mill. longa, intus 10 lata. (Coll. Nr. 58.)

Bulimus virgatus Jay catal. 1839. p. 120. t. 6. f. 4.*)
— *Sylvanus Pfr.* Symb. II. p. 51.

*) T. subperforata, oblongo-ovata, nitida, brunnea, albo-fasciata; apice obtusiusculo; anfr. 7 planiusculis, ultimo $^2/_5$ longitudinis subaequante; columella concava; apertura ovata, intus alba; perist. reflexo. — Long. 2 poll. Diam. 11 lin. (Jay l. c.)

Bulinus Sylvanus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 95.
— *virgatus Sow.* Conch. Ill. f. 112—114.
Partula labrella Grat. Bord. XI. p. 423. t. 4. f. 6.

α. T. fusca vel flavescens, fascia suturali tenui, albida, apice purpurascente, anfractu basali castaneo-trifasciato, fasciis infer. maximis, strigis angulatis longitudinalibus picto, anfractibus caeteris frequentissime longitudinaliter strigatis et maculatis.

β. Nitide flavescens, anfractu basali castaneo-quadrivittato.

γ. Flavescens, anfractu basali bivittato.

δ. Ventricosior, anfractu basali trivittato, apice purpurascente, vittis nigricantibus.

ε. T. sordide fusca, strigis et maculis angulatis elongatis obscure sparsa.
Bulimus porraceus Jay cat. 1839. p. 120. t. 6. f. 5? *)

ζ. T. graciliore, tota flavescente, linea tenuissima suturali, alba.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Cuming).

Obs. Varietates ex Broderip l. c. enumeravi. — B. virgatus differt a B. Dryade praecipue spira anfractum ultimum vix superante, perforatione fere omnino obtecta et epidermide.

99. B. Dryas Broderip.

T. subperforata, elongato-ovata, nitida, alba unicolor vel fasciis latis castaneis vel nigricantibus circumdata; spira pyramidata; anfr. 7 plani, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella arcuata, incrassata, late reflexa, tuberculosa; apertura angusta, oblonga, intus alba; perist. latissime expansum, marginibus callo junctis. — R. a. = 5 : 8. — Long. 59, diam. 22 mill. Tota apert. 28 mill. longa, intus medio 10 lata. (Coll. Nr. 59.)

Bulinus Dryas Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 94.
— *porraceus Sow.* Conch. Ill. f. 108—111.
Bulimus Dryas Pfr. Symb. II. p. 44.

α. T. alba, anfractu basali trivittato, vitta superiore et vitta inferiore strigis nigro-fuscis, media castanea, nonnunquam interrupta.

β. Anfractu basali bicincto, vitta superiore angusta, inferiore tristrigata.

γ. Anfractu basali nitide albo, vitta superiore et inferiore angustis nigrescentibus limbato.

δ. T. pallide flava, fascia suturali albente, anfr. basali vitta sup. et infer. angustissimis, castaneis limbato, caeteris castaneo-univittatis.

ε. T. tota alba: long. 45, diam. 19 mill. Ap. 22 mill. longa, intus medio 8 lata. (Spec.)

*) T. perforata, oblongo-ovata, solida, epidermide virenti-flava induta, fascia angusta obscura columellam transgrediente; anfr. 7 planiusculis, ultimo $^2/_5$ longitudinis aequante; apertura ovata, intus nitide candida; perist. valde reflexo, albo. — Long. 22, diam. 10 lin. (Jay l. c.)

ζ. Forma juvenilis, peristomate recto, intus incrassato:
Bulimus paradoxus Pfr. in Phil. Icon. II. 14. p. 155. t. 6. f. 6.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Cuming).

Obs. Sowerby hanc speciem cum B. porraceo Jay identicam putat, quem duce ipso Jay, praesertim ob epidermidem, ad B. virgati varietates potius referendum censeo. — Quid sit B. paradoxus m. olim, H. Cuming nuperrime certiorem me fecit.

100. B. partuloides Broderip.

T. subperforata, ovato-pyramidata, nitida, sub epidermide decidua, flava albicans, castaneo-vittata, vel castanea, albo-vittata; spira pyramidata, apice obtusa; sutura linearis; anfr. 6 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella latissima, superne arcuata, basi plicata; apertura oblonga, basi subangulata, intus alba; perist. late expansum, album. — R. a. = 3 : 4. — Long. 37, diam. 17 mill. Ap. 18 mill. longa, intus medio 8 lata. (Coll. Nr. 60.)

Bulinus partuloides Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 181.
Bulimus partuloides Pfr. Symb. II. p. 49.

Habitat in insulis Tablas et Mindoro (Cuming).

101. B. calobaptus Jonas.

T. subperforata, ovato-pyramidata, tenuis, subdiaphana, striis incrementi subtilissimis spiralibusque oculo nudo vix conspicuis decussata, rubro-fulvida, fasciis 2 saturate castaneis, altera basali, strigisque flavis undulosis, longitudinalibus ornata; spira pyramidata, apice obtusa; anfr. $5^1/_2$ convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella verticalis, subarcuata; apertura oblongo-ovalis, intus coerulescenti-alba; perist. simplex, tenue, margine dextro expanso, columellari dilatato, patentim reflexo. — Long. 35, diam 17 mill. Ap. 18 mill. longa, intus medio 9 lata. (Coll. Nr. 61.)

Bulimus calobaptus Jonas in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 188.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 54. Bul. t. 1. f. 6.

β. Major, pallide fulvescens, strigis angulatis stramineis obsoletioribus, fasciis 2 castaneis vel nullis. — Long. 45, diam. 19 mill. Ap. 20 mill. longa, intus $10^1/_2$ lata. (Spec.)

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Jonas, Sowerby).

102. B. multicolor (Helix) Rang.

T. rimato-perforata, oblongo-conica, solidiuscula, opaca, minutissime granulato-decussata, luteo-fusca, flammis atropurpureis variegata, maculisque pallidis aspersa; spira subpyramidata, apice obtusiuscula; sutura marginata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella subuniplicata, albida; apertura

oblongo-ovalis, intus atro-violacea; perist. expansum, reflexiusculum, roseum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 36, diam. 16 mill. Ap. intus 17 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 62.)

Helix multicolor Rang in Ann. d. sc. nat. 1831. p. 55. t. 3. f. 1.
Bulimus multicolor Sow. Conch. Ill. f. 89.
— — *King* in Zool. Journ. V. p. 341.
Bulimus multicolor Lam. ed. Dh. 38. p. 239.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 174. f. 89.
— — *Küster* p. 22. t. 4. f. 3. 4.
Gonyostomus multicolor Beck ind. p. 53. N. 4.

β. Major, strigis et flammis fusco-purpureis medio in fascias latas subconfluentibus: long. 42, diam. 16 mill. Ap. intus 21 mill. longa, medio 8½ lata. (Spec.)
Bulinus Miersii Sow. Conch. Ill. f. 90.
Bulimus Miersii Reeve Conch. syst. II. t. 74. f. 90.

Habitat in Brasilia.

103. B. larvatus Broderip.

T. subperforata, fusiformi-pyramidata, solidiuscula, nitida, fulva, strigis pallidis, obliquis, distantibus ornata; spira turrita, apice obtusa; anfr. 6 plani, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, basi attenuatus; columella leviter retrorsum arcuata, perdilatata, alba; apertura angusta, oblongo-ovalis; perist. late expansum, reflexum, nitide album. — Long. 39, diam. 13 mill. Ap. intus 13 mill. longa, 6½ lata. (Coll. Nr. 63.)

Bulinus larvatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 96.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 117.

Habitat in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

104. B. cuyoensis Pfr.

T. subperforata, ovato-pyramidata, glabriuscula, nitidula, cinnamomeo-fulvida, strigis flexuosis pallidioribus et fascia unica rufescente ornata; sutura levis; anfr. 5½ planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella brevis, incrassata, late reflexa, apertura ovalis; perist. tenue, parum expansum. — R. a. = 2 : 3. — Long. 30, diam. 15 mill. Ap. 13 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus cuyoensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 152.

Habitat rarissimus in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

105. B. fictilis Broderip.

T. subperforata, subfusiformis, laevis, nitida, variegata; sutura linearis; anfr. 6 planiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; columella incrassata, alba; apertura angusta, oblonga;

perist. album, late expansum, reflexiusculum. — R. a. = 5 : 7. — Long. 38, diam. 15 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 64.)

Bulinus fictilis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840 p. 96.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 115. 116.
Bulimus fictilis Reeve Conch. syst. II. t. 173. f. 1.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 45.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 54. Bul. t. 1. f. 5.

α. T. nitide fusca, strigis, punctis, lineisque albentibus notata, anfractus basalis vitta suturali angusta, subalbida.

β. Albescens, strigis maculisque castaneo-nigricantibus longitudinalibus clarioribus.

γ. Flavescens, lineis strigisque longitudinalibus albentibus, anfractus basalis fascia angusta, obscura.

δ. Griseo-albens vel albens, strigis longitudinalibus albidis.

Habitat in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

Obs. Varietates ex Cl. Broderip l. c. enumeratae.

106. B. erubescens Pfr.

T. subperforata, oblongo-turrita, laeviuscula, lineis spiralibus sub lente insculpta, carneo-lutea, apice rubicunda; spira turrita, apice acuta; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella superne subtorta, basi paulo recedens; apertura oblonga, intus nitide alba; perist. simplex, margine dextro expansiusculo, columellari fornicatim breviter reflexo, subappresso. — Long. 24, diam. 10 mill. Ap. 12 mill. longa, medio $5^2/_3$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus erubescens Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 112.

Habitat . . . ?

§. 7.

107. B. Milleri Sowerby.

T. subperforata, ovato-acuta, solidula, castanea, lineis concentricis confertissimis, granulosis elegantissime sculpta, fasciis latis concoloribus, panni «Atlas» dicti instar nitentibus ornata; spira ventroso-conica, apice obtusa; sutura levis, albo-marginata; anfr. $5^1/_2$, supremi rugulosi, planulati, purpurascentes, ultimus spiram subaequans, peroblique descendens, antice iterum ascendens; columella simplex, subrecta; apertura ovalis; perist. incrassatum, late expansum, saturate roseum, marginibus callo tenuissimo, livido junctis, columellari dilatato, plano, appresso. — Long. 56, diam. 28 mill. Ap. intus 26 mill. longa, medio 13 lata. (Coll. Nr. 65.)

Bulinus Milleri Sow. Conch. Ill. f. 94.

Bulimus Milleri Reeve Conch. syst. II. t. 174. f. 94.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 48.

Habitat in Brasilia, unde nuperrime copiosiorem misit Bescke.

Obs. Conf. B. unidentatus Nr. 133 et planidens N. 134.

108. B. Lamarckianus Pfr.

T. subperforata, ovata, solida, striata et undique distincte granulata, saturate fusca, punctis nigricantibus aspersa; spira brevis, obtusiuscula, anfr. 5 parum convexi, ultimus ventrosior, $^3/_5$ longitudinis subaequans; columella oblique leviter plicata; apertura oblongo-ovalis, intus livida; perist. subincrassatum, expanso-reflexum, marginibus callo tenui junctis, columellari superne dilatato, perforationem fere occultante. — Long. 62, diam. 32 mill. Ap. 40 mill. longa, intus medio 18 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Lamarckianus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in Andibus Novae Granadae, 8000′ supra mare (Funck).

Obs. Conf. B. Gibbonius Nr. 127 et castaneus Nr. 128.

109. B. Blainvilleanus Pfr.

T. subperforata, solida, ventroso-ovata, longitudinaliter confertim plicata, sub epidermide olivacea castanea, strigis sparsis nigricantibus, fulguratis variegata; spira brevis, conica, acutiuscula; anfr. $4^1/_2$, supremi plani, penultimus convexiusculus, ultimus ventrosus, regulariter malleatus, $^3/_5$ longitudinis subaequans, peroblique descendens; columella mediocriter plicata, paulo recedens; apertura oblongo-semiovalis, intus nigricans, nitida; perist. nigrum, incrassatum, late expansum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari dilatato, plano, subappresso. — Long. 50, diam. 25 mill. Ap. 32 mill. longa, intus medio 14 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Blainvilleanus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 1.

Habitat prope Zaji in provincia Merida Novae Granadae (Funck).

Obs. Characteribus quasi intermedius inter B. fulminantem Nr. 65 et B. aurem Sileni Nr. 223.

110. B. ovoideus Bruguière. †

T. ovata, ventricosa, nitida, alba; apertura semiovata marginata; apex obtusus. — Long. 14, diam. 7 lin. (Brug.)

Bulimus ovoideus Brug. Enc. méth. I. p. 335. N. 64.
Lister synops. t. 13. f. 8.
Klein ostrac. p. 52. t. 3. f. 55. } ex Brug.

Habitat . . . ?

Obs. Cl. Bruguière sic describit testam: «anfractus 7 laevigati, vix con-

vexi, primi 2 obtusi, diaphani; sutura linea vix prominente marginata. Peristomatis margo dexter expansus et reflexiusculus; axis testae perforatus: foramine obliquo, in centrum testae profunde intrante et rimam obliquam sub margine prominulo labri formante. — Testa unicolor alba, sub lente rugosa et ovi instar puncticulata.» — Characteres satis bene cum B. luzonico (conf. Nr. 86), qui ab auctoribus eadem species esse affirmatur, convenire videntur, praeter rimam umbilicarem apertam. (Conf. Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1844. p. 180.)

111. B. abyssorum Orbigny.

T. subperforata, oblongo-conica, tenuiuscula, subrugosa, albida, strigis brunneo-rufis, latis, irregularibus undulatis variegata; spira conica, apice acuminata; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella subtorta, alba; apertura semiovalis, intus albida; perist. simplex, late expansum, margine columellari dilatato, subfornicatim reflexo, subappresso, umbilicum angustissimum simulante. — Long. 46, diam. 20 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 66.)

Helix abyssorum (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 17.
Bulimus abyssorum Orb. voy. p. 308. t. 39. f. 7. 8.
Bulimulus abyssorum Beck ind. p. 64. N. 7.

Habitat in provincia Lagunensi Boliviae.

112. B. brachysoma Orbigny. †

T. oblonga, brevis, subumbilicata, ventrosa, subcrassa, laevigata, albido-fusca, lineis 3 fusco-rubentibus maculata; spira inflata, apice acuminata; anfr. 7; apertura ovalis, subreflexa; columella recta, plana; labrum latum, acutum, reflexum. (Orb.) — Long. 40, diam. 23 mill. Ap. 21 mill. longa, 12 lata. (ex ic.)

Helix brachysoma (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 18.
Bulimus brachysoma Orb. voy. p. 309. t. 39. f. 9. 10.

Habitat in Boliviae prov. S. Cruz de la Sierra.

113. B. pachychilus Pfr.

T. subperforata, ovata, apice obtusa, crassa, alba, longitudinaliter striata, lineis confertissimis transversis sub lente decussata; sutura crenulata; anfr. $4^1/_2$ convexiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; apertura integra, ovalis, intus alba; perist. late incrassatum, pallide fulvescens, nitidum, marginibus callo crasso junctis. — Long. 37, diam. 20 mill. Ap. intus 18 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 67.)

Bulimus pachychilus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 186.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 48.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 57. t. 1. f. 14.

Habitat in Questa de Arenas prope Huasco Chilensium (Bridges).

114. B. Bridgesi Pfr.

T. subperforata, oblongo-ovata, apice obtusa, tenuis, pallide luteo-fulvescens, confertissime et leviter decussata; sutura mediocris, marginata; anfr. 4 convexiusculi, ultimus spiram superans; apertura ovalis, intus nitide fulvida; perist. simplex, late reflexum, intus album, marginibus callo junctis, columellari perforationem fere occultante. — Long. 23, diam. 11 mill. Ap. intus 11 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 68.)

Bulimus Bridgesi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 186.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 43.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 58. t. 1. f. 15.

Habitat in provincia Huasco Chilensium (Bridges).

115. B. castus Pfr.

T. subperforata, ovato-conica, tenuiuscula, minutim et obsolete decussatula, hyalino-albida, basi et prope aperturam erubescens; spira conica, acutiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella strictiuscula, filiformis; apertura oblonga; perist. simplex, roseum, marginibus subparallelis, callo tenui junctis, dextro breviter expanso, columellari brevissime reflexo, perforationem fere claudente. — Long. 19, diam. 9 mill. Ap. 10½ mill. longa, intus 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus castus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 112.

Habitat in America centrali? (Lattre.)

116. B. polymorphus Orbigny. †

T. ovalis vel subelongata, brevis, crassa, substriata, subumbilicata, albido-grisea, zonis 4 latis, brunneo-violaceis intersecta; spira plana, apice obtusa; sutura crenulata, subplana; apertura ovalis; columella crassa, recta; labrum crassum, albidum. (O.) — Long. 22, diam. 13 mill. Ap. 11 mill. longa, 6½ lata. (ex ic.)

Helix polymorpha (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 20.
Bulimus polymorphus Orb. voy. p. 289. t. 41. f. 1—5.

Habitat in republica peruviana.

117. B. versicolor Jan. †

T. oblonga, ovata, subperforata, longitudinaliter striata, viridi-rufescens, maculis albis variegata; apertura ovalis; perist. reflexum, album. — Long. 1″ 6‴, lat. 10‴. Long. apert. 1″, lat. 6‴. (Jan.)

Bulimus versicolor Jan Mantissa p. 3.

Habitat in Brasilia.

Obs. Hoc loco conf. B. debilis Beck Nr. 463.

* * *

118. **B. natalensis Krauss.**

T. imperforata, globoso-conica, papyracea, longitudinaliter rugoso-striata, diaphana, fulva, fasciis 1 — 2 nigricanti-rufis ornata; spira conica, apice acuta; anfr. 6 planiusculi, ultimus acute carinatus, spiram aequans, basi convexus; apertura angulato-subovalis; columella subverticalis, stricta; perist. tenue, simplex, margine dextro breviter expanso, columellari subdilatato, fornicatim reflexo, appresso. — Long. 18, diam. 13 mill. Ap. 11 mill. longa, 9½ lata. (Coll. Krauss.)

Bulimus natalensis Krauss mss. *Pfr.* Symb. III. p. 86.

Habitat in sylvis sinus Natalensis (Krauss).

* * *

119. **B. coloratus Nyst.**

T. subperforata, ovata, tenuiuscula, subtiliter malleato-granulata, diaphana, fulva, strigis et maculis dilutis castaneis ornata; spira brevis, conica, obtusa; sutura crispula; anfr. 4½ — 5 convexiusculi, ultimus ventrosus, ⅗ longitudinis subaequans; columella superne levissime plicata; apertura oblongo-ovalis, intus margaritacea, maculis perlucentibus; perist. roseum, breviter reflexum, marginibus callo nitido junctis. — Long. 44, diam. 23 mill. Ap. 28 mill. longa, medio 15 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus coloratus Nyst in Bull. Brux. XII. N. 3. f. 2. *)

Habitat in Columbiae prov. Cumana (Funck, Nyst); specimen supra descriptum legit Lattre prope Quito reipublicae Aequatoris.

120. **B. plectostyius Pfr.**

T. subperforata, ovato-conica, solida, regulariter et distincte granulata, saturate castanea, flammis brevibus albis infra suturam ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 5 vix convexiusculi, superiores plicato-striati, ultimus tumidus, antice peroblique descendens, ⅐ longitudinis subaequans; columella superne plica valida, subobliqua munita; apertura obverse auriformis, intus sordide lilacea, nitida; perist. undique expansum et reflexum, livido-fuscum. — Long. 35, diam. 17 mill. Ap. 22 mill. longa, intus infra plicam 10 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus plectostylus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

---

*) T. ovato-oblonga, subperforata, ventricosa, tenuiuscula, pellucida, rufo-lutea, strigis subarticulatis granulisque minimis striatis, longitudinaliter ornata; spira conica, obtusa; anfr. 5, prioribus ad suturam albo-marginatis, ultimis subcrispis; apertura ovata, intus variegata, labiis lamina callosa tenui junctis; columella contorta, oblique ascendente; peristomate roseo, reflexo. — Long. 49, diam. 30 mill. (Nyst l. c.)

Bulimus plectostylus Phil. Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 7.

Habitat prope Chachopo in provincia Merida Novae Granadae (Funck).

121. B. glandiformis Lea.

T. subperforata, ovata, tenuis, confertim rugosa et granulata, fulva, maculis albis vel fuscis irregulariter aspersa; spira conica, obtusiuscula; anfr. 4 convexiusculi, ultimus inflatus, $^2/_3$ longitudinis aequans; columella complanata, superne torta, basi recedens; apertura ovalis, intus nitidissima; perist. brevissime reflexum. — Long. 29, diam. 17 mill. Ap. 19 mill. longa, intus medio $9^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 69.)

Bulimus glandiformis Lea obs. II. p. 83. t. 23. f. 92. *)

Habitat in Nova Granada.

122. B. lutescens King.

T. subperforata, ovata, tenuis, longitudinaliter striata, striolis concentricis minute decussata, epidermide tenui, olivaceo-lutescente induta; spira brevis, apice obtusa; sutura subcrenata; anfr. $4^1/_2$ convexiusculi, ultimus $^3/_5$ longitudinis subaequans; apertura ovalis; columella arcuatim recedens; perist. brevissime reflexum, aurantio-limbatum, margine columellari dilatato, perforationem subtegente. — Long. 30, diam. 17 mill. Ap. 17 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 70.)

Bulinus lutescens King in Zool. Journ. V. p. 340. **)

— *nucleus Sow.* Conch. Ill. f. 33.

Helix nucleus Orb. syn. p. 14.

Bulimus nucleus Orb. voy. p. 305.

— — *Beck* ind. p. 52. N. 16.

Habitat prope fretum Magellanicum (Sow.), Maldonado (King), Patagonia (Orb.).

Obs. 1. Cl. Beck Ampullariam roseam Spix (t. 4. f. 3.) hujus speciei pullum esse opinatur.

Obs. 2. Conf. B. ponderosus Jan Nr. 510.

123. B. Veranyi Pfr.

T. subperforata, ovata, solidiuscula, minutissime granulata, fulva, punctis castaneis conspersa et strigis luteis vel albis fulguratis distantibus ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. $4^1/_2$ convexiusculi, ultimus $^3/_5$ longitudinis aequans; columella superne

*) T. ovata, rugosa, subinflata, imperforata, subcrassa, granosa, rufo-fusca, albo-maculata, anfr. 4, ultimo magno; apertura purpurea, ovata, submagna; labro reflexo; columella laevi. — Diam. 0,7, long. 1,3 poll. (Lea l. c.)

**) T. obovata, ventricosa, subscabra, lutescente. — Long. $1^1/_8$, lat. $^{11}/_{16}$ poll. (King. l. c.)

subplicata, leviter arcuata; apertura oblongo-ovalis, intus margaritacea; perist. album, undique mediocriter expansum. — Long. 33, diam. 15 mill. Ap. 20 mill. longa, intus medio 10 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Veranyi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 5. 9.

Habitat prope Chachopo in prov. Merida Novae Granadae (Funck).

Obs. Persimilis Bul. succinoid. Petit; differt spira longiore, columella plicata et peristomate latius expanso.

§. 8.

124. B. goniostomus (Helix) Férussac.

T. rimato-perforata, fusiformis, solidula, subtiliter decussato-granulata, olivascenti-castanea vel fusca; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 6 rapide accrescentes, medio convexiusculi, ultimus spira paulo brevior, basi attenuatus, compresso-carinatus; columella arcuata; apertura oblonga, utrinque acutiuscula, basi subcanaliculata; perist. subincrassatum, breviter reflexum, rubrum, marginibus approximatis, callo albo junctis. — Long. 60, diam. 19 mill. Ap. 29 mill. longa, medio 9 lata. (Coll. Nr. 71.)

Helix goniostoma (Cochlogena) *Fér.* pr. 441.
— — *Wood* suppl. t. 7. f. 24.
Bulimus goniostoma Sow. Zool. Journ. I. p. 59. t. 5. f. 2.
— — *Lam.* ed. Dh. 61. p. 249.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 141. t. 14. f. 17. 18.
— — *Küst.* p. 21. t. 5. f. 1. 2.
Pupa goniostoma Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.
Gonyostomus gonyostoma Beck ind. p. 53. N. 1.
Goniostoma erubescens Swains. Malac. p. 177. f. 25. et p. 335.
β. Minor, flammis albis vel aureis amoene variegata: long. 46, diam. 14 mill. Ap. 22 mill. longa, 11 lata. (Spec.)

Habitat in Brasilia.

125. B. egregius Pfr.

T. perforata, fusiformis, solidula, striis longitudinalibus confertis et lineis spiralibus distantioribus subdecussata, nitida, flammis castaneis pellucidis et fulvis opacis egregie picta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram turritam aequans, basi compressus; columella subangulato-arcuata; apertura oblonga, utrinque acuta, intus livida; perist. vivide rubrum, late expansum, breviter reflexum, basi canaliculatum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 41, diam. 15 mill. Ap. 21 mill. longa, intus 7 lata. (Coll. Nr. 72.)

Bulimus egregius Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 67.

Bulimus hybridus Gould 1846. Exped. shells p. 32. *)

Habitat in Brasilia; in vicinia urbis Rio Janeiro (Gould).

Obs. Variat testa fere omnino laevigata, et anfractu ultimo ventrosiore. Praeterea peristoma in speciminibus pluribus, nuperrime a Bescke missis vix expansum observavi, quare species forsan cum praecedente jungenda erit.

* * *

126. **B. fusoides Orbigny.**

T. vix subperforata, oblongo-fusiformis, tenuis, striatula, diaphana, nitida, carneo-lutescens vel albido-rosea, strigis undulatis brunneo-purpureis ornata; spira turrita, apice obtusa; anfr. 6 — 7 convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus spira paulo brevior, attenuatus; columella subplicata, oblique recedens, purpurea; apertura oblonga, basi effusa; perist. simplex, late expansum, marginibus callo purpureo junctis, columellari breviter reflexo, subappresso, perforationem fere claudente. — Long. 40, diam. 11 mill. Ap. 19 mill. longa, medio (c. perist.) 10 lata. (Mus. Cuming.)

Helix fusoides (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 19. **)

Bulimus fusoides Orb. voy. p. 315. t. 40. f. 12. 13.

Habitat in Bolivia, in prov. Yungasensi (Orb.), prope Cocopata (Bridges).

§. 9.

127. **B. Gibbonius Lea.**

T. perforata, ovato-acuminata, solida, granulato-striata, rufa, albido-nebulosa, maculis castaneis minutis aspersa; spira brevis, acutiuscula; anfr. 5 planiusculi, ultimus inflatus, $^3/_5$ longitudinis aequans; columella alba, torto-plicata, brevis; apertura ampla, ovalis; perist. incrassatum, album, breviter reflexum, marginibus callo crasso, albido junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 72, diam. 41 mill. Ap. 46 mill. longa, 29 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Gibbonius Lea obs. II. p. 85. t. 23. f. 99.***)

Habitat in Novae Granadae montibus Quendeu.

---

*) T. crassa, elongato-ovata, polita, castanea, lituris ochraceis admodum oblique ordinatis maculata: spira anfr. 6 convexis, sub lente spiraliter striatis; ultimo magno sub-compresso, ad basim oblique carinato et rima umbilicali perforato: apertura angustata, elongato-elliptica, antice angulata et canaliculata; labro crasso, late reflexo, rubro-purpureo; fauce roseo. — Long. $1^3/_4$, lat. $^5/_8$ poll. Apert. B. goniostomi, statura et colores B. multicoloris. (Gould l. c.)

**) T. elongatissima, imperforata, inflata, tenui, diaphana, laevigata, albido-rosea, lineolis brunneo-purpureis longitudinaliter ornata; spira elongata, apice obtusà; anfr. 7, ultimo obliquo; apertura elongata, rosea; columella subrecta, reflexa; labro tenui, lato. (Orb. l. c.) — Long. 41, diam. 13 mill. Ap. 21 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

***) T. ovata, ventricosa, perforata, subcrassa, granosa, tenebroso-fusca,

128. B. castaneus Pfr.

T. vix perforata, ovato-acuminata, solidiuscula, longitudinaliter confertim striata, lineis spiralibus distantioribus decussata, unicolor castanea; spira brevis, conica, acutiuscula; anfr. $4^1/_2$ vix convexiusculi, ultimus inflatus, $^2/_3$ longitudinis subaequans; columella tenuis, subsimplex; apertura ovalis, intus saturate fusca, nitida; perist. vix incrassatum, brevissime reflexum, marginibus callo tenui junctis, columellari vix dilatato. — Long. 70, diam. 39 mill. Ap. 48 mill. longa, 27 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus castaneus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 68.

Habitat in Nova Granada «Vegas of the river Quendeu».

129. B. Tupacii Orbigny.

T. rimato-perforata, oblongo-conica, solida, rugoso-striata, brunnea vel spadicea, unicolor vel fusco-fasciata; spira pyramidata, acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella obsolete plicata, alba; apertura ovalis, intus livida, nitida; perist. subincrassatum, margine dextro brevissime reflexiusculo, columellari dilatato, plano, patente. — Long. 67, diam. 30 mill. Ap. 35 mill. longa, 18 lata. (Coll. Nr. 73.)

Helix Tupacii (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 16.
Bulimus Tupacii Orb. voy. p. 292. t. 38. f. 1—5.
— — *Beck* ind. p. 52. N. 8.
Bulinus Tupacii Sow. Conch. Ill. f. 77.

β. Minor, anfractu ultimo spira breviore. — Long. 50, diam. 23 mill. Ap. 22 mill. longa, 13 lata. (Spec.)

Habitat in Boliviae provincia Yungasensi.

130. B. rosaceus King.

T. perforata, ovato-oblonga, rugulosa et minutissime granulato-scabriuscula, epidermide olivaceo-cornea induta, pallidius marmorata; spira ovato-conica, apice rosea, obtusa; sutura crenulata, albo-papillosa; anfr. 5 convexiusculi, ultimus $^4/_7$ longitudinis subaequans; columella subrecta, interdum obsolete plicata, alba; apertura oblongo-ovalis, intus nitida, fulvescens; perist. album, expansum, breviter reflexum, marginibus callo junctis, dextro leviter arcuato, columellari dilatato, patente. — Long. 51, diam. 26 mill. Ap. intus 24 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 74.)

Bulinus rosaceus King in Zool. Journ. V. p. 341. *)

---

atro-maculata; anfr. 5, ultimo magno; apertura purpurea, magna, obliqua; labro reflexo; columella albida. — Diam. 2,4; long. 3,5″. (Lea l. c.) — Long. 90, diam. 52 mill. Ap. 57 mill. longa, 34 lata. (ex ic.)

*) T. ovato-oblonga, scabriuscula; apice et anfractibus primis rosaceis, caeteris viridi-fuscis; labro albo; suturis crenulatis seu plicatis; long. $2^1/_8$, lat. 1 poll. (King l. c.)

Bulinus rosaceus Sow. Conch. Ill. f. 5.
— — *Gray* in Beech. voy. t. 38. f. 15.
— — *Beck* ind. p. 52. N. 14.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 282.
Bulimus rosaceus Lam. ed. Dh. 98. p. 269.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 153. t. 15. f. 3. 4.
Helix rosacea (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 14.

β. Major, testa solida, opaca, undique lilaceo-rosea, apice purpurascente, granulis obsoletissimis: long. 60, diam. 32 mill. Ap. intus 30 mill. longa, 18 lata. (Spec.)

Habitat in Chile: Coquimbo (Cuming), Valparaiso (Orbigny).

131. B. crenulatus Pfr.

T. vix perforata, ovata, laeviuscula, lineis spiralibus magis minusve confertis, granulatis cincta, pallide fusca, albo-marmorata; spira brevis, obtusa; sutura albo-crenulata; anfr. 4 convexiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella subrecta, oblique recedens, alba; apertura ovalis, intus nitida; perist. incrassatum, expansum, reflexum, marginibus fere contiguis, callo tenui junctis, dextro valde arcuato, columellari dilatato, plano, patente. — Long. 38, diam. 19 mill. Ap. intus 19 mill. longa, 11 lata. (Coll. Nr. 75.)

Bulimus crenulatus Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 156.
— *chilensis Beck* ind. p. 52. N. 15.
— *rosaceus var. Desh.* in Lam. ed. II. p. 269.
— *squamulatus Crist.* et *Jan?* (Villa disp. syst. p. 20.)
Bulinus chilensis Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 36.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 4.

β. Minor: long. 30, diam. 16 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 9 lata. (Spec.)

Habitat in Chile.

132. B. pudicus (Helix) Müller.

T. perforata, ovato-acuminata, irregulariter striata et malleata, sub epidermide fulvida rosea; spira conica; anfr. 5 convexiusculi, summi regulariter et confertim costulato-striati, ultimus $^3/_5$ longitudinis subaequans; columella superne subplicata; apertura ovali-subauriformis, intus nitida, roseo-albida; perist. roseum, late expansum et reflexum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, foramen semiobtegente. — Long. 56, diam. 27 mill. Ap. intus 28 mill. longa, medio 13 lata. (Coll. Nr. 76.)

Helix pudica Müll. verm. II. p. 97. N. 295.
— — *Gmel.* p. 3645. N. 102.
— *erubescens Soland.* Portl catal.?
Auris virginea Chemn. IX. P. 2. p. 44. t. 121. f. 1042.

Bulimus virgineus Brug. Enc. méth. I. p. 315. N. 29.
— — *Wagner* in Spix p. 12.
— *pudicus Lam.* ed. Dh. 70. p. 253.
— ? — *Beck* ind. p. 53. N. 27.
— — *Küster* p. 19. t. 4. f. 7. 8.
Voluta auris virginis Dillw. descr. cat. I. p. 502. N. 8.
Partula pudica Fér. prodr. p. 66.
— — *Gray* in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 415.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 198 t. 20. f. 7. 8.
— *australis Bowd.* elem. of Conch. t. 8. f. 30.

β. Peristomate albido:
Strophocheilus Almeida Spix test. bras. t. 11. f. 2. 3.
Bulinus Myersii Sow. Conch. Ill. f. 98?
— *perplexus Sow.* in ind. Conch. Ill.?

Habitat in Brasilia, Bahia.

133. B. unidentatus (Partula) Sowerby.

T. subimperforata, ovata, crassa, ponderosa, irregulariter malleata, rosco-albida; anfr. 5 convexiusculi ultimus spira brevior, peroblique descendens; columella leviter arcuata; apertura parvula, ovalis; perist. late expansum, incrassato-reflexum, castaneum, marginibus callo castaneo junctis, dextro medio dente conico, obtuso, munito. — Long. 56, diam. 30 mill. Ap. intus 25 mill. longa, 12½ lata. (Mus. Cuming.)

Partula unidentata Sow. in Tank. catal. App. p. VII. *)
— — *Gray* in Ann. of. Phil. New ser. IX. p. 415.
Bulimus? unidentatus Beck ind. p. 53. N. 28. (excl. syn. Mich.)
— — *Pfr.* Symb. III. p. 88.

Habitat . . . ?

134. B. planidens Michelin.

T. subperforata, ovato-oblonga, minute striata, sub lente lineis concentricis minutissime decussata, nitidula, fuscescenti-olivacea; spira conica, obtusiuscula; sutura submarginata; anfr. 5 convexiusculi, ultimus peroblique descendens, ⅔ longitudinis subaequans, basi attenuatus; columella subplicata; apertura ovali-oblonga, intus lactea; perist. incrassatum, breviter reflexum, sanguineum, marginibus callo rubicundo junctis, dextro subrecto, medio dente sanguineo, planato munito, columellari reflexo, subappresso. — Long. 66, diam. 31 mill. Ap. intus 33 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 77.)

Bulimus planidens Mich. in Guér. mag. 1831. t. 25.

*) T. subimperforata, oblongo-ovata, anfr. 4 — 5 rotundatis; apertura castanea, labio externo interne unidentato, dente valido, obtuso. Long. 2, lat 1 poll. — Color pallide roseus, margo aperturae castaneus. (Sow. l. c.)

Bulimus planidens Lam. ed. Dh. 37. p. 239.
— — *Küst.* p. 17. t. 3. f. 1.

Habitat in Brasilia, prope Neu-Freiburg.

Obs. 1. Differt a B. granuloso (Nr. 57.) magnitudine, sculptura et dente peristomatis, a B. pudico sculptura, apertura oblonga, dente, umbilico obtecto etc., a B. unidentato forma, dente planato, etc.

Obs 2. Interdum dens peristomatis obsoletus est, vel omnino deficit; tamen species semper characteribus universis facile ab omnibus affinibus distinguitur.

135. B. Bolivarii Orbigny. †

T. oblonga, ventricosa, subcrassa, rugose malleata, fasciis 3 fuscis maculata, fusco-albo marmorata, margine apiceque acuminatis, flavis, intus albida, lucida; anfr. 7; apertura magna, lutea; columella torta, complanata; labrum tenue, reflexum. (Orb.) — Long. 55, diam. 25 mill. Ap. intus 28 mill. longa, 11 lata. (ex ic.)

Helix Bolivarii (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 17.
Bulimus Bolivarii Orb. voy. p. 309. t. 39. f. 5. 6.
Bulimulus Bolivarii Beck ind. p. 64. N. 6.

Habitat in Boliviae provincia Cochabambacensi.

136. B. malleatus Jay.

T. perforata, ovato-conica, tenuis, rugoso-malleata, albida, maculis fuscis subseriatis irregulariter picta; spira brevis, conica, acuta; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spiram longe superans; columella superne valide uniplicata; apertura oblonga, subauriformis, intus alba; perist. late expansum, reflexiusculum, margine columellari dilatato, soluto, angulatim reflexo. — Long. 55, diam. 23 mill. Ap. intus 30 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 78.)

Bulimus malleatus Jay in Revue zool. 1842. p. 80.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 61.
— — *Phil.* Icon. II. 9. p. 10. Bul. t. 3. f. 4.

Habitat in insulis oceani pacifici? (Jay), Nova Granada? (Petit.)

Obs. A Bul. Bolivarii praeter plicam columellae validam parum differre videtur.

137. B. fulguratus Jay.

T. perforata, oblonga, tenuiuscula, longitudinaliter minutissime et confertissime striata, lineis elevatis subconcentricis, subundulatis notata, dilute olivaceo-fusca, strigis fuscis fulminantibus ornata; spira brevis, conica, acuta, nuda, rosea; anfr. 5 convexi, ultimus spiram longe superans; columella superne valide unidentata; apertura oblonga, subauriformis; perist. simplex, late expansum, reflexiusculum, marginibus conniventibus, columellari

dilatato. — Long. 46, diam. 20 mill. Ap. intus 25 mill. longa, 14 lata. (Coll. Nr. 79.)

Bulimus fulguratus Jay in Revue zool. 1842. p. 80.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 62.
— — *Phil.* Icon. II. 9. p. 10. Bul. t. 3. f. 2.
— *eximius Reeve* Conch. syst. II. t. 173. f. 2.
Plekocheilus gracilis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 182. *)

Habitat in insulis Feejee? (Brod.), Nova Granada? (Petit.)

138. **B. morosus Gould.** †

T. crassa, rudis, ovata, albido-cinerea, longitudinaliter striata, arcte umbilicata; anfr. 5 convexi; apertura subauriculata; perist. latissime revolutum, album, postice angulatum; plica columellaris ampla. — Long. 1¾, lat. 1 poll. (G.)

Bulimus morosus Gould 1846. Exped. shells p. 31.

Habitat in insulis Feejee.

139. **B. Lattrei Pfr.**

T. perforata, oblongo-conica, tenuiuscula, opaca, subarcuatim malleata, coloribus varia; anfr. 6 — 6½ planiusculi, ultimus convexus, spiram conicam, acutam superans; columella subtorta, violacea; apertura ampla, ovalis, oblonga, intus plerumque violacea; perist. simplex, albo-marginatum, margine dextro arcuato, late expanso, columellari reflexo, perforationem semioccultante. — Long. 43, diam. 20 mill. Ap. 25 mill. longa, 14 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Lattrei Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 112. Bul. t. 4. f. 11.

α. Sordide carneus, apice rubescens, maculis et strigis nigro-fuscis irregulariter pictus.
β. Pallide lilaceus, fasciis interruptis, coerulescentibus ornatus.
γ. Unicolor stramineus, apertura concolore, columella violacea.

Habitat prope Vera Cruz Americae centralis (Lattre).

§. 10.

140. **B. labeo Broderip.**

T. perforata, ovato-acuminata; anfr. 6 convexi, ultimus (sine perist.) spira paulo brevior; columella arcuata, dente albo, obtuso munita; apertura ovalis, intus albida; perist. latissime expansum, incrassatum, reflexum, extus pallide castaneum, intus

*) T. elongata, gracili, anfr. 4, ultimo longissime maximo, subdiaphana, anfractu basali transversim corrugato, strigis angulatis irregularibus longitudinalibus creberrime fucato; anfr. caeteris subroseis; apertura subaureo-flava; labii limbo lato, reflexo, albo. — Long. 1¾, lat. ¾. (Brod. l. c.)

nitide nigricans. — Long. 78, diam. 31 mill. Ap. intus 31 mill. longa, 19 lata, c. perist. 44 mill. longa, 29 lata. (ex ic.)

Bulinus labeo Brod. in Zool. Journ. IV. p. 222. t. suppl. 31.
Bulimus labeo Nyst in Bull. Brux. XII. Extrait p. 6. t. 2. f. 2.

Habitat in Peru. (Specimen unicum Musaei Britannici, a Cl. Maw prope Toulea et inter Chachapoyas et Moyabamba detectum non amplius adest!)

141. B. Dombeyanus (Helix) Férussac.

T. rimato-umbilicata, ovato-acuminata, alba, solida, longitudinaliter rugosa; spira acuminata; anfr. 7 planulati, ultimus (excluso perist.) spiram subaequans; columella subrecta, fusca; apertura ovali-oblonga, cum fauce fusca; perist. fuscum, latissime expansum et reflexum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 59, diam. 27 mill. Ap. intus 28 mill. longa, 14 lata, cum perist. 40 mill. longa, 29 lata. (Mus. Brit. et Cuming.)

Helix Dombeyana Fér. Mus.!
Bulimus Dombeyanus Pfr. Symb. III. p. 83.

Habitat in Peru (Mus. Brit.), Mexico (Mus. Cuming.).

Obs. 1. Specimina juniora hujus speciei insignis sistunt *Lymneam rugosum Val.* in Humb. obs. zool. II. p. 250. t. 56. f. 5.

Obs. 2. Hoc loco conf. Bul. mindoroensis Nr. 194, inter Pupoideos ob affinitatem evidentem cum B. chrysalidiformi enumeratus.

142. B. Cora Orbigny. †

T. oblonga, perforata, inflata, gibbosa, subcrassa, laevigata vel subrugosa, albido-rosea, fasciis 4 transversalibus brunneis ornata; spira brevis, inflata; sutura laevigata, subplana; apex subacutus, summus truncatus; apertura magna, ovalis, lateralis; columella subobliqua; labrum tenue, acutum, subreflexum, brunneum, intus brunneum. — Latit. 44, longit. 29 mill. (Orb.) — Long. 43, diam. 23 mill. Ap. 22 mill. longa, 11 lata. (ex ic.)

Helix Cora (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 15.
Bulimus Cora Orb. voy. p. 307. t. 34. f. 14. 15.
Buliminus Cora Beck ind. p. 69. N. 11.

Habitat in republica peruviana.

143. B. Yungasensis Orbigny. †

T. elongata, umbilicata, tenuis, rugosa, griseo-violacea, brunneo-marmorata, maculis brunneis longitudinalibus, lineis 3 cincta; spira elongata, subinflata, apice obtusa; anfr. 6 elevati; apertura oblonga, obliqua; labrum tenue, subreflexum; columella

arcuata. (Orb.) — Long. 34, diam. 12 mill. Ap. 17 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Bulimus Yungasensis Orb. voy. p. 316. t. 40. f. 8.

Habitat in Bolivia.

Obs. Persimilis Bul. zoographico Nr. 266.

144. B. xanthostomus Orbigny.

T. perforata, oblongo-acuminata, crassiuscula, rugulosa, albido-rosea, fusco-maculata et strigata; spira elongata, acutiuscula; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella superne torta; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. aureum, simplex, margine dextro breviter, basali late expanso, columellari fornicatim reflexo, patente. = Long. 39, diam. 14 mill. Ap. intus 16 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 80.)

Helix xanthostoma (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 18. *)

Bulimus xanthostoma Orb. voy. p. 312. t. 40. f. 1. 2.

Bulimulus xanthostoma Beck ind. p. 64. N. 5.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

145. B. trifasciatus (Helix) Chemnitz.

T. umbilicata, ovato-oblonga, solidula, minutissime striatula, nitida, albida, fulvido-nebulosa, fasciis pluribus (plerumque 3) castaneis ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis aequans; columella subrecta; apertura ovalis; perist. album, late expansum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 27, diam. 13 mill. Ap. intus 11 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Helix trifasciata tranquebarica Chemn. IX. P. 2. p. 155. t. 134. f. 1215.

— — *Gmel.* p. 3642. N. 247.

— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 933. N. 107.

— *trizonalis* (Cochlogena) *Fér.* pr. 417.

Bulimus trifasciatus Brug. Enc. méth. p. 317. N. 32.

— — *Gray* in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — *Lam.* ed. Dh. 83. p. 261.

— — *Küst.* t. 10. f. 6. 7.

— *zonatus Swains.* Zool. Ill. t. 17.

Orthostylus? trifasciatus Beck ind. p. 51. N. 16.

Habitat ad Tranquebar (Chemnitz).

Obs. In hac sectione conf. B. Tupacii β Nr. 129.

---

*) T. elongata, subumbilicata, crassa, fere rugosa, albido-rosea, fusco-maculata, trilineis ornata; spira elongata, convexa; anfr. 8; apice obtuso, rubro; apertura elongata, recta, rosea; columella torta, subinflata; labro acuto, lato, reflexo. — Longit. 46, latit. 17 mill. (Orb. l. c.)

146. B. geometricus Pfr.

T. rimato-umbilicata, ovato-turrita, opaca, laevigata, albida, coerulescenti-fusco eleganter taeniata, fasciata et undatim strigata; spira turrita, apice acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, basi rotundatus, antice subascendens; columella superne plicata, cum fauce fusco-violascens; apertura verticalis, oblique semiovalis, intus alba, subfasciata; perist. undique late expansum, pallide flavum, margine columellari perdilatato, sinuoso, patente. — Long. 35, diam. 13 mill. Ap. intus 13 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 84.)

Bulimus geometricus Pfr. Symb. III. p. 84.

Habitat in Valle Magdalenae Novae Granadae.

147. B. ceylanicus Pfr.

T. aperte perforata, ovato-conica, solida, oblique striatula, nitidula, alba vel carneo-fusca; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata; apertura truncato-ovalis; perist. late expansum, reflexiusculum, margine columellari dilatato, reflexo, patente. — Long. 27, diam. 14 mill. Ap. intus 11 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming. et Gruner.)

Bulimus ceylanicus Pfr. Symb. III. p. 83.

Habitat in insula Ceylon (Templeton).

Obs Num hic inserendus Bulim. laevis Gray (Helix laevis Wood suppl. p. 32. t. 8. f. 67.)?

148. B. marmarinus Orbigny. †

T. elongata, ventrosa, crassa, subumbilicata, rubro-fusca, maculis fuscioribus nebulata, fasciis 4 interruptis, maculis brunneis regulariter intersecta; spira plana; anfr. 7; sutura adumbrata; apex subacutus; apertura elongata, albida, irregularis, ampla; columella torta, plana; labrum acutum, reflexum. (Orb.) — Long. 43, diam. 19 mill. Ap. 22 mill. longa, 11 lata. (ex ic.)

Helix marmarina (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 18.
Bulimus marmarinus Orb. voy. p. 310. t. 39. f. 11. 12.
Bulimulus marmarinus Beck ind. p. 63. N. 2.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

149. B. hygrohylaeus Orbigny.

T. umbilicata, oblongo-acuminata, tenuiuscula, rugoso-striatula, albida, fusco-nebulosa vel spadiceo interrupte fasciata et strigata; spira elongata, acuminata; anfr. 7 vix convexi, ultimus spira paulo brevior; columella subrecta, paulo recedens; apertura oblonga, intus concolor; perist. simplex, margine dextro superne

breviter, versus basin late expanso, columellari perdilatato, plano, patente. — Long. 39, diam. 14 mill. Ap. intus 17 mill. longa, 7½ lata. (Coll. Nr. 82.)

Helix hygrohylaea (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 18.
Bulimus hygrohylaeus Orb. voy. p. 311. t. 40. f. 3—5.
Bulinus hygrohylaeus Sow. Conch. Ill. f. 62.
Bulimulus hygrohylaeus Beck ind. p. 63. N. 3.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

150. B. expansus Pfr. †

T. perforata, ovato-pyramidata, fuscescenti-albida, strigis fulminatis, fuscis variegata, longitudinaliter confertim striata; anfr. 7 planiusculi, ultimus spiram subaequans; columella plicata; apertura dilatata, intus violacea; perist. undique late reflexum. — Long. 40, diam. 22 mill. longa. Ap. intus 18 mill. longa, 10 lata. (ex ic.)

Bulinus pulchellus Sow. Conch. Ill. f. 91. Nec Spix.
β. Minor, fuscescens: long. 36, diam. 17 mill.
Bulinus pulchellus var. Sow. Conch. Ill. f. 92.

Habitat prope Huallaga.

151. B. lophoicus Orbigny. †

T. elongata, subumbilicata, tenuis, longitudinaliter rugosa, albo-grisea vel rosea, lineis fuscioribus variata; spira elongata, inflata, apice obtusa, rosea; anfr. 8; apertura ovalis, recta, flava; columella crassa, subinflata, recta; labrum crassum, latum, reflexum. (Orb.) — Long. 34, diam. 12 mill. Ap. 15 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Helix lophoica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 19.
Bulimus lophoicus Orb. voy. p. 316. t. 40. f. 14. 15.
Bulinus lophoicus Sow. Conch. Ill. f. 65.
Bulimulus lophoicus Beck ind. p. 64. N. 9.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

152. B. strigatus Sowerby.

T. rimato-subperforata, ovato-acuta, tenuis, striatula, nitida, alba, strigis latis denticulatis, spadiceis ornata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira brevior; apertura suboblique porrecta, truncato-ovalis; perist. simplex, late expansum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 25, diam. 12 mill. Ap. intus 12 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus strigatus Sow. Conch. Ill. f. 95.
β. Unicolor albida, apertura intus lilacea.
Bulinus strigatus var. Conch. Ill. f. 96.

Habitat prope Huallaga.

153. B. Proteus Brodcrip.

T. umbilicata, ovato-conica, tenuis, confertim granulato-striata, sordide alba, fusco variegata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; umbilicus majusculus, pervius; apertura subovalis; perist. tenue acutum, late expansum, marginibus conniventibus, columellari latissimo, plano, patente. — Long. 40, diam. 19 mill. Ap. intus 19 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 83.)

Bulinus Proteus Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. p. 107.
— — *Müll.* synops. p. 22.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 14 a. b. c.
Bulimus sordidus Lam. ed. Dh. 95. p. 267. Nec Less.
Buliminus Proteus Beck ind. p. 69. N. 8.

Habitat in Peruviae montibus.

154. B. pallidior Sowerby.

T. rimata, ovato-acuminata, solidiuscula, striata, alba; spira elongato-conica, acuta; anfr. 7 convexi, ultimus spiram subaequans; columella strictiuscula; apertura ovali-oblonga, intus fuscidula; perist. simplex, late expansum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 43, diam. 17 mill. Ap. 23 mill. longa, intus 9 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus pallidior Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 72.
— — *Müll.* synops. p. 27.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 39. 44.
Bulimus pallidior Lam. ed. Dh. 125. p. 280.
Bulimulus pallidior Beck ind. p. 66. N. 37.

Habitat in America meridionali (Cuming).

155. B. versicolor Brodcrip.

T. umbilicata, ovato-pyramidata, obsolete decussata, sericea, albida, maculis castaneis, vel castanea, strigis, fasciis maculisque fulvis et albis variegata; anfr. 6 subplanulati, ultimus spiram paulo superans; umbilicus angustus, non pervius; columella subarcuata; apertura ovalis, intus concolor vel fuscidula; perist. late expansum, marginibus conniventibus, albo-limbatis, columellari dilatato, subfornicato, patente. — Long. 29, diam. 14 mill. Ap. 16 mill. longa, intus 8 lata. (Coll. Nr. 84.)

Bulinus versicolor Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 108
— — *Müll.* synops. p. 23.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 16 et 16*.
Bulimus versicolor Lam. ed. Dh. 96. p. 268.
Helix versicolor Orb. synops. p. 14.
Buliminus versicolor Beck ind. p. 69. N. 10.

β. Gracilior, spira subelongata, anfractum ultimum aequante vel su-

perante. — Long. 26, diam. 11 mill. Ap. 13 mill. longa, intus 7 lata. (Spec.)

Bulinus mutabilis Sow. Conch. Ill. f. 15.

— — *Sow.* Zool. of Beech. voy. t. 38. f. 20.

Bulimus varians Küst. p. 41. t. 13. f. 3. 4.

Habitat in Peru (Cuming), Trujillo (Orb.).

Obs. Species forma pervariabilis, sed sculptura constans.

156. B. mutabilis Broderip.

T. umbilicata, oblongo-conica, tenuiuscula, seriatim granulato-exasperata, fusco et albido strigatim variegata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira vix brevior; umbilicus mediocris, non pervius; columella subrecta, subinflata, albida vel pallide fulvescens; apertura ovalis; perist. acutum, late expansum, marginibus conniventibus, columellari fornicato, patente. — Long. 28, diam. 13 mill. Ap. intus 13 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 85.)

Bulinus mutabilis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 108.

— — *Müll.* synops. p. 23.

Buliminus mutabilis Beck ind. p. 69. N. 9.

β. Sordide albidus, fasciis variis rufescenti-fuscis, latioribus vel angustioribus ornatus.

γ. Anfractibus convexis, spira elongatiore, paulo graciliore. — Long. 31, diam. 13 mill. Ap. intus 14 mill. longa, medio 7½ lata. (Spec.)

Bulinus mutabilis Sow. Conch. Ill. f 15*.

Habitat in Peru, Truxillo (Cuming).

157. B. bivittatus Sowerby. †

T. ovato-pyramidata, albida; anfr. 8 convexi, ultimus antice zonis 2, mox evanescentibus, fuscis ornatus; perist. album, late expansum, deorsum dilatatum. — Long. 29, diam. 12 mill. (ex ic.)

Bulinus bivittatus Sow. Conch. Ill. f. 46.

Bulimulus bivittatus Beck ind. p. 65. N. 21.

Habitat in Brasilia.

158. B. lacticolor Sowerby. †

T. ovato-pyramidata, lactea, striis transversis confertis et obliquis rarioribus subdecussata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; perist. album, undique expansum. — Long. 26, diam. 14 mill. (ex ic.)

Bulinus lacticolor Sow. Conch. Ill. f. 48.

Habitat . . . ?

159. B. derelictus Brodcrip.

T. umbilicata, ovato-conica, striata, lineis concentricis sub lente obsolete decussata, albida vel rufescens; spira conica, apice rosea, subpapillaris; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram subaequans, basi juxta umbilicum apertum, pervium compressus; apertura oblongo-ovalis, basi subangulata; perist. simplex, acutum, marginibus approximatis, dextro expanso, columellari dilatato, subreflexo. — Long. 25, diam. 12½ mill. Ap. 13½ mill. longa, intus 6½ lata. (Coll. Nr. 86.)

Bulinus derelictus Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. p. 107.
— — *Müll.* synops. p. 22.
Bulimus derelictus Orb. voy. p. 306.
— — *Lam.* ed. Dh. 93. p. 266.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 139. t. 14. f. 13. 14.
— *curtus Koch* in Phil. Icon. I. 7. p. 158. Bul. t. 2. f. 8.
Helix derelicta Orb. synops. p. 14.
Buliminus derelictus Beck ind. p. 70. N. 18.

Habitat prope Cobija Boliviae (Cuming, Orb.).

Obs. Conf. B. rimatus Nr. 269.

159*. B. connivens Pfr.

T. umbilicata, ovato-conica, solidula, oblique plicatula, opaca, alba; spira conica, apice acutiuscula, lutescens; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spiram aequans, medio obsolete angulatus, basi rotundatus; columella subrecedens; apertura rotundato-ovalis, intus fuscula; perist. tenue, breviter expansum, marginibus conniventibus, callo tenui junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 19, diam. 10½ mill. Ap. 10 mill. longa, intus medio 6 lata. (Coll. Nr. 87.)

Bulimus connivens Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 148.

Habitat in provincia Senegal. (Largilliert.)

Obs. Praecedenti persimilis, forma columellae et aperturae etc. facile distinguendus.

160. B. Forskalii Beck.

T. rimata, ventricoso-conica, tenuis, sordide albido-fusces-cens, oblique (in anfractu ultimo arcuatim) costulato-striata; spira late conica, acuta; anfr. 8 plani, penultimus convexiusculus, ultimus spira paulo brevior; columella superne profunde et valide plicato-dentata; apertura semiovalis; perist. simplex, late expansum, fulvo-labiatum, marginibus approximatis. — Long. 30, diam. 20 mill. Ap. intus 12 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 88.)

Buliminus Forskalii Beck ind. p. 68. N. 3. (ex synon.)
Bulimus Forskalii Pfr. Symb. II. p. 45.

Bulimus Forskalii Küst. t. 15. f. 6. 7. (ic. Chemn.)
— *aratus Küst.* t. 18. f. 3. 4.
Helix sulcata Chemn. IX. P. 2. p. 165. t. 135. f. 1231.
Pupa candida Lam. 4. p. 106. ed. Dh. p. 171.
— — *Deless.* recueil t. 27. f. 10.
— *arata Récluz* in Revue zool. 1843. p. 4.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 75.

Habitat in Arabia (Mus. Paris.), insula Socotora (Jehenne).

Obs. Variat forma magis elongata, minus ventrosa, colore uniformi aurantiaco-fuscescente. Specimen tale vidi Musaei Cumingiani, nomine Hel. arabicae e collectione Forskaliana oriundum, sed descriptioni hujus speciei minime congruum. (Conf. Bul. labiosus Nr. 170.)

161. B. fragosus (Helix) Férussac.

T. rimata, ovato-acuminata, solidula, striis incrementi et concentricis confertissimis decussata, alba; spira conica, acutiuscula; anfr. 8½ planiusculi, ultimus spira brevior; columella obsolete uniplicata; apertura ovalis, intus alba; perist. simplex, late expansum, marginibus approximatis. — Long. 33, diam. 15 mill. Ap. intus 14 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 89.)

Helix fragosa (Cochlogena) *Fér.* pr. 421 et Mus.!
Buliminus fragrosus Beck ind. p. 68. N. 1.
Bulimus fragosus Pfr. Symb. II. p. 45.
— *labrosus Küst.* t. 18. f. 1. 2.

Habitat in Yemen Arabiae.

162. B. Bertheloti Pfr.

T. curvato-rimata, cylindracea, apice conica, solidula, obliquе striatula, corneo-albida; anfr. 8 planiusculi, supremi 5 conum brevem, subacutum formantes, ultimus ⅖ longitudinis paulo superans; apertura lata, semiovalis; columella subplicata; perist. album, late expansum, margine dextro arcuato, columellari strictiusculo, dilatato, patente. — Long. 25, diam. 10½ mill. Ap. 11 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 90.)

Bulimus Bertheloti Pfr. Symb. III. p. 83.

Habitat in insula Canaria.

163. B. labrosus Olivier.

T. rimato-perforata, cylindraceo-oblonga, apice obtusa, obliquе obsolete striata, subpellucida, corneo-albida; anfr. 7 planulati, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella superne intus uniplicata; apertura ovalis; perist. late expansum, vix reflexiusculum, marginibus conniventibus, callo nitido, interdum tuberculifero junctis. — Long. 33, diam. 12½ mill. Ap. intus 13 mill.

longa, 8 lata. (Coll. Nr. 91. Spec. ex Mus. Paris. hoc nomine communicat. Alia dimidio minora sunt.)

Bulimus labrosus Oliv. voy. II. p. 222. t. 31. f. 10.*)
Helix labrosa (Cochlogena) *Fér.* pr. 419.
Bulimina labrosa Ehrenb. Symb. phys.**)
Buliminus labrosus Beck ind. p. 69. N. 5.
Pupa labrosa Lam. 5. p. 106. ed. Db. p. 171.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 404. N. 8.
— *candida Küst.* Pupa p. 69. t. 9. f. 6. 7.

Habitat prope Berytum Syriae.

164. B. Jordani Boissier. †

T. cylindraceo-ovata, late rimata, apice obtusa, tenuiuscula, nitidula, subpellucida, pallide cornea, longitudinaliter sub lente confertissime striata; apertura ovata; perist. acutum, late reflexum, sublabiatum, marginibus callo albo junctis; anfr. 5½ planiusculi, ultimus dimidiam longitudinis partem superans. — Diam. 12, alt. 32 mill. (Ch.)

Bulimus Jordani Boissier mss.
— — *Charp.* in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 141.

Habitat circa Banias, prope fontes Jordani.

Obs. «Differt a Bul. labroso Oliv. magnitudine majore, forma ventrosiore et apice obtusiore». (Charp.) — Varietas speciei a me nomine B. labrosi descriptae esse videtur. Conf. Nr. 163 et 166.

165. B. lycicus Pfr.

T. rimato-perforata, ovata, tenuis, laevigata, nitidissima, corneo-lutescens; spira conoidea, apice obtusa; sutura submarginata; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subuniplicata; apertura ampla, semiovalis; perist. intus album, marginibus callo tenui junctis, dextro late expanso, columellari late reflexo. — Long. 25, diam. 12 mill. Ap. intus 11 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus lycicus Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 113. t. 4. f. 4.

Habitat in Lycia (Spratt).

166. B. halepensis Pfr.

T. rimata, cylindraceo-ovata, tenuis, nitida, pellucida, cornescenti-albida; sutura albo-marginata; anfr. 7 planiusculi, ulti-

*) B. cylindraceus, sordide exalbidus; spira obtusa, rufescente; labio explanato, extante; columella basi obscure gibba. (Oliv. l. c.)

**) T. oblongo-cylindracea, obtusa, glabra, subpellucida, obsolete transverse striata, albido-cornea; aperturae labro margine reflexo dilatato; columellae plica obtuse gibba. Spirae anfr. 6½. Umbilicus apertus. — Long. 14‴, lat. 6‴. (Ehrenb. l. c.)

mus ⅓ longitudinis subaequans; columella subplicata; apertura rotundato-ovalis; perist. nitide album, breviter reflexum, marginibus approximatis, callo nitido junctis. — Long. 21, diam. 8½ mill. Ap. intus 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 92.)

Helix Alepi (Cochlogena) *Fér.* pr. 418 et Mus.!
— *labrosa Wood* suppl. t. 8. f. 69.
Buliminus Alepi Beck ind. p. 68. N. 4.
Bulimus halepensis Pfr. Symb. I. p. 45.
β. Minor: long. 17, diam. 7 mill. Ap. 6½ mill. longa, 4½ lata.

Habitat in Syria.

Obs. Differt a B. labroso magnitudine, spira minus obtusa, anfractu ultimo brevi, apertura rotundata et peristomate breviter reflexo, marginibus magis approximatis. — Hunc verum Bul. labrosum Oliv. esse ex sententia Woodi et Charpentieri admittere non possum.

167. **B. syriacus Pfr.**

T. rimata, cylindraceo-subfusiformis, oblique striatula, nitida, coerulescenti-alba, apice cornea vel nigricans; anfr. 8 planulati, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi turgidus; columella obsolete uniplicata; apertura ovalis, intus fuscidula; perist. album, late expansum, marginibus conniventibus, dextro arcuato, columellarem dilatatum, patentem vix superante. — Long. 20, diam. 7 mill. Ap. intus 5½ mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 93.)

Bulimus syriacus Pfr. Symb. III. p. 88.
β. Minor: long. 16, diam. 6½ mill.

Habitat in Syria.

168. **B. Cantorii Philippi.**

T. rimato-perforata, oblongo-conica, tenuis, pellucida, oblique irregulariter striatula, cornea, albido hinc inde maculata et nebulosa; spira subturrita, apice obtusiuscula; anfr. 8 parum convexi, ultimus antice subascendens, ⅓ longitudinis subaequans; columella arcuata; apertura ovalis; perist. expansum, intus callosum, nitidum, marginibus subapproximatis, dente calloso juxta insertionem marginis dextri. — Long. 21, diam. 7 mill. Ap. intus 6½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 94.)

Bulimus Cantorii Phil. in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 165.

Habitat in China, in insula aurea prope Nanking.

169. **B. carneus Pfr.**

T. rimata, cylindracea, striatula, nitida, sordide carnea; spira elongata, apice obtuse conica; sutura marginata; anfr. 9 planiusculi, ultimus antice subascendens, ⅓ longitudinis vix aequans; columella obsolete plicata; apertura lata, semiovalis; perist. intus album, marginibus subparallelis, dextro expanso,

columellari late reflexo, patente. — Long. 26, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, intus 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus carneus Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 114. t. 4. f. 5.

Habitat in Lycia (Spratt).

Obs. 1. Differt a B. halepensi praecipue aperturae latae marginibus distantibus.

Obs. 2. Hoc loco conf. Pupa bulimoides Pfr. Nr. 19.

§. 11.

170. B. labiosus (Helix) Müller.

T. profunde rimata, oblongo-conica, subtilissime oblique striatula, nitida, pellucida, alba; anfr. 8, supremi planulati, medii convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; apertura semiovalis; columella intus uniplicata; perist. late expansum, reflexum, marginibus approximatis, callo nitido junctis. — Long. 24, diam. 9 mill. Ap. intus 9 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 95.)

Helix labiosa Müll. verm. II. p. 96. N. 294.
— — *Gmel.* p. 3645. N. 101.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 934. N. 109.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 420.
— *cylindracea acuta Chemn.* IX. P. 2. p. 166. t. 135. f. 1234.
— *arabica Niebuhr* descr. anim. quae in itinere orientali observavit P. Forskal, p. 127? *)
Bulimus labiosus Brug. Enc. méth. p. 347. N. 85?
— — *Lam.* ed. Dh. 130. p. 282.
— — *Küst.* p. 48. t. 15. f. 1. 2.
Buliminus labiosus Beck ind. p. 69. N. 6.
Pupa Jehennei Récluz in Revue zool. 1843. p. 4.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 76.

Habitat in insula Socotora (Jehenne).

Obs. In nonnullis speciminibus callus parietis aperturalis dente prominente, in specimine meo obsoleto, in illo a Cl. Bruguière descripto (si eadem species) distinctiore, munitus est.

171. B. hyalinus (Partula) Broderip.

T. perforata, ovato-oblonga, sub lente levissime decussatim striata, nitidula, hyalina; spira conica, acutiuscula; anfr. $5^1/_2$ convexiusculi, ultimus spira brevior; columella subplicata; apertura ovalis; perist. undique expansum, marginibus distantibus, callo

*) H. turrita terrestris, oblongo-conica, alba, subumbilicata, glabra; apertura muta. Descr. Vix pollicaris, dimidium digitum latum. Umbilici initium breve, formatum e labio interiore adscendente. Apertura ovato-acuminata; margine subtus et lateralibus dilatato, leviter reflexo, superne spinis appressis, obsoletis. Color albidus. — Lohajae. (Nieb. l. c.) — Conf. B. Forskalii Nr. 160.

tenuissimo junctis. — Long. 18, diam. 8 mill. Ap. intus 7 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 96.)

Partula hyalina Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. p. 32.
— — *Müll.* synops. p. 32.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 1. 2.
Bulinus hyalinus Sow. Conch. Ill. f. 9.
Bulimus hyalinus Lam. ed. Dh. 135. p. 284.
Partulus hyalinus Beck ind. p. 57. N. 5.

Habitat in insula Ohetaroa Polynesiae (Cuming).

Obs. Differt a B. labioso magnitudine, spira regulariter conica, perist. expanso, non reflexo, marginibus subparallelis, non conniventibus.

172. **B. carteriensis (Helix) Quoy.**

T. perforata, oblongo-conica, tenuis, pallide fulva, strigis longitudinalibus irregularibus et transversis confertis decussata; spira conica, acuta; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; apertura ovali-oblonga; columella leviter arcuata; perist. acutum, late expansum, marginibus conniventibus, callo tenuissimo junctis. — Long. 19, diam. 7½ mill. Ap. intus 7½ mill. longa, 3½ lata. (Mus. Cuming.)

Helix Carteriensis Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 117. t. 9. f. 10. 11.
Bulimus Carteriensis Lam. ed. Dh. 132. p. 283.
Partulus Carteriensis Beck ind. p. 57. N. 4.

Habitat ad portum Carteret Novae Hiberniae.

173. **B. griseus (Partula) Lesson.** †

T. perforata, ovato-acuta, laete cinerea, striis longitudinalibus et transversis minutissimis decussata et granulosa; spira elongata, acuta; anfr. 6 planiusculi; apertura ovalis, alba; perist. incrassatum, marginibus callo junctis, columellari reflexo. — Long. 9, diam. 3½ lin. (Less.)

Partula grisea Less. voy. Coq. p. 325. t. 13. f. 11.
Bulimus griseus Pfr. Symb. I. p. 82. II. p. 115.

Habitat in Nova Guinea.

Obs. An eadem species ac praecedens?

174. **B. Hebe Pfr.**

T. perforata, globoso-conica, tenuis, sub lente minutissime decussata, hyalina; spira brevis, conica, acuta; anfr. 4½ plani, ultimus spiram superans, globosus; columella brevis, subplicata; apertura lata, subsemicircularis, callo dentiformi profundo in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. intus albo-callosum,

undique breviter expansum. — Long. 16, diam. 9 mill. Ap. intus 7 mill. longa, 5½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Hebe Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 39.

Habitat in insulis Societatis (Mallet).

175. **B. gonochilus Pfr.**

T. subperforata, ovato-conica, tenuis, subtiliter et confertim decussata, diaphana, viridula; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus convexus, spiram superans; columella superne obsolete plicata; apertura oblonga, superne oblique truncata; perist. angulatim late expansum, reflexiusculum, tenue, intus candidum, marginibus distantibus. — Long. 17, diam. 9 mill. Ap. intus 8 mill. longa, 4 lata, cum perist. 10 longa, 7 lata. (Coll. Dunk.)

Bulimus gonochilus Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 82.

Habitat . . . ?

176. **B. gibbus (Partula) Férussac.**

T. perforata, ovato-conica, minutissime concentrice striata, laevigata; spira brevis, conica, rosea vel carnea; sutura albo-marginata; anfr. 5 subplani, ultimus spira longior, albus vel flavus, inflatus, subgibbus; columella obliqua; apertura oblique ovalis; perist. intus callosum, margine dextro expanso, columellari reflexo. — Long. 17, diam. 10 mill. Ap. intus 7 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 97.)

Partula gibba Fér. prodr. p. 66. N. 3.

— — *Fér.* in Voy. de Freyc. Zool. p. 485.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 197. t. 20. f. 3. 4.

Helix gibba Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 113. t. 9. f. 18—20.

Bulimus gibbus Lam. ed. Dh. 133. p. 283.

Partulus gibbus Beck ind. p. 57. N. 7.

β. Spira paulo magis elongata:

Helix gibba var. Quoy et *Gaim.* l. c. t. 9. f. 21. 22.

Partula gibba Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. 3. 4.

Habitat in insulis Mariannis: Guam.

177. **B. radiolatus Pfr.**

T. subperforata, oblongo-attenuata, apice obtusa, tenuis, lineis spiralibus impressis, distantiusculis sculpta, pallide straminea, strigis saturatioribus et lineis fuscis radiolata; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spiram subaequans, antice basi tumidus; columella brevis, breviter recedens; apertura oblique ovalis, intus nitida, flava; perist. simplex, tenue, album, expansum, margine dextro strictiusculo, columellari superne dilatato, fornicato-

patente. — Long. 19, diam. 10 mill. Ap. intus 9 mill. longa, medio 5 lata. (Coll. Nr. 98.)

Bulimus radiolatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 39.

β. Carneus, radiis cinnamomeis.

Habitat in Nova Hibernia (Gray).

178. B. roseus (Partula) Broderip.

T. perforata, ovato-pyramidata, apice acuta, solidula, striis incrementi et spiralibus confertissimis magis minusve distincte decussata, coloribus varia; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus ⅘ longitudinis subaequans, obsolete angulatus; columella subsimplex, vix plicata; apertura oblongo-ovalis; perist. intus incrassatum, margine dextro breviter expanso, columellari lato, reflexo. — Long. 23, diam. 12 mill. Ap. intus 9½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 99.)

Partula rosea Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 125.
— — *Müll.* synops. p. 32.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 9. 10.
Partulus roseus Beck ind. p. 57. N. 2.
Bulimus roseus Pfr. Symb. I. p. 85. II. p. 121.

β. Minor, striis spiralibus obsoletioribus: long. 19, diam. 9 mill. Ap. intus 8 mill. longa, 4½ lata. (Spec.)

Partula varia Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 125.
— — *Müll.* synops. p. 33.
— — *Reeve* l. c. t. 175. f. 5. 6.
Bulimus varius Pfr. Symb. I. p. 86. II. p. 124.

Habitat in insula Huaheine (Cuming).

Obs. Variat: unicolor saturate roseus, perist. roseo, — flavus, apice roseus, — flavus, basi, sutura et apice roseis, — flavus, basi et sutura violaceis, — flavus, spira castanea. — Var. β plerumque castanea, fascia 1 et basi flavis.

179. B. isabellinus Pfr.

T. subperforata, oblongo-conica, solida, striatula, isabellina; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 convexiusculi, supremi lineis impressis, spiralibus tenuissime sculpti, ultimus spira paulo brevior, basi antice rotundatus; columella alba, plicato-gibba; apertura oblongo-ovalis, callo dentiformi, profundo in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. callosum, album, late expansum, reflexiusculum, margine columellari dilatato, sinuato-reflexo. — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. intus 9 mill. longa, 4½ lata. (Mus Cuming.)

Bulimus isabellinus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 39.

Habitat . . . ?

180. B. vanikorensis (Helix) Quoy.

T. perforata, oblongo-conica, solida, striata, lineis spiralibus obsoletissime decussata, fulva; anfr. 5 – 6 planiusculi, ultimus spiram subaequans; columella subrecta, gibbosula; apertura oblongo-ovalis; perist. intus incrassatum, album, margine exteriore expanso, columellari reflexo. (Q.) — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. intus 10 mill. longa, 4 lata. (ex ic.)

Helix Vanikorensis Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 115. t. 9. f. 12—17.
Bulimus Vanikorensis Lam. ed. Dh. 131. p. 282.
Partulus Vanikorensis Beck ind. p. 57. N. 3.

β. Sinistrorsus: long. 21, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, intus 4½ lata. (Coll. Nr. 100.)

Partula otaheitana Reeve Conch syst. II. t. 175. f. 15?

Habitat in insula Vanikoro.

181. B. amabilis Pfr.

T. sinistrorsa, subperforata, ovato-turrita, solidula, striatula, nitida, citrina, apice acuto rubicunda; sutura albo-marginata; anfr. 5, supremi plani, reliqui convexi, ultimus spira brevior; columella subsimplex, vix plicata; apertura oblongo-semiovalis; perist. subincrassatum, album, expanso-reflexiusculum, margine columellari lato, plano, patente. — Long. 23, diam. 11½ mill. Ap. intus 9½ mill. longa, 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus amabilis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 38.

β. Paulo minor, fasciis latis nigricanti-castaneis ornatus, peristomate fusco-livido.

Habitat in insula Annaa s. Chain-Island.

182. B. otaheitanus Bruguière.

T. perforata, ovato-conica, substriata, laevigata, fusca; spira conica, acutiuscula; anfr. 5—6 vix convexiusculi, ultimus spira vix brevior; columella subgibba; apertura semiovalis, subauriformis, dente calloso in ventre anfractus penultimi saepe coarctata; perist. intus callosum, album, margine exteriore late expanso, columellari reflexo. (Coll. Nr. 101.)

A. Sinistrorsus: long. 17½, diam. 10 mill. Ap. intus 7 mill. longa, 4⅓ lata.

Bulimus otaheitanus Brug. Enc. méth. I. p. 347. N. 84.
— — *Lam.* ed. Dh. 129. p. 281.
— — *Küster* t. 14. f. 5. 6.
Helix perversa etc. Chemn. IX. P. 1. p. 108. t. 112. f. 950. 51.
— *otaheitana Dillw.* descr. cat. II. p. 935. N. 111.
— — *Wood* ind. t. 34. f. 110.
Partula otaheitana Fér. prodr. p. 66. N. 5.

Partula otaheitana Less. voy. de la Coq. t. 7. f. 6. 7.
— — *Grat.* Bord. XI. p. 426. t. 2. f. 4.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 16.
Partulus otaheitanus Beck ind. p. 58. N. 10.

β. Fulvus, fasciis nonnullis castaneis ornatus.

B. Dextrorsus: long. 20, diam. 10½ mill. Ap. intus 8 mill. longa. 5 lata.

Partula auriculata Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 33.
— — *Müll.* synops. p. 33.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 7. 8.
— *tahulana Anton* Verz. p. 40. N. 1470.
— *maura Mühlf.* (teste Anton.)
Partulus auriculatus Beck ind. p. 58. N. 8.
Bulimus auriculatus Pfr. Symb. I. p. 80. II. p. 111.

β. Pallidus, fusco-strigatus et bi- vel trifasciatus: long. 16, diam. 8 mill. Ap. intus 6 mill. longa, 4 lata. (An = Bul. lineatus Less.?)

Habitat in insulis Societatis: Taiti, Huaheine, var. *B β* in ins. Eimeo.

Obs. 1. Species pervariabilis quoad magnitudinem, spiram magis minusve gracilem et dentem aperturae saepe obsoletum vel deficientem.
Obs. 2. Conf. B. rufus Less. Nr. 631.

183. **B. lineatus (Partula) Lesson.** †

T. perforata, ovali-oblonga, pallide flava, fulvo-bifasciata; spira conica; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; apertura ovalis; perist. expansum, margine columellari valde incrassato. — Long. 8, diam. 5 lin. (L.)

Partula lineata Less. voy. Coq. p. 324. t. 7. f. 8. 9.
Partulus torosus Beck ind. p. 57. N. 6?

Habitat in insula Oualan.

Obs. 1. An praecedentis varietas absque dente?
Obs. 2. Conf. Bul. luteus Less. Nr. 629.

184. **B. Ganymedes Pfr.**

T. umbilicata, oblongo-conica, tenuis, striis incrementi crebris et lineis impressis, spiralibus, undulatis, confertissimis minute decussata, scabriuscula, sub epidermide citrina fugacissima albicans, non nitens; spira conica, acutiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram subaequans, medio obsoletissime angulatus, fascia unica, latiuscula, castanea ornatus; columella strictiuscula; apertura oblonga, superne oblique truncata; perist. simplex, tenue, undique late expansum. Long. 23, diam. 10½ mill. Ap. intus 10½ mill. longa, 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Ganymedes Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846 p. 39.

Habitat in insulis Societatis.

185. **B. faba (Limax) Martyn.**

T. perforata, ovato-conica, solidula, laevigata vel striatula, fulva unicolor vel fasciis nigricanti-castaneis, altera lata ad basin, altera angustiore prope suturam ornata; spira conica, acuta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella superne tuberculosa; apertura oblonga; perist. albidum, intus prominenter callosum, late expansum, margine supero breviter arcuato, dextro et sinistro parallelis. — Long. 26, diam. 13 mill. Ap. intus 11 mill. longa. (Coll. Nr. 102.)

Limax faba Martyn figures etc. t. 67.
— — *Mart.* in Chenu bibl. conch. II. p. 24. t. 24. f. 2 a.
Auris Midae fasciata Chemn. IX. P. 2. p. 44. t. 121. f. 1041.
Helix faba Gmel. p. 3625. N. 252.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 906. N. 46.
— — *Wood* ind. t. 33. f. 47.
Voluta auris Malchi γ Gmel. p. 3437. N. 11.
— *fasciata Dillw.* cat. I. p. 502. N. 7.
Bulimus faba Lam. ed. Dh. 134. p. 284.
— — *Küster* p. 20. t. 4. f. 3. 4.
— *australis Brug.* Enc. méth. I. p. 347. N. 83.
Partula australis Fér. pr. p. 66.
— — *Grat.* Bord. XI. p. 424. t. 2. f. 5.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 302.
— *faba Sow.* in Zool. of Beech. voy. p. 144. t. 38. f. 4.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 13. 14.
— *bulimoides Less.* voy. Coq. p. 326.
Partulus australis Beck ind. p. 57. N. 1.

β. Testa castanea, apertura angustiore:
Bulimus inconstans Mühlf. (teste Ant. p. 40.)

γ. T. flavescenti-viridi, fusco-fasciata:
Bulimus tricolor Mühlf. (teste Anton.)

Habitat in insulis Australiae.

186. **B. guamensis Pfr.**

T. rimato-perforata, ovato-conica, solidiuscula, subtilissime decussata, castanea; spira breviuscula, obtusa; anfr. 5 convexi, ultimus ventrosus, spiram superans; columella subrecta; apertura ampla, semiovalis, intus coerulescens; perist. intus album, marginibus remotis, dextro expanso, columellari late reflexo, patente. — Long. 26, diam. 15 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus guamensis Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 113. Bul. t. 4. f. 9

Habitat in insula Guam.

187. **B. Rohri Pfr.**

T. perforata, ovato-conica, solidula, longitudinaliter striatula, striis spiralibus confertissimis decussata, albido-fulva, fasciis angustis castaneis varie ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans, medio compressus; columella torta, callosa; apertura subtetragona, intus nitide lactea; perist. vix expansum, intus labiatum, marginibus subparallelis, dextro superne breviter arcuato, columellari reflexo, perforationem fere occultante. — Long. 24, diam. 13 mill. Ap 13 mill. longa, intus 6⅔ lata. (Mus. Cuming.)

Partula virgulata Mighels in Bost. Proc. 1845. Jan. p. 20.
Achatinella Rohri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 38.
Bulimus Rohri Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 115.

β. Sinistrorsus, brevior, convexior:
Achatinella insignis Migh. in sched.

Habitat in insulis Sandwich. (Rohr), Molokai (Mighels).

188. **B. Gouldi Pfr.**

T. anguste umbilicata, ovato-conica, solidula, decussatim subtilissime striatula, nitida, cinereo, fusco et albo eleganter radiata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella subtorto-plicata, alba; apertura oblonga, intus alba; perist. breviter expansum, marginibus subparallelis, columellari late reflexo, umbilicum non occultante. — Long. 19, diam. 10 mill. Ap. 9 mill. longa, intus 5 lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella radiata Gould in Bost. Proc. 1845. p. 27.
Bulimus Gouldi Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 116.

Habitat in insulis Sandwich.

Obs. Haec species et antecedens forma et columella Achatinellis affines, sed perforatae.

189. **B. fragilis (Partula) Férussac.** †

T. ovato-elongata, perforata, fragilis, striatula, pellucida, rufescens; spira obtusa, suturis valde notatis; anfr. 4, ultimus ventricosus, subcarinatus, reliquis major; apertura ovata; perist. subreflexum. (Fér.) — Dimens.?

Partula fragilis Fér. prodr. p. 66. N. 4.
— — *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 486.
Bulimus rubens Mühlf. (teste Anton p. 40.)

Habitat in insulis Mariannis (Gaudicho).

190. B. flavescens (Partula) King. †

T. subfusiformis, pallide flava, interdum castanea, vel flava et castaneo varia. — Long. $^{11}/_{16}$, lat. $^{5}/_{16}$''. (K.)

Partula flavescens King in Zool. Journ. V. p. 342.

Habitat prope Valparaiso.

* * *

191. B. Thersites Pfr.

T. perforata, inflato-conica, tenuis, albida, epidermide lutescenti-cornea partim obducta, vel pallide cinnamomea, striis spiralibus, confertissimis, undulatis sculpta; spira conica, acuminata; anfr. $5^1/_2$ convexiusculi, ultimus rugosus, medio gibbere prominente instructus, spiram vix superans; apertura irregularis, oblonga, plica umbilicali coarctata; perist. late reflexum, intus denticulato-labiatum, margine acuto. — Long. 23, diam. 15 mill. Ap. intus 11 mill. longa, $4^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 103.)

Bulimus Thersites Pfr. Symb. II. p. 52.

Partula inflata Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 197.

— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 175. f. 11. 12.

Habitat in insulis Sandwich.

* * *

192. B. auricula (Partula) Férussac.

T. subperforata, ovato-conica, albido-olivacea, superne fusca, nitida; spira conica, obtusiuscula; sutura albo-marginata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram subaequans, fusco-unifasciatus; apertura subauriculata, lamina erecta intrante anfractus penultimi coarctata; columella subtorta, superne unidentata; perist. intus incrassatum, fuscum vel album, margine dextro sinuato, basali expanso, columellari dilatato, reflexo. — Long. 8, diam. $4^3/_4$ mill. Ap. $4^1/_2$ mill. longa, $2^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 104.)

Partula auricula Fér. prodr. p. 66. N. 6. *)

— — *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 486.

— *Dumartroyi Soul.* in Revue zool. 1842. p. 102.

Auricula Owaihiensis Chamisso in Nov. Act. Leop. XIV. P. 2. (1829.) p. 639. t. 36. f. 1.

— *Küster* Auric. p. 26. t. 3. f. 14—16.

Tornatellina? owaihiensis Pfr. Symb. II. p. 130.

---

*) T. ovato-acuta, imperforata, crassiuscula, striatula, flavescens; spira conica, apice obtusa; anfr. 5 contiguis, ultimo ventricoso, subcarinato; apertura subquadrangulari, in fundo lamella elevata valde notata munita; perist. acuto, intus incrassato, latere exteriore flexo; columella unidentata. — Long. 3, lat. $1^3/_4$ lin. (Fér. l. c.)

Bulimus owaihiensis Pfr. Symb. III. p. 56.

β. Sinistrorsus, anfractu ultimo subangulato:

Auricula sinistrorsa Cham. l. c. p. 640. t. 36. f. 2?

— — *Küst.* Auric. p. 48. t. 7. f. 14—16?

Bulimus armatus Mighels in Bost. Proc. 1845. p. 19. *)

Habitat in insulis Sandwich.

Obs. Variat testa graciliore, interdum unicolore straminea vel fusca, vel olivaceo-fulva. — Spec. majorum long. 10, diam. 5½ mill. (Soul.)

§. 12.

193. B. chrysalidiformis Sowerby.

T. perforata, ovato-oblonga, solidula, striis incrementi obliquе rugosa, pallide fulva vel rufa, flammis fulvis ornata; spira elongata, cylindrico-turrita, apice obtusa; anfr. 7 convexiusculi, sensim accrescentes, ultimus spira multo brevior; apertura subauriformis, intus nitide alba; columella contorta; perist. late expansum, nigricans, margine dextro subincrassato, columellari late reflexo. — Long. 71, diam. 27 mill. Ap. intus 27 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 105.)

Bulinus chrysalidiformis Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.

— — *Müll.* synops. p. 26.

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 28.

— — *Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 86.

Bulimus chrysalidiformis Lam. ed. Dh. 121. p. 278.

— *ustulatus Jay* catal. 1839. p. 19. t. 6. f. 1.

— *aspersus Grat.* Bord. Xl. p. 421. (ex parte.)

β. Testa flava, anfractibus planiusculis, fascia fulva interrupta ad suturam, columella vix tortula, perist. minus late reflexo. — Long. 73, diam. 27 mill. Ap. 27 mill. longa, 14 lata. (Spec.)

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Cuming).

Obs. Conf. varietates a Cl. Broderip l. c. enumeratae.

194. B. mindoroensis Broderip.

T. perforata, conico-ovata, striatula, nigricans, strigis lutescentibus varie ornata; spira conica, apice obtusa, pallida; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spiram fere aequans; columella lata, superne inflata, alba; apertura oblonga, intus lactea; perist. late reflexum, nigro-marginatum. — Long. 57, diam. 27 mill. Ap. intus 25 mill. longa, medio 14 lata. (Coll. Nr. 106.)

Bulinus Mindoroensis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 84.

*) Shell sinistral, rarely dextral, conical, brown, or yellowish, sometimes with a light, revolving band below the suture, perforate; whorls five, convex; aperture oblong-ovate, with a thin, flexuous, lamellated tooth on the transverse lip, and a small tooth or fold on the columellar lip; outer lip thin, sligthly reflected. — Length ⅓, diam. ⅕ inch. — Hawaii. (Migh. l. c.)

Bulimus Mindoroensis Reeve Conch. syst. II. t. 173. f. 5.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 48.
— *Wagneri Grat.* Bord. XI. p. 164.
— *aspersus Grat.* Bord. XI. p. 421. t. 4. f. 3. (ex parte)
— — *var. Grat.* ibid. t. 2. f. 8.

β. Pallidior vel cinerascens, varie strigatus:
Bulimus aspersus var. Grat. l. c. t. 3. f. 16.

γ. Gracilior, B. chrysalidiformi affinis: long. 55, diam. 24 mill. Ap. intus 21 mill. longa, medio 14 lata. (Spec.)

δ. Testa apice nigra, peristomate nigro, azureo-micante.

Habitat in insula Mindoro Philippinarum (Cuming).

Obs. Formis intermediis cum specie praecedente conjunctus videtur.

195. **B. aratus (Helix) Sowerby.**

T. perforata, cylindrico-ovata, pupaeformis, crassiuscula, fusca, albo-unifasciata, costis obliquis, magis minusve confertis exarata; sutura profunda; anfr. 6 inflati, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella recte descendens, dilatata, latissime reflexa, plica umbilicali introrsum prominente; apertura lunato-rotundata, intus alba; perist. late reflexum, intus nigro-marginatum, basi obsolete dentatum, marginibus callo junctis. — Long. 43—45, diam. 24—26 mill. Ap. intus 16 mill. longa, 11 lata. (Coll. Nr. 107.)

Helix arata (Helicostyla?) *Sow.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 89.
Bulimus aratus Pfr. Symb. II. p. 43.

β. Omnino pallide lutescens, apertura peristomateque albis.

γ. Abbreviata, unicolor albida, anfr. 5½ rapidius crescentibus: long. 35, diam. 24 mill.

Habitat in insula Tablas Philippinarum (Cuming).

196. **B. brachyodon (Helix) Sowerby.**

T. perforata, ovata, castanea, pallide fasciata, oblique striatula; sutura distincta; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans, ad aperturam deflexus; columella late reflexa, intus unidentata, albo-callosa; apertura lunato-rotundata, perobliqua, basi unidentata; perist. late reflexum, nigro-fusco marginatum. — Long. 48, diam. 30 mill. Ap. intus 22 mill. longa, 15 lata. (Coll. Nr. 108.)

Helix brachyodon (Helicostyla) *Sow.* in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 89.
Bulimus brachyodon Pfr. Symb. II. p. 43.

β. Minor, abbreviatus, rugosiusculus, anfractibus rapidius accrescentibus: long. 42, diam. 32 mill.

γ. Heliciformis, testa subglobosa, apertura depressa. — Long. 38. diam. 30 mill. Ap. 18 mill. longa, 17 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in insula Mindoro (Cuming).

Obs. Varietati γ similes sunt Helix campanula et codonodes Pfr. (Conf. vol. I. p. 321.)

197. B. adustus (Helix) Sowerby.

T. perforata, cylindrico-ovata, pupaeformis, solida, oblique striatula, castanea, apice pallida; sutura levis; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, pallide unifasciatus; columella recte descendens, intus subtorto-truncata; apertura truncato-ovalis; perist. castaneum, late expansum, reflexiusculum, margine columellari perdilatato, reflexo, subappresso. — Long. 44, diam. 25 mill. Ap. intus 20 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 109.)

Helix adusta Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 39.

Bulimus adustus Pfr. Symb. III. p. 82.

Habitat in insula Mindoro (Cuming).

198. B. lubanicus Pfr.

T. perforata, oblonga, subcylindrica, tenuis, brunnea, subrugosa; spira magis minusve elongata, apice obtusiuscula; anfr. 5½ — 6 convexi, ultimus spira multo brevior; apertura subverticalis, oblongo-ovalis, intus livida; perist. expansum, subreflexum, margine columellari valde dilatato, umbilicum suboccultante. — Long. 37, diam. 18 mill. Ap. intus 13 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Helix oblonga Sow. in Proc. Zool. Soc. 1841. p. 40.

Bulimus oblongus Pfr. Symb. II. p. 119. Nec Müll.

— *lubanicus Pfr.* Symb. III. p. 55.

β. Testa minus elongata, anfractibus convexioribus: long. 33, diam. 19 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 10 lata.

Habitat in insula Luban Philippinarum (Cuming).

199. B. oomorphus (Helix) Sowerby.

T. perforata, ovato-oblonga, crassiuscula, longitudinaliter minute striata et subdecussatim malleata, castanea, prope suturam pallide fasciata; spira obtuse ovato-conoidea; anfr. 5 convexi, ultimus spira paulo brevior; apertura subverticalis, ovalis, intus nitide albida; perist. late expansum, reflexum, marginibus approximatis, columellari valde dilatato, reflexo, perforationem velante. — Long. 29, diam. 18 mill. Ap. intus 13 mill. longa, 8½ lata. (Coll. Nr. 110.)

Helix oomorpha Sow. in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 103.

Bulimus oomorphus Pfr. Symb. II. p. 119.

Habitat in insula Tablas Philippinarum (Cuming).

* * *

200. **B. baeticatus (Helix) Férussac.**

T. perforata, ovato-conica, irregulariter et confertim rugulato-granulata, tenuis, fusca; spira conica, apice obtusa; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura rotundato-ovalis; perist. acutum, expansum, marginibus callo subtuberculato junctis. — Long. 19, diam. 8⅔ mill. Ap. 6½ mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 111.)

Helix baeticata (Cochlogena) *Fér.* pr. 422.
Bulimus baeticatus Webb et *Berth.* syn. p. 318.
— — *Küst.* p. 25. t. 12. f. 2.
— *boeticatus Orb.* canar. p. 69. t. 2. f. 19.
— *corneus Menke* syn. ed. 2. p. 25.

Habitat in insula St. Thomas (Fér.), in insulis Canariis (WB.).

Obs. Differt a B. badioso magnitudine, sculptura, anfractibus planioribus et spira conica, attenuata.

201. **B. badiosus (Helix) Férussac.**

T. perforata, ovato-oblonga, granulato-striata, fusco-cornea, apice obtusa; anfr. 6 convexi, ultimus spira brevior; apertura rotundato-ovalis; perist. acutum, expansum, albo-labiatum, marginibus callo subtuberculoso junctis. — Long. 12, diam. 6 mill. Ap. 4¾ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 112.)

Helix badiosa (Cochlogena) *Fér.* pr. 423.
Bulimus badiosus Webb et *Berth.* syn. p. 318.
— — *Orb.* canar. p. 69. t. 2. f. 22.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 134. t. 12. f. 9. 10.
— — *Küst.* p. 35. t. 12. f. 27.
Buliminus badiosus Beck ind. p. 71. N. 44.

Habitat in insula St. Thomas (Fér.), Teneriffa (WB.).

* * *

202. **B. Kieneri Pfr.**

T. breviter rimata, cylindraceo-turrita, tenuis, oblique confertim costata, fusco-corneo et albido irregulariter marmorata; spira turrita, apice acutiusculo nigricans; sutura profunda, crenata; anfr. 13 convexi, ultimus ¼ longitudinis subaequans, basi obsolete unicarinatus; apertura lunato-circularis; perist. simplex, undique expansum, marginibus conniventibus, dextro valde ar-

cuato, columellari dilatato, patente. — Long. 18, diam. anfr. antepenult. 6 mill. Ap. 4½ mill longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 113.)

Bulimus Kieneri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 40.

Habitat in Honduras.

203. B. cylindricus Gray.

T. rimata, ovato-turrita, striatula, opaca, nitidula, alba, strigis rufis reticulatis elegantissime signata; spira turrita, apice nigricans; anfr. 11 vix convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans, subglobosus, rufo-cingulatus; apertura rotundato-ovalis; perist. acutum, margine dextro expanso, columellari vix breviore, late reflexo. — Long. 16, diam. 7 mill. Ap. 4⅔ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 114.)

Bulimus cylindricus Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 414. *)
— *cylindrus Gray* Man. p. 20. t. 6. f. 68.
— *articulatus Turt.* Man. p. 85. f. 68.
— *Guildingii Pfr.* Symb. I. p. 82. II. p. 115.
Macroceramus signatus Guild. in Zool. Journ. IV. p. 168.
— — *Beck* ind. p. 73. N. 1.
Bulinus signatus Sow. Conch. Ill. f. 57.
Leptospira signata Swns. Malac. p. 333. f. 97 a. b. (auct.)

Habitat in insula Tortola.

204. B. formosus (Turbo) Wood.

T. perforata, ovato-oblonga, apice nigricante acuminata, striatula, nitida, alba, castaneo interrupte fasciata et remote strigata; anfr. 10 convexi, summi 6 apicem conicum formantes, ultimus ⅓ longitudinis aequans; apertura subcircularis; perist. simplex, expansiusculum, margine dextro arcuato, columellari strictiore, reflexo, patulo. — Long. 16, diam. 7 mill. Ap. 5 mill. diam. (Mus. Cuming.)

Turbo formosus Wood suppl. t. 6. f. 24.
Bulimus formosus Gray in Wood suppl. p. 31.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 84.
Helix pupiformis (Cochlodonta) *Fér.* pr. 492 quat. p. 71.

Habitat in insula St. Domingo. (Prope Buliodinero: Fér.)

205. B. unicarinatus (Pupa) Lamarck.

T. rimata, cylindraceo-turrita, tenuis, oblique striatula, albida, strigis longitudinalibus, pallide corneis, serratis ornata; sutura crenulata; anfr. 10 planiusculi, ultimus $^3/_{10}$ longitudinis sub-

*) T. conico-cylindrica, perforata, albida, dense concentrice striata, fasciis 6 interruptis fuscis ornata; anfract. 9—10 convexiusculis; apertura suborbiculata; peristomate tenui. — Long. $^6/_{10}$, diam. $^3/_{10}$ unc. (Gray l. c.)

aequans, basi carina alba, obtusa instructus; apertura subcircularis; perist. albidum, patens, margine dextro arcuato, columellari vix breviore, dilatato. — Long. 14, diam. 5½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 115.)

Pupa unicarinata Lam. 10. p. 107. ed. Dh. p. 173.
— — *Deless.* recueil t. 27. f. 4.
Bulimus canimarensis Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 351.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 57. t. 1. f. 11.
— *unicarinatus Küst.* p. . t. 18. f. 10. 11.

β. Testa grisea, corneo-punctata, ad suturam punctato-fasciata.

Habitat in insula Cuba (frequens in prov. Canimarensi, prope El Fundador et Tumbadero!); Guadeloupe (Lam.).

206. **B. Gossei Pfr.**

T. rimata, turrito-cylindracea, oblique costulata, albida, opaca, strigis semilunaribus, punctisque pellucidis corneis ornata; spira cylindracea, apice attenuata, acuta; sutura crenulata; anfr. 11 convexi, ultimus ¼ longitudinis vix superans, rotundatus, basi subangulatus; apertura subcircularis; perist. breviter expansum, marginibus approximatis, columellari reflexo, patente. — Long. 11, diam. 3⅔ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 3¼ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Gossei Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 137.

β. Paulo minor, strigis et punctis corneis obsoletioribus. (Coll. Menke.)

Habitat in insula Jamaica (Gosse), var. *β* in Texas

207. **B. turricula Pfr.**

T. subperforata, ovato-acuta, tenuis, confertissime et perobliqué costato-striata, albo corneoque marmorata; spira conica, acuminata; anfr. 8—9 convexiusculi, ultimus obsolete carinatus, ⅔ longitudinis subaequans; apertura perobliqua, subcircularis; perist. simplex, tenue, marginibus conniventibus, dextro breviter expanso, columellari superne breviter dilatato, patente. — Long. 9, diam. 4½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2¾ lata. (Coll. Nr. 116.)

Bulimus turricula Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 351.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 57. t. 1. f. 13.

β. Minor: long. 6½, diam. 4 mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅘ lata.

Habitat in insula Cuba (frequens ad ripas fluvii Yumurí prope Matanzas!).

208. **B. folliculus Pfr.**

T. breviter rimata, ovato-acuminata, tenuis, distincte et oblique costata, pallide fuscescenti-albida; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus angustior, antice subascendens, ⅓ longitudinis vix aequans; apertura subcircularis; perist. subsimplex,

breviter expansum, marginibus approximatis, callo junctis, dextro arcuato, columellari dilatato, patente. — Long. $3^1/_2$, diam. medio 2 mill. Ap. long. 1 mill. vix superans. (Coll. Nr. 117.)

Bulimus folliculus Pfr. Symb. III. p. 83.
Carychium costatum Hutt. in coll. Metcalf.

Habitat in Bengalia.

Obs. Num forsan huc referenda *Pupa coenopicta Hutt.* in Journ. As. Soc. III. p. 85: «Shell about $2^1/_2$ lines in length; whorls 8; spira rather obtuse; colour brown; aperture rounded, margins reflected and interrupted by the body whorl. — Beana.» (Hutt.)?

* * *

209. B. Terverianus Webb et Berthelot. †

T. elongata, turrita, gracilis, acuta, cinereo-albida, plicis transversis eleganter ornata; apertura rotundato-ovata; perist. vix revolutum, subcontinuum. — Axis 6‴, diam. 2‴. Anfr. 10. (WB.)

Bulimus Terverianus Webb et *Berth.* syn. p. 326.
— — *Orb.* canar. p. 67. t. 2. f. 26.
— — *Küst.* p. . t. 18. f. 12. 13.

Habitat in insulis Canariis.

§. 13.

210. B. odontostoma Sowerby.

T. rimato-perforata, oblongo-turrita, tenuis, nitidiuscula, rufa, oblique confertissime granulato-striata; anfr. 6 — 7 planiusculi, rapide accrescentes, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, basi bicarinatus, extus scrobiculatus, antice breviter deorsum protractus, solutus; apertura angusta, oblonga, dentibus lamelliformibus utrinque coarctata: dentibus 3 in margine dextro, 1 in margine supero, 3 in columellari, 1 obsoletiore ad basin; perist. expansum, reflexum, rubrum. — Long. 37 — 38, diam. 11 — 12 mill. Ap. cum margine 14 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 118.)

Bulimus odontostoma Sow. in Zool. Journ. I. p. 59. t. 5. f. 3.
Helix odontostoma Wood suppl. t. 7. f. 28.
— — (Cochlodina) *Fér.* hist. t. 163. f. 2 et
— *Gargantua* (Cochlodina) *Fér.* pr. 510. Hist. t. 163. f. 1.
Pupa odontostoma Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
— *erythrostoma Menke* syn. ed. 2. p. 132.
Clausilia Gargantua Lam. ed. Dh. 38. p. 214.
Odontostomus Gargantula Beck ind. p. 54. N. 1.
Macrodontes Sowerbyi Sws. Malac. p. 334.
— *Gargantua Pfr.* Symb. II. p. 136.
— — *Küst.* Bul. t. 16. f. 1—3.

Habitat in Brasilia.

211. **B. Grayanus Pfr.**

T. gracilis, turrita, solidula, longitudinaliter subtilissime striata et lineis impressis spiralibus subdecussata, cinnamomea; spira turrita, apice valde attenuata; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, antice deflexus, solutus, dorso et basi carinatus, lateribus scrobiculatus; apertura angusta, oblonga, basi canaliculata; perist. simplex, undique expansum, dentibus 7 marginem non attingentibus instructum, 3 in latere dextro, 4 in sinistro, summo tuberculiformi, secundo valido, lamelliformi. — Long. 35, diam. 11 mill. Ap. 14 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Grayanus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 73.

Habitat in Brasilia.

212. **B. Pantagruelinus (Helix) Moricand.**

T. rimato-perforata, fusiformis, apice acuta, longitudinaliter rugosa, lineis spiralibus minutissimis obsolete decussata, cinerea, fusco-variegata; spira turrita; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus spira brevior; apertura oblonga, coarctata; perist. latissime reflexum, intus carneum, marginibus approximatis, dextro denticulis aliquot et dentibus 3 majoribus lamelliformibus, columellari 2, supero validissimo, infero minore, munitis, dente 1 brevi, linguaeformi, intrante in pariete aperturali. — Long. 70, diam. 22 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 119.)

Helix Pantagruelina (Cochlodina) *Moric.* Gen. VI. P. 2. p. 542. t. 1 f. 7. VII. p. 440. VIII. P. 1. p. 142. t. 3. f. 5. c. anim.

Scarabus labrosus Menke syn. ed. 2. p. 130.

Bulimus Pentagruelinus Lam. ed. Dh. 72. p. 255.

Odontostomus Pantagruelinus Beck ind. p. 54. N. 6.

β. Minor, peristomate albo:

Odontostomus leucotrema Beck ind. p. 54.

Habitat in Brasilia.

Obs. De nomine conf. Menke in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 32.

213. **B. excesus (Clausilia) Spix.**

T. rimata, fusiformi-turrita, solidiuscula, rugoso-malleata, cinerea; anfr. 9 convexiusculi, summi laevigati, ultimus $^3/_7$ longitudinis aequans, basi antice compressus; columella plicata, dente lamelliformi munita; lamella secunda intrans in pariete aperturali; apertura coarctata, oblonga, carneo et nigro variegata; perist. late expansum, marginibus fere contiguis, callo junctis, dextro intus bilamellato, sinistro valde dilatato, libero. — Long. 38, diam. 12 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 120.)

Clausilia excesa Spix test. bras. t. 14. f. 1.

Clausilia excesa Lam. ed. Db. 39. p. 215.
Pupa excesa Wagn. in Spix p. 19.
— *ringens Jay* catal. 1836 t. 1. f. 1.
Helix excesa Moric. Gen. VII p. 441. VIII. t. 3. f. 5.
Odontostomus excesus Beck ind. p. 54. N. 5.
Bulimus excesus Pfr. Symb. II. p. 114.
β. Zonatus: Moric. Gen. IX. p. 47. t. 4. f. 8. 9.

Habitat in Brasilia.

214. B. Hilairii Gray.

T. perforata, ovato-acuminata, solida, laevigata, alba, rufo-unifasciata; spira conica, acuta; anfr. 7½ convexiusculi, infra suturam valide longitudinaliter plicati, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, ventrosus, basi compressus; apertura oblique oblonga, ringens; perist. roseum, late expansum, incrassatum, reflexum, marginibus callo junctis; lamella 1 in ventre anfractus penultimi, secunda ad columellam, dens minor ad basin, major complanatus in margine dextro. — Long. 30, diam. 13 mill. Ap. intus 10 mill. longa, 5 lata. (Mus. Gray.)

Bulimus Hilairii Gray Mus.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 157.

Habitat in Brasilia.

215. B. punctatissimus (Clausilia) Lesson.

T. rimata, cylindrico-fusiformis, olivaceo-cinerea, albido-reticulata, laevigata; anfr. 9 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans, basi angulato-compressus, ad aperturam nigricans; apertura sinuosa, subovalis; perist. late reflexum, album, 7 plicatum: plicis 4 in margine dextro, 1 in pariete aperturali, 2 (quarum superior subtetragona) in columella. — Long. 29. diam. 8 mill. Ap. intus 8 mill. longa, 2¾ lata. (Coll. Nr. 121.)

Clausilia punctatissima Less. Voy. Coq. p. 329. t. 15. f. 3.
— — *Isis* 1833. t. 2. f. 3.
— *excesa Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 190. t. 19. f. 17. 18.
Helix excesa (Cochlodina) *Fér.* hist. t. 163. f. 3. 4.
Auricula fuscagula Lea obs. I. p. 195. t. 19. f. 76
Pupa septemplicata Mlf. Rossm. V. p. 8. f. 303.
Odontostomus fuscagulus Beck ind. p. 54. N. 3.
Bulimus septemplicatus Pfr. Symb. I. p. 85.
— *punctatissimus Pfr.* Symb. II. p. 120.

Habitat in Brasilia! Mexico? (Lea.)

216. B. fuscagula Orbigny. †

T. elongata, subumbilicata, crassa, rugoso-malleata, griseo-albida; spira elongata, inflata, apice obtusa; anfr. 9 minime con-

vexi; sutura laevigata, plana; apertura oblonga, personata, sexdentata; labrum crassum, reflexum; columella crassa, bilamellata. — Long. 30, lat. 8 mill. (O.)

Bulimus fuscagula Orb. voy. p. 318. t. 39. f. 1. 2.

Habitat prope Rio Janeiro.

217. **B. ringens Dunker.**

T. rimato-subperforata, fusiformis, tenuis, laevigata, pallide cornea, fusco-strigata vel cornea, epidermide cinerea strigatim obducta; spira turrita, acutiuscula, anfr. 7 — 7½ planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura angusta, oblonga, 4-dentata: dente 1 in pariete aperturali, secundo in columella plicata, tertio in basi, quarto in medio marginis dextri; perist. album, expansum. — Long. 18, diam. 5⅓ mill. Ap. 7 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 122.)

Bulimus ringens Dunk. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 83.

Habitat in Brasilia rarissimus (Bescke).

* * *

218. **B. Wagneri Pfr.**

T. perforata, cylindraceo-fusiformis, solidiuscula, longitudinaliter striata, fusco-cinerea et flammulis castaneis variegata; spira elongato-turrita, obtusiuscula; anfr. 11 planulati, ultimus ¼ longitudinis vix superans; apertura angusta, oblonga, intus subaequaliter 4-plicata: plica 1 in pariete aperturali, secunda ad columellam, tertia ad basin, quarta in margine dextro; perist. simplex, acutum, expansum. — Long. 31, diam. 9 mill. Ap. intus 8 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 123.)

Bulimus Wagneri Pfr. Symb. II. p. 124.
Clausilia striata Spix test. bras. t. 14. f. 2.
Pupa striata Wagn. in Spix p. 19.
— — *Lam.* ed. Dh. 39. p. 186.
— *turrita Anton* Verz. p. 47. N. 1748.
— *conspersa Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 160. t. 16. f. 34.
— *Spixii Orb.* voy. p. 320.
— — *Pot.* et *Mich.* I. in ind. p. 20.
Helix Spixii (Fér.) *Orb.* syn. p. 21.
Cyclodontina striata Beck ind. p. 88. N. 2.

Habitat in Brasiliae prov. St. Pauli et Sebastiani (Spix); in prov. Corrientes reipubl. Argentinae et Chiquitensi reipubl. Bolivianae (Orb.).

219. **B. sexdentatus (Clausilia) Spix.**

T. rimato-perforata, oblongo-fusiformis, solida, longitudinaliter striata, corneo-albida; spira conico-turrita, apice obtusius-

cula; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans, basi carinato-compressus, supra carinam biscrobiculatus; apertura semiovalis, 6—7-plicata: plica 1 intrante in pariete aperturali, secunda maxima, subquadrata in columella, reliquis in parte basali et dextra; perist. subincrassatum, expansum, reflexiusculum, margine dextro superne subangulato. — Long. 20, diam. 7½ mill. Ap. 7½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 124.)

Bulimus sexdentatus Pfr. Symb. II. p. 121.
Clausilia sexdentata Spix test. bras. t. 14. f. 3.
Pupa sexdentata Wagn. in Spix p. 19.
— — *Lam.* ed. Dh. 38. p. 186.

Habitat in Brasilia.

Obs. Variat magnitudine. Specimina adsunt usque long. 28, diam. 8 mill.

220. B. pupoides (Clausilia) Spix.

T. rimato-perforata, cylindraceo-fusiformis, tenuissime striata, pallide cornea, strigis longitudinalibus fuscis ornata; anfr. 9 planiusculi, ultimus ⅜ longitudinis subaequans, basi compressus; sutura levis; apertura oblonga, 4-dentata: dente maximo, lamelliformi ad columellam, secundo compresso, intrante in pariete aperturali, 2 in margine dextro; perist. albidum, undique expansum, reflexiusculum, extus scrobiculatum. — Long. 24, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, intus medio 3½ lata. (Coll. Nr. 125.)

Bulimus pupoides Pfr. Symb. I. p. 84. II. p. 120.
Clausilia pupoides Spix test. bras. t. 14. f. 4.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 188. t. 19. f. 7. 8.
Pupa inflata Wagn. in Spix p. 20.
— — *Lam.* ed. Dh. 36. p. 185.
— *fasciata Pot.* et *Mich.* gal. p. 165. t. 16. f. 19. 20.
Helix pupoides Moric. Gen. VII. p. 439.
Cyclodontina pupoides Beck ind. p. 88. N. 5.

β. Maxima, dentibus 2 accedentibus, altero ad basin, altero in margine dextro. Long. 32, diam. 11½ mill. (Mus. Cuming.)

γ. Lister t. 31. f. 29.
Helix Listeri (Cochlodonta) *Fér.* pr. 491.
Pupa Listeri Gray Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.
Cyclodontina Listeri Beck ind. p. 88.

δ. Junior:
Bulimus vitreus Spix test. bras. t. 8. f. 2. (teste Dh.)

Habitat in Brasilia.

221. B. dentatus (Helix) Wood.

T. rimato-perforata, ovato-acuta, subtilissime striata, corneo-albida, diaphana; spira ovato-conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; apertura semi-

ovalis, dentibus 7 fere clausa: omnibus a margine distantibus, 2 lamelliformibus (1 latissimo, subquadrato ad columellam, altero huic opposito), 3 minutis in parte basali, 1 bipartito juxta angulum labri, septimo contorto et uncinato in pariete aperturali; plica transversa, extus pellucens, in fundo aperturae; perist. expansum, subincrassatum, reflexiusculum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro superne subangulato, columellarem paulo superante. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. ad margines 10 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 126.)

Bulimus dentatus Pfr. Symb. III. p. 54.
Helix dentata Wood suppl. t. 8. f. 71.
— *Sowerbyana* (Cochlodonta) *Fér.* pr. 492 bis.
— *Sowerbiana* (Cochlodon) *Orb.* synops. p. 22.
Pupa Sowerbyana Orb. voy. p. 321. t. 41 bis. f. 15. 16.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 173. t. 17. f. 7. 8.
— *labyrinthus Mus. Berol.* teste Ant. Verz. p. 47.
Cyclodontina Sowerbyana Beck ind. p. 88. N. 7.
— — *Küst.* Bul. t. 16. f. 4—6.

β. Dentibus obsoletioribus:
Helix patagonica Orb. synops. p. 22.
Pupa Sowerbyana var. Orb. voy. t. 41 bis. f. 17. 18.
Cyclodontina patagonica Beck ind. p. 88. N. 6.

Habitat in republica Uruguayensi orientali, Banda oriental; var. β in Patagonia (Orb.)

222. B. dentatus King. †

T. cylindracea, punctata, subdiaphana, fusco-maculata; apertura dentata, Clausiliam mentiens. — Long. $^{15}/_{16}$, lat. $^{5}/_{16}$ poll. (K.)

Bulimus dentatus King in Zool. Journ. V. p. 340.

Habitat in Brasilia.

Obs. Num hic forsan sit B. pupoides, vix erui poterit.

§. 14.

223. B. auris Sileni (Voluta) Born.

T. rimata, subperforata, ovata, solida, longitudinaliter undulato-rugosa et minute striata, striis concentricis decussatula, flammis olivaceo-fuscis et rufis alternatim ornata; spira brevis, mucronata; anfr. 4½, penultimus gibbus, ultimus ⅔ longitudinis subaequans; columella valide dentato-uniplicata; apertura oblonga, angusta; perist. album, crassum, reflexum. — Long. 47, diam. 24 mill. Ap. intus 24 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 127.)

Voluta auris Sileni Born test. p. 212. t. 9. f. 3. 4.
— — — *Chemn.* XI. p. 15. t. 176. f. 1701. 2. (ic. Born.)
— — — *Gmel.* p. 3436. N. 9.

Voluta auris Sileni Dillw. descr. cat. I. p. 502. N. 6.
Bulimus auris Sileni Brug. Enc. méth. I. p. 345. N. 81.
— — — *Küst.* p. 46. t. 14. f. 3. 4.
Helix auris Sileni (Cochlogena) *Fér.* pr. 439.
Auricula caprella Lam. 8. p. 140. ed. Dh. p. 329.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 522. 523.
Pupa caprella Gray in Ann. of. Phil. New ser. IX. p. 412.
Carychium undulatum Leach Zool. Misc. I. t. 37. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 10. t. 5. f. 1.
Plekocheilus undulatus Guild. in Zool. Journ. III. 12. p. 533.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 103. (c. anim.)
Pelekocheilus Sileni Beck ind. p. 55. N. 5.

Habitat in insula St. Vincentii.

Obs. Conf. B. plectostylus (Nr. 120.), malleatus (Nr. 136.) etc.

224. B. distortus Bruguière.

T. perforata, ovato-fusiformis, solidiuscula, alba, strigis fulminantibus punctisque fuscis et spadiceis ornata, non nitens; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 6 vix convexi, summi oblique striati, ultimus granulato-rugulosus, spiram aequans, extus medio profunde impressus; columella plicam triangularem valde prominentem formans; apertura elongata, angusta, coarctata, basi subangulata; perist. album vel castaneum, incrassatum, reflexum, marginibus callo nitido junctis, dextro supra medium valide dentato, sinistro dilatato, umbilicum angustum fere occultante. — Long. 52, diam. 19 mill. Ap. intus 25 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 128.)

Auris Midae distorta Chemn. X. p. 146. t. 149. f. 1395. 96.
Bulimus distortus Brug. Enc. méth. I. p. 344. N. 79.
— — *Lam.* ed. Dh. 77. p. 258.
— — *Küst.* p. 45. t. 14. f. 1. 2.
Voluta australis var. Dillw. descr. cat. I. p. 500.
Helix distorta (Cochlogena) *Fér.* pr. 443.
Pupa distorta Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.
Pelekocheilus distortus Beck ind. p. 54. N. 2.
β. Minor: long. 44, diam. 18 mill. Ap. intus 20 mill. longa, 6 lata. (Spec.)

Habitat prope Puerto Cabello, Venezuela (Gruner).

225. B. euryomphalus Jonas.

T. perforata, fusiformi-oblonga, solidiuscula, confertim striata et obsolete decussata, lilaceo-carnea, punctis castaneis et lineis fulgurantibus fusco-coerulescentibus elegantissime picta; spira conica, acutiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spira paulo brevior, infra medium distincte striatus (striis linea transversa

impressa interruptis), basi compressus; columella nigra, superne valide plicata; apertura oblonga, utrinque angulata, intus concolor; perist. expansum et reflexum, marginibus callo castaneo junctis, columellari dilatato, flexuoso. — Long. 42, diam. 16 mill. Ap. 20 mill. longa, medio c. perist. 12 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus euryomphalus Jonas in Zeitschr. f. Malak. 1844. p. 36.
— — *Jonas* Mollusk. Beitr. p. 26. t. 10. f. 15.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 2.

Habitat ad Galipan Venezuelae (Dyson).

226. B. glaber (Voluta) Gmelin.

T. rimata, ovato-fusiformis, minute undulato-rugosa, nitidiuscula, griseo et luteo nebulosa, strigis longitudinalibus, punctis pallidis aspersis ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 5 convexiusculi, ultimus ad suturam linea impressa notatus, spiram subaequans, antice basi compressus; columella plica valida munita; apertura angustato-ovalis; perist. expansum, intus incrassatum, album, margine columellari dilatato, reflexo, dextro medio subdentato. — Long. 34, diam. 15 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 129.)

Voluta glabra Gmel. p. 3436. N. 8.
— — *Dillw.* cat. I. p. 501. N. 5.
— — *Mawe* t. 23. f. 5.
Helix auris caprinus (Cochlogena) *Fér.* pr. 442.
Pupa auris Sileni Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.
Auricula Sileni Lam. 3. p. 138. ed. Dh. p. 325.
— — Encycl. méth. t. 460. f. 4.
Bulimus glaber Lam. ed. Dh. 78. p. 258.
— — *Küst.* p. 42. t. 13. f. 7.
— *aegotis Menke* syn. ed. 2. p. 20.
Pelekocheilus undulatus et *caprinus Beck* ind. p. 55. N. 4. 5.
Martini II. f. 447. 448.

β. Testa majore, fusiformi, apertura angustiore, basi subangulata: long. 38, diam. 14 mill. Ap. 17 mill. longa, 5 lata. (Spec.)
Bulimus aegotis Küst. p. 43. t. 13. f. 5. 6.
Seba Mus. III. t. 60 juxta N. 44 et 48.

Habitat in insulis Haiti, Trinidad etc.

Obs. Varietas *β* intermedia videtur inter B. distortum et glabrum.

227. B. perdix Pfr.

T. perforata, ovato-oblonga, solida, confertim striata, albida, flammis, maculis et punctis nigricantibus picta; spira conica, apice obtusiuscula; sutura marginata; anfr. 5½ vix convexi, ultimus spiram subaequans, basi juxta perforationem angustam vix compressus; columella superne oblique plicata, leviter arcuata; aper-

tura oblonga, intus concolor; perist. undique expansum, margine columellari subfornicato. — Long. 36, diam. 15 mill. Ap. 19 mill. longa, medio 12 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus perdix Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 3.

Habitat in Nova Granada; prope Agua de Obispo legit Funck.

228. B. signatus (Auris) Spix.

T. rimato-perforata, ovato-oblonga, longitudinaliter undato-rugosa, albida, fasciis latis et strigis fusco-lividis ornata; spira conico-acuta, apice nigra; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram fere duplo superans, basi antice compressus; columella plica valida, intrante munita; apertura angusta, oblonga, alba; perist. latissime expansum, reflexum, ad columellam dilatatum, marginibus callo diffuso junctis, dextro superne dentato. — Long. 42, diam. 32 mill. Ap. intus 23 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 130.)

Auris signata et *Auris vittata Spix* test. bras. t. 12. f. 3 et 4.
Auricula signata Wagn. in Spix p. 17.
Helix signata Moric. Gen. VII. P. 2. p. 431.
Bulimus signatus Lam. ed. Dh. 71. p. 254.
— — *Grat.* Bord. XI. p. 422. t. 2. f. 13.
— — *Küst.* p. . t. 18. f. 14. 15.
Otostomus signatus Beck ind. p. 55. N. 1.

Habitat in Brasilia.

229. B. coarctatus Pfr.

T. rimato-perforata, ovato-acuta, solida, albida, lineis interruptis fuscis cingulata; spira conica, acuta; anfr. 6½ planulati, ultimus convexior, spiram aequans; apertura oblonga, coarctata; columella incrassata, tuberculata; perist. late expansum, margine dextro introrsum incrassato, acute prominente, medio sinuolato, cum columellari dilatato, reflexo angulatim juncto. — Long. 34, diam. 17 mill. Ap. intus 15 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus coarctatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 73.

β. Albida, fasciis nigricantibus ornata, fusco-maculata; apertura utrinque minus coarctata. (Mus. Cuming.)

Habitat . . . ?

Obs. Conf. B. morosus Gould Nr. 138, et B. auricula Fér. Nr. 192.

* * *

230. B. columba Bruguière. †

T. ovato-oblonga, tenuis, longitudinaliter striata et subrugosa, albida, apice obtusa; anfr. 7 planiusculi; apertura oblonga, in-

tegra; perist. tenue, patulum, reflexiusculum. – Long. 3½ poll., diam. 20 lin. (Br.)

Bulimus columba Brug. Enc. méth. I. p. 319. N. 35.

Habitat . . . ?

Obs. Species prorsus dubia, an hujus generis? — Figura Sebae III. p. 169. t. 71. f. 6, (a Cl. auctore tamquam exacta designata) est Auricula Midae.

§. 15.

231. **B. bilabiatus Broderip.**

T. perforata, ovato-acuta, tenuis, minutissime rugulosa, plicis remotis angulatis oblique costata, albida vel pallide fusca; anfr. 5½ celeriter accrescentes, ultimus spira brevior, basi compressus, subangulatus; columella contorta; apertura auriformis; perist. late expansum, reflexum, lutescens, marginibus callo aurantiaco junctis, lamina callosa prominente in pariete aperturali, in aperturae parte infima et ad medium marginis dextri ascendente. — Long. 48, diam. 28 mill. Ap. intus 20 mill. longa, medio 12 lata. (Coll. Nr. 131.)

Bulinus bilabiatus Brod. in Zool. Journ. V. p. 49. t. spl. 40. f. 1. 2.
Bulimus bilabiatus Lam. ed. Dh. 82. p. 261.
— — *Küst.* p. 35. t. 4. f. 10. 11.
Helix Maximiliana Fér. Mus.
Partula Maximiliana Pot. et *Mich.* gal. I. p. 198. t. 20. f. 5. 6.
Pachyotus bilabiatus Beck ind. p. 56. N. 2.

β. Minor, saepe roseus:
Helix Maximiliana var. Moric. Gen. VIII. t. 3. f. 4.
Pupa egregia Jay catal. 1836. t. 1. f. 4.

γ. Scalaris: Moric. Mém. VII. p. 17. t. 2. f. 20.

Habitat in Brasilia. (Illheos: Moric.)

232. **B. melanostomus Swainson.**

T. perforata, ovato-conica, solidiuscula, irregulariter et confertim undato-granulata, carnea, fusco-cinereo marmorata; spira acuta, sursum saturatius rosea; anfr. 5 convexi, supremi remote et valide plicati, ultimus spira paulo brevior, ventrosus, infra medium obsolete angulatus et albido-cingulatus, basi ad umbilicum angustum, subcompressum niger; columella torta, nigricans; apertura auriformis, intus nitide nigra vel saturate fusca; perist. nitide violaceo-nigrum, late expansum, reflexum, basi callo dentiformi cum columella canalem formante instructum, marginibus callo diffuso, nitide nigro junctis, dextro arcuato. — Long. 46, diam. 25 mill. Ap. intus 20 mill. longa, medio 12 lata. (Coll. Nr. 132.)

Bulimus melastomus Swains. Zool. Ill. I. t. 4.

Bulimus melanostomus Lam. ed. Dh. 69. p. 252.
— — *Jay* catal. 1836. t. 1. f. 3.
— — *Küst.* p. 37. t. 13. f. 8. 9.
— *Listeri Wood* suppl. t. 7. f. 23.
— *rhodospirus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 152. t. 15. f. 1. 2.
Helix melastoma Fér. pr. 445 bis.
— *rhodospira Moric.* Gen. VII. P. 2. p. 48.
Pupa melanostoma Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
Pachyotus melanostomus Beck ind. p. 56. N. 3.
Lister t. 29. f. 27.

β. Peristomate aurantio-marginato, canali latiore, dente basali simplice: long. 52, diam. 28 mill. Ap. intus 23 mill. longa, medio 14 lata (Spec.)
Auris melastoma Spix test. bras. p. 15. t. 12. f. 1. 2.
Bulimus struthiolaris Menke syn. ed. 2. p. 26.
— *melanostomus var. Küst.* p. 38. t. 13. f. 10. 11.

γ. Sordide albus, apertura cinerascente:
Bulimus melanostomus var. Küst. t. 5. f. 8. 9.

Habitat in provincia Bahiensi Brasiliae.

233. **B. Swainsoni Pfr.**

T. perforata, ovato-inflata, tenuiuscula, obsolete granulata, pallide fuscescens, punctis rufis et pallidis conspersa; spira brevis, conica, acuta, remote plicata; sutura distincte et minute crenulata; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram paulo superans, inflatus, infra medium subangulatus et pallide unifasciatus; columella nigra, subrecta; apertura ovalis; perist. albidum, aurantiaco-limbatum, late expansum, reflexum, marginibus callo nigro junctis, basali dilatato, deorsum protracto. — Long. 61, diam. 33 mill. Ap. intus 29 mill. longa, 17 lata, c. perist. 38 mill. longa. (Coll. Nr. 133.)

Bulimus Swainsoni Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 156.
Bulimus melanostomus var. Sow. Conch. Ill. f. 88.

Habitat in Brasilia.

234. **B. Illheocola (Helix) Moricand.**[3]

T. perforata, oblongo-conica, solidiuscula, confertim granulata, sordide carnea, obsolete fusco-marmorata, apice saturatior; spira acutiuscula; anfr. 5½ convexi, supremi valide plicati, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus, non compressus, juxta perforationem angustam nigro-maculatus; columella torta, alba; apertura oblonga, subauriformis, intus alba; perist. late expansum, reflexum, lutescens, marginibus callo lato nigricante junctis, dextro regulariter arcuato, basali non dentato, nec canaliculato.

— Long. 63, diam. 28 mill. Ap. intus 28 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 134.)

Helix rhodospira var. Illheocola Moric. Gen. VII. P. 2. p. 48.
Bulimus melanostomus var. Sow. Conch. Ill. f. 79.
Pachyotus rhodospira Beck ind. p. 56. N. 4.
Bulimus Illheocola Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 156.

Habitat in Brasilia. (Illheos: Moric.)

235. B auris vulpina Chemnitz.

T. arcuato-rimata, ovato-conica, longitudinaliter confertim striata, rugulosa, pallide corneo et albido marmorata; spira conica, scalariformis, apice obtusiuscula, fusca; sutura crenata; anfr. 7 convexi, superne subangulati, ultimus spiram paulo superans; columella torta; apertura angustata, subauriformis, basi canaliculata; perist. incrassatum, reflexum, marginibus callo fusco-aurantiaco, introrsum diffuso junctis, dextro introrsum dilatato, prominulo, intus aurantiaco-limbato, columellari aurantiaco, late reflexo. — Long. 44, diam. 23 mill. Ap. intus 22 mill. longa, medio 9½ lata. (Coll. Nr. 135.)

Auris vulpina Chemn. XI. p. 287. t. 210. f. 2086. 87.
Voluta auris vulpina Dillw. cat. I. p. 503. N. 9.
Helix auris vulpina (Cochlogena) *Fér.* pr. 445.
Pupa auris vulpina Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
Bulimus auris vulpina Lam. ed. Dh. 75. p. 257.
— — — *Griff. Cuv.* t. 37. f. 7.
— — — *Küst.* p. 39. t. 8. f. 5. 6.
Pachyotus alopecotis Beck ind. p. 56. N. 1.
Melania Nonpareil Perry Conch. t. 29. f. 4.

Habitat recens in China (?) teste Perry. — Specimina perfecta, colorata in insula St. Helena leguntur subfossilia.

§. 16.

236. B. canaliculatus Pfr.

T. umbilicata, oblique fusiformis, ruguloso-striata, nitida, albido, carneo et spadiceo marmorata; spira turrito-conica, acuta; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus spira vix longior, basi valde constricto-carinatus; columella arcuatim antrorsum elongata; apertura ovalis, basi canaliculata; perist. simplex, tenue, margine dextro vix expansiusculo, columellari dilatato, reflexo. — Long. 37, diam. 14 mill. Ap. 19 mill. longa, 9 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus canaliculatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 68.

Habitat in Bolivia.

237. B. fusiformis (Helix) Rang.

T. rimata, fusiformis, tenuis, diaphana, laevigata, pallide cornea, strigis distantibus rufis ornata; spira elongata, turrita; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans, basi attenuatus, compressus; columella superne uniplicata; apertura angusta, oblonga, basi subcanaliculata, intus nigro-marginata; perist. subincrassatum, album, margine dextro vix reflexiusculo, columellari dilatato, angulatim reflexo. — Long. 39, diam. 11 mill. Ap. intus 12½ mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 136.)

Helix fusiformis Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 60. t. 3. f. 2. *)
Bulimus dubiosus Jay catal. 1839. p. 122. t. 7. f. 6.
— *fusiformis Pfr.* Symb. I. p. 82. II. p. 115.

Habitat in Brasiliae provincia Minas Geraes.

238. B. angulatus Wagner.

T. profunde rimata, fusiformis, laevigata, albida, strigis remotis, fuscis ornata, apice plerumque nigra; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅖—⅓ longitudinis aequans, basi attenuatus, compressus; apertura oblonga, basi effusa; perist. simplex, striga remota nigricante signatum, margine dextro breviter expanso, cum columellari strictiusculo, late reflexo angulum formante. — Long. 38, diam. 13 mill. Ap. 17 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 137.)

Bulimus angulatus Wagn. in Spix p. 14.
— — *Lam.* ed. Dh. 62. p. 249.
Stenostoma Puru Spix test. bras. t. 13. f. 3.
Pelekocheilus Paru Beck ind. p. 54. N. 1.

Habitat in Brasilia in sylvis ad fluvios Puru et Solimoes provinciae Rio Negro (Spix). — Rarior adhuc in collectionibus.

Obs. Differt a B. fusiformi spira basi magis ventrosa, apertura superne ampla, columella stricta, etc.

239. B. trigonostomus Jonas. †

T. oblongo-conica, utrinque attenuata, umbilicata, tenuis, pellucida, nitidiuscula, longitudinaliter subtilissime striata, cinerea, maculis parvis, quadratis, fuscis, fascias transversas formantibus; anfr. 7 convexiusculi, ultimus dimidiam testae partem ferens, antice fasciis 2 nebuloso-fuscis ornatus; sutura distincta; apertura triangularis, subauriculata, medio subsinuata, intus nitida, flavescens, fusco-maculata et fasciata; labrum tenue, acutum, sub-

*) T. fusiformi, perforata, tenui, diaphana, longitudinaliter striata, pallide fulva, lineolis rufis ornata; spira elongata, acuta, in medio inflata; apertura elongata, antice subcanaliculata; columella alba, plana, reflexa; labro albo, reflexo, intus nigro-marginato, interiore albido. — Long. 4½ cent. Diam. 1 c. 2 m. Anfr. 9. (Rang l. c.)

reflexum; labium reflexum, umbilicum pro parte tegens; columella recta. — Long. 13, lat. 5‴. (Jon.)

Bulimus trigonostomus Jon. in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 36.
— — *Jon.* Mollusk. Beitr. p. 28. t. 10. f. 14.

Habitat in provincia Cumana reipublicae Venezuelae.

240. B. Knorri Pfr.

T. profunde rimato-perforata, subfusiformis, laevigata, nitida, coerulescenti-albida, strigis fuscis vel fasciis obsoletis, interruptis, fusco-coeruleis ornata; anfr. 7 plani, ultimus spiram acutam, pyramidatam paulo superans, basi compressus; columella subplicata; apertura oblonga, intus castanea, saepe pallide fasciata; perist. aurantiacum, marginibus subparallelis, dextro late expanso, columellari late reflexo, patente. — Long. 36, diam. 12 mill. Ap. intus 16 mill. longa, 7½ lata. (Coll. Nr. 138.)

Bulimus Knorri Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 115. t. 4. f. 3.
Knorr Vergnüg. VI. p. 58. t. 29. f. 3.

Habitat prope La Guayra.

241. B. undulatus (Bulimulus) Guilding.

T. perforata, ovato-fusiformis, laevigata, longitudinaliter striata, albida vel flavida, livido-brunneo-undulata; spira conica, acuta; anfr. 6½ vix convexiusculi, ultimus spiram aequans, basi compresso-angulatus; columella arcuata; apertura elliptica, basi subangulata; perist. simplex, expansum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 34, diam. 13 mill. Ap. 17 mill. longa, medio 9 lata. (Coll. Nr. 139.)

Bulimulus undulatus Guild. in Zool. Journ. IV. p. 169.
— *fluctuatus Beck* ind. p. 66. N. 41.
Bulinus undulatus Sow. Conch. Ill. f. 54.

Habitat in insula Sti Vincentii.

242. B. vimineus (Helix) Moricand.

T. perforata, oblongo-conica, solidula, glabra, alba, luteo et coerulescente vel spadiceo vittata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, basi compressus; apertura irregularis, intus fusca, basi subangulosa, effusa; perist. simplex, acutum, margine dextro strictiusculo, medio impresso, sinistro cum columellae basi angulum formante, columellari late reflexo, perforationem non obtegente. — Long. 26, diam. 12 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 6½ lata. (Coll. Nr. 140.)

Helix viminea Moric. Mém. Gen. VI. P. 2. p. 540. t. 1. f. 5.
Bulimus vimineus Pot. et *Mich.* gal. I. p. 150. t. 13. f. 19. 20.

Bulimus vimineus Lam. ed. Dh. 44. p. 242.
Bulimulus vimineus Beck ind. p. 64. N. 18.

Habitat in Brasiliae provincia Bahiensi.

243. B. janeirensis Sowerby.

T. subperforata, fusiformis, nitidula, albido-lutescens, punctis et maculis pellucide corneis conspersa; spira turrita, apice rosea; anfr. 8—9, penultimus inflatus, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella acute uniplicata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex tenue, reflexum, roseum. — Long. 26, diam. 8½ mill. Ap. intus 7½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 141.)

Bulimus janeirensis Sow. Conch. Ill. f. 97.
Bulimus janeirensis Reeve Conch. syst. II. t. 174. f. 97.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 47.
Helix Menkeana Fér. in Mus. Paris.

Habitat in Brasilia.

Obs. Interdum lamina parvula, compressa in pariete aperturali adest.

244. B. rhodinostoma Orbigny. †

T. elongata, inflexa, subumbilicata, rugosa, subcrassa, subdiaphana, albido-grisea, lineis brunneis longitudinaliter distincta; spira elongata, apice obtusa, rosea; sutura plana; apertura ovalis, rosea; columella subinflata; labrum tenue, acutum, reflexum. — Long. 21, diam. 7 mill. (O.)

Helix rhodinostoma (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 20.
Bulimus rhodinostoma Orb. voy. p. 317. t. 41. f. 6—8.

Habitat in imperio brasiliano.

Obs. Persimilis B. janeirensi. Vix sufficienter ab eo differre videtur testa subcrassa et columella subinflata, in illo acute dentata.

245. B. bahiensis (Helix) Moricand.

T. rimato-perforata, fusiformis, tenuis, fragilis, laevigata, hyalino-albida, saepe strigis opacis, albis, denticulatis, confertis ornata; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 7 subplani, ultimus spira brevior, basi subattenuatus; columella uniplicata; apertura angusta, oblonga, basi effusa; perist. simplex, acutum, margine dextro expanso, columellari dilatato, reflexo. — Long. 20, diam. 6 mill. Ap. 9 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 142.)

Helix bahiensis Moric. Genève VI. P. 2. p. 541. t. 1. f. 6. VII. p. 438.
Bulimus bahiensis Lam. ed. Dh. 68. p. 252.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 134. t. 12. f. 11. 12.
Odontostomus bahiensis Beck ind. p. 54. N. 4.

Habitat in Brasilia, prope Bahia.

246. **B. angiostomus Wagner.**

T. rimata, ovato-conica, tenuis, striata, alba, strigis angustis, rufis, irregularibus signata; spira conica; anfr. 7 planulati, ultimus spiram subaequans, convexus, antice valde compressus, a penultimo solutus; apertura angustissima, verticalis, linearis; perist. simplex, breviter reflexum, marginibus parallelis, fere contiguis, callo junctis. — Long. 25, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 143.)

Bulimus angiostomus Wagn. in Spix p. 14.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 132. t. 12. f. 5. 6.
— — *Küst.* p. 44. t. 13. f. 12—14.
— *Capueira Lam.* ed. Dh. 39. p. 239.
Stenostoma Capueira Spix test. bras. t. 13. f. 4.
Bulimulus Capueira Beck ind. p. 64. N. 14.

Habitat in Brasilia, in montibus Jacobinae.

Obs. Specimina non adulta sistunt *B. virgatum Spix* l. c. t. 6. f. 4.

247. **B. umbilicaris Soulcyet.**

T. umbilicata, ovato-conica, laevigata, carneo-cinerea; anfr. 6½ planiusculi, ultimus compressissimus, ⅖ longitudinis aequans; umbilicus latissimus, regulariter conicus, ad apicem usque pervius, margine subangulatus; apertura angusta, oblonga; perist. simplex, marginibus fere parallelis, dextro breviter expanso, columellari lato, patente. — Long. 14, diam. 6½ mill. Ap. 6 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 144.)

Bulimus umbilicaris Soul. in Revue zool. 1842. p. 102.
— — *Phil.* Icon. II. 9. p. 11. t. 3. f. 7.

Habitat prope Cobija Boliviae.

248. **B. perspectivus Pfr.**

T. umbilicata, oblongo-conica, tenuis, striatula, pellucida, nitida, rufo-cornea; spira elongato-conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis aequans, basi subangulatim compressus; umbilicus angustus, profunde perspectivus; apertura oblonga; perist. simplex, rufum, marginibus conniventibus, callo tenui junctis, dextro breviter expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 16, diam. 6½ mill. Ap. 6½ mill. longa, c. perist. 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus perspectivus Pfr. in Proc. Zool Soc. 1846. p. 33.

Habitat . . . ?

Obs. Similis B. escharifero (Nr. 304); differt umbilico, perist. magis expanso, etc.

249. B. Jacobi Sowerby.

T. umbilicata, ovato-conica, tenuis, fusca, interdum pallide bicingulata, minutissime seriatim granosa; sutura profunda; anfr. 6 ventrosi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, basi compressus; umbilicus mediocris, pervius; apertura oblonga; perist. subincrassatum, marginibus conniventibus, dextro arcuato, breviter expanso, columellari recto, dilatato, patente. — Long. 11, diam. $6^2/_3$ mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 145.)

Bulimus Jacobi Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 74.
— — *Müll.* synops. p. 29.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 45.
Bulimus Jacobi Lam. ed. Dh. 127. p. 281.
Buliminus Jacobii Beck ind. p. 70. N. 32.

Habitat in insula Jacobi inter Gallopagos (Cuming).

§. 17.

250. B. auris leporis Bruguière.

T. perforata, ovato-pyramidata, basi depressa, tenuis, leviter rugulosa, albida, flammulis luteo-fulvis nebulosis variegata; sutura crenulata; spira pyramidata; anfr. 6 rapide accrescentes, supremi plani, ultimus convexiusculus, spiram aequans, basi angulatus; columella plicato-contorta; apertura obliqua, subtriangularis; perist. simplex, late expansum, reflexum, marginibus callo tenui junctis, dextro et columellari subparallelis, basali latissimo, effuso. — Long. 44, diam. 21 mill. Ap. intus 20 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 146.)

Bulimus auris leporis Brug. Enc. méth. I. p. 346. N. 82.
— — — *Wood* suppl. t. 8. f. 75.
— — — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 150. t. 14. f. 25. 26.
— *lagotis Menke* syn. ed. 2. p. 26.
— — *Küst.* p. 24. t. 4. f. 12. 13.
Auricula leporis Lam. 4. p. 138. ed. Dh. p. 325.
— — *Deless.* recueil t. 28. f. 7.
— *auris leporis Swains.* Malac. p. 181. f. 27.
Helix auris leporis (Cochlogena) *Fér.* pr. 438.
— — — *Fér.* in Voy. de Freyc. Zool. p. 483.
Pupa auris leporis Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.
Stenostoma auritum Spix test. bras. p. 18. t. 13. f. 1. 2.
Otostomus lagotis Beck ind. p. 55. N. 4.

β. Minor, fasciis et strigis interruptis, fulminatis, nigricantibus elegantissime variegatus: long. 35, diam. 15 mill. Ap. intus 16 mill. longa, 8 lata. (Spec.)

γ. Minimus, fuscescens, lineis saturatioribus confertis, undulatis varie-

gata, apertura fere verticali: long. 34, diam. 13 mill. Ap. intus 17 mill. longa, 7 lata. (Spec.)

Habitat in Brasilia, frequens prope Rio Janeiro! — Etiam in insula Madagascar vivere asserunt Cl. Bruguière et Férussac.

251. **B. auris muris (Helix) Moricand.**

T. rimata, ovato-conica, laevigata, nitida, alba, fasciis spadiceis, superne interruptis ornata; spira conico-turrita; anfr. 6½ planiusculi, ultimus spiram superans, basi rectangulus, infra angulum subexcavatus, striatus; columella vix plicata; apertura verticalis, subtriangularis, latere dextro subeffuso; perist. late expansum, reflexiusculum, intus nitide album. — Long. 27, diam. 13 mill. Ap. intus 12 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 147.)

Helix auris muris Moric. Mém. Gen. VIII. P. 1. p. 140. t. 3. f. 1—3.
Bulimus auris muris Pfr. Symb. I. p. 80. II. p. 111.
Otostomus myotis Beck ind. p. 55. N. 2.

Habitat in Brasiliae provincia Bahiensi.

252. **B. navicula (Helix) Wagner.**

T. rimato-perforata, oblique conica, basi quasi truncata, planata, albida vel lutescens, unicolor vel castaneo-fasciata, tenuis, irregulariter malleata; spira conica, acuta, saepe rosea; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus convexus, basi carinatus, antice ad penultimum ascendens; columella nulla; apertura verticalis, triangularis, antice effusa; perist. tenue, undique late expansum. — Long. ab apice spirae ad marginem anticum aperturae 23, long. axis 16, diam. baseos maj. 28, min. 17 mill. Ap. intus 8 mill. alta, 13 lata. (Coll. Nr. 148.)

Navicula fasciata Spix test. bras. t. 15. f. 2. 3.
Helix navicula Wagn. in Spix p. 22.
— *auris leporis α Fér.* pr. 438.
Bulimus navicula Lam. ed. Dh. 74. p. 256.
— *lateralis Menke* syn. ed. 2. p. 20.
— *Lyonetianus Küst.* p. 23. t. 5. f. 5. 6. (excl. synon.)
Otostomus lateralis et *navicula Beck* ind. p. 55. N. 3. 5.

Habitat in Brasiliae provincia Bahia (Spix, Moricand).

§. 18.

253. **B. fulvicans Pfr.**

T. rimato-perforata, ovato-conica, tenuis, striis concentricis et longitudinalibus minutissime decussata, fulvicans; spira conica, acutiuscula; sutura profunda, marginata; anfr. 6½ convexi, ultimus inflatus, spiram subaequans; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, tenue, late expansum, margine columellari superne

dilatato, reflexo. — Long. 32, diam. 17 mill. Ap. 17 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 149.)

Bulimus fulvicans Pfr. Symb. I. p. 42.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 56. t. 1. f. 10.

Habitat in insulis Sechellis.

254. B. velutino-hispidus (Helix) Moricand.

T. perforata, subgloboso-conica, tenuiuscula, epidermide seriatim pilosa, fulvida induta; spira brevis, conica, acutiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus inflatus, medio obsolete albozonatus, ⅗ longitudinis aequans; apertura ampla, ovalis, intus margaritacea; perist. albidum, breviter expansum, margine columellari in laminam triangularem, reflexam dilatato. — Long. 27, diam. 18 mill. Ap. 18 mill. longa, intus 10½ lata. (Coll. Anton.)

Helix velutino-hispida Moric. Mém. Gen. VII. P. 2. p. 429. t. 2. f. 4.
Bulimus velutino-hispidus Lam. ed. Dh. 84. p. 262.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 158. t. 15. f. 21 22.
— ? *hirtus Beck* ind. p. 51. N. 1.

Habitat in Brasilia.

Obs. Species Bul. heterotricho (Nr. 306) et scobinato characteribus generalibus peraffinis, a priore spira brevi, anfractu ultimo subgloboso et peristomate non labiato diversus. B. scobinatus forma magis cum heterotricho convenit, sed gracilior est, anfractus subplani, labrum tenue, ut in velutino-hispido. Conf. Nr. 255.

255. B. scobinatus (Helix) Wood.

T. perforata, ovato-conica, rubella, epidermide lutescenti-cornea, seriatim brevipilosa, induta; spira conica, acuta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans, ventrosior; apertura ampla, ovalis; perist. breviter expansum, margine dextro subsinuato, columellari subverticali, leviter arcuato, in laminam triangularem angulatim reflexam, albam superne dilatato. — Long. 23, diam. 13½ mill. Ap. 12½ mill. longa, medio 8½ lata. (Coll. Nr. 150.)

Helix scobinata Wood suppl. t. 8. f. 77.
Bulimus scobinatus Gray in Wood suppl. p. 32.

Habitat in Brasilia (Bescke).

256. B. pulverulentus Pfr.

T. umbilicata, ovato-conica, tenuis, diaphana, concentrice striata, fusca, zona 1 angusta, saturatiore circumdata, quasi pulverulenta s. pruinosa; sutura marginata; anfr. 6½ planiusculi, ultimus spiram subaequans; umbilicus mediocris, non pervius; apertura ovato-oblonga, intus nitida; perist. simplex, tenue, carneum, margine dextro expanso, columellari dilatato, reflexo. —

Long. 24, diam. 12 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 6½ lata. (Coll. Nr. 151.)

Bulimus pulverulentus Pfr. Symb. I. p. 42.

Habitat . . . ?

Obs. Testa paululum trita amissa pruina fit nitida.

257. B. ornatus Dufo. †

T. umbilicata, oblonga, striata, lutescenti-brunnea, fascia 1 angusta, violacea ornata; anfr. 6, ultimus spiram superans; apertura ovalis, lateraliter subobliqua; perist. acutum, margine dextro expanso, planulato, columellari reflexo, postice canaliculato. (Dufo.) — Dimens.?

Bulimus ornatus Dufo in Ann. sc. nat. XIV. 1840. p. 197.

β. Extus flavus, absque fasciis, spira apice rosea.

Habitat in insula Malé Sechellarum.

* * *

258. B. fenestratus Pfr.

T. perforata, subfusiformi-oblonga, solidula, longitudinaliter profunde undulato-sulcosa, alba, fasciis sub 5 et strigis undulatis, nigricanti-castaneis fenestrata; sutura crenulata; spira conica, acuta; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella subplicata, oblique recedens, lilacea; apertura oblongo-semiovalis, intus lilacina; perist. expansum, margine columellari superne angulatim reflexo, subappresso. — Long. 45, diam. 18 mill. Ap. 25 mill. longa, medio 11½ lata. (Coll. Nr. 152.)

Bulimus fenestratus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 29.

Habitat in republica Mexicana. (Legit Cl. Liebmann.)

259. B. Dunkeri Pfr.

T. perforata, ovato-conica, tenuiuscula, longitudinaliter rugoso-striata, lineis spiralibus impressis obsolete reticulata, albido-lutescens, spadiceo-strigata et maculata, maculis minoribus albidis aspersa; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram aequans; columella verticalis, inflata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, marginibus distantibus, dextro subexpanso, columellari late reflexo. — Long. 37, diam. 16 mill. Ap. 19 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 153.)

Bulimus Dunkeri Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 112. Bul. t. 4. f. 10.

Habitat prope Michoacan reipublicae Mexicanae (Hegewisch).

260. B. mexicanus Lamarck.

T. umbilicata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, tenuissime striata, alba, fusco-zonata, zonis aut fasciis subinterruptis; anfr.

7 convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella subrecta; apertura ovalis; perist. tenue, margine dextro expanso, columellari dilatato, reflexo. — Long. 29, diam. 14 mill. Ap. 14 mill. longa, 9 lata. (ex ic. Val.)

Bulimus mexicanus Lam. 23. p. 123. ed. Dh. p. 232.
— — *Val.* in Humb. voy. Zool. II. p. 247. t. 56. f. 1.
— — *Deless.* recueil t. 27. f. 9.
Helix vittata (Cochlogena) *Fér.* pr. 397.
Bulimulus mexicanus Beck ind. p. 66. N. 40.

β. Gracilior, anfractu ultimo spira paulo breviore: long. 35, diam. 14 mill. Ap. 17½ mill. longa, intus 8 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in republica Mexicana (Humb.), var. *β* in provincia Tabasco.

261. B. serperastrus Say. †

T. umbilicata, conica vel elongato-subovata, albida vel alba, fasciis sub 6 saturate rufis, interruptis, magis minusve confluentibus; spira interrupte 3—4-fasciata; sutura mediocris; anfr. convexiusculi; apertura spiram vix aequans; labrum subexpansum, margine columellari superne subdilatato. — Long. 1½, diam. $^{7}/_{10}$ poll. (Say.)

Bulimus serperastrus Say descr. of new terr. shells p. 25.

Habitat inter urbes Vera Cruz et Mexico.

Obs. Num forsan varietas B. mexicani?

262. B. membranaceus Philippi.

T. perforata, ovato-oblonga, tenuis, membranacea, transversim confertissime striolata, pellucida, albido-hyalina; spira turrito-conica, apice acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^{3}/_{7}$ longitudinis subaequans; columella subtorta, compressa; apertura truncato-ovalis; perist. breviter subexpansum, margine columellari perdilatato, reflexo, subsinuoso. — Long. 32, diam. 12 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 154.)

Bulimus membranaceus Phil. Icon. II. 13. p. 126. t. 5. f. 1. 2.

Habitat . . . ?

263. B. papyraceus (Helix) Mawe.

T. subobtecte perforata, ovato-acuminata, longitudinaliter plicatulo-striata, tenuis, pellucida, albida, strigis longitudinalibus spadiceis, subarticulatis picta; spira conica, acuta; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus; columella strictiuscula, funiculata; apertura ovali-oblonga, concolor; perist. simplex, tenue, margine dextro leviter arcuato, breviter expanso, columellari breviter fornicatim reflexo. — Long. 29, diam. 13 mill. Ap. 15 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 155.)

Helix papyracea Mawe (1823.) Linn. syst. tab. tit. f. 7.

Helix lita (Cochlogena) *Fér.* pr. 403.
— — *Fér.* (1824.) Voy. de Freyc. Zool. p. 473. t. 67. f. 10. 11.
— — *Orb.* synops. p. 11.
Bulimus papyraceus Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Wood* suppl. t. 8. f. 76.
— *litturatus Spix* (1827.) test. bras. p. 7. t. 7. f. 3.
— *Lita Lam.* ed. Dh. 57. p. 247.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 159. t. 15. f. 23. 24.
— — *Orb.* voy. p. 268.
Bulimulus litus Beck ind. p. 64. N. 10.
— *papyraceus Beck* ind. p. 65. N. 23.
β. Ventricosior:
Bulimus inflatus Spix test. bras. t. 7. f. 1.
— *magus Wagn.* in Spix p. 6.
Habitat in Brasilia et in Corrientes reipublicae Argentinae (Orb.).

264. B. meridanus Pfr.

T. perforata, oblongo-subfusiformis, striatula, laevigata, lutescenti-albida, fasciis angustis coeruleo-fuscis, vel latis castaneis, strigatim interruptis ornata; spira turrito-conica, acutiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram aequans; columella leviter arcuata; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, margine dextro breviter expanso, columellari dilatato, fornicatim reflexo, albo, perforationem fere occultante. — Long. 29, diam. 11 mill. Ap. 15 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus meridanus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 33.
Habitat prope Merida Andium Boliviae.

265. B. vincentinus Pfr.

T. subperforata, fusiformis, tenuis, laevigata, lineis concentricis, leviter impressis sculpta, nitida, pellucida, hyalino-lutescens, fasciis 5 subaequalibus violaceo-fuscis ornata; spira conica, apice acutiuscula, nigricans; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus; columella paulo recedens; apertura obliqua, ovali-oblonga, intus concolor; perist. tenue, margine dextro breviter expanso, superne dilatato, columellari in laminam triangularem angulatim reflexo, perforationem fere claudente. — Long. 30, diam. 11½ mill. Ap. 15 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus vincentinus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 30.
β. Testa paulo graciliore, unicolore citrina vel straminea: long. 30, diam. 10½ mill. Ap. 14 mill. longa, 6½ lata. (Mus. Cuming.)
Habitat in insula St. Vincentii; var. *β* in Venezuela (Lindon).

266. B. zoographicus Orbigny.

T. perforata, ovato-elongata, tenuis, fragilis, striatula et obsolete malleata, diaphana, sordide alba, maculis longitudinalibus, castaneis marmorata; spira conica, elongata, apice acutiuscula; anfr. 6½ planiusculi, ultimus spira vix brevior; columella paulo recedens; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. tenue, margine dextro breviter expanso, subrepando, columellari dilatato, subappresse reflexo, perforationem fere tegente. — Long. 32, diam. 12½ mill. Ap. 16 mill. longa, medio 8 lata. (Coll. Nr. 156.)

Helix zographica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 19.

Bulimus zoographicus Orb. voy. p. 313. t. 40. f. 6—8.

Bulimulus zoographicus Beck ind. p. 64. N. 8.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

267. B. gracilis Lea. †

T. subfusiformis, nitida, subperforata, albida, trivittata, longitudinaliter striata; anfr. planulati; apertura ovata; labrum reflexum; columella laevis, purpurea. — Diam. 0,6, long. 1,4″. (Lea.) — Long. 36, diam. 14 mill. Ap. intus 17 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Bulimus gracilis Lea obs. II. p. 85. t. 23. f. 102.

Habitat prope Carthagena.

268. B. durus Spix.

T. rimato-perforata, ovato-acuta, striatula, lineis concentricis decussatula, nitida, alba; spira conica, acutiuscula; anfr. 7½ convexiusculi, ultimus spira vix brevior; apertura ovalis; perist. simplex, expansiusculum, margine columellari late reflexo, patulo. — Long. 28, diam. 14 mill. Ap. 14 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 157.)

Bulimus durus Spix test. bras. p. 5. t. 6. f. 2.

— — — *Lam.* ed. Dh. 45. p. 242.

β. Fulvicans, albo-unizonatus.

Habitat in Bahia Brasiliae.

269. B. rimatus Pfr.

T. profunde rimata, oblongo-turrita, tenuiuscula, subarcuatim striatula, pallide cornea; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 7 fere plani, ultimus ⅜ longitudinis aequans, basi rotundatus; columella intus uniplicata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, marginibus approximatis, callo junctis, dextro vix expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 33, diam. 11 mill. Ap. 13 mill. longa, c. perist. 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus rimatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 112.

Habitat . . . ?

270. B. bolivianus Pfr.

T. perforata, oblongo-turrita, lineis impressis (sub lente) minutissime decussata, nitida, albido-rubella, fasciis latis, badiis, subinterruptis ornata; spira turrita, apice acuta, rubra; anfr. 7 plani, ultimus convexiusculus, $^4/_9$ longitudinis subaequans; columella torto-plicata, rosea; apertura ovali-oblonga, intus concolor; perist. simplex, margine dextro breviter expanso, columellari perdilatato, reflexo, excavato, perforationem rimaeformem fere tegente. — Long. 33, diam. 13 mill. Ap. 16 mill. longa, medio $7^1/_2$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus bolivianus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 34.

Habitat prope Merida in Andibus Boliviae.

271. B. vittatus Spix.

T. perforata, oblongo-turrita, tenuis, pellucida, nitida, corneo-lutescens, vittis angustis, rufis, distantibus ornata; anfr. 8 planiusculi, lati, ultimus $^1/_3$—$^2/_5$ longitudinis subaequans, basi subcompressus, rufo-unifasciatus; apertura oblongo-ovalis, intus albida, zona pellucente; perist. simplex, acutum, margine dextro repando, breviter expanso, columellari valde dilatato, plano, reflexo. — Long. 38, diam. 13 mill. Ap. 15 mill. longa, medio 8 lata. (Coll. Nr. 158.)

Bulimus vittatus Spix test. bras. p. 7. t. 7. f. 4.
— — *Lam.* ed. Dh. 47. p. 243.
— *Coxeiranus Lam.* ed. Dh. 40. p. 240. *)
Helix Coxeirana Moric. Mém. Gen. VII. p. 433. t. 2. f. 7—11.
Bulimulus vittatus Beck ind. p. 65. N. 22.
Knorr Vergnüg. VI. t. 29. f. 2. 3!

β. Basi castaneo-bifasciatus: long. 32, diam. 13 mill. Ap. 14 mill. longa, 8 lata. (Spec.)

γ. Unicolor lutescenti-albidus.

δ. Nigricanti-castaneus, basi pallide bifasciatus: long. 22, diam. $11^1/_2$ mill. Ap. 12 mill. longa, 7 lata. (Coll. v. d. Busch.)

Habitat in Brasiliae provinciis Bahia et Pernambuco.

Obs. Variat spira magis minusve elongata; at semper apertura spira multo minor est, etiam in speciminibus authenticis B. coxeirani, quae ex Musaeo dom. Dr. v. d. Busch comparavi. Varietates β—γ Bulimum coxeiranum Moric. complectuntur.

272. B. omphalodes Menke.

T. perforata, conico-turrita, tenuiuscula, laevigata, alba, epidermide griseo-straminea, saturatius lineata, induta; spira

*) T. elongato-conica, subturrita, laevigata, nitida, luteola, fasciis fuscis transversis ornata; anfract. convexiusculis, ultimo spira aequali basi convexo, perforato; apertura ovato-oblonga, labro tenui reflexo. — Long. 33, diam. 15 mill. (Desh. l. c.)

elongata, apice acuta; anfr. 7½ convexiusculi, ultimus spira paulo brevior (5/11 longitudinis), basi rotundatus; columella obliqua, obsolete plicata; apertura oblonga, superne truncata; perist. simplex, marginibus subparallelis, dextro superne curvato, breviter expanso, columellari dilatato, patente, perforationem non tegente. — Long. 31, diam. 13 mill. Ap. 15 mill. longa, 9½ lata. (Mus. Menke.)

Bulimus omphalodes Menke in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 144.

Habitat . . . ?

273. B. Liebmanni Pfr.

T. rimato-perforata, fusiformi-oblonga, subarcuatim striatula, alba, fasciis 5 — 6 angustis, spadiceis, strigisque undulatis interdum ornata; spira turrita, apice obtusiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus 2/5 longitudinis subaequans; columella subplicata, oblique recedens; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, mediocriter expansum, margine dextro arcuato, columellari angulatim reflexo, rimam profundam formante. — Long. 34, diam. 12 mill. Ap. 15 mill. longa, intus medio 6⅓ lata. (Coll. Nr. 159.)

Bulimus Liebmanni Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 158.

Habitat in republica mexicana (Liebmann), Yucatan (Largilliert).

274. B. polygrammus (Helix) Moricand. †

T. elongata, subturrita, fulva, striis numerosissimis elevatis, albidis lineolata; spira acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spiram aequans, basi perforatus; apertura ovata; labrum acutum, reflexum. — Long. 13, diam. 5 mill. (Dh.)

Helix polygramma Moric. Mém. Gen. VII. p. 436. t. 2. f. 12—14.
Bulimus polygrammus Lam. ed. Dh. 48. p. 243.
Bulimulus polygrammus Beck ind. p. 64. N. 16.

Habitat in Brasilia: Coxeira (Moric.)

275. B. heterogrammus (Helix) Moricand. †

T. ovato-oblonga, fragilis, fulva, lineolis fuscis albidisque notata; anfr. convexiusculi, ultimus basi perforatus; apertura obliqua, ovata; labrum acutum, reflexum. — Long. 13, diam. 5 mill. (Dh.)

Helix heterogramma Moric. Mém. Gen. VII. p. 437. t. 2. f. 15—17.
Bulimus heterogrammus Lam. ed. Dh. 49. p. 244.
Bulimulus heterogrammus Beck ind. p. 64. N. 17.

Habitat in Brasilia: Coxeira (Moric.).

276. B. Jonasi Pfr.

T. perforata, oblongo-conica, tenuiuscula, longitudinaliter rugoso-plicata, opaca, straminea, sulcis longitudinalibus pellucidis, corneis; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus; columella breviter arcuata, violacea; apertura ovali-oblonga, intus concolor; perist. simplex, expansum, margine columellari fornicatim breviter reflexo. — Long. 26, diam. 10 mill. Ap. intus 12 mill. longa, 6 lata. (Mus. Cuming. et Gruner.)

Bulimus Jonasi Pfr. in Phil. Icon. II. 13. p. 125. t. 5. f. 4.

Habitat prope Vera Cruz Americae centralis (Lattre).

277. B. Studeri Pfr.

T. perforata, oblongo-conica, tenuiuscula, striatula, lineis spiralibus confertis sub lente decussata, nitida, alba, cingulis angustis, roseis 3—4 ornata; spira conica, acuta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^{4}/_{5}$ longitudinis subaequans; columella arcuata; apertura ovali-elliptica, intus concolor; perist. simplex, marginibus subconniventibus, dextro breviter expanso, columellari fornicatim reflexo, roseo. — Long. 25, diam. 10 mill. Ap. 11½ mill. longa, medio 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Studeri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 112.

Habitat in America centrali?

278. B. onager (Bulimulus) Beck.

T. perforata, oblongo-conica, solidiuscula, glabra, nitida, lutescens, strigis undatis rubro-fuscis aut spadiceis ornata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^{2}/_{3}$ longitudinis subaequans, basi obsolete angulatus; apertura obliqua, oblongo-ovalis, intus concolor; perist. album, acutum, margine dextro expanso, columellari subdilatato, breviter reflexo, perforationem fere occultante. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 160.)

Bulimus zebra Spix test. bras. p. 8. t. 7. f. 5. Nec Müll., nec Oliv.
— — *Lam.* ed. Dh. 46. p. 242.
Helix zebra Moric. Mém. Gen. VII. p. 432.
Bulimulus onager Beck ind. p. 64. N. 19. (ex synon.)

β. Anfractu ultimo infra medium zona latiuscula albida ornato. (Spec.)
Bulimus vittatus Küst. t. 16. f. 16.

Habitat in Brasiliae provincia Bahiensi.

Obs. Conf. B. vimineus Moric. (Nr. 243.), huic similis.

279. B. opalinus Sowerby.

T. perforata, ovato-pyramidata, striatula, vitrea, opalina, diaphana; spira pyramidata, acuta; anfr. 7 vix convexiusculi,

ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, angulatus; apertura lunato-ovalis; perist. simplex, tenue, margine dextro vix expanso, columellari dilatato, reflexo, perforationem occultante. — Long. 27, diam. 14 mill. Ap. 13½ mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 161.)

Bulinus opalinus Sow. Conch. Ill. f. 47.

— — *Sow.* in Beech. voy. p. 144. t. 38. f. 8.

Helix angulosa (Cochlogena) *Fér.* pr. 402. (teste Beck.)

Bulimulus angulosus Beck ind. p. 64. N. 15.

Habitat in Brasilia.

280. B. meridionalis Pfr.

T. perforata, ovato-conica, striatula, diaphana, albida, fascia 1 aurantio-fusca cingulata; spira regulariter conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spira brevior, subrotundatus; columella leviter arcuata; apertura obliqua, truncato-ovalis, intus concolor; perist. simplex, breviter expansum, margine columellari superne fornicato-reflexo. — Long. 15, diam. 8 mill. Ap. vix 8 mill. longa, 5⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus meridionalis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in Africa meridionali.

281. B. chrysalis Pfr.

T. perforata, ovato-elongata, tenuis, pellucida, minute striatula, corneo-castanea; spira conica, acuta; anfr. 7—8 planiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella subverticalis, subrecta, paululum torta; apertura concolor, ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro breviter expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 162.)

Bulimus chrysalis Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 14.

Helix limnoides (Cochlogena) *var. Fér.* pr. 393. Hist. t. 142. f. 11. 12?

Habitat in insula Guadeloupe (Petit de la Saussaie).

Obs. Valde differt a. B. limnoide (conf. Nr. 613.) perist. expanso, intus non labiato, etc.

282. B. multifasciatus Lamarck.

T. subperforata, oblongo-conica, laevis, nitida, albida, zonis rubro-violaceis, nigro-marginatis ornata; spira turrito-conica, apice nigricans; anfr. 6 convexiusculi, ad suturam coarctati, ultimus spira brevior; columella subarcuata; apertura ovalis; perist. tenue, margine dextro expanso, sinistro reflexo, perforationem fere tegente. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 6½ lata. (Coll. Nr. 163.)

Bulimus multifasciatus Lam. 24. p. 123. ed. Dh. p. 233.

Bulimus multifasciatus Deless. recueil t. 28. f. 3.
Helix picturata (Cochlogena) *Fér.* pr. 400. (teste Lam.)
Bulimulus multifasciatus Beck ind. p. 65. N. 32.

β. Major, lutescens, fasciis 3 purpurascenti castaneis ornata, area umbilicari rubicunda: long. 27, diam. 12 mill. Ap. 12½ mill. longa, 7½ lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in insulis Guadeloupe et Martinique; Cayenne (Fér.); var. β prope La Guayra.

283. B. Moricandi Pfr.

T. perforata, ovato-conica, tenuis, lineis spiralibus subconfertis insculpta, subdiaphana, citrina; spira conica, acutiuscula; sutura pallide submarginata; anfr. 6 vix convexi, ultimus spiram aequans; columella stricta; apertura suboblonga, truncato-ovalis, intus concolor; perist. simplex, breviter expansum, margine columellari superne breviter patenti-reflexo. — Long. 24, diam. 12 mill. Ap. 13 mill. longa, 7½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Moricandi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 113.

Habitat in monte Coban Americae centralis (Lattre).

284. B. lineatus Spix. †

T. perforata, oblongo-conica, laevis, minutissime striata, alba, strigis longitudinalibus luteo-brunneis picta; spira elongato-subturrita; labrum subreflexum, margine sinistro lato reflexo. — Long. 10 lin. (Dh.)

Bulimus lineatus Spix test. bras. p. 8. t. 7. f. 6.
— — *Lam.* ed. Dh. 50. p. 244.

Habitat in Brasilia.

285. B. Munsterii Orbigny. †

T. brevis, conica, inflata, subumbilicata, laevigata, translucida, albescens, lineolis brunneis longitudinaliter ornata; spira conica, brevis, apice acuta; anfr. 8 inflati, ultimus spira brevior; sutura impressa; apertura oblongo-ovalis; labrum tenue, acutum, subreflexum. — Long. 23, lat. 10 mill. (Orb.)

Bulimus Munsterii Orb. voy. p. 278. t. 34. f. 4—7.

Habitat in Bolivia.

286. B. cinnamomeo-lineatus (Helix) Moricand.

T. perforata, ovato-conica, laevis, lucida, minutissime striata, alba, strigis longitudinalibus, rectis, cinnamomeis virgata; spira elevata, obtusa; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subtorta, arcuata; apertura ovalis; perist. simplex, breviter expansum, margine columellari dilatato, angulatim

reflexo, albo. — Long. 25, diam. 9 mill. Ap. 9½ mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 164.)

Helix cinnamomeo-lineata Moric. Mém. Gen. IX. p. 46. t. 4. f. 6. 7.
Bulimus cinnamomeo-lineatus Pfr. Symb. III. p. 53.

β. Pallide flavescens, strigis obliquis corneis, perist. paulo latius expanso. (Mus. Berol.)

Habitat prope Bahia Brasiliae; var. *β* in Guiana (Schomburgk).

287. B. Manoelii (Helix) Moricand.

T. perforata, ovato-acuminata, laevigata, nitidula, alba, violaceo vel roseo nebulosa; anfr. 6½ planiusculi, ultimus spira paulo brevior, zonis 2 coerulescentibus notatus; columella leviter arcuata; apertura oblongo-ovalis, concolor; perist. simplex, tenue, margine dextro breviter expanso, columellari superne in laminam triangularem dilatato, tenui, reflexo, perforationem subtegente. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 5⅔ lata. (Coll. Nr. 165.)

Helix Manoelii Moric. Mém. Gen. IX. p. 45. t. 4. f. 4. 5.
Bulimus Manoelii Pfr. Symb. III. p. 55.
— *Coxiranus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 138. t. 13. f. 1. 2.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

288. B. abyssinicus Rüppell.

T. rimato-perforata, ovato-acuminata, tenuis, regulariter et confertim arcuato-costata, diaphana, corneo-albida; spira elongata, conica; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella subrecta, intus subtorta; apertura oblongo-ovalis; perist. acutum, margine dextro arcuato, breviter expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 21, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 166.)

Bulimus abyssinicus Rüpp. in sched. Cuming.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 157.
Buliminus habessinicus Beck ind. p. 68. N. 2.

Habitat in Abyssinia.

289. B. constrictus Pfr.

T. perforata, ovata, apice obtusiuscula, striis longitudinalibus et spiralibus minutissimis obsolete decussata, alba, epidermide cornea induta; sutura constricta; anfr. 7 convexi, ultimus spira brevior; columella subverticalis; apertura ovalis; perist. simplex, margine dextro vix patulo, columellari subrecto, late expanso. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 167.)

Bulimus constrictus Pfr. Symb. I. p. 43.
— *Angosturensis Grun.* in Wiegm. Arch. 1841. I. p. 278. t. 11. f. 3.

Habitat in Angostura.

290. B. pubescens Moricand.

T. rimato-perforata, oblongo-ovata, minutissime granulata et pubescens, tenuiuscula, diaphana, pallide cornea; spira subelongata, apice obtusa; anfr. 6½ convexi, ultimus ⅖ longitudinis aequans; columella superne dentato-plicata; apertura semiovalis, intus nitide albida; perist. simplex, margine dextro breviter expanso, columellari usque ad basin dilatato, patente. — Long. 15, diam. 7 mill. Ap. 6½ mill. longa, intus 2⅔ lata. (Coll. Nr. 168.)

Bulimus pubescens Moric. Mém. 3e suppl. p. 63. t. 5. f. 21—23.

Habitat circa Bahia Brasiliae.

291. B. limonoicus Orbigny. †

T. elongata, pyramidalis, conica, subperforata, tenuis, laevigata, translucida, albido-rufescens, lineolis longitudinalibus brunneis variata; spira conica, brevis, plana, apice acuta; anfr. 8, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; sutura plana, laevigata; apertura ovalis, angulosa; columella recta, subinflata; labrum tenue, acutum, subreflexum. — Long. 19, lat. 8 mill. (O.)

Helix limonoïca (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 13.

Bulimus limonoicus Orb. voy. p. 284. t. 33. f. 15. 16.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

292. B. Montagnei Orbigny. †

T. elongato-conica, umbilicata, tenuis, laevigata, translucida, albida, lineolis transversalibus minimis, fasciis formantibus et graciose flammis brunneis ornata; spira elongata, conica; anfr. 6 subconvexi; apertura oblonga; labrum tenue, acutum, subreflexum; columella arcuata. (O.) — Long. 24, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa; 5 lata. (ex ic.)

Bulimus Montagnei Orb. voy. p. 286. t. 32. f. 5—7.

Habitat circa Petaca Boliviae.

293. B. Pazianus Orbigny. †

T. oblongo-pyramidalis, subumbilicata, tenuis, diaphana, laevigata vel subrugosa, albida, flammulis longitudinalibus brunneis ornata; spira subplana, apice acuta, rosea; sutura plana; anfr. 7; apertura lata, subquadrilateralis; columella recta; labrum tenue, acutum, subreflexum. (O.) — Long. 24, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 5½ lata. (ex ic.)

Helix Paziana (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 12.

Bulimus Pazianus Orb. voy. p. 286. t. 32. f. 10. 11.

Bulimulus Pazianus Beck ind. p. 68. N. 67.

Habitat in provincia Sicasica Boliviae.

294. B. trichodes Orbigny.

T. aperte perforata, ovato-elongata, tenuis, striatulo-granulata, pilis brevissimis obsita, cornea, lineis longitudinalibus, confertis, albidis ornata; spira elongata, apice acuta; anfr. 8 convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis fere aequans; columella recta, paulo recedens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro expansiusculo, columellari fornicatim reflexo, patente. — Long. 20, diam. 9 mill. Ap. $8^1/_2$ mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 169.)

Helix trichodes (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 12.*)
Bulimus trichodes Orb. voy. p. 277. t. 33. f. 1—5.
Buliminus trichodes Beck ind. p. 71. N. 37.

Habitat in Boliviae provincia Sta Cruz de la Sierra.

* * *

295. B. montivagus Orbigny.

T. aperte perforata, oblongo-turrita, tenuis, substriata, albida, lineis longitudinalibus flavis interdum ornata; spira turrita, apice acuta; anfr. 8—9 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans; columella strictiuscula, vix recedens; apertura oblonga; perist. simplex, breviter expansum, margine dextro breviter curvato, columellari dilatato, patenti-reflexo. — Long. 16, diam. $6^2/_3$ mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 170.)

Helix montivaga (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 14.**)
Bulimus montivagus Orb. voy. p. 275. t. 34. f. 1—3.
Bulinus montivagus Sow. Conch. Ill. f. 84.
Buliminus montivagus Beck ind. p. 71. N. 38.
β. Major: long. 23, diam. $8^1/_3$ mill. Apert. 8 mill. longa.

Habitat in prov. Lagunensi Boliviae et prov. Entre Rios reipubl. Argentinae, var. β in Chiquitos.

296. B. lichenum Orbigny. †

T. elongata, turriculata, umbilicata, tenuis, diaphana, laevigata vel subrugosa, albida, griseo-flavicante marmorata, spira elongatissima, aequalis, apice obtusa; anfr. 11—12; apertura

*) T. elongata, pyramidali, convexa, subperforata, tenui, diaphana, transversaliter villosa, cinereo-fulva; spira elongata; apice acuto; anfr. 8; sutura subprofunda; apertura oblonga; columella recta, inflata; labro tenui, acuto, subreflexo. — Long. 20, lat. 10 mill. (Orb. l. c.)

**) T. elongata, conica, pyramidali, haud umbilicata, tenui, substriata, albida, lineis albidis et longitudinalibus ornata; apice obtuso, fusco; spira inflata; sutura profunda; anfr. 9; apertura ovali, recta; columella recta, crassa; labro acuto. — Long. 16, lat. 7 mill. (Orb. l. c.)

prominula, recta, albida; columella torta; labrum acutum, tenue. — Long. 17, diam. 5 mill. (O.) — Coll. Nr. 171? *)

Helix lichnorum (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 20.
Bulimus lichnorum Orb. voy. p. 264. t. 41. f. 9—11.
Cochlicellus lichenum Beck ind. p. 63. N. 12.

Habitat prope Cobija Boliviae.

Obs. 1. Peristoma in icone distincte expansum apparet.
Obs. 2. Bul. lichnorum Sow. Conch. Ill. f. 81. 82 ad B. Hennahi referendus est.

297. B. rugulosus Sowerby.

T. rimata, oblongo-turrita, longitudinaliter rugosa, lineis elevatis concentricis granulata, fusca, rufo-bicingulata; anfr. 8 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis superans, a latere compressus; apertura oblonga; perist. simplex, vix expansiusculum, marginibus subparallelis, callo junctis, dextro superne leviter arcuato, columellari dilatato, fornicato-patente. — Long. 21, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 4 lata. (Mus. Cuming.)

Bulinus rugulosus Sow. Conch. Ill. f. 87.

Habitat in insulis Gallopagos et « Chatham islands ».

298. B. pupiformis Brodcrip.

T. rimato-subperforata, turrita, apice obtusa, laeviuscula, fusco et albido variegata; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus convexus, $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella breviter arcuata; apertura vix obliqua, ovalis, intus alba; perist. simplex, tenue, marginibus callo tenui junctis, dextro late expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 22, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, $3^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 172.)

Bulinus pupiformis Brod. in Conch. Ill. f. 27.
Bulimus pupiformis Pfr. Symb. II. p. 49.
Cochlicellus? pupiformis Beck ind. p. 63. N. 14.

Habitat prope Huasco Chilensium (Cuming.)

299. B. neglectus Pfr.

T. perforata, turrita, apice obtusiuscula, striatula, opaca, corneo-lutescens; sutura impressa, albo-crenulata; anfr. $8^1/_2$ vix

*) T. perforata, subfusiformi-cylindracea, laevigata, corneo et albido alternatim anguste et irregulariter strigata; spira turrita, apice obtusiuscula; anfr. 11 convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans, juxta perforationem apertam vix compressiusculus; columella subrecta, verticalis; apertura oblonga; perist. simplex, margine dextro breviter expanso, columellari a basi reflexo, superne dilatato. — Long. 16, diam. $4^2/_3$ mill. Ap. $4^2/_3$ mill. longa, medio (excl. perist.) $2^1/_3$ lata. Specimina a Cl. Petit absque nomine communicata, ex Chile vel Peru, figurae B. cambae Orb. (t. 41. f. 15—17.) potius quam lichnorum (t. 41. f. 9—11.) congrua.

convexi, ultimus medio obsolete angulatus, $^1/_3$ longitudinis subaequans; columella torta, superne unidentata; apertura obverse auriformis; perist. simplex, margine dextro expanso, superne repando, columellari dilatato, patente. — Long. 19, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, medio c. perist. $7^1/_3$ lata. (Coll. Nr. 173.)

Bulimus neglectus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 67.

Habitat in Brasilia.

Obs. Differt a praecedente sutura crenulata, columella unidentata etc.; a B. Guarani Orb. (Nr. 563.), cujus figurae persimilis est, statim distinguitur peristomate expanso, etc.

299*. B. costatus Pfr.

T. vix perforata, solida, cylindraceo-turrita, longitudinaliter subconfertim costata, nitida, cinerascenti-carnea; spira elongata, obtusa; anfr. $8^1/_2$ planiusculi, sutura impressi disjuncti, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix aequans; columella superne dentato-plicata; apertura oblonga, intus fusca; perist. breviter expansum, margine dextro superne arcuato, tum strictiusculo, columellari dilatato, reflexo, perforationem fere tegente. — Long. 18, diam. $5^1/_2$ mill. Ap. 6 mill. longa, medio cum perist. 4 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus costatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Brasilia.

300. B. terebralis Pfr.

T. rimato-subperforata, subulata, longitudinaliter rugulosa, albida, superne fusco-coerulescens; anfr. $10^1/_2$ plani, ultimus $^1/_4$ longitudinis vix superans, basi subcarinatus; columella obsolete plicata; apertura ovalis, intus alba; perist. simplex, margine dextro ampliato, columellari subdilatato, patente, superne carinae affixo. — Long. 19, diam. 4 mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 174.)

Bulimus terebralis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 51.

Habitat in rupibus et plantis littoris prope Coquimbo Chilensium (Bridges).

301. B. sandwicensis Pfr.

T. perforata, cylindraceo-turrita, apice acutiuscula, tenuis, striatula, cornea, strigis albis, opacis, irregularibus variegata; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis non aequans, basi circa perforationem apertam subcompressus; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, tenue, margine dextro leviter arcuato, expansiusculo, columellari membranaceo, fornicato,

patente. — Long. 15, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 2⅕ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Sandwicensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 31.

Habitat in insulis Sandwich.

302. B. camba Orbigny. †

T. elongato-turrita, subperforata, tenuis, exilissime striata, albido-grisea; spira elongata, apice obtusa; anfr. 9; sutura profunda; apertura ovalis; labrum acutum, subreflexum, violaceum. — Long. 14, lat. 4 mill. (O.)

Bulimus camba Orb. voy. p. 263. t. 41. f. 15—17.

Habitat in Bolivia.

Obs. Conf. adnotatio ad B. lichenum Nr. 296.

303. B. rugiferus Sowerby.

T. subperforata, turrita, fusca, longitudinaliter grosse undulato- et ramoso-plicata, transversim regulariter et minutissime striata; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 9 convexiusculi, ultimus ¼ longitudinis vix superans, basi compressus; apertura oblonga, basi subangulata; perist. simplex, acutum, margine dextro expansiusculo, columellari dilatato, patente. — Long. 12½, diam. 3¾ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 175.)

Bulinus rugiferus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 36.
— — *Müll.* synops. p. 25.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 40.
Cochlicellus rugifer Beck ind. p. 63. N. 11.
Bulimus rugiferus Lam. ed. Dh. 117. p. 276.

Habitat in insulis Gallopagos. Legit Cuming inter scorias ad ins. Jacobi.

304. B. escharifcrus Sowerby.

T. late rimato-umbilicata, oblongo-pyramidata, arcuatim striata, nitida, rufo-fusca, inferne fascia pallidiore circumdata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, basi compressus; columella subrecta; apertura oblonga, basi subangulata; perist. simplex, marginibus conniventibus, dextro breviter expanso, columellari libero, angulatim patente. — Long. 18, diam. 6½ mill. Ap. 6 mill. longa, extus 6 lata. (Coll. Nr. 176.)

Bulinus escharifcrus Sow. Conch. Ill. f. 85.
Bulimus escharifcrus Pfr. Symb. II. p. 45.

Habitat in insulis Gallopagos.

305. B. helvolus Webb et Berthelot. †

T. elongata, tenuis, lucida, substriata, helvola; apertura patula, elongato-ovata, angulata; perist. acutum, leviter reflexum, subcontinuum. (WB.) — Long. 15, diam. 5 mill. (ex ic.)

Bulimus helvolus Webb et *Berth.* syn. p. 326.
— — *Orb.* moll. canar. p. 71. t. 2. f. 21.

Habitat in insula Teneriffa.

§. 19.

306. B. heterotrichus (Helix) Moricand.

T. perforata, ovato-conica, minutissime granulato-decussata, epidermide castanea pubescente et pilis rectis, seriatim dispositis induta; spira conica, acuta; anfr. 7 convexi, ultimus pallide zonatus, spiram aequans, ventrosus; apertura rotundato-ovalis, intus albida; perist. incrassatum, albo-sublabiatum, breviter expansum, margine columellari late reflexo, calloso, excavato. — Long. 48, diam. 28 mill. Ap. intus 24 mill. longa, 17 lata. (Coll. Nr. 177.)

Helix heterotricha Moric. Mém. Gen. VII. P. 2. p. 430. t. 2 f. 5. 6.
— *tumida Gmel.* p. 3668. N. 221? *)
Bulimus heterotrichus Lam. ed. Dh. 42. p. 241.
— ? — *Beck* ind. p. 51. N. 2.
Gualtieri t. 5. f. Q?

Habitat in Brasilia.

307. B. Liberianus Lea. †

T. exerta, lactea, pellucida, nitida, minute striata, perforata; anfr. 6; apertura longula; labrum incrassatum, reflexum; columella laevis. — Diam. 0,4, long. 0,8″. (Lea.) — Long. 22, diam. 11 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (ex ic.)

Bulimus Liberianus Lea in Philad. trans. VII. p. 457. t. 11. f. 4.

Habitat in Liberia Guineae.

308. B. Olivieri Pfr.

T. perforata, oblongo-ovata, tenuis, longitudinaliter confertim et acute plicata, lineis impressis, concentricis, confertissimis granulata, fusca; spira conica, acutiuscula; sutura albo-marginata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella subverticalis, obsolete torta; apertura oblongo-ovata, basi subangulata, intus fulva; perist. subreflexum, albo-sublabiatum, margine colu-

*) T. ventricosa acuminata cinerea; anfractu primo reliquos omnes superante, apertura ovali ampla altero latere marginata. Testa 1 3/4 poll. longa, fascia ad columellam alba. (Gmel. l. c.) — Descriptio ex figuris dubiis Gualtierii et Schröteri (Flussconch. t. 10 min. B. f. 2) composita.

mellari dilatato, fulvo, albo-marginato, patente, in adultissimis incrassato, perforationem claudente. — Long. 27, diam. 14 mill. Ap. 14½ mill. longa, medio 8 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Olivieri Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 14.

Habitat in Abyssinia.

309. B. obesatus Webb et Berthelot.

T. rimata, oblongo-ovata, striatula, tenuiuscula, rufo-cornea; spira ovato-conica, apice acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^{3}/_{7}$ longitudinis subaequans, ventrosus, basi attenuatus; apertura ovalis; perist. acutum, expansum, intus valide albo-labiatum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 17, diam. 8 mill. Ap. c. perist. 7½ mill. longa, 5⅔ lata. (Coll. Nr. 178.)

Bulimus obesatus Webb et *Berth.* syn. p. 318. *)

— — *Orb.* moll. canar. p. 68. t. 2. f. 20.

— — *Küst.* p. 25. t. 12. f. 1.

Helix obesata Fér. pr. 451? } (Scyde, Baruth-Syriac.)
Mastus obesus Beck ind. p. 73. N. 3? }

Habitat in insula Canaria (WB.), Gomera (Küster).

310. B. nitidulus Pfr.

T. rimato-perforata, oblonga, solida, striatula, nitidula, fulva; sutura profunda; anfr. 5½ convexi, scalariformes, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; apertura ovalis; perist. expansum, album, intus sublabiatum, marginibus conniventibus, dextro arcuato, columellari subrecto, dilatato, patente. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. 1½ mill. longa, 1 lata (Coll. Nr. 179.)

Bulimus nitidulus Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.

Habitat rarissimus circa Matanzas in insula Cuba!

* * *

311. B. cretensis Pfr.

T. breviter rimata, cylindraceo-turrita, solidiuscula, oblique striata, epidermide tenui, carneo-lutescente induta; spira elongata, apice obtusa; sutura levis, albo-marginata; anfr. 7—8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; apertura semiovalis, intus alba, nitida; perist. expansiusculum, intus valide albo-labiatum, marginibus callo tenui, dextrorsum obsolete tuberculifero junctis, columellari reflexo, subappresso. — Long. 18—21, diam. 8 mill. Ap. 7½ mill. longa, intus 3⅔ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus cretensis Pfr. in Phil. Icon. II. 13. p. 124. t. 5. f. 8.

Habitat in insula Candia (Spratt).

---

*) T. oblonga, ovato-cylindrica, transverse striata, cornea; peristomate albo, subreflexo. — Axis 3½ (?), diam. 4½‴; anfr. 7½. (WB. l. c.)

312. B. arcuatus Hutton.

T. sinistrorsa, rimata, ovato-oblonga, tenuiuscula, rugulosostriata, cornea, strigis lutescentibus confertim variegata; spira oblongo-conica, apice obtusa; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^3/_8$ longitudinis subaequans; columella strictiuscula; apertura oblongo-ovalis; perist. pallide carneum, margine sinistro arcuato, expanso, columellari breviter dilatato, patente. — Long. 14, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, intus 3 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus arcuatus Hutt. mss.

— — *Küst.* Monogr. t. 17. f. 1. 2.

Habitat in India orientali: Moul Mien.

313. B. vibex Hutton.

T. sinistrorsa, rimato-perforata, ovato-oblonga, tenuiuscula, oblique striata, diaphana, livido-cornea; spira attenuata, obtusiuscula; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans; apertura semiovalis, basi subangulosa; columella subarcuata; perist. intus livido-sublabiatum, margine exteriore expanso, superne arcuato, columellari dilatato, patenti-reflexo. — Long. 11, diam. medio $4^1/_2$ mill. Ap. $3^2/_3$ mill. longa, intus 2 lata. (Coll. v. d. Busch.)

Bulimus vibex Hutt. mss.

— — *Küst.* Monogr. t. 17. f. 5. 6.

Habitat in India orientali.

314. B. Huttoni Pfr.

T. sinistrorsa, rimato-perforata, oblongo-conica, oblique ruguloso-striata, cornea; spira oblonga, apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella arcuata; apertura ovalis, intus fulvescens; perist. vix sublabiatum, margine exteriore vix expansiusculo, flexuosa, columellari dilatato, reflexo. — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Coll. v. d. Busch.)

Bulimus Huttoni Pfr. Symb. III. p. 55.

— *cylindricus Hutt.* mss.

— — *Küst.* Monogr. t. 17. f. 3. 4.

Habitat in India orientali.

315. B. gibber Krynicki.

T. sinistrorsa, perforato-rimata, ovato-oblonga, rugosostriata, coerulescenti-albida; spira conico-turrita, obtusiuscula; sutura marginata; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans; apertura rotundato-ovalis; perist. vix patulum, subsimplex, marginibus approximatis, columellari dilatato, angu-

latim reflexo. — Long. 20, diam. 7½ mill. Ap. 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 180.)

Bulimus gibber Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 416. t. 3. f. 6.
— *revolutus Zgl.* Mus. *Rossm.* VI. p. 47. f. 389.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 154. t. 15. f. 9. 10.
Buliminus revolutus Beck ind. p. 71. N. 48.
β. Obsolete lutescenti-radiatus.

Habitat in Tauria prope Merdwen et pagum Skel (Kryn.).

316. B. coelebs Benson.

T. profunde rimata, oblongo-acuminata, tenuis, striatula, lineis confertis, spiralibus sub lente decussatula, pallide cornea, diaphana, strigis obliquis, albidis, opacis variegata; anfr. 7 — 8 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi turgido-subcompressus; apertura ovalis; perist. tenue, expansum, intus sublabiatum, marginibus subconniventibus, columellari brevi, dilatato, patente. — Long. 20, diam. 7½ mill. Ap. 7½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 181.)

Bulimus coelebs Bens. in Mus. Cuming.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 83.

Habitat prope Almorah Bengaliae.

317. B. nilagiricus Pfr.

T. rimato-perforata, oblongo-turrita, solida, opaca, lineis impressis, confertissimis, subundulatis obsolete sculpta, fusca, albido oblique strigata; spira regulariter turrita, apice obtusiuscula; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi subcompressus; apertura ovalis; perist. expansum, late albo-labiatum, margine dextro superne subangulato, columellari usque ad basin dilatato, patente. — Long. 28½, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 6½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus nilagiricus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 41.

Habitat in montibus Nilagiricis Indiae orientalis.

318. B. Merduenianus (Peristoma) Krynicki.

T. perforato-rimata, ovato-turrita, apice obtusiuscula, substriata, tenera, corneo-lutescens; anfr. 7 — 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix aequans; apertura rotundato-ovalis; perist. acutum, marginibus fere contiguis, callo albido junctis, dextro valde arcuato, simplice, columellari subdilatato, reflexiusculo. — Long. 13, diam. 5½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 2¾ lata. (Coll. Nr. 182.)

Peristoma Merduenianum Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 421. t. 9. f. 7.
Bulimus Merduenianus Kryn. Bull. Mosc. 1837. p. 53.

Bulimus tener Zgl. Mus. *Rossm.* VI. p. 46. f. 388.
— *fragilis Parr. Anton* Verz. p. 42. N. 1541.
Buliminus tener Beck ind. p. 71. N. 43.

Habitat in Tauria, in monte Merdwen et ad fluvium Ail (Kryn.).

319. B. martinicensis Pfr.

T. rimato-perforata, oblongo-turrita, oblique striatula, solidula, lutescenti-cornea; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans; apertura ovato-oblonga; perist. breviter expansum, intus albo-labiatum, labio extus pellucente, marginibus subconvergentibus, dextro arcuato, columellari dilatato, patente. — Long. 20, diam. 8 mill. Ap. $7^2/_3$ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 183.)

Bulimus martinicensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 40.

Habitat in insula Martinique.

320. B. montanus Draparnaud.

T. rimata, oblongo-conica, obtusa, fusca, striata et minutissime granulata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^2/_3$ longitudinis subaequans; apertura acute ovalis; perist. sublabiatum, rubicundum, margine dextro et infero expanso, columellari late reflexo. — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. intus $5^1/_2$ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 184.)

Bulimus montanus Drap. tabl. d. moll. p. 65. N. 2.
— — *Drap.* hist. p. 74. t. 4. f. 22.
— — *Lam.* 32. p. 125. ed. Dh. p. 235.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 3. T. 6.
— — *C. Pfr.* I. p. 52. t. 3. f. 10.
— — *Turt.* Man. p. 80. f. 62.
— — *Rossm.* I. p. 86. f. 41.
— (Bulimulus) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 14. t. 2. f. 2.
— *Lackhamensis Fleming* brit. anim. p. 265.
— — *Gray* Man. p. 181. t. 6. f. 62.
— *Montacuti Jeffr.* Linn. trans. XVI. p. 345.
Helix Lackhamensis Mont. test. britt. p. 394. t. 11. f. 3.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 953. N. 150.
— — *Wood* ind. t. 35. f. 148.
— *sylvestris Stud.* in Coxe trav. (Htm.)
— *buccinata Alten* p. 100. t. 12. f. 22.
— *obscura Schranck* Fauna III. 273.
Bulinus obscurus a Hartm. in Neue Alpina I. p 222.
Ena montana Leach moll. p. 112.
— — *Hartm.* Gast. I. p. 75. t. 20.
Buliminus Lakhamensis Beck ind. p. 71. N. 42.
Merdigera montana Held in Isis 1837. p. 917.

β. Albinus: testa virenti, hyalina.

γ. Elongatus, subturritus, anfr. 8, ultimo $\frac{1}{3}$ longitudinis aequante. Long. 21, diam. 7 mill. Ap. intus 6 mill. longa, $3\frac{1}{2}$ lata. (Spec.)

Bulimus montanus var. Rossm. VI. p. 46. f. 386.

δ? Major, anfr. 5 — 6, ultimo spiram superante:

Bulimus Collini Mich. compl. p. 49. t. 15. f. 41. *)

Buliminus Collini Beck ind. p. 72. N. 49.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Britannia etc., var. β rara cum α, var. γ in Carniolia prope Laibach, δ rara in Gallia.

Obs. 1. Huc referendi: Bul. consentaneus, caucasius et fallax Zgl.

Obs. 2. Hoc loco conf. Bul. baeticatus Nr. 200. et badiosus Nr. 201.

321. B. graecus (Buliminus) Beck. †

T. subperforata, ovato-conica, glabra, tenuis, fragilis, corneo-rubescens; anfr. convexiusculi; labrum simplex; labium rima umbilicali reflexum. — Long. 20, diam. 10 mill. (Dh.)

Buliminus graecus Beck ind. p. 72. N. 50. (ex synon.)

Bulimus corneus Desh. Expéd. de Morée III. p. 164. t. 19. f. 11. 12.

— — *Lam.* ed. Dh. 56. p. 247.

Habitat in Morea.

322. B. apenninus Jan.

T. rimata, ovato-turrita, parum striata, corneo-fuscula, nitidula, tenera, subpellucida; anfr. 8 convexiusculi; apertura ovalis; perist. reflexiusculum, albo-sublabiatum, marginibus conniventibus. — Long. 20, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, $4\frac{1}{2}$ lata. (Coll. Nr. 185.)

Bulimus apenninus Jan Mantissa p. 3.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 132. t. 14. f. 1. 2.

— *rupestris Kryn.* Bull. Mosc. VI. p. 413. t. 3. f. 5.

— *assimilis Zgl.* Mus. *Rossm.* VI. p. 46. f. 385.

Buliminus assimilis Beck ind. p. 71. N. 40.

Merdigera assimilis Held in Isis 1837. p. 917.

Habitat in Italia (Jan), Tauria (Kryn.).

323. B. assimilis Potiez et Michaud. †.

T. oblongo-conica, solida, perforata, nitida, albido-cinerea, laeviter striis longitudinalibus impressa; anfr. 8 convexi; apertura subrotunda, superne angulata; perist. simplex, subpatulum; apex

*) T. ovata, ventricosa, perforata, subtilissime striata, pellucida, nitida, corneo-fucescente; anfr. 5—6, ultimo maximo, convexo; apertura ovata; peristomate simplici, acuto; apice obtuso. — Alt. 7, diam. 4 lin. (Mich. l. c.)

obtusus, corneus. — Long. 10, diam. 8 mill. (P. et M.) — Long. 17, diam. 5½ mill. Ap. 6 mill. longa. (ex ic.)

Bulimus assimilis Pot. et *Mich.* gal. I. p. 153. t. 15. f. 5. 6.

Habitat prope Smyrna.

Obs. «Affinis B. montano et apennino.» — Descriptio et figura haud congruunt.

324. B. gastrum Ehrenberg.

T. rimato-subperforata, ovata, tenuis, minute striata, nitida, cornea; sutura linearis, albo-marginata; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella brevis; apertura semiovalis; perist. album, simplex, margine dextro expanso, columellari dilatato, libere reflexo. — Long. 13½, diam. 7½ mill. Ap. intus 6 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 186.)

Bulimus gastrum Ehrenb. Symb. phys.

Buliminus gastrum Beck ind. p. 71. N. 46.

Habitat ad Arissam Syriae (Ehrenb.).

325. B. Spratti Pfr.

T. rimato-perforata, ovato-acuta, solida, longitudinaliter ruguloso-plicata, sub epidermide olivaceo-lutescente nitide alba; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram conicam aequans; apertura lata, truncato-ovalis, intus alba; perist. subsimplex, margine dextro vix expansiusculo, columellari subrecto, dilatato, patente. — Long. 20, diam. 11 mill. Ap. 10 mill. longa, intus 6 lata. (Coll. Forbes.)

Bulimus Spratti Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 114. t. 4. f. 6.

Habitat rarissimus prope Termessum Pisidiae (Forbes), in Lycia (Spratt).

326. B. fasciolatus Olivier.

T. subperforata, oblonga, striatula, solidula, nitida, albida, strigis corneo-fuscis ornata; spira turrito-conica, apice obtusa, cornea; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi attenuatus; columella brevis, subrecta; apertura ovalis, intus nigricanti-fusca; perist. simplex, album, margine dextro vix expansiusculo, columellari breviter reflexo, appresso, perforationem fere tegente. — Long. 20, diam. 7½ mill. Ap. 7 mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 187.)

Bulimus fasciolatus Oliv. voy. I. p. 416. t. 17. f. 5.

— — *Roth* dissert. p. 18.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 140. t. 14. f. 15. 16?

— — *Küst.* Monogr. t. 17. f. 11. 12.

Helix fasciolata (Cochlogena) *Fér.* pr. 391. Hist. t. 142. f. 1.

Pupa fasciolata Lam. 8. p. 107. ed. Dh. p. 173.
— — *Blainv.* in Dict. sc. natur. tome 28. p. 93.
Brephulus fasciolatus Beck ind. p. 72. N. 4.
Zebrina fasciolata Held in Isis 1837. p. 917.

β. Unicolor candidus:
Helix fasciolata Fér. t. 142. f. 3.
Bulimus unicolor Andrz. (teste Kryn.)
— *faux nigra Parr.* in sched.

γ. Sordide albus, punctis et lineis fulminatis minutis corneis dense aspersa.

Habitat in insula Creta, Rhodo, Syria et Caramania; nec non prope Sebastopolin, in Merdwen etc. (Kryn.)

327. B. illibatus Zieglcr. †

T. rimata, ovali-oblonga, alba, glabriuscula; anfr. 7—7½ vix convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, basi subcompressus; apertura oblique semiovalis; perist. vix patulum, sublabiatum; columella flexuosa, callosa. (Rm.) — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. 5½ mill. longa, 3 lata. (ex ic.)

Bulimus illibatus Zgl. Mus. *Rossm.* VI. p. 44.
— *candidatus Zgl. Rossm.* VI. f. 381.
Brephulus illibatus Beck ind. p. 72. N. 3.
Zebrina illibata Held in Isis 1837. p. 917.

Habitat in Tauria.

328. B. subtilis Rossmässler.

T. subperforata, cylindracea, apice attenuata, obtusiuscula, substriata, nitida, cornea; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; apertura acute ovalis; cervix tumida, albocincta; perist. subrectum, margine exteriore longiore, albolabiato. — Long. 14, diam. 4¾ mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 188.)

Bulimus subtilis Rossm. VI. p. 47. f. 392.
— *noctivagus Parr.* in sched.

Habitat prope Cattaro Dalmatiae.

328ª. B. Frivaldskyi Pfr.

T. subimperforata, vix rimatula, subcylindrica, sursum attenuata, obtusa, striatula, nitidula, fusco-cornea; sutura linearis; anfr. 9 subplani, ultimus ⅓ longitudinis non aequans; apertura obliqua, subsemiovalis; perist. breviter expansum, intus valide albo-labiatum, marginibus sejunctis, dextro repando, columellari reflexo, appresso, basi antrorsum curvato. — Long. 14,

diam. 4½ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, intus medio 2⅓ lata. (Coll. Nr. 189.)

Bulimus fuscus Friv. in sched. Nec Guild.

— *Frivaldskyi Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 191.

Habitat prope Brussa Natoliae.

329. B. olivaceus Pfr.

T. rimata, oblonga, tenuiuscula, oblique striatula, sericina, epidermide virenti-cornea induta; spira elongato-conica, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella verticalis, medio subplicata; apertura semi-ovalis; perist. breviter expansum, intus valide albo-labiatum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 13, diam. 5 mill. Ap. oblique 5 mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus olivaceus Pfr. in Phil. Icon. II. 13. p. 124. t. 5. f. 6.

Habitat in insula Candia (Spratt).

330. B. barbarus (Helix) Linn.

T. subperforata, ovato-oblonga, minute striata, cornea, flammis albidis variegata; spira conico-turrita; anfr. 6 convexi, ultimus spira brevior; apertura ovato-subcircularis; perist. acutum, expansum, intus labiatum, margine columellari perforationem fere tegente. — Long. 11, diam. 5½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 190.)

Helix barbara Linn. syst. ed. X. p. 773. N. 610. *) ed. XII. p. 1249. N. 701.

— — *Gmel.* p. 3656. N. 125.

— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 960. N. 165.

Bulimus Jeannoti Terv. p. 30. t. 4. f. 10. 11.

— *Terverii Forb.*

Cochlicellus barbarus Beck ind. p. 63. N. 5?

Habitat in Algeria, prope Bugia.

331. B. obscurus (Helix) Müller.

T. rimata, ovato-oblonga, apice acutiuscula, nitidula, fusca, pellucida, oblique striata; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix aequans; apertura rotundato-ovalis; perist. albo-sublabiatum, expansum, margine columellari brevi, dilatato, patente. — Long. 10, diam. 4½ mill. Ap. intus 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 191.)

Helix obscura Müll. verm. II. p. 103. N. 302.

---

*) T. imperforata oblonga rudi: anfractibus octonis, apertura subrotundo-lunata. Habitat Algiriae. E. Brander. (Linn. l. c.) — Conf. Menke in Zeitschr f. Malak. 1845. p. 29.

Helix obscura Gmel. p. 3661. N. 141.
— — *Mont.* test. britt. p. 391. t. 22. f. 5.
— — *Alten* p. 98. t. 12. f. 21.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 953. N. 149.
Bulimus obscurus Drap. tabl. d. moll. p. 65. N. 1.
— — *Drap.* hist. p. 74. t. 4. f. 23.
— — *C. Pfr.* I. p. 52. t. 3. f. 11.
— — *Turt.* Man. p. 81. f. 63.
— — *Rossm.* VI. p. 46. f. 387.
— — (Bulimulus) *Charp.* catal. p. 14. t. 2. f. 1.
— — *Porro* Malac. p. 54.
— — *Gray* Man. p. 183. t. 6. f. 63.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 73.
— *hordeaceus Brug.* Enc. méth. I. p. 334. N. 62.
— — — *Lam.* 33. p. 125. ed. Dh. p. 236.
Bulinus obscurus β Hartm. in Neue Alpina I. p. 222.
— — *Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 8. T. 1.
Turbo rupium Da Costa p. 90.
Ena obscura Leach moll. p. 113.
— — *Beck* in Amtl. Ber. Kiel 1846. p. 122.
Buliminus obscurus Beck ind. p. 71. N. 45.
Merdigera obscura Held in Isis 1837. p. 917.

β. Albinus, testa pellucida, virenti-hyalina.

γ. Juvenis:
Helix ventricosa Müll. verm. II. p. 102. N. 301? *)
— *trochulus Müll.* ibid. p. 79. N. 276. **)

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Suecia, Italia. Hispania, Lusitania, var. *β* rarissime inter normales.

332. B. variatus Webb et Berthelot.

T. arcuato-rimata, oblonga, apice obtusiuscula, tenuis, striatula, nitida, cornea, strigis lutescentibus variegata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans, basi subcompressus; columella strictiuscula; apertura truncato-oblonga, basi obsolete angulata; perist. albo-callosum, expansum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 12½, diam. 4½ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 192.)

Bulimus variatus Webb et *Berth.* syn. p. 326. ***)

---

*) T. conica, pallida, striata, apertura edentula. — Long. 2, lat. 1 lin. (Müll. l. c.) — An haec potius Pupa aliqua juvenilis?

**) T. imperforata, trochiformi, fusca, glabra; apertura edentula, labro nullo. — Long. ½ — 2 lin. Lat. bas. 1⅓ lin. (Müll. l. c.)

***) T. elongato-ovata, subcylindrico-pyramidata, acutiuscula, fusco-cornea, fasciis albis longitudinalibus variata, substriata; apertura ovata; perist. reflexo, albido. (WB. l. c.)

Bulimus variatus Orb. canar. p. 71. t. 2. f. 25.
— — *Küst.* t. 17. f. 7. 8.

Habitat in insulis Canariis. E Roccella Africae occidentalis legerunt Cl. Webb et Berthelot.

Obs. Cl. Orbigny speciem varietatem B. roccellicolae esse censet.

333. B. roccellicola Webb et Berthelot.

T. subperforata, conico-oblonga, tenuis, ruguloso-striata, nitida, pellucida, fusco-cornea; spira conica, obtusa; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis aequans, ventrosior; apertura ovalis; perist. expansum; sub-albolabiatum, margine dextro superne subsinuoso, columellari in laminam triangularem, reflexam, subappressam dilatato. — Long. $9^1/_2$, diam. $4^1/_3$ mill. Ap. 4 mill. longa, $2^1/_3$ lata. (Spec. Webbian. coll. Küst.)

Bulimus roccellicola Webb et *Berth.* syn. p. 325. *)
— — *Orb.* canar. p. 70. t. 2. f. 23.
— — *Küst.* t. 18. f. 5. 6.

Habitat in insulis Canariis.

334. B. myosotis Webb et Berthelot. †

T. elongata, conico-cylindrica, acuta, obsolete striata, nitida, pallida; apertura ovata, margine exteriore porrecto. — Axis $5^1/_2$, diam. 2 lin. Anfr. 7. (WB.)

Bulimus myosotis Webb et *Berth.* syn. p. 319.
— — *Orb.* canar. p. 71. t. 2. f. 27.

Habitat in insula Canaria.

Obs. An var. B. roccellicolae? (Orb.)

* * *

335. B. dardanus Frivaldsky.

T. rimato-subperforata, turrito-conica, alba, glabriuscula; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus $^3/_8$ longitudinis subaequans; apertura oblique semiovalis, intus fusca; perist. intus remote labiatum, margine dextro vix expanso, columellari lato, reflexo. — Long. 24, diam. $8^1/_2$ mill. Ap. 9 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 193.)

Bulimus dardanus Friv. in sched.
— — *Phil.* Icon. I. 7. p. 158. t. 2. f. 5.
— — *Küst.* t. 17. f. 9. 10.

*) T. elongato-ovata, anfractu ultimo ventricosulo, fusco-corneo leviter striata; apertura subrotundo-ovata; perist. acutum, reflexum, lactescens. — Axis 5, diam. 2 lin.; anfr. 6. (Webb et Berth. l. c.)

β. Strigis irregularibus fulvis ornatus:
Helix fasciolata var. Fér. hist. t. 142. f. 2?
Habitat circa Trapezuntum et Gumushana; circa Constantinopolin (Phil.).

336. **B. candelaris Pfr.**

T. sinistrorsa, profunde rimata, cylindracea, apice sensim attenuata, acutiuscula, suboblique striatula, sordide alba; anfr. 9 planiusculi, ultimus minus oblique descendens, ⅓ longitudinis vix aequans, basi subrotundatus; apertura semiovalis, intus nitida, alba; perist. album, undique expansum, marginibus callo tenui junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 27, diam. 8 mill. Ap. 8½ mill. longa, 6¾ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus candelaris Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 40.

Habitat . . . ?

Obs. Conf. affines: B. tauricus Nr. 618, bacillaris Nr. 619 et subulatus Nr. 620.

§. 20.

337. **B. Ehrenbergi Pfr.**

T. profunde rimata, oblonga, solida, oblique striatula, albida; spira oblonga, apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 7½ vix convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis paulo superans; apertura angulato-ovalis; perist. incrassatum, breviter reflexum, marginibus callo crasso, prope insertionem labri tuberculifero junctis, columellari dilatato, crasso, patente. — Long. 24, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, intus medio 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Ehrenbergi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 113.

Habitat in Cerigotto Graeciae.

338. **B. Rossmässleri Pfr.**

T. profunde rimata, oblonga, solidula, confertim rugoso-plicata, superne fusco-cornea, basi sordide albida; spira oblongo-conica, apice obtusa; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus basi rotundatus, ⅓ logitudinis aequans; columella brevis, strictiuscula; apertura truncato-ovalis, intus alba; perist. albo-labiatum, breviter expansum, marginibus callo tenui, juxta insertionem labri dentifero junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 19, diam. 7 mill. Ap. 6½ mill. longa, intus 3½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Rossmässleri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 113.

β. Minor, sublaevigatus, cereus: long. 14, diam. 5 mill. Ap. 4⅔ mill. longa. (Coll. Küst.)

Habitat . . . ? Var. *β* prope Brussa Asiae minoris.

338[a]. **B. athensis Frivaldsky.**

T. rimato-perforata, oblonga, sursum attenuata, striatula, nitidula, cornea; sutura albo-marginata; anfr. 8—9 plani, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans; apertura subrhombeo-semiovalis; perist. expansum, albo-labiatum, marginibus callo crassiusculo, juxta insertionem marginis dextri in tuberculum transversum producto, junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 20, diam. 6½ mill. Ap. 6½ mill. longa, c. perist. 5 lata. (Coll. Rossm.)

Bulimus athensis Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 191.

Habitat in monte Athos.

339. **B. pupa (Helix) Linn.**

T. rimata, ovato-oblonga, acutiuscula, subtiliter striata, sordide lutescens; spira conica, apice subpapillata; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; apertura oblique semiovalis; perist. albo-labiatum, marginibus callo juxta angulum superum dentifero junctis, dextro expanso, columellari late reflexo. — Long. 17, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 194.)

Helix pupa Linn. syst. ed. X. p. 773. N. 609. *) ed. XII. p. 1248. N. 700.
— — *Gmel.* p. 3656. N. 124.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 960. N. 164.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 452.
Bulimus pupa Brug. Enc. méth. I. p. 349. N. 89.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 140. t. 8. f. 21.
— — *Rossm.* VI. p. 42. f. 379. XI. p. 9. f. 719.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 136.
— — *Küster* p. 29. t. 12. f. 23—26.
— *tuberculatus Turt.* in Zool. Journ. II. p. 363. t. 13. f. 4.
— — *Turt.* Man. p. 81. f. 64.
— — *Lam.* ed. Dh. 51. p. 244.
— *emarginatus Desh.* Expéd. de Morée III. p. 165. t. 19. f. 13—15.
— *Babauchii Anton* Verz. p. 42. N. 1547. (test. spec.)
— *labiatus Ziegl.* Mus.
Pupa primitiva Menke syn. ed. II. p. 34.
— *normalis Menke* olim.

Mastus emarginatus, tuberculatus et *pupa Beck* ind. p. 73. N. 1. 2 et 9.
β. Minor, ovatus: long. 10½, diam. 5½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata.

Habitat in Sicilia, Graecia, Morea, Rhodo, Algeria, insulis Canariis. Nec in Britannia.

*) T. subimperforata ovato-oblonga rudi, anfractibus senis, apertura lunato-oblonga. Habitat in Mauritania. E. Brander. (Linn. l. c.) — Conf. Menke in Zeitschr. f. Malakoz. 1845. p. 27.

340. B. quinquedentatus (Pupa) Mühlfeldt.

T. rimata, subcylindrica, acuminata, corneo-lutescens, subtiliter striata; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura semiovalis, dentibus 5—6 coarctata: 1 magno, lamelliformi, intrante in pariete aperturali, secundo in angulo marginis dextri, 1—2 in medio marginis dextri, 2 in columella (columella contorta dentem superiorem formante); perist. albolabiatum, expansum, marginibus callo tenui junctis, dextro subarcuato. — Long. 19, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, intus 2½ lata. (Coll. Nr. 195.)

Pupa quinquedentata Mühlf. Mus.
— — *Rossm.* V. p. 9. f. 304.
— — *Küster* p. 64. t. 8. f. 11—24.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 13.
— *quinqueplicata Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 163. t. 16. f. 11. 12.
Chondrus quinqueplicatus Jan catal. p. 5.
— *major Kryn.* Bull. Mosc. VI. p. 408?
Chondrula quinqueplicata Beck ind. p. 87. N. 1.
Gonodon quinquedentata Held in Isis 1837. p. 918.
Torquilla quinquedentata Villa disp. syst. p. 24.
Bulimus quinquedentatus Pfr. Symb. I. p. 84. II. p. 121.

Habitat in Dalmatia. Et in Caucaso? (Kryn.)

Obs. Species pervariabilis quoad formam et magnitudinem. Conf. Küst. l. c.

340ª. B. albolimbatus Pfr.

T. rimata, ovato-oblonga, solida, striatula, nitida, corneo-castanea; spira elongata, obtusa; sutura levis; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; apertura subsemiovalis, basi subangulata, 5 dentata: dente 1 juxta insertionem marginis dextri, 1 complanato, intrante in pariete aperturali, 1 parvulo ad basin columellae, 2 parvulis profundis in parte supera marginis dextri; perist. vix expansiusculum, intus callosum, extus albido-limbatum. — Long. 14, diam. vix 6 mill. Ap. 5½ mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Pupa obesa Parreyss in sched.

Habitat prope Saratow.

341. B. tridens (Helix) Müller.

T. vix rimata, oblonga, apice obtusiuscula, subtiliter striata, cornea, diaphana; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella brevis, recta; apertura semiovalis, sinuosa; perist. carneo-labiatum, vix expansum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro et columellari unidentatis; dens tertius compressus, intrans in pariete aperturali, quartus ad angulum peri-

stomatis. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 196.)

Helix tridens Müll. verm. II. p. 106. N. 305.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 453.
Turbo tridens Gmel. p. 3611. N. 93.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 877. N. 149.
— *quadridens Alten* p. 19.
Bulimus tridens Brug. Enc. méth. I. p. 350. N. 90.
— — *Fitzing.* syst. Verz. p. 106.
Bulinus tridens α Hartm. in Neue Alpina I. p. 221.
— *variedentatus Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 7. T. 8.
Pupa tridens Drap. tabl. d. moll. p. 60. N. 16.
— — *Drap.* hist. p. 67. t. 3. f. 57.
— — *Lam.* 16. p. 108. ed. Dh. p. 175.
— — *C. Pfr.* I. p. 53. t. 3. f. 12.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 168. t. 235. f. 4113.
— — *Rossm.* I. p. 80. f. 33. V. p. 9. f. 305. XI. p. 9. f. 720.
— — (Eucore) *Charp.* catal. d. moll. de la Suisse p. 15.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 142.
— — *Küster* p. 7. t. 1. f. 9—13.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 13.
— *tridentata Brard* coq. p. 88. t. 3. f. 11.
Chondrus tridens Cuvier règne an. II. p. 408.
— — *Kryn.* Bull. Mosc. VI. p. 405. t. 2. f. 4.
Jaminia tridens Risso hist. IV. p. 90. N. 205.
Chondrula tridens Beck ind. p. 87. N. 4.
Gonodon tridens Held in Isis 1837. p. 918.
Torquilla tridens Villa disp. syst. p. 24.
— — *Graells* catal. de los moluscos de Esp. p. 8.

β. Elongatus:
Pupa cylindrus Mus. Berol. olim. *Anton* Verz. p. 47. N. 1742.

γ. Eximius: long. 14, diam. 5½ mill. Ap. 4¾ mill. longa, 2½ lata. (Spec. tergestina, transitum efficientia ad B. quinquedentatum.)
Pupa tridens var. eximia Rossm. V. f. 305.* XI. f. 722.
— *spreta Ziegl.* Mus.
Chondrus elatus Andrz. (teste Kryn.)
Torquilla spreta Villa disp. syst. p. 24.

Habitat passim in Germania, Helvetia, Gallia, Austria, Carinthia, Carniolia etc.; var. γ in Illyria et Sardinia.

342. **B. Loewii Philippi.**

T. sinistrorsa, rimata, subcylindrica, apice acuminata, obtusiuscula, corneo-lutescens; anfr. 9—10 planulati, ultimus ¼—⅔ longitudinis aequans; apertura semiovalis, quadridentata: dente 1 lamelliformi in pariete aperturali, 1 in margine exteriore, 1 in

columellari, quarto in ipsa columella profunde contorta; perist. albo-labiatum, expansum. — Long. 16, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 197.)

Bulimus Loewii Phil. in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 106.

Pupa Loewii Küst. p. 93. t. 13. f. 7. 8.

β. Magis ventrosus: long. 15, diam. 5⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata.

Habitat in Asia minore (Phil.), Lycia (Forbes).

343. B. quadridens (Helix) Müller.

T. sinistrorsa, vix rimata, ovato-oblonga, obtusiuscula, lutescenti-cornea; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi compressus; apertura semiovalis, intus cruciatim quadrisinuata; perist. patulum, labiatum, quadridentatum: dentibus singulis in pariete aperturali et in margine exteriore, 2 minoribus in columella. — Long. 10, diam. 3½ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 198.)

Helix quadridens Müll. verm. II. p. 107. N. 306.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 454.
Turbo quadridens Gmel. p. 3610. N. 92.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 879. N. 152.
Bulimus quadridens Brug. Enc. méth. I. p. 351. N. 91.
Pupa quadridens Drap. tabl. d. moll. p. 60. N. 15.
— — *Drap.* hist. p. 67. t. 4. f. 3.
— — *Lam.* 17. p. 109. ed. Dh. p. 175.
— — (Eucore) *Charp.* moll. de la Suisse p. 15.
— — *Rossm.* V. p. 10. f. 308. XI. p. 9. f. 723.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 143.
— — *Küster* p. 9. t. 1. f. 14. 15.
Chondrus quadridens Cuvier règne animal II. p. 408.
— — *Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 88.
Jaminia heterostropha Risso hist. IV. p. 91. N. 209. t. 3. f. 31. *)
Chondrula quadridens Beck ind. p. 87. N. 7.
Gonodon quadridens Held in Isis 1837. p. 918.
Torquilla quadridens Villa disp. syst. p. 24.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 8.
Eucore quadridens Agass. Hartm. Gast. I. p. 150. t. 49. f. 1—3.

Habitat in Gallia, Helvetia, Italia, Hispania.

344. B. seductilis (Pupa) Ziegler.

T. sinistrorsa, rimata, ovato-oblonga, obtusiuscula, nitida, fusco-cornea; sutura marginata; anfr. 9—10 plani, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; apertura oblique semiovalis, intus trisinuata,

*) T. glabra nitida; anfr. 8; peritremate albido, 4 dentato; apertura postice denticulo armata; epidermide cornea. — Long. 0,016. (Risso l. c.)

dente 1 ad parietem aperturalem et 1 minuto (saepe deficiente) juxta insertionem labri coarctata; perist. subrectum, labiatum, callosum, margine columellari dente elongato, pliciformi, sinistro intus denticulo breviter conico munito. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 199.)

Bulimus seductilis Pfr. Symb. I. p. 85.
— *Niso Pfr.* Symb. II. p. 118.
Jaminia Niso Risso hist. IV. p. 92. N. 214? *)
Pupa seductilis Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* V. p. 10. f. 306. XI. p. 9. f. 724.
— — *Küster* p. 27. t. 3. f. 24—27.
Chondrula seductilis Beck ind. p. 87. N. 8.
Gonodon seductilis Held in Isis 1837. p. 918.
Torquilla seductilis Villa disp. syst. p. 24.

β. Cylindraceus, elongatus:
Pupa lunatica Jan in sched.
— *seductilis var. Rossm.* V. f. 307.

Habitat in Dalmatia, Croatia meridionali (frequens in «Growniker Ebene» prope Fiume!) Gallia meridionali, Italia.

Obs. Species pervariabilis quoad formam et magnitudinem.

345. B. tricuspidatus (Pupa) Küster. †

T. rimata, cylindracea, apice attenuata, obtusa, nitida, glabra, pellucida, cornea; anfr. 7 convexiusculi; perist. reflexum, album, tridentatum; paries aperturalis unilamellatus. — Long. 4½—5, diam. 2—2⅓ lin. (K.)

Pupa tricuspidata Küster p. 62. t. 8. f. 5. 6.
Bulimus tricuspidatus Pfr. Symb. III. p. 57.

Habitat in Syria, prope Beirut. (Küstero commun. Kurr.)

346. B. microtragus (Pupa) Parreyss.

T. arcuato-rimata, ovato-oblonga, substriata, nitida, corneo-lutescens; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, basi compressus; apertura semiovalis, coarctata, quadrisinuata; perist. callosum, subreflexum, marginibus utrinque callo dentiformi approximatis, columellari dente unico, dextro 1 majore et minoribus nonnullis munito; dens 1 compressus, intrans in ventre anfractus penultimi. — Long. 12, diam. 5⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 200.)

Pupa microtragus Parreyss in sched.
— — *Rossm.* X. p. 30. f. 651.

---

*) T. turrita, glabra, postice gradatim acuminata; anfr. 8 subplanatis; apertura sinistrorsa; peristomate albido, dentibus 3 obtusis armato; epidermide grisea. — Long. 0,010. — In rupium fissuris circa Nizza. (Risso l. c.)

Pupa microtragus Küster p. 62. t. 8. f. 9. 10.
— *labidens Parr. Anton* Verz. p. 47. N. 1745.
Bulimus microtragus Pfr. Symb I. p. 83.
β. Minor: long. 8½, diam. 4 mill. (Spec.)

Habitat in Graecia.

347. B. microstomus (Pupa) Andrz. †

T. subovato-oblonga, turgidula, vertice acutiuscula, perforata, nitidula, transversim irregulariter oblique striata, brunnescenti-cornea; anfr. 7 tumiduli; sutura superficialis; apertura coarctata, antice retusa, subtridentata; perist. reflexum, album. — Long. 4¾, diam. 2 lin. (Kryn.)

Pupa microstoma Andrz. (teste Krynicki.)
— — *Jay* catal. 1839. p. 52.
Chondrus microstomus Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 409.
Chondrula microstoma Beck ind. p. 87. N. 5.

Habitat in Podolia australi.

348. B. Kutschigii (Pupa) Küster.

T. rimata, cylindraceo-conica, solidula, subtilissime striata, nitidula, corneo-lutescens; spira sursum sensim attenuata, apice obtusiuscula; anfr. 7 leviter convexi, ultimus basi tuberculato-gibbus; apertura verticalis, semiovalis, denticulo minuto ad insertionem marginis dextri et secundo majore, profundo in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. albo-labiatum, incrassatum, margine dextro obtuso, subsinuato, columellari brevi, juxta rimam reflexo. — Long. 7½, diam 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Küster.)

Pupa Kutschigii Küster p. 61. t. 8. f. 1. 2.
Bulimus Kutschigii Pfr. Symb. III. p. 55.

Habitat rariss. in Dalmatia meridionali.

348ª. B. alumnus Parreyss.

T. vix subperforata, oblonga, solidula, subtiliter striata, nitida, cornea; spira elongata, obtusiuscula; sutura profunda, marginata; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; apertura verticalis, oblique semiovalis, denticulis 2, altero ad insertionem marginis dextro, altero profundo parietali, munita; perist. albo-callosum, angulatim expansum, marginibus callo filari junctis, columellari brevi, extus subemarginato. — Long. 11, diam. 4½ mill. Ap. c. perist. 4 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Pupa alumnus Parreyss in sched.

Habitat in insula Cypro.

349. B. Parreyssi Pfr.

T. rimata, ovato-oblonga, apice attenuata, tenuiuscula, striatula, pallide corneo et albo strigato-marmorata; sutura submarginata; anfr. 6½ planiusculi, ultimus ⅖ longitudinis aequans, antice albescens, basi gibboso-compressus; apertura semiovalis, dente parvulo, profundo in ventre anfractus penultimi et tuberculo calloso parietis aperturalis juxta insertionem marginis dextri coarctata; columella intus tuberculo elongato munita; perist. expansum, intus calloso-incrassatum, album. — Long. 10, diam. 4½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 201.)

Bulimus Parreyssi Pfr. Symb. III. p. 86.
— — *Phil.* Icon. II. 13. p. 124. t. 5. f. 5.
Pupa crassilabris Parr. in sched.

Habitat in insula Cypro.

350. B. Botterianus Philippi.

T. sinistrorsa, profunde rimata, ovato-oblonga, apice obtusiuscula, striatula, corneo-albida, nitida; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi gibbus; apertura parvula, oblique semiovalis, dente parvulo, compresso, profundo in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. subrectum, intus crasse labiatum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 9, diam. 4⅓ mill Ap. 3 mill. longa, 2¼ lata. (Coll. Roemer.)

Bulimus Botterianus Phil. Icon II. 13. p. 126. Bul. t. 5. f. 9.

Habitat in Dalmatiae insula Lesina, ubi legit Botteri.

351. B. Bergeri (Pupa) Roth.

T. rimato-subperforata, fusiformi-ovata, corneo-lutescens, striatula; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; apertura coarctato-sinuosa; perist. reflexiusculum, marginibus callo superne in dentem incrassato junctis, tridentatum: dente 1 arcuatim intrante in margine dextro prope basin, 1 in columellari, 1 in pariete aperturali. — Long. 13, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 202.)

Pupa Bergeri Roth diss. p. 19. t. 2. f. 1.
— — *Küst.* p. 63. t. 8. f. 7. 8.
— *tridentata Anton* Verz. p. 47. N. 1741.
— *tricuspis Rossm.* XI. p. 9. f. 721.
Bulimus tridentatus Parr. Pfr. Symb. II. p. 52.
— *tricuspis Pfr.* Symb. II. p. 123.
— *Bergeri Pfr.* Symb. III. p. 52.
Chondrula tricuspis Beck ind. p. 87. N. 3.

Habitat in Graecia, Peloponneso, Lycia, Egypto.

Obs. Variat magnitudine et forma magis cylindracea

352. B. septemdentatus (Pupa) Roth. †

T ovato-cylindrica, apice obtusa, rimata, irregulariter striata, calcarea; apertura semiovata, coarctata, septemdentata; perist. late reflexum; labium crassum. — Long. 5 lin. (R.)

Pupa septemdentata Roth diss. p. 19. t. 2. f. 2.
— — *Küst.* p. 60. t. 8. f. 3. 4.
Bulimus septemdentatus Pfr. Symb. III. p. 57.
— — *Charp.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 142.

Habitat in Syria; circa Beirut in rupibus (Boissier.)

Obs. Conf. Pupa ovularis Oliv. Nr. 84.

352ª. B. nucifragus Parreyss.

T. rimato-perforata, ovata, tenuiuscula, striatula, nitidula, pallide cornea; spira conica, acutiuscula; sutura levis submarginata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; apertura verticalis, semiovalis, sub-6-dentata; dente 1 (interdum obsoleto) juxta insertionem marginis dextri, 1 profundiore in pariete aperturali, reliquis subaequalibus, limbum non attingentibus, 2 in margine dextro, 1 in basali, 1 in columellari; perist. breviter expansum, albo-callosum. — Long. 7½, diam. 4 mill. Ap. 3½ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Pupa nucifraga Parr. in sched.

Habitat in insula Cypro.

352ᵇ. B. stylus Parreyss.

T. perforata, globoso-ovata, tenuis, striatula, pellucida, hyalina; spira conica, acutiuscula; sutura impressa; anfr. 5 convexiusculi, ultimus tumidus, antice subascendens, spira vix brevior; apertura lunaris, 6-dentata: dentibus 2 approximatis in pariete aperturali, 2 fere contiguis, elongatis, limbo parallelis in margine dextro, 1 parvulo in basi, 1 in columella; perist. simplex, expansum. — Long. 6, diam. 4 mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Rossm.)

Pupa stylus Parr. in sched.

Habitat in insula Cypro.

* * *

353. B. Tournefortianus (Helix) Férussac.

T. sinistrorsa, rimata, fusiformis, cretacea; anfr. 11 planulati, ultimus ⅔ longitudinis vix superans; apertura trisinuato-coarctata, intus fulva; perist. patulum, intus labiatum, marginibus callo junctis, dextro et sinistro unidentatis, dente tertio lamelliformi

intrante in pariete aperturali. — Long. 25, diam. 7 mill. Ap. 7 mill longa, 3 lata. (Coll. Nr. 203.)

Tournefort voyage au Levant, III. lettre 21. p. 308. (Fér.)
Helix Tournefortiana (Cochlogena) *Fér.* pr. 457.
Pupa tridentata Lam. 7. p. 106. ed. Dh. p. 172.
— — *Blainv.* Dict. sc. nat. XXVIII. p. 96.
— — *Desh.* in Enc. méth. II. p. 403. N. 7.
— *Tournefortiana Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 174. t. 17. f. 9. 10.
— — *Jay* catal. 1839. p. 53.
Clausilia laevis Blainv. Malac. p. 457. t. 39. f. 6.
Brephulus Tournefortii Beck ind. p. 73. N. 9.
Bulimus Tournefortianus Rossm. X. p. 31. f. 652.

Habitat in Turcia: Natolia, prope Constantinopolin.

353ª. **Bulimus orientalis Frivaldsky.**

T. sinistrorsa, subperforata, fusiformi-oblonga, tenuis, striatula, diaphana, lutescenti- vel rubello-cornea, apice obtusiuscula; anfr. 10 planiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella plica obliqua, valida, dentiformi munita; apertura oblonga, ringens; perist. breviter expansum, intus albo-labiatum, marginibus disjunctis, sinistro bidentato. — Long. 17, diam. medio 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Bulimus orientalis Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 6.

Habitat in insula Prinkipos (Frivaldsky).

353ᵇ. **B. bicallosus Frivaldsky.**

T. subperforata, fusiformi-cylindracea, tenuis, subtilissime striatula, diaphana, nitidula, pallide cornea; spira a medio sensim attenuata, obtusa; sutura submarginata; anfr. 10—11 vix convexiusculi, ultimus $^1/_4$ longitudinis paulo superans; columella plica transversa valida, dentiformi munita; apertura coarctata 8-formis; perist. expansum, albo-labiatum, marginibus disjunctis, dextro medio unidentato, extus non scrobiculato. — Long. 20—21, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, c. perist. 4 lata. (Coll. Rossm.)

Bulimus bicallosus Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 192.

Habitat prope Szlivno (Frivaldsky).

354. **B. leucodon Pfr.**

T. rimata, oblonga, subtiliter striata, obsolete reticulata, diaphana, cornea; spira apice attenuata, acutiuscula; sutura albo-marginata; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis aequans; apertura oblonga, coarctata; perist. intus albo-labiatum,

marginibus callo funiculato junctis, dextro expanso, supra medium dente valido, albo, extus scrobiculum formante, munito, columellari lato, reflexo, patente. — Long. 17, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 2 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus leucodon Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 114. t. 4. f. 7.

Habitat prope Trapezuntum et Gumushana.

354ª. B. compactus Frivaldsky.

T. profunde rimata vel perforata, ovato-oblonga, solida, ruguloso-striata, opaca, alba, fusculo obsolete strigata; spira sursum attenuata, obtusa; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; apertura truncato-ovalis, tridentata: dente 1 compresso, profundo in pariete aperturali, 1 in margine dextro, tertio parvulo in columella; perist. vix expansiusculum, intus sublabiatum, margine columellari angusto, patente. — Long. 14½, diam. fere 6 mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 204.)

Bulimus compactus Friv. in sched.

— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 6.

Habitat in insula Creta.

Obs. Peraffinis sequenti, attamen forma, perforatione etc. bene distinctus.

355. B. zebriolus (Helix) Férussac.

T. rimata, fusiformi-cylindracea, obtusiuscula, alba, plerumque fusco-strigata; anfr. 9 planiusculi, ultimus ¼ longitudinis subaequans; apertura trisinuato-coarctata; perist. patulum, intus labiatum, callo connexum, tridentatum: singulis dentibus in pariete aperturali, in columella plicata et in margine dextro. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 205.)

Bulimus zebra Oliv. voy. I. p. 225. t. 17. f. 10. Nec Müll.

— — *Roth* dissert. p. 18.

— — *Rossm.* X. p. 31. f. 653.

Helix zebriola (Cochlogena) *Fér.* pr. 455.

— *zebrula Fér.* prodr. p. 70.

Pupa zebra Lam. 9. p. 107. ed. Dh. p. 173.

— — *Desh.* Enc. méth. II. p. 403. N. 6.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 177. t. 17. f. 15. 16.

Chondrus zebra Cuvier règne an. II. p. 408.

Brephulus zebrula Beck ind. p. 73. N. 8.

Clausilia zebriola Jay catal. 1839. p. 54.

Torquilla zebra Villa disp. syst. p. 26.

β. Unicolor albus:

Bulimus calcareus Parr. Anton Verz. p. 43. N. 1551.

Habitat in Graecia et Rumelia; in insula Rhodo (Roth), Cerigo (Forbes).

356. B. spoliatus Parreyss.

T. rimata, ovato-cylindracea, apice obtusiuscula, solidula, nitida, cinerea unicolor vel fusco-strigata; anfr. 8 planiusculi; apertura ovalis, dente parietis aperturalis lamelliformi, intrante coarctata; perist. subpatulum, intus labiatum, marginibus callo junctis, columellari brevi, reflexo, dextro medio unidentato. — Long. 10½, diam. 3½ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 206.)

Bulimus spoliatus Parr. in sched.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 87.

β. Major, candidus, interdum fusco-strigatus, saepe apice nigricans: long. 14, diam. 4⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, 2½ lata. (Spec.)

Pupa fusiformis Desh. Expéd. de Morée III. p. 169. t. 19. f. 55—57?
— — *Lam.* ed. Dh. 35. p. 184?*)
Chondrula fusiformis Beck ind. p. 87. N. 2.

Habitat in Graecia (Parr.), var. β in insula Thermia (Forbes). Morea? (Desh.)

357. B. bidens Krynicki.

T. rimata, cylindrica, ruguloso-striata, alba unicolor vel fusco-strigata; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus ¼ longitudinis vix superans, basi angulato-compressus; apertura oblique semiovalis: columella flexuosa, prominula, dentem simulans; palatum in fundo valide et oblique uniplicatum; perist. subrectum, intus albo-labiatum. — Long. 17, diam. 4⅔ mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 207.)

Bulimus bidens Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 401. t. 1. f. 3.
— — *Rossm.* VI. p. 44. f. 382. 83.
— *clausiliaeformis Menke* syn. ed. II. p. 20.
— *appendiculatus Jan* in sched.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 133. t. 14. f. 3. 4.
— *internicosta Partsch* in Mus. Vindob.
— *flammeus, zebrinus* et *perdiceus Ziegl.* olim.
Helix clausiliaeformis (Cochlogena) *Fér.* pr. 456?
Chondrus clausiliaeformis Jan catal. p. 5.
Brephulus fuscostrigatus Beck ind. p. 73. N. 7?
— *zebrinus* et *clausiliaeformis Beck* ind. p. 72. N. 5. 6?

β. Minor: long. 12, diam. 2⅔ mill. Ap. 3 mill. longa, 1½ lata. (Spec.)
Chondrus attenuatus Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 404?**)

Habitat in Tauria, Turcia, Syria.

* * *

*) T. elongato-angusta, fusiformi, apice acuminata, albo-grisea, substriata; apertura elongato-acuminata, obliqua; labro reflexo, intus unidentato; columella uniplicata, contorta. — Long. 19, diam. 4½ mill. (Desh. l. c.)

**) T. elongata, cylindracea, vertice acutiuscula, perforata, transversim

358. B. Alvarezii Orbigny. †

T. elongata, pyramidali, subumbilicata, crassa, regulariter striata, albida; spira elongata; sutura vix adumbrata; apertura personata, irregularis, dentibus 7, 2 supra columellam, 2 marginata, albida; columella plana; labrum acutum. — Long. 19, lat. 6 mill. (O.)

Helix Alvarezii (Cochlodon) *Orb.* syn. p. 22.
Bulimus Alvarezii Orb. voy. p. 319.

Habitat in provincia Entre Rios reipublicae argentinae.

§. 21.

359. B. fibratus (Limax) Martyn.[1]

T. imperforata, oblongo-conica, rugoso-striata, ponderosa, castanea, saturatius radiata; spira conica, acuta, apice albida; anfr. 7—8 planiusculi, ultimus spiram subaequans; columella valide et oblique uniplicata; apertura oblongo-ovalis, intus aurantiaca; perist. subrectum, incrassatum, fulvido-album, marginibus callo crasso, nitido, aurantiaco (in adultis medio tuberculum prominens formante) junctis, dextro strictiusculo, columellari dilatato, adnato — Long. 78, diam. 30 mill. Ap. intus 35 mill. longa, medio 15 lata. (Coll. Nr. 208.)

Limax fibratus Martyn fig. of nondescr. shells t. 25.
— — *Martyn* in Chenu bibl. conch. tome II. p. 21. t. 7. f. 3.
Auris Midae Chemn. IX. P. 2. p. 42. t. 121. f. 1039. 40.
Voluta auris Malchi β Gmel. p. 3437. N. 11.
— *australis Dillw.* descr. cat. I. p. 500. N. 3.
Bulimus bovinus Brug. Enc. méth. I. p. 345. N. 80.
— — *Küster* p. 18. t. 4. f. 5. 6.
— *bootis Menke* syn. ed. 2. p. 26.
— *fibratus Gray* in Dieffenbach travels I. p. 247.
— — *Gray* in Revue zool. 1844. p. 375
Helix auris bovina (Cochlogena) *Fér.* pr. 447. Hist. 159. f. 1—5.
Auricula aurantiaca Schumacher p. 228.
— *bovina Lam.* 7. p. 139. ed. Dh. p. 328.
— — *Jay* catal. 1839. p. 58.
Pupa auris bovina Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
Placostylus bootis Beck ind. p. 57. N. 1.

Habitat in Nova Caledonia! In insulis Amicorum (Martyn).

---

[1] irregulariter subplicata, longitudinaliter tenuissime granulato-striata, tenui, grisescenti-albida vel fuscescente, fasciis fuscis transversis tota superficie tecta; anfr. 11 planiusculis, suturis profundioribus; columella supra contorta dentem aemulante, sub contortione in aperturae fundo plica longitudinali; labro simplice. — Alt. 6, diam. 1½ lin. (Kryn. l. c.) — Conf. Férussac in Bull. zool 1835. p. 20.

360. B. Shongii Lesson.

T. imperforata, oblongo-conica, solida, rugoso-striata, epidermide olivaceo-rufa induta, ad suturam albido-cingulata; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus spira brevior, basi subcompressus; columella arcuata; apertura oblongo-ovalis, intus cerasina, basi subcanaliculata; perist. valde incrassatum, basi tuberculo calloso mediocri munitum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, prominente. — Long. 67, diam. 27 mill. Ap. 28 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 209.)

Bulimus Shongii Lesson voy. de la Coq. p. 321. t. 7. f. 4. 5.
— — *Küster* t. 16. f. 14. 15.

Habitat in Nova Seelandia.

361. B. caledonicus Petit.

T. imperforata, ovato-acuta, crassa, ponderosa, sub epidermide olivacea rufescens, longitudinaliter striata, lineis elevatis subdecussata; spira conica, acuta; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans, postice gibbosus; apertura irregularis, oblonga, angustata; perist. album, incrassatum, non reflexum, marginibus callo crasso, nitido, unidentato junctis, dextro superne sinuoso, columellari dente lato verticali munito. — Long. 70, diam. 34 mill. Ap. intus 30 mill. longa, 11 lata. (Coll. Nr. 210.)

Bulimus caledonicus Petit in Revue zool. 1845. p. 53.

Habitat in Nova Caledonia.

362. B. Powisianus Petit.

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, crassa, nitida, longitudinaliter obsolete striata, rufo-fulva, flammis longitudinalibus et obliquis, interruptis vel continuis, fusco-nigris picta; spira conica, apice concaviuscula, nigra; sutura albida, linea fusca marginata; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, infra medium obtuse angulatus, zona purpureo-nigra, linea alba superne marginata, cinctus; columella callosa, angulata; apertura subquadrangularis, intus alba, violaceo-nigricante limbata; perist. crassum, margine obtuso, rotundato. — Long. 68, diam. 30 mill. Ap. intus 30 mill. longa, medio 15 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Powisianus Petit in Revue zool. 1843. p. 239.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 65.

Habitat in Nova Granada, ubi circa Sante Fe de Bogota detexit Goudot.

363. B. Hartwegi Pfr.

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, striata, nitidula, carneo-fulvida, strigis punctisque castaneis ornata; spira conica, apice

obtusiuscula; sutura crenulata; anfr. 6½ vix convexiusculi, supremi minute granulosi, ultimus spira paulo brevior; columella albo-callosa, leviter arcuata; apertura rhombeo-semiovalis, intus margaritacea; perist. vix incrassatum, rectiusculum, margine basali cum columella angulum formante. — Long. 57, diam. 26 mill. Ap. 29 mill. longa, 16 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Hartwegi Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 111. t. 4. f. 1.

Habitat in republica Aequatoris, ubi ad «El Catamaija prope Loxa» detexit Hartweg.

364. **B. melanocheilus Nyst.** †

T. ovato-oblonga, subperforata, striata, brunneo-virescens; anfr. 7 convexi, ultimus transversim obscure zonatus, spiram aequans; sutura undulata, albo-marginata; apertura elongato-angusta, intus nitens, leucophaea; labrum incrassatum, subreflexum, nigro-marginatum; columella nigra, subtorta, lamina callosa labia jungente. — Long. 80, diam. 35 mill. (N.)

Bulimus melanocheilus Nyst in Bull. Brux. XII. Extr. p. 8. t. 3. f. 3.

Habitat in America meridionali, in «Pampas».

365. **B. Thompsoni Pfr.**

T. imperforata, ovato-oblonga, solidula, longitudinaliter striata, fusco-olivacea; spira conica, apice obtusa, rubra; anfr. 6, supremi planulati, purpureo-strigati, ultimus spiram aequans; sutura albo-marginata, crenulata; columella recta (non torta) leviter arcuata; apertura oblongo-ovalis, intus livida; perist. subincrassatum, rectum, intus nigro-limbatum, marginibus callo castaneo junctis, basali cum columella (basin attingente) angulatim juncto. — Long. 70, diam. 31 mill. Ap. 37 mill. longa, 18 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Thompsonii Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 74.

Habitat prope Quito.

366. **B. Taunaisii (Helix) Férussac.**

T. imperforata, ovato-elongata, crassa, rugoso-striatula, fulvo-brunnea, strigis saturatioribus ornata; spira elongato-conica, apice obtusiuscula; anfr. 7—8, supremi plani, 2 ultimi convexiusculi, ultimus spira brevior; sutura in anfr. 2 ultimis distincte marginata; columella torto-plicata, albida; apertura oblongo-ovalis, intus coerulescens; perist. rectum, incrassatum, marginibus callo tenui junctis, columellari subdilatato, appresso. — Long. 74, diam. 35 mill. Ap. intus 31 mill. longa, medio 14 lata. (Coll. Nr. 211.)

Helix Taunaisii (Cochlostyla) *Fér.* pr. 331. Hist. t. 113. f. 4—6.

— — *Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 18.

Bulimus Taunaisii Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— ? — *Beck* ind. p. 52. N. 3.
— *Taunaysii Orb.* voy. p. 294.
— — *Lam.* ed. Dh. 41. p. 240.

Habitat in regionibus interioribus Brasiliae.

367. **B. Inca Orbigny.** †

T. elongata, pupoïdes, inflata, imperforata, crassa, laevigata, brunneo-nigra; spira elongata, apice acuminata; sutura irregularis; anfr. 8; apertura ovalis, albida; labrum crassum, subreflexum; columella recta. (O.) — Long. 68, diam. 26 mill. Ap. 27 mill. longa, 14 lata. (ex ic.)

Helix Inca (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 16.
Bulimus Inca Orb. voy. p. 292. t. 38. f. 6. 7.
Bulimus Inca Sow. Conch. Ill. f. 67.

Habitat prope Tutulima Boliviae.

Obs. Hoc loco conf. B. Mahogani Nr. 61.

368. **B. Spixii Wagner.** †

T. oblongo-ovata, longitudinaliter striata, apice obtusa, albida; apertura ovata, margine incrassato. — Long. 2″ 1‴, lat. 9‴. (Wagn.)

Columna bulimea Spix test. bras. t. 10. f. 3.
Bulimus Spixii Wagn. in Spix p. 11. *)
— — *Lam.* ed. Dh. 66. p. 251.
Bulinus sordidus King in Zool. Journ. V. p. 341? **)
β. Junior?
Bulimus fragilis Spix test. bras. t. 6. f. 3.
— *hyalinus Wagn.* in Spix p. 6.

Habitat in Brasilia.

369. **B. clavator Petit.**

T. rimato-perforata, oblonga, tenuis, longitudinaliter striata, obsolete decussata, pallide fulvida; spira subpyramidalis, apice obtusiuscula; anfr. 8 planiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis paulo superans; sutura crenulato-marginata; apertura oblongo-ovalis;

*) T. oblongo-ovata, solida, longitudinaliter striata, subimperforata, epidermide tenui vestita. Anfr. 7 — 8 inflato-convexi, suturis profundis disjuncti. Spira inflato-conica, apice obtusa, longitudine anfractus ultimi. Apertura ovata, laevis; perist. incrassatum, margine sinistro ad columellam plicam obliquam formante. Rima umbilicalis nulla aut angustissima. Color testae albus, epidermis fuscescens; apertura alba. (Wagn. l. c.)

**) T. pyramidali, transversim striata, fusca; anfr. basali ad suturam subalbido, linea subcentrica pallida; labii vix reflexi margine albo. — Long. $1\frac{15}{16}$, lat. $\frac{7}{8}$ poll. — Rio Janeiro. (King l. c.)

columella verticalis, recta; perist. simplex, subincrassatum, margine columellari late reflexo, patente, perforationem occultante. — Long. 63, diam. 22 mill. Ap. 24 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus clavator Petit in Revue zool. 1844. p. 3.
— — *Guérin* mag. 1844. t. 94.

Habitat in insula Madagascar.

Obs. Hoc loco conf. species nonnullae in §. 25 enumeratae.

370. **B. orobaenus Orbigny.** †

T. oblonga, subumbilicata, longitudinaliter et irregulariter rugose striata, luteo-fulva, apice obtusa; apertura ovalis; columella obliqua; labrum crassum, albidum, intus albido-rufum; anfr. 8. — Long. 40, latit. 16 mill. (O.)

Helix orobaena (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 17.
Bulimus orobaenus Orb. voy. p. 293.

Habitat in provincia Yungasensi Boliviae.

371. **B. brephoides Orbigny.** †

T. oblonga, pupoidea, umbilicata, crassa, substriata, rufo-brunnea, apice obtusa; anfr. 6; apertura ovalis, albo-fusca; labrum crassissimum; sutura albida. (O.) — Long. 50, diam. 25 mill. Ap. 25 mill. longa, 11 lata. (ex ic.)

Helix brephoides (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 17.
Bulimus brephoides Orb. voy. p. 294. t. 38. f. 8. 9.

Habitat in republica Peruviana.

§. 22.

372. **B. zebra (Buccinum) Müller.**

T. ovato-conica, tenuiuscula, glabra, albida, strigis undulatis livido-fuscis, fasciisque interruptis castaneis ornata; spira conica, apice obtusiuscula, nigra; anfr. 6—7 planiusculi, ultimus spira brevior, interdum obsolete angulatus; columella strictiuscula, alba, subincrassata, truncationem simulans; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, acutum, nigro-limbatum, marginibus callo lato, profunde intrante, castaneo, ad basin columellae porrigente junctis. — Long. 62, diam. 33 mill. Ap. 33 mill. longa, medio 19 lata. (Coll. Nr. 212.)

Buccinum zebra Müll. verm. II. p. 138. N. 331.
Zebra Mülleri Chemn. IX. P. 2. p. 24. t. 118. f. 1015. 16.
Bulla zebra Gmel. p. 3431. N. 31.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 494. N. 52.
Bulimus undatus Brug. Enc. méth. I. p. 320. N. 38.

Bulimus undatus Lam. 5. p. 118. ed. Dh. p. 223.
— — *Valenc.* in Humb. Zool. II. p. 245. t. 55. f. 1.
— — *Küster* Bul. p. 6. t. 2. f. 4. 5. (ic. Chemn.)
— *zebra Anton* Verz. p. 43. N. 1577.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 174. t. 6. f. 9. 10.
Helix undata (Cochlostyla) *Fér.* pr. 337. Hist. t. 114. f. 5—8. t. 115. f. 1—6.
— — *Orb.* synops. p. 8.
Orthalicus undatus et *zebra Beck* ind. p. 59. N. 5 et 6. *)
Achatina zebra Pfr. Symb. II. p. 135. Nec Chemn., Lam. *Kämmerer* p. 126. t. 10. f. 4.

β. Testa solidiore, distinctius striata, spira elongata, anfractibus convexioribus. — Long. 56, diam. 27 mill. Ap. 26 mill. longa, 16 lata. (Spec.)

γ. Subunicolor griseo-fulvus, strigis remotis fulvis:
Orthalicus livens Beck ind. p. 59. N. 7?

δ. Ventrosior, anfractibus convexioribus, ultimo medio fascia lata, virenti-castanea ornato, strigis albis undatis in fascia remotioribus, antrorsum flexis: long. 62, diam. 30 mill. Ap. 33 mill. longa, 21 lata.
Bulinus princeps Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 18.
Helix princeps (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 8.
Orthalicus princeps Beck ind. p. 59. N. 3.

ε. « Testa ovata, conica, glabra, laevi, alba, fasciis 3 flavis, striis undatis nullis. — Long. 19, diam. 11 lin. » (Val.)
Bulimus melanocheilus Val. in Humb. Zool. II. p. 246. t. 55. f. 3.

Habitat in Mexico et in insulis Antillis; var. δ in Peru.

Obs. Nonne var. ε potius ad B. phlogerum Orb. referenda?

373. B. pulchellus (Achatina) Spix.

T. ovato-acuta, tenuiuscula, levissime striata, albida vel flavida, strigis angustis, confertis, undulatis, spadiceis vel nigricantibus, in fascias 1—2 latiores, articulatas confluentibus ornata; spira conica, apice breviter obtusata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ventrosus, spiram superans; columella strictiuscula, subcallosa; apertura truncato-ovalis, intus concolor; perist. simplex, rectum, plerumque nigro-limbatum. — Long. 41, diam. 23 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 15 lata. (Coll. Nr. 213.)

Achatina pulchella Spix test. bras. t. 9. f. 2.
Bulimus undatus Wagn. in Spix p. 9.
— *pulchellus Mke* syn. ed. II. p. 20.

*) Genus Orthalici bene ex animalis differentia constitutum esse asserit Cl. Troschel in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 50.

Bulimus zigzag Lam. 4. p. 118. ed. Dh. p. 223? *)
Orthalicus pulchellus Beck ind. p. 59. N. 4.
— *zigzac Beck* l. c. N. 2?
Helix undata var. Fér. hist. t. 117. f. 1.

Habitat in Brasilia, Bolivia.

Obs. Species anfractu ultimo spiram superante et columella subsimplice, vix calloso-incrassata a praecedente distinguenda. Si revera teste Beck figura Ferussaciana t. 117. f. 1 ad B. zigzag Lam. referenda est, nomen Lamarckianum anteponatur.

374. B. phlogerus Orbigny.

T. oblongo-conica, tenuiuscula, laevigata, albida vel carneo-fulvida, fusco et castaneo varie strigata et articulato-fasciata; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^{1}/_{3}$ longitudinis subaequans; columella torta, curvata, calloso-incrassata, supra basin aperturae truncationem simulans; apertura oblongo-semiovalis, intus sordide alba, marmorata; perist. simplex, acutum, nigro-limbatum, marginibus callo nigricanti-castaneo, intrante, junctis. — Long. 44, diam. 21 mill. Ap. 22 mill. longa, 11½ lata. (Coll. Nr. 214.)

Helix phlogera (Cochlitoma) *Orb.* syn. p. 8.
— *regina β Fér.* hist. t. 119. f. 1. 2.
Bulimus phlogerus Orb. voy. p. 259. t. 29. f. 6. 7.
Achatina flogera Pot. et *Mich.* gal. I. p. 127. t. 12. f. 1. 2.
— *phlogera Pfr.* Symb. II. p. 134.
Orthalicus phlogerus Beck ind. p. 59. N. 8 et
— *Adamsonii Beck* ind. p. 60. N. 9? (ex ic. Féruss.)

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae (Orb.), Orinoco (Gruner.)

Obs. Conferantur huic sectioni affines: Achatina Saulcydi, regina, flammigera, fasciata.

§. 23.

375. B. gallinasultana (Helix) Chemnitz.

T. imperforata, ventroso-conica, tenuis, confertim et subtiliter decussata, lutea, strigis flexuosis, rufis, confertis, longitudinalibus picta et fasciis sub 3 rufo-articulatis ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus ventrosus, $^{3}/_{5}$ longitudinis subaequans; columella simplex, strictiuscula, tenuiter albo-callosa; apertura oblongo-ovalis, intus nitida, concolor; perist. simplex, acutum. — Long. 68, diam. 40 mill. Ap. 45 mill. longa, 26 lata. (Coll. Nr. 215.)

Helix gallinasultana Chemn. XI. p. 281. t. 210. f. 2070. 71.

*) T. ovato-conica, solida, laevis, alba, strigis rufo fuscis longitudinalibus angulatim flexuosis picta; labri margine interno columellaque rufo-fuscis. — Long. 22‴. — Favanne Conch. t. 65. f. M. 4. (Lam. l. c.)

Helix sultana Dillw. descr. cat. II. p. 920. N. 75.
— — (Cochlostyla) *Fér.* pr. 338. Hist. t. 117. f. 2.
— — *Wood* ind. t. 33. f. 75.
— — *Orb.* synops. p. 8.
Bulimus gallinasultana Lam. 3. p. 117. ed. Dh. p. 222.
— — *Wagn.* in Spix p. 9.
— — *Orb.* voy. p. 265.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 173. f. 7.
— — *Küster* p. 8. t. 8. f. 1. 2.
— *princeps Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 151. t. 14. f. 29.
Achatina pavonina Spix test. bras. t. 9. f. 1.
— *sultana Swains.* Exot. Conch. t. 10.
Orthalicus sultan Beck ind. p. 59. N. 1.
Succinea gallinasultana Pfr. Symb. II. p. 131.

Habitat in Guyana, Bolivia, Brasilia.

Obs Hanc speciem, nunc minime raram, loco auctoribus solito enumeravi; attamen aptius juxta Succineas collocandam censeo. Conferantur quae scripsi in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 188, et in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 184.

376. **B. Broderipii Sowerby.**

T. imperforata, ovato-conica, ventrosa, tenuiuscula, obsoletissime decussatula, sordide alba, nigro fulvoque maculata et variegata; spira conica, acuta; anfr. 5 rapide accrescentes, convexiusculi, ultimus inflatus; columella subrecte recedens, subincrassata; apertura ovalis, intus concolor, nitida; perist. simplex, acutum. — Long. 40, diam. 21 mill. Ap. 27 mill. longa, medio 16 lata. (Coll. Philippi.) — Long. 50, diam. 24 mill. Ap. 32 mill. longa. (ex ic.)

Bulinus Broderipii Sow. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 50.
— — *Müll.* synops. p. 16.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 1 et 1 *.
Helix Broderipii (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 7.
Bulimus Broderipii Lam. ed. Dh. 87. p. 263.
Plectostylus Broderipii Beck ind. p. 58. N. 6.
Succinea Broderipii Pfr. Symb. II. p. 131.
β. Minor: long. 30, diam. 18 mill. (Coll. Nr. 216.)
Bulinus Broderipii var. Sow. Conch. Ill. f. 1 **.
γ? Elongatus:
Bulimus Broderipii var. Orb. voy. p. 266.

Habitat prope Copiapo Chilensium, prope Cobija Boliviae (Orb.), var. β prope Iquiqui Peruviae (Cuming).

377. **B. variegatus (Succinea) Pfr.**

T. imperforata, ovato-acuta, solidiuscula, longitudinaliter et distanter rugosa, minute granulata, lutea, maculis longitudinali-

bus punctisque nigricanti-rufis seriatim picta; spira conica, acuta; anfr. 5½ planiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans; columella simplex, filiformis, alba; apertura oblongo-ovalis, intus nitide alba, strigis perlucentibus; perist. simplex, acutum. — Long. 46, diam. 21 mill. Ap. 27 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 217.)

Succinea variegata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 56.
Bulimus variegatus Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 184.

Habitat in regionibus septentrionalibus reipublicae Chilensis.

378. **B. coquimbensis Broderip.**

T. imperforata, ovato-fusiformis, tenuis, subdiaphana, striata et lineis impressis concentricis obsolete decussata, alba, fusco-nebulosa, strigis interruptis et maculis rufis ornata; spira conica, acuta; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram superans; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari vix incrassato. — Long. 42, diam. 18 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 11 lata. (Coll. Nr. 218.)

Bulinus coquimbensis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 30
— — *Müll.* synops. p. 17.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 8.
Helix coquimbensis (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 7.
Plectostylus Coquimbensis Beck ind. p. 58. N. 4.
Bulimus coquimbensis Lam. ed. Dh. 89. p. 264
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 136. t. 12. f. 15. 16.
— — *Orb.* voy. p. 267.
Succinea coquimbensis Pfr. Symb. II. p. 131.

Habitat prope Coquimbo Chilensium (Cuming), prope Concepcion (Orb.).

379. **B. reflexus (Succinea) Pfr.**

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuis, pellucida, nitida, minutissime granulosa, corneo-sulphurea, strigis irregularibus, interdum ramosis, rufis ornata; spira conica, acuta; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram vix superans; apertura ovali-oblonga, intus albida, obsolete strigata; perist. simplex, acutum, margine columellari tenuissimo, albo, reflexo, appresso. — Long. 37, diam. 15 mill. Ap. 21 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 219.)

Succinea reflexa Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 56.
Bulimus reflexus Pfr. Symb. III. p. 56.

Habitat ad Pichidanque prope Coquimbo, ubi legit Bridges in foliis Pourretiae coarctatae.

380. B. elegans (Succinea) Pfr.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuis, pellucida, laeviuscula, rubello-cornea, strigis longitudinalibus, opacis, albis, rufo-marginatis ornata; anfr. 5½ planiusculi, ultimus spiram acutam superans; apertura ovali-oblonga, intus nitida, concolor; columella subsimplex, filiformis, alba; perist. simplex, acutum. — Long. 35, diam. 16 mill. Ap. 20 mill. longa, medio 10 lata. (Coll. Nr. 220.)

Succinea elegans Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 56.
Bulimus elegans Pfr. Symb. III. p. 54.

Habitat prope Huasco Chilensium, ubi in «Questa de Arenas» in Junci specie quadam degentem legit Bridges.

381. B. Buschii (Succinea) Pfr.

T. imperforata, ovato-acuminata, minutissime granulata, pellucida, fulvo-lutea, strigis et flammis irregularibus, longitudinalibus picta; spira apice papillaris; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram duplo superans; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari subincrassato, reflexiusculo. — Long. 24, diam. 15 mill. (Coll. v. d. Busch.)

Succinea Buschii Pfr. Symb. II. p. 56.
Bulimus Buschii Pfr. Symb. III. p. 53.

Habitat . . . ?

382. B. Pseudosuccinea (Helix) Moricand.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, flavescenti-hyalina; spira conica, acutiuscula; anfr. 5—6 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella simplex, filiformis; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum. — Long. 24, diam. 10 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 221.)

Helix pseudosuccinea Moric. Mém. Gen. VII. p. 435. t. 2. f. 18.
Bulimus pseudosuccineus Lam. ed. Dh. 59. p. 248.
— *pseudosuccinea Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 140. t. 13. f. 5. 6.
Bulimulus pseudosuccineus Beck ind. p. 64. N. 11.
Succinea Moricandi Pfr. Symb. II. p. 131.

Habitat circa Bahia Brasiliae.

383. B. Kochi Pfr.

T. imperforata, ovata, tenuissima, subrugulosa, nigricanti-olivacea, epidermide tenuissima, decidua induta; spira brevis, obtusa; anfr. 4 convexi, ultimus ⅔ longitudinis superans; columella simplex, filaris, albida, rectiuscula; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, margine dextro antrorsum

arcuato. — Long. 20½, diam. 12 mill. Ap. 15 mill. longa, medio 9 lata. (Coll. Koch.)

Bulimus Kochi Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 144.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 10.

Habitat in republica Chilensi?

384. **B. citrino-vitreus (Helix) Moricand.**

T. imperforata, ovato-conica, tenuissima, fragilis, laevigata, citrino-hyalina; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 convexi, ultimus inflatus, ⅗ longitudinis subaequans; columella subarcuata, filiformis; apertura rotundato-ovalis, magna; perist. tenue, acutum. — Long. 14, diam. 8⅓ mill. Ap. 9 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 222.)

Helix citrino-vitrea Moric. Mém. Gen. VII. P. 2. p. 436. t. 2. f. 19.
Bulimus citrino-vitreus Lam. ed. Dh. 55. p. 246.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 135. t. 12. f. 13. 14.
Bulimulus citrino-vitreus Beck ind. p. 64. N. 13.

Habitat circa Bahia Brasiliae.

385. **B. Boissieri Moricand.**

T. imperforata, globoso-mucronata, tenuissima, oblique striatula, pellucida, fulva; anfr. 4 convexiusculi, ultimus inflatus, ⅔ longitudinis superans; columella simplex, arcuata; apertura lunato-rotundata; perist. rectum, simplex, acutum. — Long. 13, diam. 9 mill. Ap. 8½ mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 223.)

Bulimus Boissieri Moric. Mém. 3e suppl. p. 62. t. 5. f. 24. 25.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

§. 24.

386. **B. vitreus (Helix) Born.**

T. semiobtecte perforata, ovato-acuta, tenuis, fragilis, laevigata, subdiaphana, fulva, strigis longitudinalibus, fulminantibus, luteis ornata; anfr. 5, superi carinati, ultimus ventrosus, ⅗ longitudinis aequans; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari reflexo. — Long. 53, diam. 34 mill. Ap. 32 mill. longa. (ex ic. spec. unici Mus. Vindob.)

Helix vitrea Born test. p. 383. t. 15. f. 15. 16.
— — *Chemn.* XI. p. 282. t. 210. f. 2072. 73. (ic. Born.)
— — *Gmel.* p. 3622. N. 166.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 919. N. 74.
— — *Wood* ind. t. 33. f. 74.
Bulimus vitreus Brug. Enc. méth. I. p. 299. N. 5.
— — *Lam.* ed. Dh. 85. p. 262.
— — *Küster* p. 9. t. 8. f. 7. 8.

Habitat . . . ?

387. B. coturnix Sowerby.

T. subperforata, ovato-conoidea, tenuis, striatula et obsolete granulosa, lutescenti-albida, fusco-subfasciata, maculata et variegata; sutura distincta; anfr. 4—5 ventrosi, ultimus spiram multo superans; apertura rotundato-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 34, diam. 21 mill. Ap. 21 mill. longa, medio 14 lata. (Coll. Nr. 224.)

Bulinus coturnix Sow. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 30.
— — *Müll.* synops. p. 17.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 3.
Helix coturnix (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 7.
Bulimus coturnix Lam. ed. Dh. 88. p. 264.
— — *Orb.* voy. p. 266.
Buliminus coturnix Beck ind. p. 69. N. 13.

Habitat prope Huasco in Chile (Cuming).

Obs. Deshayes (l. c. p. 262.) hanc speciem varietatem B. vitrei esse opinatur.

388. B. punctulifer Sowerby.

T. subperforata, ovato-acuminata, tenuis, albida, punctulis rufis seriatim ornata, epidermide decidua, flavescente induta; spira conica, acuta; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram vix superans; sutura crenulata; columella verticalis, recta; apertura oblongo-ovalis, intus nitida, concolor; perist. simplex, margine columellari reflexo, fornicato, perforationem fere tegente. — Long. 39, diam. 18 mill. Ap. 21 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 225.)

Bulinus punctulifer Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 36.
— — *Müll.* synops. p. 24.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 36.

Habitat in Chile, ubi ad Questa Prado rarissimum legit H. Cuming.

389. B. harpa (Helix) Say?

T. subperforata, conico-ovata, tenuissima, subtiliter striata, distanter plicata, pellucida, olivacescenti-cornea; spira conica, obtusiuscula; anfr. 4 convexi, ultimus rotundatus, spira paulo brevior; columella subrecedens; apertura lunato-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari superne breviter reflexo. — Long. 3½, diam. 2 mill. Ap. 1⅔ mill. longa, 1¼ lata. (Coll. Nr. 226.)

Helix harpa Say in coll. v. d. Busch.
Bulimus harpa Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 147.

Habitat . . . ?

§. 25.

390. B. obtusatus (Helix) Gmelin.

T. subimperforata, elongato-turrita, apice obtusa, solida, confertim costulato-striata, alba, nitida; anfr. 10 convexiusculi, sensim accrescentes, ultimus ⅓ longitudinis non aequans; columella subrecta; apertura ovalis; perist. rectum, vix incrassatum, margine columellari reflexo. — R. a. = 5 : 7. — Long. 71, diam. 20 mill. Ap. 21 mill. longa, 11½ lata. (Coll. Nr. 227.)

Helix obtusata Gmel. p. 3655. N. 250.
— *calcarea Chemn.* IX. P. 2. p. 162. t. 135. f. 1226. Nec Born.
— — *Wood* ind. t. 34. f. 137.
— — (Cochlicella) *Fér.* pr. 382. Hist. t. 140. f. 9—11
Bulimus calcareus Brug. Enc. méth. I. p. 328. N. 50.
— — *Lam.* 16. p. 121. ed. Dh. p. 228.
— — *Küster* p. t. 15. f. 5.
Obeliscus obtusatus Beck ind. p. 61. N. 3.
Leptospira striata Swains. Malac. p. 335.
Kämmerer t. 11. f. 3.
Lister t. 14. f. 9?

Habitat in insula Madagascar (Beck).

391. B. calcareus (Helix) Born.

T. subimperforata, elongato-turrita, apice obtusa, solida, longitudinaliter striata lineisque spiralibus obsolete decussata, olivaceo-fusca; anfr. 10 vix convexiusculi, lente accrescentes, ultimus ¼ longitudinis vix superans; columella brevis, recta; apertura compresso-ovalis, intus lactescens; perist. simplex, marginibus callo tenui junctis, dextro et sinistro fere parallelis, columellari parum reflexo. — R. a. = 6 : 7. — Long. 84, diam. 26 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 13 lata. (Coll. Nr. 228.)

Helix calcarea Born test. p. 389. t. 16. f. 13.
— *calcaria Dillw.* descr. cat. II. p. 948. N. 138.
— *caxapregana Moric.* Mém. Gen. VII. P. 2. p. 426.
Columna maritima Spix test. bras. t. 10. f. 1.
— — *Villa* disp. syst. p. 20.
— *octogyrata Spix* l. c. t. 10. f. 2.
Bulimus calcareus Wagn. in Spix p. 10.
— *maritimus Lam.* ed. Dh. 64. p. 250.
— *obeliscus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 148. t. 13. f. 17. 18.
Obeliscus calcareus Beck ind. p. 61. N. 1.

Habitat in Brasilia, in sylvis provinciae Paraensis (Spix), in insula Caxaprego (Moric.).

Obs. Differt a B. obtusato sculptura, ratione anfractuum, apertura brevi, marginibus subparallelis.

392. B. obeliscus (Helix) Moricand.

T. imperforata, elongato-turrita, apice obtusa, regulariter et confertim striata, cinerascenti-lutea; anfr. 16—18 lente accrescentes, convexiusculi, ultimus sublaevigatus, $^2/_{11}$ longitudinis subaequans; columella subrecta, simplex; apertura ovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari breviter reflexiusculo, appresso. — Long. 72, diam. 14 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 229.)

Helix obeliscus Moric. Mém. Gen. VI. P. 2. p. 540. t. 1. f. 4. VII. P. 2. p. 424.

Bulimus obeliscus Lam. ed. Dh. 65. p. 251.

Obeliscus obeliscus Beck ind. p. 62. N. 5.

Columna obeliscus Villa disp. syst. p. 20.

Habitat in Brasilia, prope Caravalhas (Moricand).

Obs. Hoc loco conf. B. clavator Nr. 369.

393. B. cochliodes Pfr.

T. imperforata, turrita, solida, oblique regulariter striata, albida, apice obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 9 planiusculi, ultimus $^1/_4$ longitudinis aequans; columella subincrassata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum. — R. a. = 7 : 9. Long. 48, diam. 12 mill. Ap. 12½ mill. longa, 6 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus cochliodes Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 151.

Habitat in insula Cuyo Philippinarum (Cuming).

394. B. haplostylus Pfr.

T. imperforata, turrita, tenuiuscula, subarcuatim costulato-striata, diaphana, luteo-virens; spira elongata, obtusa; anfr. 9 planiusculi, ultimus sublaevigatus, $^2/_7$ longitudinis aequans; columella simplicissima, introrsum arcuata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 39, diam. 10 mill. Ap. 11 mill. longa, 5½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus haplostylus Pfr. Symb. III. p. 84.

Habitat in republica Aequatoris. Ad «El Catamaija prope Loxa» legit Hartweg.

395. B. decollatus (Helix) Linn.

T. rimata, adulta post priorum 8—9 anfractuum detruncationem cylindrico-oblonga, supra refracta, corneo-albida, rugulosostriata, lineis concentricis obsolete decussata; anfr. 4—6 convexiusculi; apertura acute semiovalis; perist. rectum, incrassato-sublabiatum, marginibus callo crassiusculo junctis, columellari

altero duplo breviore. — Long. 28, diam. 10 mill. Ap. 8½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 230. Spec. prope Duino lecta.)

Helix decollata Linn. syst. ed. X. p. 773. N. 608. ed. XII. p. 1247.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 182. t. 136. f. 1254. 55.
— — *Gmel.* p. 3651. N. 115.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 947. N. 136.
— — *Mawe* t. 29. f. 6.
— — (Cochlicella) *Fér.* pr. 383. Hist. t. 140. f. 1—5. 7. 8.

Bulimus decollatus Brug. Enc. méth. I. p. 326. N. 49.
— — *Drap.* tabl. d. moll. p. 66. N. 4.
— — *Drap.* hist. p. 76. t. 4. f. 27. 28.
— — *Lam.* 17. p. 121. ed. Dh. p. 229.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 139. t. 8. f. 14.
— — *Rossm.* VI. p. 45. f. 384.
— — *Gray* Man. p. 5. t. 6. f. 60.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 135.
— — *Küst.* p. 26. t. 11. f. 5—8. t. 12. f. 13—20.
— — *Sav.* Descript. de l'Eg. Zool. II. t. 2. f. 22.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 73.
— — *Graells* cat. de los mol. p. 7.

Bulinus decollatus Hartm. in Neue Alpina I. p. 223.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 289.

Rumina decollata Risso IV. p. 79. N. 178.
Obeliscus decollatus Beck ind. p. 61. N. 4.
Knorr Vergn. VI. t. 32. f. 3.

β. Major: long. 39, diam. 14. mill. Ap. 15 mill. longa, 8 lata. (Spec.)
Helix decollata var. Fér. t. 140. f. 6.
Bulimus decollatus var. Küst. t. 12. f. 21. 22.

γ. Juvenis:
Orbitina truncatella Risso IV. p. 82. t. 3. f. 25.

δ. Pullus:
Orbitina incomparabilis Risso IV. p. 82. t. 3. f. 23.

Habitat in Gallia meridionali, provincia Austriae littorali, Hispania, Lusitania, Italia, Sicilia etc., in insulis Canariis (Webb); var. *β* in Africa boreali.

Obs. Specimen exstat in Musaeo Gruneriano 53 mill. longum, 20 diam.

396. **B. mutilatus Say.** †

T. turriculata, truncata, pallide rufa, irregulariter striata: striis prominentioribus ad suturam mediocrem; anfr. 4, ultimus apice plus quam duplo latior; labrum simplex, album. — Long. vix 1″, diam. vix ½″, long. apert. ⅖″. (Say.)

Bulimus multilatus Say in Philad. journ. II. p. 373.

Bulimus mutilatus Jay catal. 1839. p. 56.

Habitat in Carolina meridionali: prope Charleston in hortis.

Obs. «Differt a B. decollato forma magis conica et apertura (ratione testae) longiore». — Nonne varietas B. decollati in hortis introducta?

397. B. truncatus Pfr.

T. subcylindrica, apice decollata, solidula, epidermide virenticornea induta, oblique striata; sutura impressa, pallida; anfr. 8 convexi, ultimus basi angulatus; apertura fere circularis, intus sordide albida; perist. subsimplex, marginibus lamina callosa junctis, dextro vix incrassato, columellari late expanso, rimam umbilicarem fere tegente. — Long. 28, diam. 8⅔ mill. Ap. 5½ mill. longa, 4 lata. (Spec. adult. coll. Hegewisch et jun. Coll. Nr. 231.)

Bulimus truncatus Pfr. Symb. I. p. 43.

— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 55. t. 1. f. 8.

Habitat in republica Mexicana. Sub foliis Agaves americanae prope Angangueo legit b. Hegewisch.

398. B. decapitatus Spix. †

T. cylindrico-turrita, tenuissime striata, albida, apice truncata, consolidata; anfr. planiusculi. — Long. 9½, lat. 4½ lin. (Wagn.)

Bulimus decapitatus Spix test. bras. p. 8. t. 8. f. 3.

Habitat in Brasilia. (Specimen unicum in Musaeo Monacensi.)

399. B. elongatulus Pfr.

T. imperforata, subulata, solidula, sub epidermide tenuissime striata (interdum obsolete decussata) alba; spira subulata, acuta; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis fere aequans; columella leviter recedens, callosa, plana; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, margine dextro antrorsum subarcuato, columellari recedente, subincrassato, appresso. — Long. 24, diam. 5⅔ mill. Ap. 7 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 232.)

Bulimus elongatulus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 42.

Habitat in insula Luzon. Prope Calanang legit H. Cuming.

400. B. leptocochlias Jonas.

T. subperforata, elongato-conica, tenuissima, pellucida, subtilissime striata, straminea; spira conica, apice obtusiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella subrecta; apertura parvula, ovalis; perist. simplex, acutum, rectum, marginibus remotis, columellari dilatato, angulatim reflexo, per-

forationem fere tegente. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Jonas.)

Bulimus leptocochlias Jonas in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 13.
— — *Phil.* Icon. II. 14. p. 156. t. 6. f. 9.

Habitat in Guinea.

401. B. septenarius Bruguière. †

T. turrita, perforata, pellucida, alba; anfr. 7 planiusculi; sutura distincta; columella recta, rotundata; apertura ovalis; perist. simplex, tenue, acutum, margine columellari reflexiusculo. — Long. 1″, diam. 4‴. (Br.)

Bulimus septenarius Brug. Enc. méth. I. p. 324. N. 46.
Petiv. Gazophyl. t. 17. f. 4. (Brg.)
Obeliscus septenarius Beck ind. p. 62. N. 9?

Habitat prope Lima (Le Blond, Brug.).

402. B. columella Philippi.

T. subimperforata, cylindraceo-turrita, solidiuscula, laevigata, flavescenti-alba; spira elongata, apice obtusa; sutura subcrenulata; anfr. 10 convexiusculi, ultimus $^2/_9$ longitudinis subaequans, basi subangulatus; columella stricta; apertura oblique semiovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 25, diam. $6^1/_2$ mill. Ap. $5^1/_2$ mill. longa, 3 lata. (Coll. Philippian.)

Bulimus columella Phil. Icon. I. 7. p. 158. Bul. t. 2. f. 7.

Habitat in Brasilia.

Obs. «Similis B. obelisco Moric. Differt magnitudine, superficie glabra et anfractu ultimo angulato». (Phil. l. c.)

403. B. subuliformis (Helix) Moricand.

T. imperforata, gracilis, cylindracea, versus apicem obtusum attenuata, laevigata, nitida, cerea; anfr. 14—16 angusti, planulati, ultimus $^1/_8$ longitudinis vix aequans; apertura minima, obliqua, ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro stricte recedente, columellari arcuato. — Long. 25, diam. $3^1/_2$ mill. Ap. 3 mill. longa, $2^1/_3$ lata. (Mus. Cuming. et v. d. Busch.)

Helix subuliformis Moric. Mém. Gen. VII. P. 2. p. 427. t. 2. f. 3.
Bulimus subuliformis Lam. ed. Dh. 67. p. 252.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 156. t. 15. f. 15. 16.
Obeliscus subuliformis Beck ind. p. 62. N. 8.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

404. B. Rivasii Orbigny. †

T. elongato-conica, tenuis, laevigata, translucida, griseo-fusca, lineolis brunneis longitudinaliter ornata; spira subelongata,

conica, acuta; anfr. 8 minime inflati, curti, ultimus spira brevior; sutura non impressa; apertura oblonga, subangulata; labrum tenue acutum; columella recta, antice angulata. — Long. 19, lat. 8 mill. (O.)

Bulimus Rivasii Orb. voy. p. 276. t. 34. f. 8—10.

Habitat in Andibus Boliviae.

405. B. bacterionides (Helix) Orbigny. †

T. elongata, turrita, subcylindrica, tenuis, lucida, laevigata, albida; spira subplana, apice obtusa; anfr. 9; apertura fere quadrangularis; columella recta, acuta; labrum tenue; umbilicus nullus. — Long. 17, diam. 4 mill. (O.)

Helix bacterionides (Cochlitoma) *Orb.* syn. p. 9.
Achatina bacterionides Orb. voy. p. 260. t. 29. f. 1—3.
Bulinus bacterionides Sow. Conch. Ill. f. 83.
Obeliscus bacterionides Beck ind. p. 62. N. 11.

Habitat in Bolivia.

Obs. Haec species nunquam mihi visa characteres Bulimi potius, quam Achatinae exhibere mihi videtur.

406. B. panayensis Pfr.

T. imperforata, subulata, tenuis, laevigata, pellucida, cereo-hyalina; spira elongata, apice obtusa; anfr. 8 lati, vix convexiusculi, ultimus ¼ longitudinis vix aequans; columella brevis, strictiuscula; apertura ovali-oblonga, basi subangulata; perist. simplex, rectum, margine columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 11, diam. 2½ mill. Ap. 2½ mill. longa, 1⅓ lata. (Coll. Nr. 233.)

Bulimus Panayensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 33.

Habitat prope Dingle insulae Panay (Cuming).

407. B. achatinaceus Pfr.

T. imperforata, elongato-turrita, solida, confertim ruditer striata, opaca, cerea; spira elongata, acutiuscula; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella stricta, basin fere attingens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari brevissime reflexiusculo, adnato. — Long. 13, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, medio 2⅔ lata. (Coll. Nr. 234.)

Bulimus achatinaceus Pfr. Symb. III. p. 82.

Habitat in insula Java (v. d. Busch).

408. B. pellucidus Pfr.

T. subperforata, turrita, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, lutescenti-cornea; spira elongata, apice obtusa; anfr. 7 con-

vexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; columella subtorta; apertura subquadrangulari-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari breviter revoluto. — Long. 11½, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2 lata. (Mus. Cuming. spec. max.)

Bulimus pellucidus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in provincia Merida Novae Granadae (Funck.)

Obs. Species Achatinis anomalis subperforatis valde affinis.

409. B. linearis Krauss.

T. subperforata, turrito-subulata, solidula, arcuatim striatula, vix nitidula, corneo-straminea, apice acutiuscula; anfr. 10 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, basi rotundatus; columella recta, subverticalis; apertura elliptica, utrinque attenuata; perist. simplex, rectum, margine dextro antrorsum dilatato, columellari reflexo, perforationem fere tegente. — Long. 13½, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, medio 2 lata. (Coll. Krauss. spec. max.)

Bulimus linearis Krauss mss.

Habitat in monte Mohapaani Africae meridionalis.

410. B. gracilis Hutton. †

T. translucida, tenuis, pallida; spira conica; anfr. 12, ultimus 2 praecedentes aequans; apertura longior quam lata, semiovalis; perist. acutum, margine columellari stricto, reflexiusculo. — Long. 6½‴. (H.)

Bulimus gracilis Hutt. in Journ. As. Soc. III. p. 84.

Habitat prope Mirzapoor Indiae orientalis.

411. B. indicus Pfr.

T. subperforata, subulata, tenuis, diaphana, corneo-cerea, subarcuatim confertissime striata; spira subulata, apice acutiuscula; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella recta, verticalis; apertura oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari usque ad basin breviter reflexo, perforationem fere tegente. — Long. 10, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 1½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus indicus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 40.

Achatina gracilis Bens. mss. in sched. Cuming.

Habitat in India orientali.

412. B. acuticostatus Orbigny. †

T. elongata, tenuis, fusca, longitudinaliter acuto-costata, transversim bicostata, sulcata; spira elongata, subulata, apice

acuta; anfr. 9 convexi, ultimus bicarinatus; apertura angusta, dilatata. — Long. 12; diam. 3 mill. (O.)

Bulimus acuticostatus Orb. moll. cub. I. p. 175. t. 11. f. 15—18.

Habitat in insula Cuba.

413. B. subula (Achatina) Pfr.

T. subperforata, turrito-subulata, subtiliter striata, nitidula, diaphane cerea; anfr. 8 convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella recta; apertura ovali-oblonga: perist. simplex, acutum, margine dextro recto, columellari brevissime reflexo, appresso. — Long. $11^1/_2$, diam. 3 mill. Ap. $3^1/_3$ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 235.)

Achatina subula Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.

Bulimus subula Pfr. Symb. I. p. 85.

— *octonoides Orb.* moll. cub. I. p. 177. t. 11. f. 23. 24. *)

— *procerus Adams* in Bost. Proc. 1845. p. 13.

Habitat in insula Cuba, frequens circa Havana et Matanzas! Nec non in ins. Jamaica.

414. B. Tuckeri Pfr.

T. perforata, cylindraceo-subulata, tenuis, longitudinaliter distincte striata, nitidula, cerea; spira elongata, apice acutiuscula; anfr. 9 convexiusculi, ultimus $^1/_4$ longitudinis vix aequans; columella oblique recedens; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari superne dilatato, patente. — Long. 9, diam. $2^3/_4$ mill. Ap. 2 mill. longa, $1^1/_4$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Tuckeri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 30.

Habitat in «Sir Charles Hardy's island» oceani pacifici (Tucker).

Obs. Differt a B. subula inprimis anfractibus angustis, ultimo brevissimo.

415. B. oparanus Pfr.

T. subimperforata, subulata, longitudinaliter distincte striata, tenuis, cereo-hyalina; spira subulata, acutiuscula; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella vix arcuata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari fornicatim brevissime reflexo, adnato. — Long. 11, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, $1^1/_2$ lata. (Spec. max. Mus. Cuming. Coll. Nr. 236.)

Bulimus Oparanus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 34.

Habitat in insula Opara (Cuming).

Obs. A B. subula praecipue differt striis longitudinalibus distinctis.

*) T. elongata, pellucide cornea, longitudinaliter striata; spira elongata conica, apice acuta; anfr. 8 convexis; apertura ovali; labro tenui, acuto. — Long. 12, diam. 3 mill. (Orb. l. c.)

416. B. Goodallii (Helix) Miller.

T. subperforata, elongato-turrita, apice obtusiuscula, tenera, subarcuato-striata, pellucida, cornea; anfr. 7—8 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella subtorta; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, margine dextro antrorsum arcuato, columellari breviter reflexiusculo. — Long. 6½, diam. 2 mill. Ap. 2 mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 237.)

Helix Goodallii Mill. in Ann. of Phil. VII. 1822. p. 381.
— *clavulus* (Cochlicella) *Fér.* pr. 381.
— — *Quoy* et *Gaim.* Astrol. Zool. II. p. 133. t. 11. f. 30—33.*)
Bulimus clavulus Turt. Man. p. 79. f. 61.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 151. t. 14. f. 27. 28.
— *Goodallii Gray* in Ann. of. Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Flem.* brit. anim. p. 266.
— — *Gray* Man. p. 6. t. 6. f. 61.
— *clavulinus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 136. t. 14. f. 9. 10?**)
— *laevigatus Adams* in sched.
Achatina clavulus Sow. gen. of shells.
Obeliscus Goodallii? Beck ind. p. 62. N. 16.
— *clavulus Beck* ind. p. 62. N. 15?
Columna clavula Villa disp. syst. p. 20.
β. Minor, hyalinus: long. 4⅔, diam. 1⅔ mill. Ap. 1⅓ mill. longa, ⅔ lata. (Spec.)
Bulimus pumilus Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 252.

Habitat in insulis Indiae occidentalis, Guadeloupe, Jamaica etc., nec non in Americae meridionalis terris; in Isle de France (Quoy, Gray), Madagascar (Beck); var. *β* in Cuba. — In Anglia introductus in hortis servatur.

417. B. laeviusculus Adams. †

T. minima, tenuis, nitida, diaphana, ovata, elongata; anfr. 6 haud multum convexi, striis paucis, distantibus, exilissimis, longitudinalibus ornati; apertura elongata, supra angusta et acuta; labrum tenue, infra retractum; columella torta. — Div. 18°. Spirae long. 0,16, long. tot. 0,25, lat. 0,075″. (A.)

Bulimus laeviusculus Adams in Bost. Proc. 1845. p. 13.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. Nonne potius Achatinis adnumerandus?

---

*) T. perforata, elongato-acuminata, pellucida, fragili, cornea, tenuissime striata; anfr. 8 obliquis, ultimo longiore; apertura longa, ovali; labro simplice; columella paululum contorta. — Long. 4½, diam. 1½ lin. (Quoy et G. l. c.)

**) T. turrita, fragili, vitrea, nitida, diaphana; anfr. 6 convexis, ultimo majore; apertura ovata, superne et ad sinistram angulosa; perist. simplice, acuto; apice obtuso. — Long. 8 mill. — Ins. Bourbon. — Intermedius inter B. clavulum et oryzam. (P. et M. l. c.)

418. B. gracillimus (Achatina) Pfr.

T. imperforata, subuliformis, tenuis, costis longitudinalibus, subrectis, lineisque confertissimis, parallelis in interstitiis costarum sculpta, pallide corneo-albida; sutura impressa; anfr. 7—8 planulati, ultimus $^1/_4$ longitudinis vix superans, infra medium obtuse angulatus; columella subsimplex, ad basin aperturae angulum formans; apertura ovali-subtriangularis; perist. simplex, margine dextro extus impresso, repando, columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 7, diam. $1^3/_4$ mill. Ap. 2 mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 238.)

Achatina gracillima Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.
Bulimus gracillimus Pfr. Symb. III. p. 54.
— *striato-costata Orb.* moll. cub. I. p. 176. t. 11. f. 19—21?*)

Habitat in insula Cuba.

419. B. hannensis Rang. †

T. conico-elongata, tenuis, diaphana, lutescens, exilissime striata, apice obtusa; anfr. 6, ultimus spira brevior; apertura ovalis; columella recta; labrum simplex, acutum. — Long. 4—5, lat. $1^1/_2$—2 mill. (R.)

Helix hannensis Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 41. t. 3. f. 8.

Habitat in Promontorio viridi Africae occidentalis.

420. B. striatellus Adams.

T. imperforata, turrita, distincte et confertim striata, tenuis, pellucida, cerea; anfr. 7 convexi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella superne leviter torto-plicata; apertura ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari reflexiusculo. — Long. $4^2/_3$, diam. $1^1/_2$ mill. Ap. $1^1/_4$ mill. longa, $^3/_4$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus striatella Adams in Bost. Proc. 1845. p. 13.**)
— *striatellus Pfr.* Symb. III. p. 87.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. Persimilis habitu Achatinae exili Pfr. Nr. 72.

421. B. octonoides Adams. †

T. parva, albida, elongata; anfr. 7 perconvexi; labrum tenue; columella recta. (B. octono similis, speciei, quam gen. Achatina

*) T. elongato-aciculata, alba, longitudinaliter costata et striata; spira elongata, apice acuta; anfr. 7 convexis; apertura ovali, subrhomboidali. — Long. 5, diam. $1^1/_4$ mill. (Orb. l. c.)

**) T. parva, tenui, nitida, diaphana, elongata; anfr. 7 convexis, striis robustis, parallelis ornatis; apertura lata; labro tenui; columella haud multum torta. — Div. 30°. Spir. long. 0,15, long. tot. 0,2, lat. 0,07 poll. (Ad. l. c.)

habeat.) — Div. 22°. Spirae long. 0,22, long. tot. 0,31, lat. 0,1 poll. (Ad.)

Bulimus octonoides Ad. in Bost. Proc. 1845. p. 12.

Habitat in insula Jamaica.

422. B. pallidus Adams. †

T. parva, tenuis, diaphana, cornea, elongata; anfr. 5 convexi; labrum tenue; columella recta. — Div. 35°. Spir. long. 0,16, long. tot. 0,27, lat. 0,13 poll. (Ad.)

Bulimus pallidus Ad. in Bost. Proc. 1845. p. 12.

Habitat in insula Jamaica.

423. B. cylindraceus Calcara. †

T. parva, cylindracea, apice obtusa, laevis, nitida, alba, subdiaphana; anfr. 5 plani; sutura vix impressa; apertura rotundata; labrum simplex. — Long. 3, diam. ½ lin. (C.)

Bulimus cylindraceus Calc. Monogr. p. 33.

— — *Arad.* et *Magg.* cat. p. 148.

Habitat in Sicilia rarissimus.

§. 26.

424. B. holostomus Pfr.

T. rimato-perforata, cylindrica, apice obtusa, opaca, carneo-cinerea, oblique et valide plicato-costata; anfr. 7 subplanulati, deorsum attenuati, superne subangulati, ultimus ¼ longitudinis subaequans; apertura verticalis, oblonga, integra; perist. simplex, acutum, marginibus subparallelis, supero breviter soluto. — Long. 9, diam. 2⅔ mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus holostoma Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 28.

Habitat prope Cobija Boliviae.

Obs. Specimen adest in Musaeo Cumingiano, vix costis validioribus distinguendum, quod a Cl. Tucker ex insulis Sandwicensibus allatum esse affirmatur.

* * *

425. B. solutus (Bostryx) Troschel.

T. turrita, tenuiuscula, rugosa, cinerea, plerumque castaneo-bicingulata; spira turrita, apice obtusiuscula; anfr. 6, supremi 4 regulariter adjacentes, convexi, 2 ultimi omnino soluti, liberi, latere dextro superne et basi carinati: carinis linea impressa utrinque marginatis; apertura subverticalis, oblongo-tetragona, angulis lateris sinistri rotundatis; perist. simplex, rectum, continuum. —

Long. 12, diam. 5½ mill. Ap. 4 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Dunker.)

Bulimus solutus (Bostryx) *Troschel* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 49.

Habitat in Peru, ubi rarum legit Cl. de Tschudi.

Obs. Specimina circa 20 lecta sunt omnino aequalia, nec monstrosa.

§. 27.

426. **B. pullus Gray.**

T. subperforata, oblonga, apice attenuata, confertissime plicatulo-striata, diaphana, corneo-albida; anfr. 9 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis non attingens; columella brevis, subrecta; apertura parvula, rotundato-ovalis; perist. subincrassatum, margine columellari brevi, dilatato, incrassato, patente. — Long. 16, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 2¾ lata. (Spec. max. coll. Grayanae; mea paulo minora: Coll. Nr. 239.)

Bulimus pullus Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.
— — *Müll.* synops. p. 15.
Pupa cylindrica Hutt. in Journ. As. Soc. III. p. 85.
β. Minor, albidus: long. 11½, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Spec.)

Habitat in India orientali ad ripas Gangis (Gray), prope Delhi (Bens.); var. *β* prope Hansi in deserto occidentali (Benson).

427. **B. Burchellii Gray.**

T. subimperforata, ovato-oblonga, striatula, albida; spira elongata, apice obtusa; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella brevis, subrecta; apertura ovalis; perist. simplex, obtusum, margine columellari dilatato, reflexo, appresso. — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Coll. Gray.)

Bulimus Burchellii Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.
— — *Müll.* synops. p. 16.

Habitat in Africa australi prope Lattacoo.

428. **B. mimosarum Orbigny.** †

T. elongato-turrita, subperforata, tenuis, laevigata, griseo-albida; spira elongata, apice subtruncata; anfr. 12; sutura profunda; apertura ovalis; columella subarcuata, crassa; labrum subcrassum, album. — Long. 14½, lat. 3½ mill. (O.)

Helix mimosarum (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 20.
Bulimus mimosarum Orb. voy. p. 262. t. 41. f. 12—14.
Obeliscus mimosarum Beck ind. p. 62. N. 18.

Habitat in provincia Lagunacensi Boliviae.

429. B. obtusus (Pupa) Draparnaud.

T. subimperforata, cylindrica, obtusissima, striatula, caesio-albida, glabriuscula, nitidula; anfr. 7—8 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis aequans; columella brevis, recta; apertura lunato-ovalis; perist. intus sublabiatum, rectum, vix expansiusculum, margine dextro arcuato, columellari brevissime reflexo, rimam punctiformem formante. — Long. 13, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, $2^2/_3$ lata. (Coll. Nr. 240.)

Pupa obtusa Drap hist. p. 63. t. 3. f. 44.
— — *C. Pfr.* Ill. p. 36. t. 7. f. 2.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 169. t. 235. f. 4115.
— — *Desh.* in Enc. méth. II. p. 402. N. 4.
— — *Rossm.* V. p. 19. f. 337.
— *germanica Lam.* 14. p. 108. ed. Dh. p. 174.
— — *Blainv.* in Dict. sc. nat. tome 28. p. 93.
Helix obtusa (Cochlostyla) *Fér.* pr. 329. Hist t. 109. f. 4.
Cylindrus obtusus Fitzing. syst. Verz. p. 107.
Mastus? obtusus Beck ind. p. 73. N. 10.
Bulimus obtusus Pfr. Symb. I. p. 84. II. p. 119.
— — *Küster* p. t. 16. f. 9. 10.

Habitat in alpibus Austriae: Schneeberg, Oetscher, Breiner Alpe.

430. B. subdiaphanus (Pupa) King.

T. subimperforata, cylindracea, apice attenuata, obtusiuscula, obsolete striata, subdiaphana, alba; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix aequans; columella stricta, basin aperturae attingens; apertura semiovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 11, diam. $4^1/_2$ mill. Ap. $3^3/_4$ mill. longa, $2^1/_3$ lata. (Coll. Nr. 241.)

Pupa subdiaphana King in Zool. Journ. V. p. 340. *)
Helix Bamboucha Fér. cat. *Rang* in Bull. sc. nat. 1827. Févr. et Mars.
Bulimus Bamboucha Webb et *Berth.* synops. p. 325.
— *baboucha Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 134. t. 14. f. 5. 6.
— *subdiaphanus Pfr.* Symb. II. p. 122.
— — *Küster* p. t. 16. f. 7. 8.

Habitat in insulis Promontorii viridis.

431. B. Tschudii Troschel.

T. perforata, oblonga, apice attenuata, acutiuscula, sublaevigata vel striata, opaca, albida, interdum fusco-punctato-fasciata;

*) T. cylindracea, alba, subdiaphana, transversim creberrime substriata; long. $^4/_8$ paulo minus; lat. $^3/_{16}$ paulo minus; poll. — Hab. ad Portum Praya. (King l. c.)

anfr. 7—8 convexi, ultimus medio subcompressus, $^1/_3$ longitudinis aequans; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, marginibus conniventibus, dextro superne curvato, antrorsum protracto, columellari brevi, subverticali, dilatato, patente. — Long. 9, diam. $3^1/_3$ mill. Ap. $2^3/_4$ mill. longa, $1^2/_3$ lata. (Mus. Berol.)

Bulimus Tschudii Troschel mss.

Habitat in Peru, ubi legit Cl. de Tschudi.

Obs. Persimilis figurae Orbignyanae, B. mimosarum exhibenti, sed hujus descriptio minime congruit.

432. **B. Beckianus Pfr.**

T. perforata, ovato-oblonga, acuminata, tenuis, diaphana, virenti-hyalina, confertim costulato-striata: costulis prope suturam crenulatam validioribus; anfr. 9 convexi, ultimus $^1/_4$ longitudinis subaequans, basi rotundatus; columella brevis, strictiuscula; apertura lata, semiovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari patente. — Long. 9, diam. $3^1/_2$ mill. Ap. $2^1/_3$ mill. longa, $1^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 242.)

Bulimus Beckianus Pfr. Symb. III. p. 82.
— *oryza Desh.* in Lam. ed. 2. p. 263. N. 86?
— *vitreus Mühlf.* Ant. Verz. p. 42. N. 1549.
Obeliscus Annaaensis Beck ind. p. 62. N. 13?

Habitat in insula Opara.

Obs. In collectionibus frequenter vidi nomine B. oryzae designatum, sed descriptioni Bruguiereanae minime convenit.

433. **B. oryza Bruguière.** †

T. imperforata, cylindrica, utrinque obtusa, cancellata, nitida, alba; anfr. 5, supremi glabri, reliqui convexi, subcostulato-striati; sutura distincta; apertura ovalis; perist. simplex, subexpansum. — Long. 3, diam. 1 lin. (Brg.)

Bulimus oryza Brug. Enc. méth. I. p. 333.
— — *Lam.* ed. Dh. 86. p. 263? *)
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 142. t. 14. f. 19. 20?
Obeliscus oryza Beck ind. p. 62. N. 17.

Habitat in insula Guadeloupe (Brug.).

Obs. «Forma similis B. fuso, sed multo minor». (Brg.)

---

*) T. elongato-turrita, vitrea, virescente, apice obtusa, basi subperforata, longitudinaliter tenuissime striata; anfr. 8 angustis, convexis; apertura minima, ovato-circulari; labio simplice, tenui, acuto. — Long. 7, diam. $2^1/_2$ mill. — Brasil. (Desh. l. c.)

434. B. scutilus Mighels. †

T. cylindrica, turrita, alba, polita, imperforata; anfr. 6 convexi; apertura elongato-ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. $^{7}/_{30}$, diam. $^{3}/_{35}$ poll. (M.)

Bulimus scutilus Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 20.

Habitat in insula Sandwich. Oahu.

435. B. Moquinianus Webb et Berthelot. †

T. elongata, cylindrica, obtusiuscula, obsolete striatula, cornea, fasciis albidis longitudinalibus variata; apertura suborbicularis. — Axis 6, diam. 2‴. Anfr. 8. (WB.)

Bulimus Moquinianus Webb et *Berth.* syn. p. 319.
— — *Orb.* canar. p. 70. t. 2. f. 24.

Habitat in insula Canaria.

436. B. micra Orbigny. †

T. elongata, turrita, pyramidalis, tenuis, translucida, striatissima, subumbilicata, albida; spira tumida, apice obtusa; anfr. 8; apertura ovalis, recta, albida; columella acuta, recta; labrum acutum. — Long. $6^{1}/_{2}$, lat. $2^{1}/_{2}$ mill. (O.)

Helix micra (Cochlitoma) *Orb.* syn. p. 9.
Bulimus micra Orb. voy. p. 262. t. 41. f. 18—20.
Obeliscus micra Beck ind. p. 62. N. 12.

Habitat in America meridionali.

Obs. Bulimus pupoides Ant. (Verz. p. 42. N. 1535.) ex eadem specie descriptus est, quam nomine Hydrocenae oparicae cum dubio inter Cyclostomacea enumeravi. Bulimi speciebus nonnullis ex hac sectione persimilis, sed operculo praedita est.

* * *

437. B. Webbii Orbigny. †

T. oblongo-elongata, laevis, solidula, albida; spira elongata, subconica, leviter inflata, acuta, anfr. 6, ultimus magnus; apertura oblonga, postice compressa; perist. incrassatum, continuum. (O.)

Bulimus Webbii Orb. canar. p. 72. t. 6. f. 1. 2.
Achatina folliculus Webb et *Berth.* syn. p. 320.

Habitat in insulis Canariis.

Obs. Bulimo pupiformi Cantr. affinis videtur.

§. 28.

438. B. magnificus Grateloup.

T. imperforata, oblonga, solidiuscula, longitudinaliter striata, virenti-castanea, nitida; spira elongata, conica, apice fusca, obtusiuscula; anfr. 7 vix convexi, ultimus $^{1}/_{9}$ longitudinis subaequans;

columella subtorta, callosa, alba; apertura oblongo-semiovalis. intus nitide violacescenti-livida; perist. simplex, rectum, marginibus callo tenui, coerulescente junctis, dextro albo-limbato, columellari subincrassato. — Long. 81, diam. 34 mill. Ap. 38 mill. longa, medio 17 lata. (Coll. Nr. 243.)

Bulimus magnificus Grat. Bord. XI. p. 419. t. 4. f. 1.*)

Habitat in Brasilia; in Peru (Grateloup).

Obs. Similis Bul. Taunaisii, saepe in collectionibus cum illo confusus, peristomate acuto constanter distinctus. (Conf. Nr. 366.)

439. B. Largillierti Philippi.

T. imperforata, cylindraceo-elongata, tenuiuscula, longitudinaliter striata, lineis impressis, spiralibus obsolete decussata, fulvida, strigis castaneis irregulariter distantibus ornata; spira elongato-conica, obtusa; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella torta, alba; apertura oblongo-ovalis, intus submargaritacea; perist. simplex, rectum, margine columellari vix incrassato. — Long. 52, diam. 20 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 12 lata. (Coll. Philippi.)

Bulimus Largillierti Phil. Icon. II. 9. p. 11. t. 3. f. 6.

Habitat prope Sta Catarina in Brasilia (Largilliert).

440. B. peruvianus Bruguière.

T. imperforata, ovato-oblonga, tenuis, longitudinaliter rugosa. albo, violacescenti et spadiceo irregulariter strigata; spira conica. apice acuta, nigra; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella simplex, torta, filiformis, violacea; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. rectum, acutum, marginibus callo tenui violacescente junctis, columellari angustissimo, appresso. — Long. 48, diam. 23 mill. Ap. 26 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 244.)

Bulimus peruvianus Brug. Enc. méth. I. p. 320. N. 37.
— — *Lam.* 13. p. 120. ed. Dh. p. 227.
— — *Gray* Spicil. zool. t. 5. f. 4.
— — *Orb.* voy. p. 267.
Bulimus Gravesii King in Zool. Journ. V. p. 340.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 12 et 12 *.
Helix peruviana (Cochlostyla) *Fér.* pr. 334. Hist. t. 114. f. 1. 2.
— — *Orb.* synops. p. 8.
Plectostylus Peruvianus Beck ind. p. 58. N. 3.

β. Unicolor, fulvo-lutescens, anfract. summis denudatis, apertura intus

*) T. elongato-oblonga, fusco-brunnea, nitida, imperforata, longitudinaliter striata: striis tenuissimis confluentibus; anfr. 7 — 8, ultimo zona pallida circumdato; apertura ovata, intus nitide subviolacea: labro simplice, albo, subacuto; columella recta, alba. — Long. 80, diam. 35 mill. (Grat. l. c.)

sordide rosea: long. 45, diam. 21 mill. Ap. 26 mill. longa, 11 lata. (Spec.)

Bulinus Gravesii var. Sow. Conch. Ill. f. 12 **.

Helix peruviana β Fér. hist. t. 114. f. 4. jun.

γ. Spira magis producta, gracili, anfractum ultimum superante: long. 50, diam. 19 mill. Ap. 25 mill. longa, 11 lata. (Spec.)

Helix peruviana α Fér. hist. t. 114. f. 3.

Habitat in Peru, Concepcion etc., Valparaiso (Orb.), var. β prope Quilliota (King).

441. **B. chilensis (Achatina) Lesson.**

T. subimperforata, ovato-acuminata, undique granulata, luteo-fusca, strigis rufis irregulariter ornata; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram superans; columella subtorta, oblique recedens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari appresso-dilatato. — Long. 38, diam. 16 mill. Ap. 20 mill. longa, 10 lata. (Coll. Nr. 245.)

Achatina chiliensis Less. voy. Coq. p. 317. t. 7. f. 3.

Bulimus chilensis Lam. ed. Dh. 90. p. 264.

— — *Orb.* voy. p. 267.

— *granulosus Pot.* et *Mich.* gal. I. p 142 t. 13. f. 9. 10.

Bulinus granulosus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.

— — *Müll.* synops. p. 17.

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 7 et 7 *.

Helix granulosa (Cochlostyla) *Orb.* syn. p. 8.

Bulimulus graniger Beck ind. p. 67. N. 55.

Habitat in Chile: prope Concepcion et Valparaiso; prope Ilo reipublicae Peruvianae (Orb.).

442. **B. Goudoti Petit.**

T. imperforata, ovata, tenuis, pellucida, fusco-olivacea; anfr. 5 convexiusculi, longitudinaliter et irregulariter tenue striati, ultimus spiram paulo superans; columella in medio anguloso-callosa; apertura oblongo-ovalis, intus sordide coerulescens; perist. simplex, margine columellari reflexiusculo. — Long. 39, diam. 19 mill. Ap. 23 mill. longa, 14 lata. (Mus. Cuming).

Bulimus Goudotii Petit in Revue zool. 1843. p. 239.

— — *Guérin* mag. 1843. t. 67.

Habitat in Nova Granada, in monte Tolima prov. Sta Fe de Bogota (Goudot).

Obs. Conf. B. Hanleyi Nr. 458.

443. **B. lithoicus Orbigny.** †

T. elongata, imperforata, subtenuis, irregulariter reticulata, flava; spira subelevata, plana, apice obtusa; anfr. 6; sutura sub-

crenulata; apertura ovalis; columella recta, plana; labrum tenue, intus albidum. (O.) — Long. 34, diam. 17 mill. Ap. 17 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Helix lithoica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 13.
Bulimus lithoicus Orb. voy. p. 288. t. 33. f. 10. 11.
Bulimulus lithoicus Beck ind. p. 67. N. 57.

Habitat in provincia Pazensi Boliviae.

444. B. Dufresnii Leach.

T. imperforata, ovato-oblonga, solida, subtilissime rugoso-granulata, fusca, fasciis luteis et fuscis cincta; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram subaequans; columella subtorta; apertura ovalis, intus fusca; perist. simplex, obtusum, rectum, margine columellari vix dilatato. — Long. 38, diam. 18 mill. Ap. 20 mill. longa, 11½ lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 246. jun.)

Bulimus Dufresnii Leach Miscell. Zool. II. p. 153. t. 120. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 11. t. 9. f. 7.
— — *Lam.* ed. Dh. 54. p. 246.
Helix Dufresnii (Cochlostyla) *Fér.* pr. 330. Hist. t. 113. f. 3.
— — *Quoy* et *Gaim.* Astrol. II. p. 118. t. 10. f. 1—3.
Orthostylus Dufresnii Beck ind. p. 50. N. 9.
β. Minor: long. 22—23, diam. 11—12 mill.
Helix Dufresnii var. Fér. t. 113. f. 1. 2.

Habitat in insula Vandiemensland.

445. B. niger Dufo. †

T. imperforata, oblonga, striata, unicolor saturate brunnea; anfr. 4, ultimus spiram superans, carinatus; apertura ovalis, angustiuscula; perist. simplex, margine dextro rotundato, non reflexo, columellari postice oblique canaliculato. *) (Dufo.) — Long. . . . ?

Bulimus niger Dufo in Ann. sc. nat. XIV. 1840. p. 197.

Habitat rarus in insulis Sechellis Mahé et Praslin.

446. B. coronatus Pfr.

T. imperforata, oblongo-turrita, laevigata, tenuis, diaphana, cereo-flavida vel albida; spira turrita, apice obtusiuscula; anfr. 7 planiusculi, ad suturam tuberculis parvis, albis, confertis coronati, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari strictiusculo, planulato, appresse reflexo. — Long. 21, diam. 7½ mill. Ap. 8 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 247.)

Bulimus coronatus Pfr. Symb. III. p. 83.

Habitat in Brasilia.

*) «présente une gouttière oblique à sa partie postérieure».

447. **B. funeralis Bruguière.** †

T. imperforata, oblongo-ovata, tenuis, pellucida, haud nitens, alba, fasciis nigris 5 circumdata; spira subacuta; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; apertura ovalis; perist. simplex, tenue, acutum; columella simplex, non reflexa, intus subemarginata*). — Long. 9, diam. 5‴. (Brg.)

Bulimus funeralis Brug. Enc. méth. I. p. 321. N. 39.
Helix funeralis (Cochlostyla) *Fér.* pr. 335.

Habitat in America meridionali.

Obs. An forte Achatinae species?

448. **B. Grateloupi Pfr.**

T. imperforata, ovato-oblonga, ruguloso-striata, tenuissima, nitida, pellucida, stramineo-albida; anfr. 6 — 7 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella callosa, retrorsum flexuosa; apertura semiovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro antrorsum arcuato. — Long. 18, diam. 8 mill. Ap. 9 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 248.)

Bulimus Grateloupi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 42.

Habitat ad Albay insulae Luzon et Dingle insulae Panay (Cuming).

449. **B. interstinctus Gould.**

T. imperforata, ovato-conica, sublaevigata, tenuis, pellucida, pallide straminea; spira conica, acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subincrassata, filaris, torta; apertura oblonga; perist. simplex, tenue, acutum. — Long. 11, diam. 4½ mill. Ap. 5 mill. longa, 2¼ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus interstinctus Gould in sched. Cuming.

Habitat in regionibus interioribus Promontorii Palmarum.

Obs. Differt a B. Grateloupi magnitudine, spira conica, apice acuta et aperturae forma. — Similis etiam B. guineensi Jon. (subperforato), a quo differt anfractu ultimo breviore, basi non attenuato, columella magis torta, etc.

450. **B. lacteus Lea.** †

T. ovato-conica, imperforata, nitida, lactea, tenuis, subdiaphana, minutissime transversim striata, inferne brunneo vittata; anfr. 6; apertura subparva; labrum acutum. (Lea.) — Long. 17, diam. 9 mill. Ap. 8 mill. longa, fere 5 lata. (ex ic.)

Bulimus lacteus Lea obs. II. p. 65. t. 23. f. 100.

Habitat in Columbia.

---

*) «... légèrement évasée et presque échancrée à sa base interne».

451. B. nivalis Orbigny. †

T. ovata, tenuis, diaphana, laevigata, lucida, fulvo-brunnea; spira subconvexa, apice obtusa; sutura crenulata; anfr. 5; apertura ovalis; columella recta; labrum tenue, acutum. (O.) — Long. 16, diam. 10 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (ex ic.)

Helix nivalis (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 12.

Bulimus nivalis Orb. voy. p. 287. t. 32. f. 8. 9.

Habitat in America meridionali.

452. B. parvus Lea. †

T. imperforata, conica, carinata, lactea, apice rufa; anfr. 6 planulati; apertura ovata; labrum acutum; columella laevis, subangulata. (Lea.) — Long. 14, diam. 7 mill. Ap. 7½ mill. longa, 3½ lata. (ex ic.)

Bulimus parvus Lea obs. II. p. 84. t. 23. f. 96.

Habitat prope Carthagena.

453. B. pumicatus Mighels. †

T. imperforata, conica, polita, nitida, laete cornea; anfr. 7 convexiusculi; apertura parva, ovalis, plica tenui marginis columellaris munita; perist. simplex, acutum. — Long. $^1/_5$, diam. $^3/_{20}$ poll. (M.)

Bulimus pumicatus Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 19.

Habitat in insula Oahu Sandwich.

454. B. plicatus Guilding.

T. imperforata, oblonga, pallide cornea, tenuis, pellucida, longitudinaliter confertim plicata; spira obtusa; anfr. 5 convexi, ultimus spira paulo brevior; columella subrecta; apertura ovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. 1¾ mill. longa, 1 lata. (Coll. Metcalf.)

Bulimulus plicatus Guild. mss.

Bulimus plicatus Pfr. Symb. III. p. 86.

Habitat in India occidentali.

* * *

455. B. subsemiclausus Petit.

T. imperforata, ovato-acuta, tenuis, striatula, alba, punctis diaphanis aspersa, apice fulvicans; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 convexiusculi, ultimus spiram aequans, ventrosus, basi saccatus; columella brevis, recta; apertura oblonga, semiclausa; perist. simplex, marginibus callo funiculato fusco junctis, dextro et basali

angulatim introrsum flexo. — Long. 22, diam. 12 mill. Ap. 11 mill. longa et (excluso sepimento) 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus subsemiclausus Petit in Revue zool. 1843. p. 239.
— — *Guérin* mag. 1843. t. 66.

Habitat in Nova Granada. In prov. Bogota detexit Goudot.

§. 29.

456. B. atomatus Gray.

T. subimperforata, ovato-acuta, tenuis, striis longitudinalibus et spiralibus obsolete decussata, fulvescens, punctis triangularibus, saepe strigosis, castaneis ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^1/_7$ longitudinis subaequans; apertura ovalis, intus coerulescens; perist. simplex, rectum, margine columellari stricto, verticali, superne dilatato-reflexo, fornicato, perforationem fere tegente. — Long. 61, diam. 29 mill. Ap. 35 mill. longa, 18 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus atomatus Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 64.
— — *Müll.* synops. p. 14.
— — *Gray* New-Zealand t. 2. f. 1.

Habitat in Nova Hollandia.

457. B. prolatus Gould. †

T. ovoidea, antrorsum angustata, leviter striata, albido-cinerea, fasciis 4 liturarum ferruginearum cincta; spira ovato-conica; anfr. 5 convexiusculi; apertura elliptica, totius longitudinis dimidium adaequans; labrum simplex, acutum; columella brevis, late reflexa, alba, umbilicum parvum tegens. — Long. $1^3/_4$, lat. 1 poll. (G.)

Bulimus prolatus Gould 1846. Exped. shells p. 32.

Habitat ad Santiago, Chili.

Obs. «Aliquantulum similis B. Favannii Lam.»

458. B. Hanleyi Pfr.

T. subimperforata, oblongo-subfusiformis, tenuis, pellucida, unicolor fusca; spira elongata, acutiuscula; anfr. 7 planiusculi, ad suturam impressam crenulato-striati, ultimus oblique descendens, $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella subrecta; apertura oblongo-ovalis, intus coerulescens; perist. simplex, rectum, margine columellari breviter reflexo, perforationem angustissimam simulante. — Long. 51, diam. $17^1/_2$ mill. Ap. 23 mill. longa, medio $11^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 249.)

Bulimus Hanleyi Pfr. in Phil. Icon. II. 12. p. 111. t. 4. f. 2.

Habitat in Brasilia (Miller, Bescke).

459. B. auratus Pfr.

T. subobtecte perforata, oblongo-turrita, tenuis, longitudinaliter subtiliter striata, pellucida, aurata, lineolis saturatioribus spiralibus obsolete notata; spira turrita, obtusa; sutura submarginata, minute crenulata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis vix aequans; columella strictiuscula; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari breviter reflexo, subappresso. — Long. 30, diam. 10 mill. Ap. 13 mill. longa, $5^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 250.)

Bulimus auratus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat . . . ?

460. B. Recluzianus Pfr.

T. subperforata, subfusiformi-oblonga, sublaevigata, lineis confertis spiralibus subtiliter sculpta, nitida, opaca, carnea, strigis latis, irregularibus, castaneis et griseo-violaceis ornata; spira conica, apice obtusiuscula; sutura albo-marginata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella tenuis, leviter arcuata, superne subtorta; apertura subverticalis, oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari superne reflexo, subadnato. — Long. 30, diam. 12 mill. Ap. 16 mill. longa, $7^1/_2$ lata. (Coll. Philippi.)

Bulimus Recluzianus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 82.

Habitat . . . ?

461. B. amoenus Pfr.

T. subperforata, fusiformi-oblonga, longitudinaliter striata, opaca, flavescens, roseo-nebulosa, fasciis 4 spadiceis, quintaque basali, rosea ornata; spira turrito-conica, apice acutiuscula; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram aequans; columella superne compressa, deorsum leviter arcuata; apertura ovali-oblonga, intus concolor; perist. simplex, rectum, margine dextro subrepando, columellari breviter reflexo, subadnato. — Long. 29, diam. 10 mill. Ap. 15 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Philippi.)

Bulimus amoenus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 82.

Habitat . . . ?

462. B. Hegewischi Pfr.

T. subimperforata, ovato-acuta, alba, strigis fuscis et rugis obliquis notata; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram superans; apertura oblongo-ovalis, intus nitide fusco-carnea; perist. simplex, margine columellari superne subdilatato, reflexo, subappresso. — Long. 26, diam. 12 mill. Ap. 14 mill. longa, $6^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 251.)

Bulimus Hegewischi Pfr. Symb. II. p. 46.

Seba III. t. 39. f. 49?

β. Fasciis latis interruptis, violacescenti-fuscis ornatus.

Habitat in republica Mexicana: prope Michoacan, Pazquaro (Hegewisch).

463. B. debilis Beck.

T. subobtecte perforata, ovato-elliptica, tenuis, subtilissime striatula, diaphana, albida; spira conica, acutiuscula; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella oblique recedens, subtorta; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro vix expansiusculo, columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 252.)

Bulimulus debilis Beck ind. p. 65. N. 34.

Helix fragilis (Cochlogena) *Fér.* hist. t. 142 B. f. 10.

Habitat . . . ?

Obs. An varietas Bulimi fragilis Lam., imperfecte descripti. Conf. Nr. 626.

464. B. crepundia Orbigny. †

T. elongata, subinflata, pyramidata, subperforata, tenuis, laevigata, translucida, fusco-cinerascens; spira elongata, inflata, apice acuta; anfr. 8; sutura profunda, laevigata; apertura oblonga; columella subtorta, inflata; labrum tenue, acutum. (O.) — Long. 25, diam. 11 mill. Ap. 9½ mill. longa, 5 lata. (ex ic.)

Helix crepundia (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 14.

Bulimus crepundia Orb. voy. p. 275. t. 33. f. 18. 19.

Buliminus crepundius Beck ind. p. 71. N. 36.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

465. B. apodemetes Orbigny.

T. subperforata, ovata, tenuis, laevigata, albido-flavicans, griseo-marmorata vel brunneo-strigata; spira conica, apice acutiuscula; sutura levis, simplex; anfr. 6 vix convexi, ultimus spiram paulo superans; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari brevissime reflexo, subappresso. — Long. 23, diam. 12½ mill. Ap. 14 mill. longa, 7⅔ lata. (Coll. Nr. 253.)

Helix apodemetes (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10. *)

Bulimus apodemetes Orb. voy. p. 279. t. 30. f. 5—8.

Bulinus apodemetes Sow. Conch. Ill. f. 64.

Bulimulus apodemetes Beck ind. p. 68. N. 68.

Habitat in republica Argentina, nec non in Bolivia.

*) T. ovata, ventricosa, tenui, diaphana, laevigata, albido-flavicante, marmorata griseo, vel maculis longitudinaliter brunneis intersecta; spira subconica, apice obtuso; sutura profunda; apertura ovali; labro tenui, acuto. — Long. 25, lat. 14 mill. (Orb. l. c.)

466. B. ciliatus Gould. †

T. tenuis, ovato-conica, viridis, striis volventibus, cilias rigidas nunc longas, nunc breviores gerentibus, cincta; spira acuta; anfr. 6 convexi, ultimus magnus, ventricosus, subangulatus; apertura subovata, antice angustata; labrum simplex; columella recta, alba, umbilicum parvum obtegens. — Long. $^{9}/_{10}$, lat. $^{6}/_{10}$ poll. (G.)

Bulimus ciliatus Gould 1846. Exped. shells p. 32.

Habitat in Brasilia (Organ Mountain).

Obs. «Aspectus Paludinae cujusdam.»

467. B. Kingii Gray.

T. vix subperforata, ovato-oblonga, rugoloso-striata, albida, flammulis inaequalibus fusco-nigris magis minusve dense strigata; anfr. 5—6 vix convexiusculi, ultimus spiram conicam paulo superans; columella recta, subverticalis; apertura oblongo-ovalis, intus nitida; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo, subappresso. — Long. 23, diam. 11 mill. Ap. 12½ mill. longa, 6½ lata. (Coll. Nr. 254.)

Bulimus Kingii Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.*)

Helix Kingii Wood suppl. t. 7. f. 27. (Bul. Gray ibid. p. 32.)

Habitat in Nova Hollandia (King, Gray).

468. B. trilineatus (Helix) Quoy. †

T. imperforata, ovato-conica, alba, strigis rufo-fuscis longitudinalibus plus minusve densis ornata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira brevior; columella basi nigra; apertura ovata, violacea; perist. simplex, acutum, margine columellari reflexo. (Q. et G.) — Long. 28, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Helix trilineata Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 107. t. 9. f. 1—3.

Bulimus trilineatus Lam. ed. Dh. 60. p. 248.

— *melo var. b Menke* Moll. Nov. Holl. p. 7.

Habitat ad portum regis Georgii Novae Hollandiae.

Obs. Varietas praecedentis esse videtur.

469. B. Draparnaudi Pfr.

T. subobtecte perforata, oblongo-subfusiformis, striatula, opaca, nitida, alba, coerulescenti-nebulosa, strigis nigro-castaneis et brunneis, interdum maculose interruptis, ornata; spira turrito-conica, apice acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^{3}/_{8}$ longitudinis

*) T. conico-ovata, perforata, albida, pellucida, transverse nigro-fusco lineolata; anfr. convexiusculis; apertura spirae longitudine; perist. tenui, intus purpureo-nigro. — Long. 1, diam. ½ unc. (Gray l. c.)

subaequans; columella recta; apertura oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, membranaceo, angulatim reflexo, appresso. — Long. 28, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa, 6⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Draparnaudi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 113.

β. Minor, interstitiis strigarum castaneo-litturatis. (Coll. Nr. 255.)

Habitat prope Chilon Boliviae (Bridges).

470. **B. livescens Pfr.**

T. vix perforata, ovato-turrita, laevis, livescenti-albida, strigis nonnullis fuscidulis signata; spira elongata, acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira brevior; apertura angusta, oblonga, intus fuscescens; perist. simplex, margine columellari vix revoluto, perforationem minimam tegente. — Long. 23, diam. 9 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 256.)

Bulimus livescens Pfr. Symb. II. p. 48.

β. Fasciis 3 angustis, rufis. (Similis B. pulchello Conch. Ill. f. 17.)

Habitat in Mexico, var. *β* ad Tehuacan (Hegewisch).

471. **B. cactivorus Broderip.**

T. subperforata, ovato-oblonga, tenuis, costulato-striata, nitidula, albida; spira conica, apice acutiuscula, nigricans; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella vix arcuata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari anguste reflexo, appresso. — Long. 23, diam. 10½ mill. Ap. 11 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 257.)

Bulimus cactivorus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.

— — *Müll.* synops. p. 17.

Bulimus cactivorus Lam. ed. Dh. 101. p. 270.

Plectostylus cactivorus Beck ind. p. 58. N. 5.

Habitat in Columbia, ubi ad montem Christi legit H. Cuming.

472. **B. Ziegleri Pfr.**

T. subperforata, ovato-conica, tenuis, confertim striatula, lineis spiralibus sub lente obsolete decussata, albida; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus medio subangulatus, spira paulo brevior; columella paulo recedens; apertura ovalis; perist. simplex, margine columellari breviter reflexo, subappresso. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 258.)

Bulimus Ziegleri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 113.

β? T. pellucida, lutescens, fasciis castaneis (supremis maculose interruptis) cincta.

Habitat in America centrali (Largilliert) et in republica mexicana? (Liebmann.)

473. B. Menkei Gruner.

T. subperforata, oblongo-acuta, tenuis, laevigata, albida, fasciis 3 nigris (2 basalibus confluentibus, tertia suturali) strigisque castaneis ornata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella oblique recedens; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, nigrum, margine columellari dilatato, fornicato-reflexo, appresso. — Long. 21, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, $4^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 259.)

Bulimus Menkei Grun. in Wiegm. Arch. 1841. I. p. 277. t 11. f. 2.

Habitat prope Orinoco reipublicae Venezuelae.

474. B. Sayi Pfr.

T. subperforata, ovato-oblonga, solidiuscula, confertim rugoso-plicata, nitida, alba, strigis pellucidis, fuscis ornata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexi, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus, circa perforationem obsoletam fusco-areolatus; columella leviter arcuata; apertura elliptico-oblonga, intus fusco-carnea; perist. simplex, margine columellari breviter reflexo, subappresso. — Long. 20, diam. 9 mill. Ap. 10 mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Sayi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 114.

Habitat . . . ?

475. B. discrepans Sowerby.

T. vix perforata, oblongo-conica, laevigata, nitida, fulvescenti-alba, strigis angustis, obliquis, rufis, remotis ornata; anfr. 6 convexi, ultimus spira brevior, obsolete unifasciatus; columella subrecta; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari superne dilatato-appresso, perforationem occultante. — Long. 19, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 260.)

Bulinus discrepans Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 72.
— — *Müll.* synops. p. 27.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 52.
Bulimulus discrepans Beck ind. p. 65. N. 26.
Bulimus discrepans Lam. ed. Dh. 122. p. 179.

Habitat in America centrali; prope Conchagua legit H. Cuming.

476. B. nitidus Broderip.

T. subimperforata, fusiformis, obtuse costulato-striata, nitida, albida, strigis crebris spadiceis et fuscis vel castaneis ornata; spira turrito-conica, apice nigricans, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus subangulatus, spira paulo brevior; apertura ovalis, intus concolor; perist. simplex, acutum, marginibus vix

conniventibus, columellari brevissime reflexo, appresso. Long. 28, diam. 11 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 6½ lata. (Coll. Nr. 261.)

Bulinus nitidus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.
— — *Müll.* synops. p. 18.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 2.
Bulimus nitidus Lam. ed. Dh. 102. p. 271.
Bulimulus nitidulus Beck ind. p. 67. N. 52.

Habitat in Peruvia; prope Tumbez legit H. Cuming.

477. **B. tenuis Anton.**

T. subperforata, oblongo-ovato-conoidea, tenerrima, decussatim subtiliter striata, concolor cornea, nitida; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram fere aequans; apertura acute ovalis; perist. acutum, margine columellari perforationem suboccultante. — Long. 9, diam. 4¼ lin. (A.)

Bulimus tenuis Ant. Verz. p. 42. N. 1523.
— *corneus Dh.?* (Ant.)

Habitat . . . ?

478. **B. guttatus Broderip.**

T. subperforata, ovato-fusiformis, ruguloso-striata, tenuis, pellucide cornea, strigis et guttis albis, opacis variegata; spira conica, apice papillaris; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; apertura ovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari superne dilatato, fornicatim reflexo, perforationem suboccultante. — Long. 18, diam. 8 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 262.)

Bulinus guttatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.
— — *Müll.* synops. p. 18.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 10.
Bulimus guttatus Lam. ed. Dh. 103. p. 271.
Bulimulus guttatus Beck ind. p. 68. N. 69.

Habitat in Peruvia: Cobija s. Puerto de la Mar (Cuming).

479. **B. mozambicensis Pfr.**

T. obtecte perforata, ovato-turrita, laevigata, nitida, albida, interrupte et confertim castaneo-strigata; spira conico-turrita, apice acuta, nigricans; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis aequans, medio linea nigra cinctus, basi unicolor albidus; columella subverticalis; apertura lunato-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari superne dilatato, nitido, castaneo, reflexo, appresso. — Long. 15, diam. 8 mill. Ap. 7½ mill. longa, 4¾ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Mozambicensis Pfr. Symb. III. p. 85.

Habitat in Mozambique.

480. B. pallens Jonas.

T. subperforata, ovato-conica, striatula, tenuis, fragilis, opaca, pallide straminea; spira conica, acutiuscula; anfr. 6, summi convexiusculi, reliqui subplanati, ultimus spira paulo brevior, medio angulatus; apertura ovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari brevissime reflexo, subappresso. — Long. 14, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 263.)

Bulimus pallens Jonas in Phil. Icon. I. 3. p. 53. t. 1. f. 3.

Habitat in Guinea.

481. B. guineensis Jonas.

T. subperforata, oblongo-conica, minutissime striata, tenuissima, hyalina, pallide virenti-straminea; spira conica, acuta; anfr. 6—7 convexiusculi; apertura ovato-oblonga; perist. rectum, acutum, margine columellari breviter reflexo, appresso. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 6⅓ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 264.)

Bulimus guineensis Jonas in Phil. Icon. I. 3. p. 54. t. 1. f. 4.

Habitat in Guinea.

482. B. coniformis Pfr.

T. subperforata, ovato-conica, tenuis, irregulariter striata, fuscescenti-albida, strigis obliquis, fuscis signata; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 planiusculi, ultimus spiram paulo superans, medio angulatus, basi subcompressus; columella leviter arcuata; apertura ovalis, utrinque angustata; perist. simplex, rectum, margine columellari superne dilatato, breviter reflexo, perforationem fere claudente. — Long. 12, diam. 6½ mill. Ap. 6½ mill. longa, medio 3½ lata. (Coll. Philippi.)

Bulimus coniformis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 114.

Habitat prope Merida Andium Columbiae.

* * *

483. B. turritus Brodcrip.

T. subperforata, turrita, subtiliter striata, nitida, albida, castaneo-taeniata, apice acutiuscula; anfr. 9 — 10 planiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, basi fascia latiore ornatus; columella recta; apertura ovalis; perist. simplex, margine dextro acuto, columellari superne breviter reflexo, subappresso. — Long. 26, diam. 7½ mill. Ap. 7½ mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 265.)

Bulimus turritus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 21.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 31.
Bulimus turritus Lam. ed. Dh. 112. p. 275.

Habitat in Peru; in montibus prope Truxillo legit H. Cuming.

484. B. eburneus Pfr.

T. obsolete subperforata, turrita, apice obtusa, oblique striatula, nitide alba; anfr. 9½ lente accrescentes, ultimus ¼ longitudinis subaequans; apertura oblongo-ovalis, intus carnea; perist. acutum, intus subtiabiatum, margine columellari reflexiusculo. — Long. 23, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 266.)

Bulimus eburneus Pfr. Symb. II. p. 44.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 58. t. 1. f. 16.

Habitat prope Hierosolymam.

Obs. Affinis B. taurico (Nr. 618), forma regulariter turrita, apertura parva et perforatione obsoleta diversus.

§. 30.

485. B. Adansoni Pfr.

T. perforata, ovato-conica, tenuis, exilissime et irregulariter striata, pallide lutea, flammis longitudinalibus luteis ornata; spira conica, apice subacuta, alba; anfr. 8—9 convexiusculi, ultimus spiram vix aequans, vel brevior; columella verticalis, ad basin aperturae recte descendens; apertura subovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 63, diam. 30 mill. Ap. 32 mill. longa, medio 17 lata. (Coll. Nr. 267.)

Bulimus Adansoni Pfr. Symb. II. p. 110.
— *Kambeul Brug.* Enc. méth. I. p. 322. N. 40.
— — *Lam.* 15. p. 121. ed. Dh. p. 227.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 145. t. 13. f. 11. 12.
— *speciosus Parr.*
— *xantholinus* et *achatinoides Zgl.*
Helix Kambeul Dillw. descr. cat. II. p. 932. N. 105.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 388. Hist. t. 141 A. f. 1. 2.
— — *Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 42.
— *flammata Cailliaud* voy. IV. p. 264. t. 60. f. 5.
Achatina flammea Oken Naturg. V. 1. p. 424.
Limicolarius Kambeul Beck ind. p. 60. N. 4.
Kambeul Adans. Sénégal p. 14. t. 1. f. 1.

β. Solidior, subunicolor, lutescens, vel pallide rufo obsolete strigatus: long. 83, diam. 38 mill. (ex ic. Fér.) — Long. 52, diam. 25 mill. Ap. 25 mill. longa, 13 lata. (Spec.)

Helix aedilis (Cochlogena) *Fér.* pr. 390. Hist. t. 141 A. f. 4. 5.
— *flammata var. Caill.* voy. IV. p. 264. t. 60. f. 4.
Bulimus Kordofanus Parr. in sched.

γ. Tenuis, lutescenti-rubellus: long. 59, diam. 23 mill. Ap. 25 mill. longa, 12 lata. (Spec.)

Habitat in Africa: Senegal, Guinea, Syria, Egypto etc.; var. β circa Mouna, Sennâr (Caill.).

486. B. Rüppellianus Pfr.

T. umbilicata, ovata, minutissime granulosa, albida, flammis longitudinalibus, undulatis, rufis picta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus ventrosus, spiram vix superans, basi subcompressus; sutura crenulata; apertura subauriformis; perist. tenue, margine columellari stricto, fornicato, late reflexo, umbilicum semitegente. — Long. 53, diam. 34 mill. Ap. 29 mill. longa, 14½ lata. (Coll. Nr. 268.)

Bulimus Rüppellianus Pfr. Symb. II. p. 50.
— *abyssinicus Coll.* Nec Rüpp.

Habitat in Abyssinia.

Obs. Differt a B. Adansoni spira breviore, obtusa et superficie regulariter granulosa.

487. B. flammeus (Helix) Müller.

T. perforata, oblonga, laevis, striatula, nitida, alba, fulvida vel rosea, strigis subrectis, rufis vel nigricantibus ornata; spira turrita, apice obtusa; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans, praecedentibus vix latior; columella verticalis, ad basin aperturae oblongae protracta; perist. simplex, acutum, margine columellari fornicatim revoluto. — Long. 55, diam. 19 mill. Ap. 21 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 269.)

Helix flammea Müll. verm. II. p. 87. N. 285. *)
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 932. N. 104.
— — (Cochlogena) *Fér.* pr. 389. Hist. t. 141. f. 1—10. t. 141 A. f. 3.
Bulla flammea Chemn. IX. P. 2. p. 32. t. 119. f. 1024. 25!
Bulimus flammeus Brug. Enc. méth. I. p. 322. N. 41.
— *Kambeul Küst.* p. 10. t. 1. f. 5. 6.
Limicolaria flammea Schumach. p. 200.
Limicolarius flammeus Beck ind. p. 60. N. 5.
Achatina elongata Swains. Malac. p. 174.
β. Bulimus Sennaariensis Parreyss.

Habitat in Africa occidentali.

Obs. Cl. Müller speciem ab Adansonio Kambeul dictam synonymam Helicis flammeae laudat; Cl. Bruguière primus utramque distinxit ex forma elongata, fere turrita, vel magis ovata. Attamen difficile est, constituere limites certas inter diversissimas formas huc pertinentes. Bul. abyssinicus quoque vix a flammeo stricte separari potest. — Forma, magnitudo et longitudo spirae, nec non colores, in speciebus 3 enumeratis pervariabiles.

*) T. perforata, oblonga, alba, fasciis longitudinalibus rufis; axi reflexo, recto. — Long. 18 — 28, lat. 9 — 11 lin. — T. tenera, pellucida, glabra, albida, achatina, fasciis longitudinalibus subundatis, saturate rufis, seu cruentis. Anfr. 8 vel 9, aequaliter decrescentes, maximus non ventricosus. Apertura... fere triangularis. Labrum exterius acutum, indestinctum, etc. (Müll. l. c.)

487ª. B. flammulatus Pfr.

T. perforata, turrito-oblonga, tenuis, striatula, non nitens, pellucida, corneo-lutescens, rufo sparsim flammulata; spira subturrita, apice obtusa; anfr. 7 planiusculi, medii minutissime reticulati, ultimus vix latior, ⅓ longitudinis paulo superans; columella verticalis; apertura oblique truncato-oblonga, basi vix angulata; perist. simplex, rectum, margine columellari compresse reflexo, sursum sensim dilatato. — Long. 29, diam. 12 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 6⅓ lata. (Coll. Largilliert.)

Bulimus flammulatus Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 147.

Habitat . . . ?

488. B. striatulus (Buccinum) Müller. †

T. conica, alba, striata, axi recto reflexo. — Long. 14—22, lat. 6—8 lin. (Müll.)

Buccinum striatulum Müll. verm. II. p. 147. N. 335.
Bulla striatula Gmel. p. 3430. N. 27.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 492. N. 48.
Bulimus striatulus Brug. Enc. méth. I. p. 329. N. 54.
Helix striatula (Cochlogena) *Fér.* pr. 387.
Limicolarius striatulus Beck ind. p. 61. N. 7.

Habitat in Guinea.

Obs. 1. «A Bucc. strigato tantum differt, quod tota alba, absque vestigio strigarum, et quod striis praesertim in anfractibus minoribus, oculo armato videndis, subelevatis instructa sit. Apertura ovata, margo absque labro, labium in anfractu vicino; axis rectus, perforatus, reflexus». (Müll. l. c.)

Obs. 2. Etsi a Cl. Müllero alii generi ascripta, tamen haec species a Férussac et Beck inter proxime affines Helicis flammeae Müll. enumeratur, ad cujus varietates forsan referenda est.

489. B. strigatus (Buccinum) Müller. †

T. conico-acuminata, glabra, strigis undulatis fulvis, axi recto reflexo. — Long. 2 unc. 3 lin., lat. 1 unc. — Inter Bucc. fasciatum et striatum medium. (Müll.)

Buccinum strigatum Müll. verm. II. p. 148. N. 336.
Bulla strigata Gmel. p. 3430. N. 26.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 492. N. 47.
Helix flammata (Cochlogena) *Fér.* pr. 385.
Limicolarius strigatus Beck ind. p. 61. N. 6.

Habitat in Africa (Fér.), Guinea (Beck).

Obs. 1. «Testa alba, glabra, absque striis distinctis; strigae longitudinales serpentinae, aequidistantes, fulvae. Anfractus 8, minus elongati, quam in Bucc. striato. Apertura ovato-oblonga, pallide caerulescens, strigis pellucentibus. Margo absque labro; labium exiguum in anfractu aperturae opposito pluribus solitum; axis rectus, reflexus, perforatus». (Müll. l. c.)

Obs. 2. Hanc speciem esse ipsissimum Bul. Kambeul, valde suspicor ex descriptione et ex synonymis Beckianis, qui varietates sequentes distinguit: «a. pictus (H. flammata Fér.!): α. flammis distinctis nigro-castaneis, β flammis rufis distinctis (an Fér. t. 141. f. 7?), γ. flammis rufis obsoletis, δ. flammis rufis coalitis (Fér. t. 141. f. 4. 5.); b. bicolor (Hel. aedilis Fér.!); c. unicolor: α. rufescens, β. pallide flavus, γ. albus (Fér. t. 141. f. 9, Bul. bootis var. microstoma Menke syn. ed. II. p. 20! Hel. flammata var. alba Fér. in Caill.)» — Sed quibusnam notis specificis Cl. Beck distingui vult Limicolarium Kambeul, flammeum, strigatum, striatulum et Babel Fér.?

Obs. 3. Formatio columellae in omnibus speciebus Bulimo Adansoni affinibus tam peculiaris est, ut genus Limicolaria Schum. forsan adoptandum erit. Tunc, quando ex cognitione permultorum speciminum ex omnibus regionibus Africae limites variationum in singulis cum certitudine aliqua constituta erunt, 6 — 7 bonas species hujus generis distingui posse suspicor.

* * *

490. B. decoratus Lea.

T. perforata, fusiformis, striatula, glabra, nitida, viridi-fusco et albo alternatim fasciata; spira conica, acutiuscula, apice rubra; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spira paulo brevior, basi compressus, angulatus; columella antrorsum arcuata, purpurea; apertura subrhombea, intus fasciata; perist. simplex, tenue, margine dextro recto, columellari breviter reflexo, perforationem occultante. — Long. 27, diam. 10½ mill. Ap. 12 mill. longa, medio 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus decoratus Lea obs. II. p. 86. t. 23. f. 108. *)

Habitat prope Carthagena (Lea), in Chimborazo.

491. B. quitensis Pfr.

T. umbilicata, ovato-conica, solidula, ruguloso-striata, pallide fuscescens, strigis variis fuscis et castaneis variegata; spira conica, acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus convexus, spiram vix superans, basi juxta umbilicum angustum, apertum compressus, nigricans; columella recta, verticalis, nigricans; apertura oblonga, ad basin columellae subangulata, intus nigricanti-limbata; perist. simplex, rectum, marginibus subparallelis, dextro superne repando, columellari dilatato, patente. — Long. 26, diam. 12 mill. Ap. 14 mill. longa, intus medio 6 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus quitensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat prope Quito reipublicae Aequatoris (Delattre).

Obs. Similis B. striato King. Conf. Nr. 573.

---

*) T. subturrita, imperforata, nitida, crocea, trifasciata; anfract. 6 convexiusculis; apertura ovata, canaliculata; labro subreflexo; columella arcuata. — Diam. 0,5, long. 1,2 poll. (Lea l. c.)

492. B. nux Brodcrip.

T. rimato-perforata, ovato-pyramidata, solidula, rugosa, castanea, interdum lineis concentricis, impressis notata; spira pyramidata, acutiuscula; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus inflatus, $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella brevis, subrecta; apertura oblonga, intus livida; perist. simplex, marginibus subparallelis, callo tenui junctis, dextro recto, acuto, columellari perdilatato, patente, subincrassato. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 270.)

Bulimus nux Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 125.
— *Müll.* synops. p. 24.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 37. 37 *.
Bulimus nux Lam. ed. Dh. 116. p. 276.
Buliminus nux Beck ind. p. 70. N. 27.

Habitat in insulis Gallopagos, ubi legit H. Cuming.

493. B. Dysoni Pfr.

T. anguste perforata, oblongo-ovata, solidula, tenuiter longitudinaliter striata, subdiaphana, fusco-cornea; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 6—6½ convexi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata, basin attingens; apertura elliptica, basi subangulata; perist. simplex, rectum, marginibus callo tenui junctis, dextro arcuato, cum columellari, superne dilatato, fornicatim reflexo, angulum formante. — Long. 20, diam. 9½ mill. Ap. 9 mill. longa, medio 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Dysoni Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 39.

Habitat in Honduras (Dyson).

494. B. irregularis Pfr.

T. umbilicata, ovato-oblonga, solidula, plicis confertis, longitudinalibus rugosa, carnea, fusculo substrigatim variegata; spira conica, acutiuscula, apice rufa; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spira vix brevior, circa umbilicum angustum, non pervium subangulato-compressus; columella leviter arcuata; apertura elliptica, basi subangulata; perist. simplex, rectum, margine columellari a basi reflexo, superne dilatato. — Long. 19, diam. 9 mill. Ap. 10 mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus irregularis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat prope Quito reipublicae Aequatoris (Lattre).

495. B. sculpturatus Pfr.

T. perforata, ovato-turrita, tenuiuscula, longitudinaliter subremote et valide undulato-rugosa, interstitiis rugarum spiraliter argute striata, fuscula; spira elongato-conica, apice acutiuscula,

cornea; anfr. 7 convexi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella stricta, basin aperturae attingens; apertura elliptica, basi angulata; perist. simplex, acutum, margine columellari fornicatim reflexo, libero. — Long. 14, diam. 6½ mill. Ap. 6½ mill. longa, $3^2/_3$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus sculpturatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 29.

Habitat in insulis Gallopagos (Darwin).

§. 31.

496. B. Kraussi Pfr.

T. perforata, ovato-acuta, solidiuscula, irregulariter rugosa, striis longitudinalibus et transversis confertis granulata, sub epidermide castanea, decidua albida, spadiceo-nebulosa et maculata; spira pyramidata, apice obtusa; anfr. 7 — 8 planiusculi, ad suturam crenulato-rugosi, ultimus spiram subaequans; columella arcuata, subtorta, compressa, castanea; apertura ovalis, intus lactea; perist. simplex, acutum, castaneo-limbatum, marginibus callo castaneo, introrsum diffuso junctis, columellari angulatim reflexo, perforationem suboccultante. — Long. 100, diam. 50 mill. Ap. 52 mill. longa, 33 lata. (Coll. Krauss.)

Bulimus Kraussi Pfr. Symb. III. p. 85.

Habitat in sylvis ad fluvium Umlaas, Natal (Krauss).

497. B. clobatus Gould. †

T. solidula, elongato-ovata, longitudinaliter plicoso-striata et lineolis volventibus interruptis corrosa, epidermide sordide luteo et viridi marmorata induta, arcte umbilicata; anfr. 5 convexi, ultimus magnus; apertura angusta, subelliptica; labrum simplex, obtusum, aurantium; plica columellaris perobliqua. — Long. 2", lat. $1^4/_5$ poll. (G.)

Bulimus elobatus Gould 1846. Exped. shells p. 31.

Habitat in insulis Feejee.

Obs. «Affinis B. fulgurato et malleato, major et peristomate non reflexo distinctus».

498. B. Favannii Lamarck.

T. perforata, ovato-acuta, solidula, irregulariter plicato-striata, castanea, fascia unica, lata, alba in medio strigisque albis notata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 7 planulati, ultimus spiram aequans; columella brevis, obliqua; apertura ovato-acuta, intus albida; perist. simplex, rectum, marginibus callo junctis, columellari latissimo, patulo, supra perforationem reflexo. — Long. 53, diam. 27 mill. Ap. 27 mill. longa, 16 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Favannii Lam. 14. p. 120. ed. Dh. p. 227.

Bulimus Favannii Deless. recueil t. 27. f. 8.
— *cinctus Jay* catal. 1839. p. 111. t. 1. f. 1.*)
Helix Favannii (Cochlogena) *Fér.* pr. 408.
Habitat . . . ? (Calcutta: Jay.)

499. B. crassilabris Gray.

T. perforata, ovato-acuta, crassa, laevigata, nitida, alba, fusco-nebulosa, medio albo-fasciata; spira conica, apice obtusa; anfr. 7 angusti, planiusculi, ultimus ventrosus, spiram aequans; columella subrecta, recedens; apertura acute ovalis; perist. simplex, marginibus callo crasso junctis, columellari perdilatato, crasso, reflexo, perforationem fere obtegente. — Long. 35, diam. 19 mill. Ap. 19 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming. et Gray.)

Bulimus crassilabris Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.
— — *Müll.* synops. p. 15.
β. T. subtiliter costulato-striata, apice rosea, anfractu ultimo fulvo, fascia 1 lata ornato.
Habitat in insula Madagascar.

500. B. thamnoicus Orbigny.

T. perforata, ovato-acuta, crassiuscula, rugoso-striata, interdum lineis impressis, spiralibus subreticulata, fusco-grisea, unicolor vel fasciis 3—5 latis spadiceis cincta; anfr. 6—7 vix convexiusculi, ultimus spiram paulo superans, subventrosus; columella strictiuscula, brevis, alba; apertura oblongo-ovalis, intus albida vel subfasciata; perist. simplex, margine dextro acutiusculo, columellari dilatato, patente. — Long. 47, diam. 24 mill. Ap. 27 mill. longa, 15 lata (Coll. Nr. 271.)

Helix thamnoica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 16.
Bulimus thamnoicus Orb. voy. p. 290. t. 37. f. 4—9.
Bulinus thamnoicus Sow. Conch. Ill. f. 70. 71.
Buliminus thamnoicus Beck ind. p. 69. N. 12.
β. Minor: long. 34, diam. 20 mill.
Bulinus thamnoicus var. Sow. Conch. Ill. f. 72.
γ. Marmoratus.
Habitat in Bolivia.

501. B. Petiti Pfr.

T. perforata, ovato-conica, solidula, longitudinaliter rugoso-striata, striis concentricis, irregularibus obsoletissime subdecussata, fusca; spira conica, apice obtusa, pallida; sutura crenulata,

*) T. ovato-acuta, glabra, castanea, cingulo lato albo et strigis albis notata; anfr. 8 planiusculis, ultimo spiram subaequante; columella late expansa, alba; apertura ovali; perist. subincrassato, albo. — Long. 26, diam. 13 lin. (Jay l. c.)

albido-marginata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella leviter arcuata; apertura acuto-ovalis, intus nitidula, livida; perist. simplex, rectum, margine dextro acuto, columellari dilatato, albo, libere reflexo. — Long. 36, diam. 16 mill. Ap. 19 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Petiti Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 31.

Habitat in Peru.

Obs. Similis B. taeniolo Nyst Nr. 544.

502. B. rhodostomus Gray.

T. anguste umbilicata, ovata, solida, striata, superne lineis concentricis obsolete decussata, fulvida, roseo-nebulosa, obsolete fusco-fasciata; spira conica, acuta; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus spiram vix superans; sutura subcrenulata; columella subrecta; apertura ovali-oblonga, intus rosea; perist. simplex, obtusum, marginibus subparallelis, columellari fornicato-reflexo. — Long. 31, diam. 17 mill. Ap. 17½ mill. longa, 8½ lata. (Mus. Cuming. et Gray.)

Bulimus rhodostomus Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 65.
— — *Müll.* synops. p. 15.

Habitat in Nova Hollandia?

503. B. indutus Menke.

T. subperforata, solida, ovato-acuta, utrinque attenuata, rugulosa, albida, epidermide tenui, corneo-lutea induta; sutura irregulariter crenulata; anfr. 5½ planiusculi, ultimus spiram aequans; columella superne incrassata, late reflexa, carnea; apertura oblongo-ovalis, intus nitide lactea; perist. simplex, acutum. — Long. 35, diam. 17 mill. Ap. 20 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 272.)

Bulimus indutus Menke Moll. Nov. Holl. p. 6.

Habitat in Nova Hollandia juxta fluvium Cygnorum ad jugum montium Darlingsrange et ad montem Elizae.

504. B. Jussieui Valenciennes.

T. perforata, ovato-conica, striis rudibus incrementi spiralibusque minutis irregulariter decussato-granulata, cornea, oblique albido et luteo strigata, spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella recedens, subarcuata; apertura ovalis, intus nitide alba; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, albido, subfornicatim reflexo. — Long. 32, diam. 15 mill. Ap. 17 mill. longa, infra medium 10 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Jussieui Val. in Mus. Paris.

Bulimus Jussieui Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 33.

β. Minor, striis fortioribus, albidus, apice corneus: long. 26, diam. 13 mill. Ap. 14 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat prope Cusco Peruviae.

505. B. Schiedeanus Pfr.

T. perforata, ovato-acuta, calcarea; alba, longitudinaliter et irregulariter rugoso-striata; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spiram aequans; apertura ovali-oblonga, intus fulvida; columella obsolete plicata; perist. simplex, acutum, marginibus callo nitido junctis, columellari late reflexo, nitido, albo. — Long. 31, diam. 17 mill. Ap. 17 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 273.)

Bulimus Schiedeanus Pfr. Symb. I. p. 43.

— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 56. t. 1. f. 12.

β. Minor, apertura paulo minore, anfractibus planioribus: long. 26, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (Spec.)

Bulimus xanthostomus Wiegm. in Mus. Berol. olim.

— *candidissimus Nyst* in litt.

Habitat in republica mexicana.

506. B. lactarius Menke.

T. rimata vel perforata, ovato-acuta, pallidissime fulvida, strigis lacteis, opacis, longitudinalibus, denticulatis et fimbriatis ornata; spira conica, acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, reflexo. — Long. 27, diam. 14 mill. Ap. 14 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 274.)

Bulimus lactarius Mke mss. *Pfr.* Symb. III. p. 85.

— *Galeottii Nyst* in litt.

Habitat in republica mexicana.

Obs. Differt a B. Schiedeano testa laevigata, diaphana, strigata, columella brevi, inde apertura magis regulariter ovali, etc.

507. B. dealbatus (Helix) Say.

T. aperte perforata, ovato-conica, striata, solida, cretacea, alba; spira conica, apice obtusiuscula; sutura profunda; anfr. 6—7 convexi, ultimus ventrosus, spiram subaequans; columella strictiuscula; apertura ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 18, diam. 10⅓ mill. Ap. 9½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 275.)

Helix dealbata Say in Philad. journ. II. p. 159.

Bulimus dealbatus Pot. et *Mich.* gal. I. p. 139. t. 13. f. 3. 4.

— — *Phil.* Icon. I. 7. p. 158. t. 2. f. 6.

— — *Küster* t. 16. f. 11—13.

Buliminus dealbatus Beck ind. p. 72. N. 51.
Zebrina dealbata Held in Isis 1837. p. 917.
β. T. tenuiore, diaphana, cornea, albido strigata et marmorata.
Habitat in America boreali, Alabama; var. β rar. in Tennessee.

508. B sordidus Lesson.

T. perforata, ovato-conica, granulato-striata, sordide fuscescens; spira conica, acuta; anfr. 6—7, summi planiusculi, ultimus ventrosior, spiram paulo superans; columella subverticalis; apertura ampla, ovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari supra perforationem dilatato-reflexo. — Long. 20, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa. (ex ic.)

Helix sordidus Less. voy. de la Coq. p. 315. t. 13. f. 3. *)
— *sordida* (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10.
Bulimus sordidus Pot. et *Mich.* gal. I. p. 155. t. 15. f. 11. 12.
— — *Orb.* voy. p. 281.
— — *Küster* t. 18. f. 7—9.
Habitat in Monte S. Cristoval prope Lima (Less.)

Obs. Conf. B. Proteus Brod. (Nr. 153), saepe cum hac specie confusus.

509. B. melo (Helix) Quoy et Gaimard.

T. subobtecte perforata, ovata, solida, longitudinaliter, praesertim ad suturam, rugoso-striata, alba, flammis rubescentibus fasciaque suturali rufescente interdum ornata; anfr. 5 planiusculi, ultimus ventrosus, 1/2 longitudinis subaequans; columella brevis, carnea; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari fornicatim reflexo. — Long. 26, diam. 15 mill. Ap. 16 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 276.)

Helix melo Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 109. t. 9. f. 4—7.
— *melones* (Cochlogena) *Fér.* pr. 406.
Bulimus melo Lam. ed. Dh. 53. p. 245.
— — *Sow.* in Zool. Beech. voy. p. 145. t. 38. f. 16.
— — *Menke* Moll. Nov. Holl. p. 7.
— *melones Pot.* et *Mich* gal. I. p. 147. t. 13. f. 15. 16.
Bulimulus melo Beck ind p. 68. N. 76.
Habitat in Nova Hollandia.

---

*) La bouche est droite, obovalaire, ouverte dans le sens de l'axe. Le bord droit est le plus étendu, le gauche est dilaté en lame, qui s'insère au devant de l'ombilic. Celuici est évasé à l'entrée, puis rétréci en fente étroite. Les tours supérieurs de la spire sont serrés, séparés par un sillon linéaire. Le dernier tour est allongé, très ventru, dilaté et convexe. Sa surface est legèrement striée et chaque strie est finement granuleuse. Le péristome est simple dans le jeune âge, dejeté dans l'âge adulte. Cette coquille n'a ordinairement que 5‴ de diam. sur 9‴ de hauteur, mais il y en a qui ont 12 sur 18. L'épiderme est fauve sâle. (Lesson l. c.)

510. **B. ponderosus Jan.** †

T. ovata, ventricosa, perforata, lactea; apertura ampla, ovata; perist. labio columellari subreflexo. — Long. 1″, diam. 7‴. Ap. 6‴ longa, 4‴ lata. (Jan.)

Bulimus ponderosus Jan Mantissa p. 3.

Habitat in Peru.

Obs. Specimen collectionis Grunerianae, a Zieglero olim hoc nomine designatum, descriptioni bene congruum et B. nucleo simillimum, characteres testae fossilis exhibere videtur.

511. **B. bulla Menke.**

T. perforata, elliptico-ovata, solidiuscula, longitudinaliter striata, sub epidermide tenui virescenti-flava albida, vittis vel fasciis fuscis picta; anfr. 6 convexi, superius ad suturam marginati et fimbriati; spira mediocris, obtusa; aperturae elliptico-ovatae faux alba; columella recta; labrum acutum. — Long. 10, lat. 6 lin. (Mke.)

Bulimus bulla Menke Moll. Nov. Holl. p. 7.

β. Minor, long. 7, lat. 5‴.

Habitat in Nova Hollandia, ad jugum montium Darlingsrange.

512. **B. inflatus Lamarck.**

T. perforata, ovata, ventrosa, longitudinaliter striata, solida, squalide alba; spira conica, obtusiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus spiram vix superans; columella subarcuata; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo, umbilicum non occultante. — Long. 19, diam. 11 mill. Ap. 10½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 277.) — Long. 27, diam. 14 mill. (ic. Deless.)

Bulimus inflatus Lam. 19. p. 122. ed. Dh. p. 230.

— — *Deless.* recueil t. 28. f. 1.

— *costulatus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 138. t. 12. f. 17. 18.

Helix costulata (Cochlogena) *Fér.* pr. 405. (ex Lam.)

Bulimulus inflatus Beck ind. p. 68. N. 75.

Habitat in Nova Hollandia.

513. **B. badius Sowerby.**

T. perforata, ovato-acuta, solidula, ruguloso-striata, fulvescens, fasciis interruptis punctisque seriatis rufis variegata; spira conica, acuta; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella subrecta; apertura ovalis, intus albida; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, fornicato, reflexo,

perforationem semioccultante. — Long. 26, diam. 13½ mill. Ap. 15 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 278.)

Bulinus badius Sow. in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 141.
— — *Müll.* synops. p. 31.

Habitat in Peruviae provincia Xagua (Matthews).

514. B. erythrostoma Sowerby.

T. aperte perforata, ovato-acuta, solida, rugoso-striata, lineis concentricis minutissimis obsolete granulata, alba, nitida; anfr. 6 convexi, ultimus spiram conicam, obtusiusculam superans; columella subrecta; apertura rotundato-ovalis; intus cum fauce saturate sanguinea; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, expanso. — Long. 26, diam. 15 mill. Ap. 15 mill. longa, 9½ lata. (Coll. Nr. 279.)

Bulinus erythrostoma Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — *Müll.* synops. p. 26.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 50.
Bulimus erythrostoma Lam. ed. Dh. 120. p. 278.
Bulimulus erythrostoma Beck ind. p. 68. N. 72.

Habitat in Chile, prope Huasco (Cuming).

515. B. albus Sowerby.

T. semiobtecte perforata, ovato-conica, solidula, irregulariter striata, nitida, alba, apice rubra; anfr. 5 convexi, ultimus subglobosus, ⅗ longitudinis subaequans; columella recta; apertura rotundato-ovalis, intus carneo-fuscidula; perist. simplex, acutum, marginibus callo carneo junctis, columellari dilatato, reflexo. — Long. 22, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 8½ lata. (Coll. Nr. 280.)

Bulinus albus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 28.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 51.
Bulimus albus Lam. ed. Dh. 99. p. 269.
— — *Orb.* voy. p. 280.
Helix olorinus (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 11.
Bulimulus albus Beck ind. p. 68. N. 74.

β. T. punctulis corneis aspersa.

γ. Strigis latis, pellucidis, corneis ornata, apice pallide cornea.

δ. T. fragili, interdum subelongata: long. 17, diam. 13 mill.
Bulimus olorinus Duclos in Guérin. mag. 1833. t. 24.

Habitat in Chile, prope Copiapo (Cuming); Peru (Orb.); var. *γ* ad Questa de Arenas prope Huasco (Bridges); var. *δ* Chile (Gay).

516. B. conspersus Sowerby.

T. perforata, ovato-subacuminata, tenuis, cornea, albido-guttulata et lineata; spira conica, attenuata, apice acutiuscula;

anfr. 6 convexi, ultimus spiram vix aequans; columella oblique recedens; apertura ovalis, intus nitida; perist. acutum, tenue, margine columellari superne dilatato, reflexo, fornicato. — Long. 20, diam. 10 mill. Ap. 10½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 281.)

Bulinus conspersus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 28.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 49.
— — *Sow.* Zool. of Beech. voy. t. 38. f. 17.
Bulimus conspersus Orb. voy. p. 280.
Helix conspersa (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10.
Bulimulus conspersus Beck ind. p. 68. N. 73.

β. T. pallide rosea, punctis corneis aspersa, apice et columella saturate roseis.

Habitat prope Lima Peruviae (Cuming), var. β in Chile.

517. B. albicans Brodcrip.

T. perforata, ovato-acuta, ruguloso-striata, fusca, lineolis confertis strigisque longitudinalibus albis ornata; spira conica; anfr. 6 convexi, ultimus spiram subaequans; columella strictiuscula; apertura ovalis, intus rubescenti-fusca; perist. simplex, acutum, rectum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 19, diam. 10½ mill. Ap. 10 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 282.)

Bulinus albicans Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 105.
— — *Müll.* synops. p. 20.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 22.
Helix albicans (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 9.
Bulimus albicans Lam. ed. Dh. 110. p. 274.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 135. t. 14. f. 7. 8.
Bulimulus albicans Beck ind. p. 68. N. 71.

β. T. albida, roseo-strigata, apice, columella et margine aperturae interno roseis: long. 20, diam. 12 mill. (Spec.)
Bulinus albicans var. Sow. Conch. Ill. f. 22 *.

γ. T. cornea, albido-conspersa:
Bulimus Spixii Pot. et *Mich.* gal. I. p. 155. t. 15. f. 13. 14.
— *conspersus Pot.* et *Mich.* l. c. in ind. p. 19.

Habitat in Chile; legit H. Cuming ad Copiapo; var. β in deserto inter Huasco et Copiapo (Bridges).

* *
*

518. B. Chemnitzii Küster. †

T. trochiformis, perforata, nitida, laevis, sinistrorsum gyrata, in primo anfractu carinata, longitudinaliter strigata; anfr. 6 convexiusculi; apertura lunaris, angulata; columella brunnea: perist.

simplex, acutum. (Chemn.) — Long. 28, diam. 19 mill. Ap. 15 mill. longa, medio 11 lata. (ex ic.)

Bulimus Chemnitzii Küst. p. 47. t. 14. f. 11. 12.
Helix trochoides contraria Chemn. X. p. 369. t. 173. f. 1686. 87.
— — *Gmel.* p. 3642. N. 249.

Habitat in India orientali.

Obs. An revera hujus generis?

519. B. spadiceus Menke.

T. umbilicata, globoso-conica, rugoso-striata, rufa, epidermide tenui, decidua, margaritacea obducta; spira conica, acuta; anfr. 6 convexi, ultimus spiram subaequans, carinatus; umbilicus angustus, pervius; apertura lunato-ovalis, intus margaritacea; perist. simplex, acutum, margine columellari superne valde dilatato, libero, umbilicum semioccultante. — Long. 19—22, diam. 14—15 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 9 lata. (Coll. Nr. 283.)

Bulimus spadiceus Mke mss. *Pfr.* Symb. III. p. 87.
— — *Phil.* Icon. II. 13. p. 123. t. 5. f. 3.
β. Minor, fusco-corneus: long. 18, diam. 12 mill.
Bulimus caffer Krauss in litt.

Habitat in sylvis ad fluvium Umlaas, Natal (Krauss).

520. B. pemphigodes Jonas.

T. perforata, globoso-conica, tenuissima, fragilis, hyalina, nitida, epidermide straminea, opaca induta; spira brevis, acuta; anfr. 5½ convexiusculi, subtilissime striati, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, medio obsolete angulatus; columella leviter arcuata; apertura lata, ovalis; perist. simplex, tenue, vix expansiusculum, marginibus remotis, columellari superne dilatato, fornicatim reflexo. — Long. 17, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 7½ lata. (Coll. Jonas.)

Bulimus pemphigodes Jon. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 12.
— — *Phil.* Icon. II. 14. p. 155. t. 6. f. 7.
— *vesiculosus Jonas* olim in litt.

Habitat in Guinea.

* * *

521. B. velutinus Pfr.

T. perforata, ovato-inflata, tenuis, striis concentricis confertissimis et obliquis minutissimis decussata, velutina, saturate rufa; spira conica, acuta; anfr. 5 convexiusculi, ultimus ⅘ — ⅚ longitudinis subaequans, inflatus; apertura ampla, ovalis, intus nitide rufa; perist. simplex, acutum, margine columellari brevissime

reflexiusculo. — Long. 22, diam. 15 mill. Ap. 14 mill. longa, 8½ lata. (Coll. Nr. 284.)

Bulimus velutinus Pfr. Symb. I. p. 42.

— *strigilosus Dufo* in Ann. sc. nat. XIV. p. 197? (Descr. nulla.)

Helix strigilosa Fér. Mus.!

Habitat in insulis Sechellis.

522. B. styliger Beck.

T. aperte umbilicata, ovato-conica, apice subito attenuata, tenuis, laevigata, albida, vittis latis fuscis, saepe interruptis circumdata; anfr. 7 convexi, ultimus spiram paulo superans, ventrosus; columella strictiuscula, rosea; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro arcuato, columellari superne in laminam triangularem dilatato, patente. — Long. 29, diam. 18 mill. Ap. 15 mill. longa, intus 9 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 285 jun.)

Bulimus vittatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31. Nec Spix.

— — *Müll.* synops. p. 18.

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 6. 6 *.

— — *Sow.* Zool. of Beech. voy. t. 38. f. 14.

Buliminus styliger Beck ind p. 70. N. 21.

Bulimus lemniscatus Lam. ed. Dh. 104. p. 271.

Habitat in Peruvia, ubi prope Ilo legit H. Cuming.

Obs. Cl. Orbigny hanc speciem distinctissimam cum B. Hennahi Gray (Nr. 536) confundere vult.

523. B. tumidulus Pfr.

T. subobtecte perforata, ovato-acuminata, tenuis, striatula, nitida, albida, lineis castaneis denticulatis taeniata et interrupte strigata; spira conica, mucronulata: mucrone corneo; anfr. 7 planulati, ultimus tumidus, spiram aequans; columella subrecta, area rubescente circumdata; apertura ovalis, intus concolor; perist. simplex, acutum, margine columellari rubicundo, fornicatim reflexo, perforationem fere occultante. — Long. 23, diam. 12 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 286.)

Bulimus inflatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1836. p. 45. *) Nec Lam.

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 61.

Bulimus tumidulus Pfr. Symb. II. p. 123.

β. Carneo-albidus, lineis paucis rufis et seriebus punctulorum ruforum ornatus.

Habitat juxta Ambo Peruviae.

---

*) T. fragili, subalbida vel flava, fusco vel castaneo maculata, anfractu basali castaneo fasciata, fasciis numerosis. — Long. 7/10, lat. 4/10 poll. (Brod. l. c.)

524. B. nigrofasciatus Pfr.

T. perforata, ovata, tenuis, sublaevigata, albido-flavicans, fasciis 5 latis nigris ornata; spira conica, apice acuta; anfr. 6 vix convexi, ultimus ventrosior, spiram aequans; columella recta, verticalis; apertura semiovalis, intus concolor; perist. simplex, rectum, margine dextro arcuato, columellari usque ad basin dilatato, fornicatim breviter reflexo. — Long. 24, diam. 12 mill. Ap. 12½ mill. longa, medio 7½ lata. (Mus. Cuming. et Gruner.)

Bulimus nigrofasciatus Pfr. in Phil. Icon. II. 13. p. 125. t. 5. f. 7.

Habitat in valle Magdalenae Novae Granadae.

525. B. Bontiae Chemnitz. †

T. perforata, conico-acuminata, ventricosa, pellucida, fragilissima, apice nigra; anfr. 6, ultimus in fundo flavescente albido fasciis 3 flavescentibus transversaliter cinctus: fascia superiore lineari, inferioribus latioribus; apertura ovata, extensa, integra, basi subtruncata. (Ch.) — Long. 21, diam. 12 mill. Ap. 11 mill. longa, 8½ lata. (ex ic.)

Helix Bontia Chemn. IX. P. 2. p. 156. t. 134. f. 1216. 17.
— — *Gmel.* p. 3642. N. 248.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 934. N. 108.
Bulimus Bontia Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Lam.* ed. Dh. 76. p. 257.
— — *Küster* t. 10. f. 8. 9.
Bulimulus Bontia Beck ind. p. 65. N. 29.

Habitat in Bengalia, ubi in Bontia degentem legit König. (Chemn.)

526. B. bengalensis Lamarck.

T. perforata, ovato-acuta, tenuis, diaphana, glabra, albo-lutescens, fusco-fasciata: fasciis plerumque 2, altera suturam marginante, rarius 1—3; spira conica, apice acuta, nigra; anfr. 6 planiusculi, ultimus convexus, spiram subaequans; apertura ampla, ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. 11 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 287.)

Bulimus bengalensis Lam. 25. p. 124. ed. Dh. p. 233.
— — *Deless.* recueil t. 28. f. 1.
Bulimulus bengalensis Beck ind. p. 65. N. 28.

Habitat in Bengalia.

Obs. Num a praecedente satis diversus?

527. B. zonulatus Pfr.

T. perforata, oblongo-conica, tenuis, laevigata, opaca, pallide straminea, seriebus 2 macularum fuscarum pellucidarum cincta,

basi lineis 2 castaneis ornata; spira conica, acutiuscula, apice cornea; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram vix superans; columella stricta; apertura ovali-oblonga; perist. acutum, tenue, margine columellari a basi dilatato, membranaceo, angulatim reflexo, perforationem fere occultante. — Long. 18, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 288.)

Bulimus zonulatus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 41.

Habitat in provincia Nueva Ecija insulae Luzon (Cuming).

Obs. Differt a B. bengalensi structura et colore testae, anfractibus convexioribus, columella a basi dilatata, etc.

528. B. Sowerbyi Pfr.

T. perforata, ovato-conica, tenuis, sublaevigata, albida, strigis obliquis, castaneis, maculas albas pyramidales et rhomboidales formantibus ornata; spira conica, acuta; anfr. 6½ vix convexiusculi, ultimus spiram aequans, medio pallide, juxta basin attenuatam castaneo-unifasciatus; columella paulo recedens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari angulatim late reflexo, plano. — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. 11½ mill. longa, 6 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Sowerbyi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 114.

Habitat in Andibus Columbiae.

529. B. unifasciatus Sowerby.

T. perforata, ovato-acuta, tenuis, pellucida, striatula, nitida, fusco-cornea, albido-unifasciata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram aequans, inflatus; columella strictiuscula; apertura ovalis, intus concolor, nitida; perist. simplex, acutum, margine dextro arcuato, columellari superne dilatato, patente. — Long. 19, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 289.)

Bulinus unifasciatus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — *Müll.* synops. p. 25.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 55.
Bulimulus unifasciatus Beck ind. p. 67. N. 65.
Bulimus unifasciatus Lam. ed. Dh. 118. p. 277.

β T. magis elongata, solidiore, rugulosa. (Mus. Cuming.)

Habitat in insulis Gallopagos; legit H. Cuming.

530. B. translucens Broderip.

T. subperforata, ovata, tenuissima, translucida, laevigata, lutescenti-albida; anfr. 5 convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus spiram subaequans; columella subtorta; apertura ampla, semilunaris; perist. simplex, acutum, margine dextro vix patulo, columellari superne dilatato, subtriangulari, perforationem fere

occultante. — Long. 20, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 290.)

Bulimus translucens Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.
— — *Müll.* synops. p. 18.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 11.
Bulimulus translucens Beck ind. p. 67. N. 64.
Bulimus translucens Lam. ed. Dh. 91. p. 265.

Habitat in insulis sinus Panamensis: Kings et Saboga islands (Cuming).

531. B. Fourmiersii Orbigny. †

T. brevis, subventricosa, tenuis, diaphana, laevigata, griseo-fulva; spira conica, brevis, apice obtusa; anfr. 5 elevati, ultimus spiram aequans; sutura impressa; apertura ovalis; labrum acutum. — Long. 11, lat. 7 mill. (O.)

Bulimus Fourmiersii Orb. voy. p. 273. t. 30. f. 12—14.

Habitat in provincia Corrientes reipublicae Argentinae.

532. B. longiseta (Helix) Moricand. †

T. ventricoso-conica, perforata, pellucida, tenuis, sordide lutescens; anfr. 4 rotundati, ultimus zona pallidiore parum conspicua notatus, setis rariusculis longis onustus; apertura subrotunda; labrum tenue. — Long. 7, diam. 7 mill. (M.)

Helix (Bulimus) *longiseta Moric.* Mém. 3e suppl. p. 62. t. 5. f. 18—20.

Habitat rarus in provincia Bahiensi Brasiliae.

Obs. Nonne B. velutino-hispidi status juvenilis?

* * *

533. B. sulcosus Pfr.

T. perforata, ovato-oblonga, opaca, longitudinaliter sulcosa, carneo-albida, strigis maculisque nigris ornata: sulcis irregularibus, confertis, saepe undulatis; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus spiram vix superans; apertura oblonga, intus purpurascenti-livida, nitida; perist. simplex, albo-marginatum, margine dextro recto, acuto, columellari fornicato, reflexo, triangulari, perforationem fere tegente. — Long. 31, diam. 13½ mill. Ap. 17 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 291.)

Bulimus sulcosus Pfr. Symb. I. p. 43.
— — *Phil.* Icon. I. 3. p. 56. t. 1. f. 9.

Habitat in republica Mexicana; prope Tacubaya legit Hegewisch.

534. B. granadensis Pfr.

T. anguste perforata, fusiformi-ovata, tenuis, irregulariter striata, albida, strigis vitellinis et maculis longitudinalibus nigricantibus, fasciatim dispositis ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram aequans; columella recta; apertura ovali-oblonga, intus concolor; perist. acutum, simplex, vix expansiusculum, margine columellari in laminam tenuem, triangularem reflexo, perforationem fere occultante. — Long. 26, diam. 11 mill. Ap. 14 mill. longa, medio 7½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus granadensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.
— — *Phil.* Icon. III. 20. Bul. t. 8. f. 8.

Habitat in provincia Merida Novae Granadae (Funck).

535. B. rudis Anton.

T. aperte perforata, ovato-conica, striis incrementi irregularibus, magnis sculpta, nitidula, alba, fusco et livido flammulata et fasciata; spira subelongata, apice acuta; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus inflatus, spiram aequans; apertura oblongo-ovalis, intus fuscula, nigro-striata, nitida; perist. acutum, margine columellari fornicato, dilatato, patente. — Long. 23, diam. 13 mill. Ap. 12 mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 292.)

Bulimus rudis Ant. Verz. p. 43. N. 1563.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 50.

β. Major, anfr. 6, ultimo sulcoso: long. 34, diam. 17 mill. Ap. 19 mill. longa, 10 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in republica Mexicana; prope Chapultepeque legit Hegewisch.

536. B. Hennahi Gray.

T. umbilicata, ovato-elongata, acuminata, solida, longitudinaliter confertim rugosa, lineis castaneis sparse vittata; spira conica, acuta, apice rosea; anfr. 7 convexi, ultimus spiram subaequans; columella recta, paulo recedens; apertura ovalis, intus purpurascens; perist. simplex, acutum, margine columellari superne dilatato, fornicato, roseo. — Long. 27, diam. 14 mill. Ap. 14 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 293.)

Bulimus Hennahi Gray Spicil. zool. P. I. p. 5. t. 5. f. 5. *)
— — *Fér.* in Bull. d. sc. nat. 1829. XVI. p. 468.
— — *Orb.* voy. p. 283. t. 30. f. 3. 4.
Bulinus lychnorum Sow. Conch. Ill. f. 81. 82.
Helix cactorum (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10. **)

*) T. conic^{a}, elonga^{ta}; anfr. 6 — 7 rotundato-convexis, albo-rubentibus, tenuiter transversim rugosis; apertura spira breviore, ovata; perist. incrassato, fauce eximie rosea; axi perforata. — Axis $^{9}/_{8}$, diam. $^{5}/_{8}$″. Apert. $^{1}/_{8}$″. (Gray l. c.)

**) T. oblongata, ventricosa, conica, crassa, umbilicata, substriata, albida

Buliminus cactorum Beck ind. p. 70. N. 19.

Habitat in Peruvia: prope Arica (Hennah), in provincia Tacnaensi (Orb.).

Obs. Rarius anfractus ultimus spira brevior est.

537. B. bicolor Sowerby.

T. perforata, oblongo-acuta, solidiuscula, longitudinaliter striata, pallida, fasciis latis fuscis, interruptis ornata: spira conica, acutiuscula, apice nigricans; anfr. 5 subplanulati, ultimus spiram conicam aequans; columella subrecta, paulo recedens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, acutum, margine columellari dilatato, plane reflexiusculo. — Long. 22, diam. 10 mill. Ap. 11½ mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 294.)

Bulinus bicolor Sow. in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 141.

— — *Müll.* synops. p. 31.

Bulimus bicolor Phil. Icon. II. 12. p. 113. Bul. t. 4. f. 8.

Habitat in Peruvia; in provincia Xagua legit Matthews.

538. B. helena (Helix) Quoy.

T. perforata, ovato-conica, tenuiuscula, striis elevatis longitudinalibus et transversis confertis reticulata, lutescenti-fusca; spira scalaris, apice obtusa; sutura profunde impressa; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; apertura ovalis; perist. simplex, rectum, margine dextro superne sinuoso, columellari a basi late reflexo, albo. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11½ mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 295.)

Helix helena Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 111. t. 9. f. 8. 9.

Bulimus helena Lam. ed. Dh. 52. p. 245.

Habitat in insula St. Helena.

539. B. pruinosus Sowerby.

T. aperte umbilicata, oblongo-acuta, laevigata, tenuis, cornea, maculis et strigis opacis, albis variegata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexi, ultimus spiram subaequans; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 14, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 296.)

Bulinus pruinosus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 36.

— — *Müll.* synops. p. 25.

Bulimulus pruinosus Beck ind. p. 68. N. 70.

Habitat in montibus prope Cobija Peruviae (Cuming).

* * *

aut rosea violaceo-tincta, lineolis purpureis longitudinaliter ornata; spira subinflata; apice acuminato, roseo; anfr. 8 regularibus; apertura oblonga, recta, rosea; columella recta, acuta; labro tenui. — Long. 25, lat. 15 mill. (Orb. l. c.)

540. B. Darwini Pfr.

T. profunde rimata, ovato-conica, solidula, rugis undulatis et crispis, validis sculpta, sordide albida; spira conica, acutiuscula, cornea; anfr. 6 convexi, 3 supremi laevigati, ultimus spiram subaequans; columella subtorta, subverticalis; apertura lata, subovalis, intus nitidula, alba, tuberculo calloso, profundo in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. simplex, rectum, margine dextro superne arcuato, columellari perdilatato, patente. — Long. 17, diam. 9 mill. Ap. 8½ mill. longa, intus 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Darwini Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 29.

Habitat in insulis Gallopagos (Darwin).

§. 32.

541. B. Aurora Jay. †

T. subumbilicata, ovato-oblonga, tenuis, subpellucida, glabra, nitida, unicolor rubella, apice obtusa; sutura impressa, corrugata; anfr. 9 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis aequans; apertura ovalis; perist. simplex, margine columellari reflexo. — Long. 33, diam. 13‴. (Jay.)

Bulimus Aurora Jay catal. 1839. p. 119. t. 6. f. 2.

Habitat . . . ?

542. B. bifasciatus Philippi.

T. perforata, ovato-turrita, apice obtusa, striata, olivaceo-fusca, pallide 1 — 2-fasciata; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅔ longitudinis aequans; columella subplicata; apertura ovali-oblonga, intus coerulescens; perist. simplex, acutum, marginibus callo tenui junctis, dextro recto, columellari dilatato, patente, rimam formante, livido-rubello. — Long. 54, diam. 20 mill. Ap. 20 mill. longa, medio 10½ lata. (Coll. Nr. 297.)

Bulimus bifasciatus Phil. Icon. II. 9. p. 10. t. 3. f. 5.
— *bivittatus Phil.* in Arch. f. Naturg. 1845. I. p. 62.
— *bitaeniatus Nyst* Bull. Brux. XII. Extrait p. 11.

Habitat in sylvis Peruviae, ubi legit Philippi jun.

543. B. porphyrius Pfr.

T. perforata, oblongo-attenuata, solidiuscula, confertim et ruditer corrugata, castanea, strigis albis irregulariter marmorata; spira conica, apice obtusa; sutura submarginata, irregulariter crenata; anfr. 7 planiusculi, summi subtiliter granulati, ultimus spira paulo brevior; columella subrecta; apertura angusta, oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo,

carneo-livido, perforationem fere occultante. — Long. 51, diam. medio 20 mill. Ap. 25 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus porphyrius Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 114.

Habitat in Bolivia.

544. B. taeniolus Nyst.

T. subperforata, ovato-turrita, apice obtusa, solidula, striis irregularibus longitudinalibus et spiralibus leviter et confertissime decussata, castanea, ad suturam ruditer crenulatam albo-unifasciata; anfr. 6½ vix convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, basi subinflatus; columella paulo recedens; apertura oblongo-ovalis, intus nitida, livida; perist. simplex, rectum, margine dextro albo-limbato, columellari albo, dilatato, reflexo, fere appresso. — Long. 46, diam. 18 mill. Ap. 20 mill. longa, medio 11 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus taeniolus Nyst in Bull. Brux. XII. Extr. p. 9. t. 3. f. 4.

Habitat in America meridionali.

545. B. Deshayesi Pfr.

T. umbilicata, turrita, solida, striatula, violacescenti-alba, strigis maculisque violacescenti-fuscis irregulariter signata; sutura subcrenulata; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella subrecta; apertura ovalis, intus violacea; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, fornicatim reflexo, rimam umbilicarem non occultante. — Long. 45, diam. 15 mill. Ap. 16 mill. longa, 9 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Deshayesii Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 73.

Habitat . . . ?

546. B. poecilus Orbigny.

T. perforata, oblongo-conica, striatula, tenuiuscula, flavo-albida, fasciis nigricanti-castaneis 7—8 inaequalibus, interdum confluentibus vel strigis fuscis conjunctis ornata; spira conica, acuta, apice saepe nigra; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subtorta, recedens; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, vix expansiusculum, margine columellari dilatato, subangulatim reflexo, patente. — Long. 33, diam. 13½ mill. Ap. 15½ mill. longa, medio 8½ lata. (Coll. Nr. 298.)

Helix poecila (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 11.

Bulimus poecilus Orb. voy. p. 268. t. 31. f. 1—10.

— *praecilus Anton* Verz. p. 41. N. 1508.

Bulimus poecilus Sow. Conch. Ill. f. 68.

Bulimulus poecilus Beck ind. p. 65. N. 24.

β. T. flavida, fasciis 3 distantibus, areaque lata basali castaneis.
Bulinus poecilus var. Sow. Conch. Ill. f. 69.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

547. B. columbianus Lea. †

T. elongato-turrita, perforata, nitida, alba, tenuis, minutissime transversim striata, apice aurea; anfr. 7, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; apertura subparva; labrum acutum. (L.) — Long. 32, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Bulimus Columbianus Lea obs. II. p. 66. t. 23. f. 110.

Habitat in Columbia.

548. B. Torallyi Orbigny.

T. elongata, acuta, pyramidalis, tenuis, subdiaphana, laevigata, lucida, albida, flammis brunneis longis longitudinalibus variegata, maculis transversalibus minimis nebulosa, fasciis formantibus, vel gratiose flammis variata, fasciisque nec non lineolis sparsis; spira elevata, apice subacuta, nigra; anfr. 8; columella recta; apertura ovalis; labrum tenue, acutum. — Long. 31, diam. 11 mill. (O.) — Long. 30, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 6 lata. (ex ic.)

Helix Torallii (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 11.
Bulimus Torallyi Orb. voy. p. 285. t. 32. f. 1—4.
Bulimulus Torallii Beck ind. p. 67. N. 53.

β? Minor, subrugulosus, fere unicolor albidus, apice nigricans. (Coll. Nr. 299.)

Habitat in provincia Valle grande Boliviae.

549. B. sporadicus Orbigny.

T. perforata, oblongo-subfusiformis, tenuiuscula, sublaevigata, albida, strigis angustis corneis vel fuscis variegata; spira elongata, conica, apice acuta; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans, basi attenuatus; columella strictiuscula, paulo recedens; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari superne dilatato, fornicatim reflexo, perforationem semitegente. — Long. 32, diam. 12½ mill. Ap. 15 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 300.)

Helix sporadica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 12. *)
Bulimus sporadicus Orb. voy. p. 271. t. 32. f. 12—15.
Bulinus sporadicus Sow. Conch. Ill. f. 73—75.

*) T. elongata vel ovata, pyramidali, subperforata, laevigata vel irregulariter striata, albida, interdum rufo-flavicante longitudinaliter fasciata; spira elongata, apice acuta; anfr. 8; apertura elongata, ovali; columella plana; labro tenui, acuto. — Long. 33, lat. 14—17 mill. (Orb. l. c.)

Bulimulus sporadicus Beck ind. p. 67. N. 56.

Habitat in prov. Corrientes reipubl. Argentinae et Chiquitensi Boliviae.

550. B. montevidensis Pfr.

T. perforata, ovato-conica, subfusiformis, tenuis, oblique striatula, non nitens, albida, opaca, lineis longitudinalibus crebris, pellucidis, pallide corneis strigata; spira conica, apice acuta; anfr. 7—8 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, interdum medio obsolete angulatus; columella verticalis, stricta; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari membranaceo, fornicatim reflexo. — Long. 28, diam. 12 mill. Ap. 14 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 301.)

Bulimus montevidensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 33.

Habitat in Montevideo, Buenos Ayres.

551. B. virgulatus (Helix) Férussac.

T. perforata, ovato-conica, laevigata, alba, unicolor vel strigis interruptis, fasciatim dispositis, vel fasciis continuis, spadiceis ornata; spira conica, acuta, apice plerumque nigricans; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spira brevior; columella recta; apertura ovali-oblonga, intus pallide fulvescens; perist. simplex, margine dextro vix expansiusculo, columellari superne valde dilatato, foramen fere obtegente. — Long. 28, diam. 13 mill. Ap. 13½ mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 302.)

Helix virgulata (Cochlogena) *Fér.* pr. 396. Hist. t. 142 B. f. 1—7.
— *detrita Chemn.* IX. f. 1225. a. b.
— *exilis γ Gmel.* p. 3669.
Bulimus virgulatus Menke syn. ed. 2. p. 27.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 132. t. 12. f. 7. 8?
— *Caribaeorum Lam.* 26. p. 124. ed. Dh. p. 233.
Bulimulus Caraibaeorum Beck ind. p. 66. N. 39.
Lister t. 8. f. 2.
Kämm. p. 125. t. 10. f. 2.

β. Minor, lateritius, unicolor vel fasciis 3 nigricantibus ornatus: long. 24, diam. 11 mill. Ap. 14 mill. longa, 5½ lata. (Spec.)
Bulimus Proteus Guild. in Coll.
Helix Ludovica Rang in Mus. Paris.!

Habitat in insulis Antillis.

552. B. oreades Orbigny.

T. umbilicata, oblongo-conica, tenuis, translucida, laevigata, micans, flava, irregulariter brunneo-strigata: strigis in medio anfractus ultimi subito evanescentibus; spira conica, acutiuscula; anfr. 7—8 plani, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella

vix arcuata; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, fornicato, reflexo. — Long. 32, diam. 12½ mill. Ap. 15 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 303.)

Helix oreades (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 11.
Bulimus oreades Orb. voy. p. 270. t. 31. f. 11. 12.
Bulinus sporadicus var. Sow. Conch. Ill. f. 78.
Bulimulus oreades Beck ind. p. 65. N. 35.

Habitat in provincia Corrientes reipublicae Argentinae.

553. B. loxensis Pfr.

T. umbilicata, ovato-oblonga, striatula, alba, strigis interruptis, spadiceis irregulariter flammulata; spira pyramidata, acuta; anfr. 7½ planiusculi, ultimus 3/7 longitudinis subaequans; columella subtorta, intrans; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, acutum, margine columellari late reflexo, patente. — Long. 35, diam. 14 mill. Ap. 16 mill. longa, intus 7 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus loxensis Pfr. Symb. III. p. 85.

Habitat in republica Aequatoris, ubi ad «El Catamaija prope Loxa» legit Hartweg.

554. B. liliaceus (Helix) Férussac.

T. perforata, ovato-subfusiformis, tenuis, laevigata, lineis impressis, spiralibus, confertissimis sub lente notata, albida; spira regulariter conica, apice acuta; sutura plana, albo-marginata; anfr. 6 plani, ultimus subventrosus, interdum medio obsolete angulatus, spira paulo brevior; columella torta, planata; apertura irregularis, oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari superne in laminam triangularem dilatato, angulatim reflexo. — Long. 28, diam. 11½ mill. Ap. 14 mill. longa, 6½ lata. (Coll. Nr. 304.)

Helix liliacea (Cochlogena) *Fér.* pr. 401. Hist. t. 142 B. f. 11.
Bulimus liliaceus Pfr. Symb. I. p. 43.

Habitat in insulis Antillis, Portorico (Maugé, Férussac).

555. B. stramineus Guilding. †

T. subdiaphana, straminea, transverse densissime striatula; anfr. 6—7, apicalis ferrugineus. (G.) — Long.?

Bulimus stramineus Guild. in Linn. trans. XIV. P. 2. p. 340.
— *flavidus Menke* catal. Malsb. p. 6? *)
— *liliaceus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 146. t. 14. f. 23. 24?

*) T. ovato-acuta, subperforata, tenui, flavida, suturis albo-marginatis. — Long. 10‴. α T. tota flavida, β inferius rubicunda. (Menke l. c.)

Bulimulus stramineus Guild. in Zool. Journ. IV. p. 170.
— — *Beck* ind. p. 65. N. 33.
Helix liliacea var. Fér. hist. t. 142 B. f. 12—14. (teste Beck.)
Lister t. 8. f. 3?

Habitat in insula St. Vincent. (Guilding.)

556. B. perlucidus Spix. †

T. ovato-conica, tenuis, diaphana, perforata, laevis, albido-coerulescens; spira elongato-acuta; apertura ovata, obliqua, margine simplice, acuto, sinistro reflexo. — Long. 8 — 9 lin. (Spix.)

Bulimus perlucidus Spix test. bras. p. 7. t. 7. f. 2.
— — *Lam.* ed. Dh. 58. p. 248.
Bulimulus perlucidus Beck ind. p. 67. N. 60.

Habitat in Brasilia.

557. B. heloicus Orbigny. †

T. elongata, tenuis, diaphana, laevigata, albido-flavicans; spira elongata, plana, apice obtusa; anfr. 7; sutura plana; apertura oblonga; labrum tenue, acutum; columella recta. (O.) — Long. 27, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, 6 lata. (ex ic.)

Helix heloica (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 11.
Bulimus heloicus Orb. voy. p. 272. t. 30. f. 9—11.
Bulimulus heloicus Beck ind. p. 67. N. 62.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae (Orb. syn.), in prov. Santa Cruz de la Sierra (Orb. voy.)

558. B. multilineatus Say. †

T. subumbilicata, conica, laeviuscula, luteo-alba, lineis rufis cingulata: linea subsuturali nigricante; anfr. convexiusculi; sutura linearis; apex et regio umbilicalis nigricantes; columella albida; labrum simplex, nigricans. — Long. vix $^7/_{10}$, diam. vix $^7/_{20}$ poll. (Say.)

Bulimus multilineatus Say in Philad. journ. V. p. 120.

Habitat in Florida orientali.

559. B. tigris Broderip.

T. subperforata, ovato-fusiformis, tenuis, nitida, longitudinaliter plicatula, fulvido-alba, castaneo anguste et confertim strigata; spira turrita, apice acuta, pallida; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^4/_7$ longitudinis subaequans, basi attenuatus; columella subrecta; apertura ovali-oblonga; perist. acutum, margine dextro recto, columellari superne dilatato, triangulari, subappresso. — Long. 37. diam. 13 mill. Ap. 19 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 305.)

Bulinus tigris Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 107.

Bulimus tigris Müll. synops. p. 22.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 21.
Bulimus tigris Lam. ed. Dh. 115. p. 276.
Bulimulus tigris Beck ind. p. 67. N. 51.
β. Testa magis ventrosa: long. 25, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa, 5 lata.

Habitat in montibus Peruviae; prope Truxillo legit H. Cuming.

560. **B. vexillum (Helix) Wood.**

T. aperte perforata, oblongo-acuminata, tenuis, striata, nitida, albida, fasciis 3 aequalibus fusco-nigricantibus et quarta foramen cingente ornata; spira turrita, acutiuscula; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$—$^3/_7$ longitudinis aequans; apertura oblongo-ovalis; perist. tenue, rectum, acutum, margine columellari subverticali, dilatato, fornicato. — Long. 32, diam. 12 mill. Ap. 14 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 306.)

Helix vexillum Wood suppl. t. 8. f. 78.
Bulimus vexillum Gray ibid. p. 32.
— *pulchellus Lam.* ed. Dh. 113. p. 275.
Bulinus pulchellus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 21.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 17.
Bulimulus vexillum Beck ind. p. 67. N. 48.
β. Testa castanea, maculis et strigis albis variegata:
Bulinus varians Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 107.
— — *Müll.* synops. p. 22.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 20. 20*.
Helix varians (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 12.
Bulimus varians Orb. voy. p. 284.
— — *Lam.* ed. Dh. 94. p. 266.
Bulimulus varians Beck ind. p. 67. N. 50.
γ. Testa unicolore pallide rubra, obsolete albo-maculata:
Bulinus rubellus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 124.
— — *Müll.* synops. p. 24.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 32.
Bulimus rubellus Lam. ed. Dh. 97. p. 268.
Bulimulus rubellus Beck ind. p. 67. N. 49.

Habitat in montibus Peruviae; omnes varr. prope Truxillo legit H. Cuming.

561. **B. maculatus Lea.**

T. perforata, oblonga, acuminata, tenuis, longitudinaliter striatula, obsolete decussata, flavescenti-albida, maculis spadiceis, fasciatim seriatis ornata; spira turrita, apice acuta; anfr. 6 pla-

niusculi; ultimus $^3/_4$ longitudinis subaequans; columella subrecta; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari fornicato, reflexo. — Long. 26, diam. 10½ mill. Ap. 11½ mill. longa, 5½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus maculatus Lea obs. II. p. 86. t. 23. f. 112. *)

Habitat prope Carthagena.

562. B. virgo Lea. †

T. perforata, conico-acuta, nitida, diaphana, longitudinaliter striata; anfr. 7 convexiusculi; apertura ovata; labrum acutum; columella angulata. — Long. 0,9, diam. 0,3″. (L.) — Long. 24, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (ex ic.)

Bulimus virgo Lea obs. II. p. 84. t. 23. f. 97.

Habitat prope Carthagena.

Obs. «Affinis B. maculato, diversus absentia macularum, apice non nigro et umbilico minus obtecto».

563. B. Guarani Orbigny. †

T. elongata, pyramidalis, subventrosa, umbilicata, tenuis, strigillata, griseo-fusca; umbilicus rugosus; spira elata, apice obtusa; anfr. 9; sutura vix delineata; apertura oblonga; columella torta, subtus plana, unidentata; labrum acutum. — Long. 23, diam. 8½ mill. (O.) — Long. 25, diam. 9 mill. Ap. 10 mill. longa, 4½ lata. (ex ic.)

Helix Guarani (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 21.

Bulimus Guarani Orb. voy. p. 318. t. 41 bis. f. 1.

Cyclodontina Guarani Beck ind. p. 88. N. 3.

Habitat in provincia Corrientes reipublicae Argentinae.

Obs. Conf. B. neglectus Pfr. Nr. 299.

564. B. panamensis Broderip.

T. perforata, ovato-acuminata, laevigata, tenuiuscula, pallide rubescenti-fulva; anfr. 6 convexiusculi, penultimus convexior, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans; columella recta; apertura lata, ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari late reflexo. — Long. 22, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 307.)

Bulinus Panamensis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 105.

— — *Müll.* synops. p. 19.

— — *Sow.* Conch. Ill. f. 25.

---

*) T. conico-acuta, imperforata, nitida, alba, rufo-maculata; apice nigro; anfract. 7 subplanulatis; apertura ovata; labro acuto; columella subangulata. — Diam. 0,3; long. 0,9 poll. (Lea l. c.)

Bulimulus Panamensis Beck ind. p. 67. N. 63.
Bulimus Panamensis Lam. ed. Dh. 108. p. 273.

Habitat in insulis sinus Panamensis; legit H. Cuming in «King's et Saboga-islands».

565. **B. alternans Beck.**

T. perforata, ovato-conica, tenuis, albida, fasciis 5 castaneis, latiusculis, subaequalibus ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira brevior; columella verticalis; apertura ampla, rotundato-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari superne breviter reflexo. — Long. 21, diam. 11 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 308.)

Bulimus vexillum Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 105. Nec Wood.
— — *Müll.* synops. p. 19.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 26.
Bulimulus alternans Beck ind. p. 65. N. 25.
Bulimus vexillum Lam. ed. Dh. 106. p. 272.

Habitat in ins. sinus Panamensis; legit H. Cuming in «King's et Saboga islands».

566. **B. affinis Broderip.**

T. perforata, ovato-oblonga, apice valde attenuata, tenuis, rugulato-striata, pallide cornea, strigis undulatis, denticulatis, opacis, albis ornata, apice mammillata, rosea; anfr. 7 convexi, ultimus spira brevior; columella recta; apertura verticalis, ovalis; perist. acutum, margine dextro recto, columellari tenui, dilatato, reflexo, roseo. — Long. 26, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 309.)

Bulinus affinis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 20.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 30.
Buliminus affinis Beck ind. p. 69. N. 16.
Bulimus affinis Lam. ed. Dh. 109. p. 273.

Habitat in Peruvia; legit H. Cuming ad «Mexillones, desert of Atacama».

567. **B. modestus Broderip.**

T. umbilicata, ovato-turrita, tenuis, oblique confertim costulata, albida, strigis crebris castaneis ornata; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; umbilicus mediocris, apertus; columella subrecta; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, patente. — Long. 29, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, $6^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 310.)

Bulinus modestus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 20.

Bulinus modestus Sow. Conch. Ill. f. 19.
Buliminus modestus Beck ind. p. 70. N. 25.
Bulimus modestus Lam. ed. Dh. 111. p. 274.
β? Bulimus apicatus Mlf. Anton Verz. p. 43.

Habitat in montibus Peruviae; prope Huacho legit H. Cuming.

568. B. Philippii Pfr.

T. umbilicata, oblongo-acuminata, tenuis, subpellucida, costulato-striata, striis concentricis obsolete subdecussata, albida, fusco-luteo multifasciata; spira conica, sursum attenuata, acutiuscula, cornea; anfr. 7 convexi, ultimus spira paulo brevior; apertura ovalis; perist. acutum, marginibus conniventibus, dextro recto, columellari dilatato, patente. — Long. 20, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 311.)

Bulinus striatulus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 29.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 58.
Bulimus striatulus Lam. ed. Dh. 100. p. 270.
— *Philippii Pfr.* Symb. II. p. 120.

Habitat in Peru; prope Lima legerunt H. Cuming et Philippi jun.

Obs. Nomen mutatum ob B. striatulum Lam. foss. 9.

569. B. Orbignyi Pfr.

T. umbilicata, oblongo-turrita, tenuis, regulariter et confertim plicata, alba; spira turrita, apice acuta; anfr. 7½ convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, umbilicus angustus, apertus; columella vix arcuata; apertura oblonga; perist. simplex, acutum, marginibus subparallelis, superne conniventibus, columellari subfornicato, patente. — Long. 19, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 4 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Orbignyi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 31.

Habitat prope Lima (De Lattre).

570. B. turritella Orbigny.

T. aperte perforata, ovato-conica, tenuiuscula, laevigata, subdiaphana, corneo-grisea, lineolis albis confertis ornata; spira conica, acutiuscula, apice pallide cornea vel rosea; anfr. 6 vix convexi, ultimus spira vix brevior; columella levissime arcuata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, subfornicatim patente. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. 11 mill. longa, medio 5 lata. (Coll. Nr. 312.)

Helix turritella (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 13.
Bulimus turritella Orb. voy. p. 274. t. 33. f. 12—14.
Bulimulus turritellatus Beck ind. p. 67. N. 58.

Habitat in provincia Chiquitensi Boliviae.

571. B. sericinus Jonas.

T. perforata, ovato-acuta, solida, longitudinaliter striatula, lineis confertis sub lente minutissime decussata, sericina, alba; spira conica, acuta; anfr. 6 planulati, ultimus spira vix brevior; columella subrecta; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, marginibus subparallelis, columellari dilatato, patente. — Long. 19, diam. 8 mill. Ap. 9 mill. longa, 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus sericinus Jonas in sched.

Habitat in Guinea.

572. B. hondurasanus Pfr.

T. aperte perforata, ovato-conica, laevigata, nitida, flavescenti-albida, fasciis 3 areaque umbilicali fusco-roseis ornata; spira conica, acuta; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella stricta, verticalis; apertura ovali-oblonga, intus concolor; perist. simplex, rectum, margine columellari in laminam triangularem subfornicatim expanso. — Long. 18½, diam. 10 mill. Ap. 9 mill. longa, 5 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Hondurasanus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 29.

Habitat in Honduras.

573. B. striatus King.

T. perforata, ovato-conica, fulvido-alba, apice livida, longitudinaliter striata et strigis rufis ornata; anfr. 6—7 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior, obsolete angulatus; umbilicus angustus; columella leviter arcuata; apertura ovalis, nigro-marginata, intus fulvida, strigis pellucentibus; perist. simplex, acutum, margine columellari superne dilatato, reflexo, albo. — Long. 17, diam. 9 mill. Ap. 8 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 313.)

Bulinus striatus King, Sow. Conch. Ill. (Jul. 1833.) f. 56.
Bulimus striatus Pfr. Symb. II. p. 51.
Buliminus striatellus Beck ind. p. 70. N. 24.

Habitat in Peruvia; prope Santos legit H. Cuming.

Obs. Conf. B. quitensis Pfr. Nr. 491.

574. B. apiculatus Gray. †

T. ovata, elongata, perforata, laevis, alba, strigis brunneis obliquis; spira conica, apice acutiuscula, saturate brunnea; ultimus anfractus obsoletissime albo-carinatus; apertura spira paulo brevior, subangusta; labium externum simplex, internum tenue, ante columellam parum reflexum, saturate brunneum. — Long. 10, diam. 4¼ lin. (Gr.)

Bulimus apiculatus Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.

Bulimus apiculatus Müll. synops. p. 15.

Habitat . . . ?

Obs. «Similis B. Kingii». — An praecedentis varietas paulo gracilior?

575. B. Voithianus Pfr.

T. perforata, subfusiformi-oblonga, solidula, rugis longitudinalibus lineisque concentricis impressis ruditer granulata, sordide alba; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 6 — 7 vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subverticalis, nigro-castanea; apertura angusta, oblonga, intus castanea; perist. simplex, rectum, marginibus callo fusco junctis, columellari dilatato, fornicatim reflexo, perforationem profundam non tegente. — Long. 19, diam. 7½ mill. Ap. 9⅕ mill. longa, 3¾ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Voithianus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 114.

Habitat in Chile.

576. B. benguelensis Pfr.

T. aperte perforata, ovato-conica, solida, laevigata, lutescenti-albida, superne nigricanti-castanea; spira conica, acuta; anfr. 6 planiusculi, ultimus spiram subaequans; apertura oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari dilatato, nitido, fornicatim reflexo. — Long. 17, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 314.)

Bulimus benguelensis Pfr. Symb. III. p. 82.

Habitat prope Benguela Africae occidentalis.

577. B. pulcher Gray. †

T. ovato-conica, tenuis, albida, fasciis 3 purpureo-fuscis ornata; anfr. convexiusculi; perist. simplex, labio interiore roseo. — Long. ½ unc. (Gr.)

Bulimus pulcher Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

Helix pulchra Wood suppl. t. 7. f. 29.

Bulimulus pulcher Beck ind. p. 65. N. 30.

Habitat in Guinea? (Beck.)

Obs. Ex icone persimilis videtur B. exilis varietati trifasciatae, sed spira multo breviore et perist. simplice facile distinguitur. — A Bulimo benguelensi differt columella arcuata (in icone) et fasciis. An nihilominus eadem species?

578. B. scabiosus Sowerby.

T. rimato-perforata, oblongo-acuminata, confertim et distincte striata, solidiuscula, corneo et albido variegata, apice nigricans; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅕ longitudinis aequans; columella oblique recedens; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum,

margine columellari late reflexo. — Long. 16, diam. 4½ mill. Ap. 5½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 315.)

Bulinus scabiosus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 74.
— — *Müll.* synops. p. 30.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 24.
Helix scabiosa (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 20.
Bulimus scabiosus Orb. voy. p. 263.
— — *Lam.* ed. Dh. 128. p. 281.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 154. t. 15. f. 7. 8.
Cochlicellus scabiosus Beck ind. p. 63. N. 13.

Habitat prope Cobija (Cuming, Orb.).

579. B. bilineatus Sowerby.

T. perforata, oblongo-conica, tenuis, striatula, pallide fulva, fusco in medio bizonata, interstitio albo; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella repanda; apertura ovalis; perist. tenue, acutum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 14, diam. 6½ mill. Ap. 6 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 316.)

Bulinus bilineatus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — *Müll.* synops. p. 26.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 29.
Buliminus bilineatus Beck ind. p. 71. N. 33.
Bulimus bilineatus Lam. ed. Dh. 119. p. 277.

Habitat in Columbia occidentali et ad St. Elena. (Cuming.)

580. B. decoloratus Sowerby.

T. aperte perforata, ovato-acuta, striatula, albida, corneo-strigata et basi bifasciata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella subverticalis; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, fornicato, ad perforationem reflexo. — Long. 13, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 317.)

Bulinus decoloratus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 29.

Habitat in Peruvia; legit H. Cuming prope Lima.

581. B. rhodacme Pfr.

T. aperte rimata, ovato-oblonga, longitudinaliter striata, striis transversis, obsoletis minutissime decussato-subgranulata, alba, maculis et flammis pellucidis, rubellis ornata, apice obtuso rosea; anfr. 6 convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, rectum, margine columellari di-

latato, patente. Long. 13, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 318.)

Bulimus rhodacme Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 50.

Habitat in Chile; prope Frierina vallis Huasco legit Bridges sub Cactis humilibus.

Obs. Variat apertura magis ovali.

582. B. tricingulatus Anton.

T. perforata, ovato-conica, pellucida, nitida, glabra, pallide lutea, fasciis 3 brunneis in anfractu ultimo, 2 clarioribus in reliquis ornata; spira subturrita, acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis aequans; sutura profunda; apertura ovali-oblonga; perist. acutum. — Alt. 13, lat. 6‴. (Ant.)

Bulimus tricingulatus Anton Verz. p. 43. N. 1566.

Habitat in insulis Saboja (Ant.).

583. B. Ferussaci Dunker.

T. perforata, oblongo-turrita, laevigata, nitida, alba, strigis pallide corneis ornata, punctisque numerosis fuscis conspersa; spira turrita, apice acutiuscula, cornea; anfr. 8 supremi planulati, ultimi convexi, ultimus $^3/_8$ longitudinis subaequans, basi fascia 1 spadicea cinctus; columella arcuata; apertura ovato-oblonga, intus fuscidula, fasciata; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, fornicatim reflexo, perforationem semitegente. — Long. 19, diam. 7½ mill. Ap. 8 mill. longa, 4 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus Ferussaci Dunk. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 164.

Habitat ad Loanda in montibus arenosis haud frequens (Tams).

584. B. punctatus Anton.

T. perforata, ovato-conica, parum nitida, laevis, alba, minutim brunneo-punctata; spira apice acuta, cornea; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, fascia 1 angusta, brunnea medio cingulatus; columella strictiuscula; apertura irregulariter ovalis; perist. acutum, margine columellari dilatato, membranaceo, patente. — Long. 10, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming. et Anton.)

Bulimus punctatus Ant. Verz. p. 42. N. 1540.
— *solutus Bens.* mss. in Mus. Cuming.

Habitat in India orientali: Banda Bundsk (Benson).

* *
*

585. **B. Gruneri Pfr.**

T. anguste perforata, cylindraceo-turrita, laevigata, nitida, albida unicolor vel fusco oblique strigata vel macularum spadiceārum seriebus nonnullis cingulata; spira elongata, apice acuta; sutura albo-marginata; anfr. 7—8 plani, ultimus $^1/_3$ longitudinis aequans; columella subtorta; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, rectum, margine columellari basi expanso, superne fornicatim breviter reflexo. — Long. 28, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 319.)

Bulimus Gruneri Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 30.

β. Perforatione aperta, margine peristomatis fornicatim patente.

Habitat in republica mexicana.

* * *

586. **B. albatus (Helix) Férussac.**

T. umbilicata, turrito-conica, nivea unicolor vel fasciis 2—3 interruptis, brunneis ornata, laevis, nitida; anfr. 8 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis paulo superans; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 25, diam. 12 mill. Ap. 10 mill. longa, medio $5^1/_3$ lata. (Coll. Nr. 320.)

Helix albata Fér. in Mus. Paris.!

Bulimus albatus Pfr. Symb. II. p. 42.

— *bicinctus Récluz* in Revue zool. 1843. p. 4.

Habitat in Arabia. (Yemen: Mus. Paris.)

587. **B. castrensis Pfr.**

T. anguste umbilicata, oblongo-conica, levissime striatula, opaca, albida, strigis spadiceis denticulatis et maculis albis pyramidalibus ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus ventrosior, infra medium lineis nonnullis spadiceis cinctus, $^2/_3$ longitudinis subaequans; columella strictiuscula; apertura oblonga; perist. simplex, rectum, margine dextro superne arcuato, columellari dilatato, patente. — Long. 19, diam. 9 mill. Ap. $8^1/_2$ mill. longa, $4^1/_2$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus castrensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 115.

Habitat . . . ?

588. **B. scutulatus Broderip.**

T. perforata, ovato-turrita, solidula, irregulariter striata, alba, strigis castaneis, interruptis scutulata; anfr. 8 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans; columella arcuata; apertura oblongo-ovalis, intus fasciata; perist. simplex, acutum, margine

columellari late reflexo, patente. — Long. 26, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 321.)

Bulimus scutulatus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 20.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 39.
Helix scutulata (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10.
Bulimus scutulatus Orb. voy. p. 282.
— — *Lam.* ed. Dh. 92. p. 265.
Buliminus scutulatus Beck ind. p. 70. N. 22.

Habitat in Peruvia; prope Islay legit H. Cuming.

589. B. andicola Pfr.

T. perforata, turrito-conica, solida, lineis concentricis, confertis sub lente sculpta, opaca, nitida, alba, strigis fuscis, linearibus irregulariter ornata; spira elongata, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, basi rotundatus; columella deorsum aliquantulum recedens; apertura ovali-oblonga; perist. simplex, acutum, margine columellari superne fornicatim reflexo, perforationem angustam formante. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, $5^1/_3$ lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus andicola Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 115.

Habitat in Andibus Boliviae.

Obs. Persimilis B. albato, perforatione punctiformi praecipue distinctus.

590. B. acutus (Helix) Müller.

T. minutissime perforata, conico-turrita, irregulariter striata, albida, fasciis et strigis fuscis varie ornata; anfr. 9—10 convexiusculi, summi carinati, sequentes rotundati, ultimus $^1/_3$ longitudinis non aequans; apertura ovalis; perist. rectum, acutum, simplex, margine columellari membranaceo, superne reflexo, perforationem fere claudente. — Long. 15, diam. $5^1/_2$ mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 322.)

Helix acuta Müll. verm. II. p. 100. N. 297.
— — *Gmel.* p. 3660. N. 136.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 956. N. 156.
— — (Cochlicella) *Fér.* p. 378.
— *cretacea Chemn.* IX. P. 2. p. 190. t. 136. f. 1263. N. 1. 2?
— *bifasciata Pult.* cat. 49. New edit. p. 55. t. 18. f. 8. 10.
— — *Wood* ind. t. 35. f. 154.
Turbo fasciatus Penn. Brit. Zool. IV. p. 131. t. 82. f. 119.
— — *Mont.* test. brit. p. 346. t. 22. f. 1.
Bulimus acutus Brug. Enc. méth. I. p. 323. N. 42.
— — *Drap.* tabl. d. moll. p. 68. N. 8.
— — *Drap.* hist. p. 77. t. 4. f. 29.

Bulimus acutus Lam. 30. p. 125. ed. Dh. p. 234.
— — *C. Pfr.* III. p. 35. t. 7. f. 1.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 140. II. p. 112.
— — *Rossm.* VI. p. 41. f. 378.
— — *Thomps.* moll. of Irel. p. 22.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 134.
— — *Küster* p. 31. t. 11. f. 9—12.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 73.
— *ventricosus Turt.* Man. p. 84. f. 69.
— *turritella Andrz.* Kryn. in Bull. Mosc. VI. p. 415.
Bulinus variabilis Hartm. in Sturm Fauna VI. H. 6. T. 12.
— — *α Hartm.* in Neue Alpina I. p. 223.
Elisma fasciata Leach moll. p. 109.
Cochlicella meridionalis et *turricula Risso* IV. p. 78. t. 3. f. 26.
Cochlicellus acutus Beck ind. p. 63. N. 8.
Longaeva turrita Mühlf. Mus.
Savigny descr. de l'Egypte. Zool. II. t. 2. f. 21.

β. Unicolor albidus:
Bulimus litoralis Brumati Monf. p. 34. f. 9.

γ. Major, nigro articulatim fasciatus: long. 19, diam. 6 mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Spec.)
Turbo turricula maroccana Chemn. XI. p. 280. t. 209. f. 2063. 64.
Bulimus acutus δ Drap. t. 4. f. 30.
— — *Gray* Man. p. 185. t. 6. f. 67.
— *articulatus Lam.* 29. p. 124. ed. Dh. p. 234.
— — *Deless.* recueil t. 28. f. 8.
Cochlicellus articulatus Beck ind. p. 63. N. 3.
— *maroccanus Beck* ind. p. 63. N. 5.

δ. Minor, ventrosior:
Bulimus acutulus Ziegl. (teste Anton.)
— *acutus β Phil.* Sicil. I. p. 140.

Habitat in littoribus maris Mediterranei, in Hispania, Lusitania et in parte occidentali Angliae, Scotiae et Hiberniae; in Helvetia (prope Romanshorn: Hartm.); var. *β* prope Tanger, Marocco.

Obs. Huc etiam referendus B. ambiguus Zgl.

591. B. ventrosus (Helix) Férussac.

T. angustissime perforata, ovato-conica, obtusiuscula, plicatulo-striata, albida, strigis et fasciis fuscis vel corneis varie ornata; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; apertura oblique semiovalis; perist. rectum, acutum, margine columellari strictiusculo, breviter dilatato, patente. — Long. 9, diam. 5½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 323.)

Helix ventrosa (Cochlicella) *Fér.* pr. 377.
— *acuta Webb* et *Berth.* syn. p. 317.

Helix cretacea Chemn. IX. P. 2. p. 190. t. 136. f. 1263. N. 3. 4?
— *carinula Gmel.* p. 3655. N. 242?
Bulimus ventricosus Drap. tabl. d. moll. p. 68. N. 9.
— — *Drap.* hist. p. 78. t. 4. f. 31. 32. Nec Brug.
— — *Lam.* 31. p. 125. ed. Dh. p. 235.
— — *Orb.* canar. p. 67.
— — *Terv.* catal. p. 30.
— — *Rossm.* VI. p. 41. f. 377.
— — *Küster* p. 30. t. 12. f. 10—12.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 73.
— *ventrosus Pfr.* Symb. III. p. 57.
— *carinula Pfr.* Symb. II. p. 112?
Bulimus variabilis β Hartm. in Neue Alpina I. p. 223.
Cochlicella ventrosa Risso hist. IV. p. 77.
Cochlicellus ventricosus Beck ind. p. 62. N. 2.
β. Minor:
Helix agnata Ziegl. Mus.
Cochlicellus agnatus Beck ind. p. 62. N. 1.

Habitat in Gallia meridionali (Drap.), Lusitania (Mor.), Africa septentrionali et occidentali, in insulis Canariis et Azoris.

592. B. solitarius (Helix) Poiret.

T. aperte perforata, globoso-conica, striatula, nitidula, alba, fasciis fuscis multimode variegata; spira conoidea, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculi, superiores carinati, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; apertura semiovalis; perist. rectum, simplex, acutum, marginibus convergentibus, columellari vix breviore, subdilatato, patente. — Long. $9^1/_2$, diam. $6^1/_2$ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 324.)

Helix solitaria Poir. coq. fluv. etc. p. 85.
— *conoidea Drap.* tabl. d. moll. p. 69. N. 1.
— — *Drap.* hist. p. 78. t. 5. f. 7. 8.
— — (Cochlicella) *Fér.* pr. 375.
— — *Lam.* 106. p. 94. ed. Dh. p. 76.
— — *Blainv.* Malac. p. 460. t. 40. f. 5.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 134. II. p. 110.
— *fibula Wood* suppl. t. 8. f. 66.
— *turbida Küster* in litt. olim.
Bulimus conoideus Jan catal. p. 4.
— — *Rossm.* VI. p. 41. f. 376.
— — *Küster* p. 33. t. 12. f. 3—9.
— *solitarius Pfr.* Symb. II. p. 122.
Theba conoidea Beck ind. p. 11. N. 6.
Obelus conoideus Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 159.

Habitat in littoribus maris Mediterranei, Gallia, Italia, Sicilia, Hispania etc., nec non in insulis Azoris (Fayal: Tams).

593. B. scalariformis Broderip.

T. umbilicata, oblongo-pyramidata, confertim plicato-costata, albida, fusco-variegata vel varie fasciata; spira conica, apice acutiuscula, cornea; anfr. 5½ convexi, ultimus 3/7 longitudinis subaequans; umbilicus mediocris, subpervius; apertura oblonga; perist. rectum, acutum, marginibus convergentibus, columellari vix dilatato. — Long. 11½, diam. 6 mill. Ap. 5⅓ mill. longa, 3¼ lata. (Coll. Nr. 325.)

Bulinus scalariformis Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 31.
— — *Müll.* synops. p. 19.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 13.
— — *Sow.* in Zool. of Beech. voy. p. 144. t. 38. f. 12.
Helix scalariformis (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10.
Bulimus scalariformis Orb. voy. p. 282.
— — *Lam.* ed. Dh. 105. p. 272.
Buliminus scalariformis Beck ind. p. 70. N. 26.

Habitat in Peruvia; prope Arcon legit H. Cuming, prope Lima D'Orbigny.

594. B. pustulosus Broderip.

T. umbilicata, oblongo-conica, pallide fuscescens vel alba, subdiaphana, costato-striata: striis magis minusve confertis, moniliformibus; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 convexi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; apertura oblongo-ovalis; perist. acutum, marginibus conniventibus, dextro recto, columellari dilatato, patente. — Long. 14, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 326.)

Bulinus pustulosus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 105.
— — *Müll.* synops. p. 19.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 23.
Buliminus pustulosus Beck ind. p. 69. N. 17.
Bulimus pustulosus Lam. ed. Dh. 107. p. 273.

Habitat in Chile; prope Huasco legit H. Cuming.

595. B. ustulatus Sowerby.

T. subaperte perforata, oblongo-conica, nitida, fusco-nigricans, fulvo-strigata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculi, summi verticaliter striati, sequentes obsolete decussati, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, convexus; apertura ovalis; perist. simplex, margine dextro recto, columellari superne breviter dilatato, reflexo. — Long. 13, diam. 6½ mill. Ap. 5⅔ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 327.)

Bulinus ustulatus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 72.

Bulinus ustulatus Müll. synops. p. 27.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 42.
Buliminus ustulatus Beck ind. p. 70. N. 28.
Bulimus ustulatus Lam. ed. Dh. 124. p. 279.
Habitat in insulis Gallopagos (Cuming).

596. B. Laurentii Sowerby.

T. umbilicata, ovato-pyramidata, striata, tenuis, albida, cingulis fuscis varie ornata; spira pyramidata, acutiuscula; anfr. 5½ convexi, ultimus spira paulo brevior; umbilicus mediocris, non pervius; apertura oblongo-ovalis, intus fuscula; perist. simplex, acutum, marginibus conniventibus, dextro arcuato, columellari subdilatato, patente, non reflexo. — Long. 13, diam. 7½ mill. Ap. 6½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 328.)

Bulinus Laurentii Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — *Müll.* synops. p. 25.
Helix Lorenzii (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 9.
Bulimus Lorenzii Orb. voy. p. 281.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 146. t. 13. f. 13. 14.
Buliminus Laurentii Beck ind. p. 70. N. 23.
β. Testa unicolore albicante.
γ. Spira paulo elongatiore, anfr. 6; long. 15, diam. 7½ mill.
Habitat in Peruvia; in insula St. Laurentii sinus Callao legit H. Cuming; var. *β* prope Sitka littoris Americae occidentalis.

§. 33.

597. B. tenuissimus (Helix) Férussac.

T. aperte perforata, oblongo-conica, tenuissima, pellucida, pallide cornea, striis incrementi lineisque spiralibus subtilibus obsolete et confertim decussata; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira vix brevior; columella subobliqua; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, margine dextro recto, columellari superne breviter reflexo, triangulari, patente. — Long. 21, diam. 9½ mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 329.)

Helix tenuissima (Cochlogena) *Fér.* hist. t. 142 B. f. 8.
— — *Orb.* synops. p. 11.
Bulimus tenuissimus Orb. voy. p. 272. *)
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 158. t. 15. f. 19. 20.
Bulimulus tenuissimus Beck ind. p. 67. N. 61.

*) T elongata, conica, subperforata, tenui, sublaevigata, diaphana, albido-flavicante; spira elongata; anfr. 6; sutura excavata; apertura subovali; labro acuto. (Orb. l. c.)

β? Anfractibus paucioribus, convexioribus:

Bulimus corneus Pot. et *Mich.* gal. I. p. 137. t. 14. f. 11. 12. *)

Habitat in Pernambuco (Petit), Brasilia (Orb.); var. β? in Cayenne.

Obs. Cl. Beck speciem Orbignyanam a Ferussaciana diversam censet, prioremque nomine *Bulimuli Thoreyi* designat; differentiam inter utriusque specimina invenire non possum.

598. B. corneus Sowerby.

T. umbilicata, oblongo-conica, solidiuscula, diaphana, cornea, laevigata, nitidula; spira conica, apice fusca, obtusa; anfr. 6 convexi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; umbilicus angustus, subpervius; apertura ovali-oblonga; perist. acutum, marginibus approximatis, dextro recto, columellari albo, nitido, superne dilatato, fornicato-patente, triangulari. — Long. 14, diam. 7 mill. Ap. $6^1/_3$ mill. longa, $3^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 330.)

Bulinus corneus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — *Müll.* synops. p. 26.
Buliminus corneus Beck ind. p. 71. N. 34.

Habitat in America centrali (Cuming).

599. B. unicolor Sowerby.

T. aperte perforata, oblongo-conica, apice obtusa, tenuis, striatula, pellucida, unicolor corneo-albida; anfr. 6 convexi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella subrecta; apertura ovalis, basi subangustata; perist. simplex, acutum, margine columellari concolore, pellucido, reflexo, appresso, foramen subsemitegente. — Long. 16, diam. 8 mill. Ap. 7 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 331.)

Bulinus unicolor Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — *Müll.* synops. p. 29.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 43.
Helix unicolor (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 10.
Bulimus unicolor Lam. ed. Dh. 126. p. 280.
Buliminus unicolor Beck ind. p. 71. N. 35.

β? Anfractu ultimo longiore:

Bulimus corneus Lea obs. II. p. 66. t. 23. f. 111. **)

Habitat in insula Perico sinus Panamensis (Cuming), in provincia Guayaquil reipublicae Columbianae (Orb.).

---

*) T. ovata, cornea, nitida, sublaevigata, subperforata; apertura ovata; perist. acuto; anfr. 7 convexis, ultimo maximo; apice obtuso. — Long. 20—25, diam. 12 mill. (Pot. et Mich. l. c.)

**) T. ovato-conica, umbilicata, cornea, tenui, pellucida; anfr. 7; apertura parva; labro acuto. — Buenavista Columbiae. (Lea l. c.)

600. B. Fontainii Orbigny. †

T. elongata, umbilicata, laevigata, tenuis, diaphana, griseo-flavicans; spira elongata, inflata, apice obtusa; anfr. 7 elevati; sutura impressa; apertura oblonga; labrum acutum. — Long. 13, diam. 6 mill. (O.)

Bulimus Fontainii Orb. voy. p. 273.

Habitat in America meridionali.

601. B. fraterculus (Helix) Férussac.

T. perforata, oblongo-ovata, pallide cornea absque nitore, striis incrementi et spiralibus confertis minutissime decussata; spira conica, obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, tenue, margine dextro vix expansiusculo, columellari reflexo. — Long. 14, diam. 7 mill. Ap. 6½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 332.)

Helix fraterculus (Cochlogena) *Fér.* pr. 395 et Mus.!

Bulimus fraterculus Pot. et *Mich.* gal. I. p. 141. t. 13. f. 7. 8.

— — *Pfr.* Symb. II. p. 46.

Bulimulus fraterculus Beck ind. p. 67. N. 46.

Habitat in insula Guadeloupe. (Fér. Mus.)

Obs. Beck cum dubio fig. Fér. t. 142 B. f. 8 huc refert.

602. B. sarcodes Pfr.

T. aperte perforata, oblongo-conica, tenuis, striatula, lineis spiralibus sub lente obsoletissime decussata, carnea; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis sub-aequans; columella leviter arcuata; apertura ovalis, intus nitida; perist. rectum, acutum, margine dextro arcuato, columellari dilatato, fornicatim patente. — Long. 17½, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 333.)

Bulimus sarcodes Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 30.

Habitat in Honduras.

603. B. junceus Gould. †

T. parva, elongato-conica, tenuis, translucida, dilute virens, concinne striata, vix perforata; spira ad apicem obtusa; anfr. 7 convexiusculi, superne contabulati; apertura elongato-ovata; labrum simplex, ad columellam vix reflexum. — Long. 3/10, lat. 1/10 poll. (G.)

Bulimus junceus Gould 1846. Exped. shells p. 32.

Habitat in insulis Societatis et Sandwich.

* * *

604. **B. Antoni Pfr.**

T. angustissime umbilicata, ovato-conica, tenuis, nitida, pellucida, cornea; spira acuta; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus $\frac{2}{5}$ longitudinis aequans; columella stricta, verticalis; apertura subovalis, plica levi intrante parietis aperturalis vix coarctata; perist. simplex, acutum, margine columellari a basi reflexo, superne dilatato-patente. — Long. 3, diam. $1\frac{2}{3}$ mill. Ap. $1\frac{1}{3}$ mill. longa, $\frac{2}{3}$ lata. (Coll. Nr. 334.)

Strobilus oblongus Anton Verz. p. 46. N. 1692.
Bulimus Antoni Pfr. Symb. I. p. 24. II. p. 43.

Habitat in insula Opara.

Obs. 1. Haec species transitum formare videtur ad Baleam et Tornatellinam.
Obs. 2. Bul. paludinoides Ant. (Verz. p. 42. N. 1534.) nunc ab ipso auctore generi Paludinae, nomine Pal. elatae adscriptus est.

§. 34.

605. **B. culmineus Orbigny.**

T. subperforata, ovato-oblonga, crassiuscula, longitudinaliter striata, lineis spiralibus granulato-decussata, albida, fusco interdum variegata; spira conica, obtusa; sutura subcrenulata; anfr. 6 convexi, ultimus $\frac{3}{7}$ longitudinis subaequans; columella paulo recedens; apertura ovalis, alba; perist. rectum, intus albo-labiatum, margine columellari dilatato, reflexo, subappresso. — Long. 28, diam. 13 mill. Ap. 14 mill. longa, medio 8 lata. (Coll. Nr. 335.)

Helix culminea (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 13. *)
Bulimus culmineus Orb. voy. p. 288. t. 33. f. 8. 9.
Bulinus culmineus Sow. Conch. Ill. f. 86.
Buliminus culmineus Beck ind. p. 69. N. 14.

Habitat in culminibus Andium Boliviae.

606. **B. alternatus Say.** †

T. umbilicata, ovato-conica, alternatim strigis subaequalibus cinereis et fuscescentibus ornata; anfr. 6 convexiusculi; sutura mediocris; apertura intus alba, submargaritacea; perist. intus labiatum. — Long. $1\frac{1}{5}$, diam. $\frac{7}{10}$ poll. (Say.)

Bulimus alternatus Say descr. of new terr. shells p. 25.

Habitat in Mexico.

607. **B. Emeus Say.** †

T. anguste umbilicata, conica vel elongato-ovata, lineis impressis, minutis, capillaribus, undulatis obtecta, albida, maculato-

*) T. oblonga, ovata, subventrosa, imperforata, crassa, irregulariter striata vel tenuissime reticulata, albida; spira brevi, inflata, apice obtusa; anfr. 6; sutura crenulata; apertura ovali, alba; columella recta, plana; labro subcrasso, intus albido. — Latit. 17, long. 13 mill. (Sic! Orb. l. c.)

fasciata; sutura mediocris; anfr. medio subangulati, ultimus spira multo brevior, obsolete angulatus; columella brevis, recurva; labrum externum simplex, intus subincrassatum. — Long. $^{13}/_{20}$, diam. $^{3}/_{10}$ poll. (Say.)

Bulimus Emeus Say descr. of new terr. shells p. 26.

Habitat inter Veracruz et urbem Mexico.

608. B. callosus Pfr.

T. perforata, ovato-conica, solidula, opaca, sordide albida, strigis irregularibus, pellucidis ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 planiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella breviter recedens; apertura acuminato-ovalis; perist. acutum, intus callo crasso, marginem non attingente, labiatum, margine columellari fornicatim reflexo. — Long. 21, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa, 6 lata. (Coll. v. d. Busch.)

Bulimus callosus Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 128.

Habitat . . . ?

609. B. pruninus Gould. †

T. ovato-turrita, solida, leviter striata, livido-purpurea, infra suturam et circa umbilicum albido-zonata; spira acuta; anfr. 6 convexiusculi, subtabulati; apertura modica, ovata; labrum simplex, intus callo stramineo incrassatum, ad columellam reflexum; faux livida. — Long. $^{7}/_{8}$, lat. $^{3}/_{8}$ poll. (G.)

Bulimus pruninus Gould 1846. Exped. shells p. 32.

Habitat in America meridionali?

610. B. detritus (Helix) Müller.

T. rimato-perforata, oblongo-conica, striata, solidula, alba unicolor vel fusco aut griseo varie radiata; spira conica, obtusa; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spira brevior; apertura acute ovalis, intus pallide fuscescens; perist. rectum, albo-sublabiatum, margine columellari dilatato, reflexo. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. 9½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 336.)

Helix detrita Müll. verm. II. p. 101. N. 300.
— — *Chemn.* IX. t. 134. f. 1225. c. d.
— — *Gmel.* p. 3660. N. 139.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 957. N. 158.
— *sepium Gmel.* p. 3654. N. 200.
— *radiata* (Cochlogena) *Fér.* pr. 392. Hist. t. 142. f. 4—6. et 8?
Bulimus detritus Gray Man. p. 12. f. 2.
— — *Küster* t. 17. f. 13—18.
— *radiatus Brug.* Enc. méth. I. p. 312. N. 25.
— — *Drap.* tabl. d. moll. p. 65. N. 3.
— — *Drap.* hist. p. 73. t. 4. f. 21.

Bulimus radiatus Sturm Fauna VI. H. 4. T. 13.
— — *Lam.* 20. p. 122. ed. Dh. p. 230.
— — *C. Pfr.* I. p. 49. t. 3. f. 4—6.
— — *Blainv.* Malac. p. 455. t. 38. f. 3?
— — *Rossm.* I. p. 86. f. 42. VI. p. 47. f. 390.
— — (Bulimulus) *Charp.* cat. p. 14.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 136.
Bulinus detritus Stud. syst. Verz. p. 18.
— *sepium Hartm.* in Neue Alpina I. p. 223.
Bulimulus radiatus Risso hist. IV. p. 78. N. 177.
Buliminus detritus Beck ind. p. 72. N. 52.
Zebrina radiata Held in Isis 1837. p. 917.

β. Major, albus:
Helix dealbata Fér. hist. t. 142. f. 7? Nec Say.

γ. Testa cornea:
Bulimus radiatus var. Rossm. VI. f. 391.
— *detritus var. Küst.* t. 17. f. 17.

δ. Vertice nigricante:
Bulimus melanorhinus Jan. (teste Rossm.)

ε. Testa minore, abbreviata:
Bulimus abbreviatus Jan.

ζ. Testa lutea, fusco-radiata:
Bulimus luteus Ziegl. (teste Anton.)

Habitat passim in plerisque Europae mediae terris.

Obs. Cl. Cantraine ex speciminibus Tergesti lectis Bulimum fasciolatum Oliv. cum detrito conjungere vult; sed quae ipse specimina copiosissima in montibus circa Tergestum legi, nullo modo ab illis ex aliis Germaniae regionibus differunt; Bulimus fasciolatus autem ab omnibus facillime distinguitur. Conf. Nr. 326.

611. B. Hohenackeri Krynicki.

T. subperforata, oblongo-conica, solida, ponderosa, ruditer et irregulariter striata, alba; spira conica, obtusiuscula; anfr. 8 convexi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, basi rotundatus; columella brevis, strictiuscula; apertura subovalis, intus fusca; perist. rectum, intus labiatum, margine columellari dilatato, plano, magis minusve reflexo. — Long. 24, diam. 10—11 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 337.)

Bulimus Hohenackeri Kryn. in Bull. Mosc. IX.
— *xanthostomus Hohenack.* olim.
Helix dealbata Fér. hist. t. 142. f. 7?

Habitat in Georgia. (Commun. Cl. de Middendorff.)

612. B. exilis (Helix) Gmelin.

T. perforata, oblonga, striatula, laeviuscula, albida, fusco obsolete strigata, fascia 1 fusca vel rufa ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6—7 planulati, ultimus spira brevior; columella

subarcuata; apertura oblongo-ovalis; perist. acutum, intus sublabiatum, margine columellari subdilatato, reflexo. — Long. 20, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, medio 5 lata. (Coll. Nr. 338.)

Helix exilis Gmel. p. 3668. N. 252.
— *acuta Chemn.* IX. t. 134. f. 1224. N. 1. 2.
— *guadaloupensis Dillw.* descr. cat. II. p. 957. N. 159.
— *guadeloupensis Wood* ind. t. 35. f. 157. 158.
— *guadalupensis* (Cochlogena) *Fér.* pr. 394.
Bulimus guadaloupensis Brug. Enc. méth. I. p. 313. N. 26.
— — *Lam.* 22. p. 123. ed. Dh. p. 232.
— — *Griffith* an. kingd. t. 27. f. 1.
— *Antiguensis Guild.* mss. (Swains. Malac. p. 177.
— *exilis* (Lam. ed.) *Desh.* p. 232.
— — *Küster* t. 10. f. 14. 15.
Bulimulus acutus Leach Zool. Misc. I. t. 18. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 11. t. 2. f. 3. 4.
— *simplex Beck* ind. p. 66. N. 43.
Kämmerer Conch. p. 124. t. 12. f. 2.

β. Trifasciatus, fascia media angusta, suprema et infima latis:
Bulimulus trifasciatus Leach Zool. Misc. I. t. 18. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 12. t. 2. f. 1. 2.
— *Gouadaloupensis Beck* ind. p. 66. N. 42.
Bulimus guadaloupensis Guérin Iconogr. Moll. t. 6. f. 11.
Bulimus Guadaloupensis Sow. Conch. Man. f. 283.
Lister t. 8. f. 1. (fig. rud.)
Kämmerer p. 124. t. 12. f. 3.

γ? Unicolor albus:
Helix detrita Mont. test. brit. p. 384.
Bulimus exilis Gray Man. p. 18. t. 9. f. 109.
— *guadeloupensis var. Sow.* in Zool. of Beech. voy. p. 144. t. 38. f. 13.

Habitat in insula Guadeloupe; var. *γ*? teste Sow. in Brasilia, teste Guild. in insula St. Vincentii — nec in Britannia.

613. B. limnoides (Helix) Férussac.

T. subperforata, ovato-conica, solida, rugoso-striatula, fusca; spira conica, acuta, apice rufa; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, antice descendens; sutura albo-marginata; columella strictiuscula; apertura truncato-ovalis, intus livida; perist. acutum, intus labiatum, margine columellari solido, albo, fornicatim reflexo, subappresso. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 339.)

Helix limnoides (Cochlogena) *Fér.* pr. 393. Hist. t. 142. f. 9. 10.
Bulimus limnoides Lam. ed. Dh. 81. p. 260.

Habitat in insulis Guadeloupe et St. Vincent. (Fér.)

614. B. erosus Broderip.

T. rimato-umbilicata, ovato-conica, rugoso-striata, nitida, alba, opaca, punctis corneis, diaphanis aspersa; spira conica, apice obtusa, pallide cornea; anfr. 6 convexi, ultimus spiram subaequans; columella arcuata; apertura ovalis, intus pallidissime fuscescens; perist. acutum, sublabiatum, margine columellari late reflexo, libero, superne horizontaliter adnato. — Long. 23, diam. 12 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 6½ lata. (Coll. Nr. 340.)

Bulinus erosus Brod. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — *Müll.* synops. p. 21.
— *arrosus Sow.* Conch. Ill. f. 34.
Buliminus erosus Beck ind. p. 69. N. 15.
Bulimus erosus Lam. ed. Dh. 114. p. 275.

Habitat in Peruvia; prope Iquiqui legit H. Cuming.

615. B. calvus Sowerby.

T. perforata, turrito-oblonga, ruguloso-striatula, nitida, fulva vel castanea, saturatius strigata; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella verticalis, recta; apertura ovalis, basi subangulata; perist. acutum, intus labiatum, margine columellari dilatato, reflexo-patente. — Long. 14, diam. 6 mill. Ap. 5½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 341.)

Bulinus calvus Sow. in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 72.
— — *Müll.* synops. p. 27.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 41.
Buliminus calvus Beck ind. p. 70. N. 29.
Bulimus calvus Lam. ed. Dh. 123. p. 179.

Habitat in insulis Gallopagos (Cuming).

616. B. pusio Broderip. †

T. valde ventricosa, ovato-globosa, cornea, diaphana, longitudinaliter striata; labri margo albus; umbilicus mediocris. — Long. 5/12, lat. 2/10 poll. (Br.)

Bulinus Pusio Brod. in Proc. Zool. Soc. 1836. p. 45.
— — *Sow.* Conch. Ill. f. 66. *)

Habitat in maris mediterranei insulis graecis: Syra (Graves).

Obs. «Duo tantum specimina lecta sunt; in altero umbilicus conspicuus, in altero fere obtectus est.»

*) T. ovata, olivaceo-fuscescens, longitudinaliter confertim striata; anfr. 6, summi planulati, infimi ventrosi; apertura rotundato-ovalis; columella rosea; perist. subreflexum (?), extus roseum. — Long. 13½, diam. 7½ mill. Ap. 6 mill. longa. (ex ic.)

617. **B. socotorensis Pfr.**

T. perforata, ovata, solidiuscula, confertim costulato-striata, nitidula, alba, strigis antrorsum obliquis fuscis ornata; spira conica, acuta; anfr. 5½ planiusculi, summi castaneo-marmorati, ultimus spiram paulo superans, convexus; columella torto-plicata; apertura oblongo-ovalis, intus fusca; perist. acutum, sublabiatum, margine columellari dilatato, reflexo, perforationem semitegente. — Long. 10, diam. 6½ mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 342.)

Bulimus Socotorensis Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 157.

Habitat in insula Socotora.

Obs. Num huic sectioni adnumerandus B. polymorphus Nr. 116?

* * *

618. **B. tauricus Lang.**

T. rimata, cylindrica, apice attenuata, striatula, alba, concolor vel fusco-strigata; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis fere aequans, basi juxta rimam profundam subcompressus; apertura acute ovalis; perist. rectum, albo-sublabiatum, margine columellari subincrassato, dilatato, patente. — Long. 24. diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 343.)

Bulimus tauricus Lang ined. (teste Menke.)
— *cylindricus Mke* syn. ed. 2. p. 129. Nec Gray 1825.
— *lineatus Rossm.* VI. p. 43. f. 380. Nec Spix 1827.
— *obsoletus Zgl.* teste Fér. in Bull. Zool. 1835. p. 20.
Chondrus lineatus Kryn. in Bull. Mosc. VI. p. 395. t. 6. f. 1.
Brephulus tauricus Beck ind. p. 72. N. 2.

β. Paulo major, anfr. 11, strigis obliquis cinereo-fuscis, pellucidis: long. 33, diam. 8 mill. Ap. 9 mill. longa. (Coll. Menke.)
Bulimus fusiformis Mke syn. ed. 2. p. 129.

γ. Minor, albus:
Chondrus fuscilabrus Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 398. t. 6. f. 2.
— — *Rossm.* VI. p. 43.

δ? Chondrus turgidus Kryn. l. c. p. 398. Rm. VI. p. 43.

ε? — concolor Kryn. l. c. p. 401. Rm. VI. p. 43.

Habitat in Tauria.

618ª. **B. varnensis Frivaldsky.**

T. profunde rimata, fusiformi-oblonga, solida, irregulariter striata, lactea, nitida, apice attenuato, obtusiusculo coerulescenti-cornea; anfr. 10 convexiusculi, ultimus 3/10 longitudinis subaequans, juxta rimam subcompressus; apertura parva, oblongo-ovalis, intus fuscula; perist. subrectum, acutum, intus albo-labiatum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, patente. —

Long. 21, diam. 6⅓ mill. Ap. 6⅓ mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 344.)

Bulimus varnensis Friv. in sched.

— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 192.

Habitat prope Varna Turciae.

619. B. bacillaris Menke. †

T. cylindrica, elongata, obtusiuscula, perforata, tenuiter striata, albida, strigis fuscescentibus picta; anfr. 11; apertura subovata; columella uniplicata; labrum simplex. — Long. 6, lat. 1⅓ lin. (Mke.)

Bulimus bacillaris Menke syn. ed. 2. p. 128.

Habitat . . . ?

620. B. subulatus Rossmässler. †

T. minutissime rimata, attenuato-cylindrica, obtusa, cinerea, fusculo-strigata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; apertura acute semiovata; perist. rectum, subsimplex, margine exteriore longiore. (Rm.) — Long. 10, diam. 3 mill. Ap. 2½ mill. longa, 1½ lata. (ex ic.)

Bulimus subulatus Rossm. Icon. VI. p. 48. f. 393.

Habitat . . . ?

Obs. 1. An forte idem ac praecedens?

Obs. 2. Conferantur Bul. compactus Nr. 354[a] et zebriolus Nr. 355.

§. 35.

621. B. antipodarum Gray. †

T. oblonga, imperforata, laevigata, pallide fusca, epidermide pallide fusca, opaca obtecta, lineis saturatioribus, praesertim ad suturam variegata, apice obtusa, rubicunda; anfr. convexiusculi; apertura...; perist....? — Spec. non adultum: anfr. 4, ultimus 1 poll. diam.; axis 1 poll. (Gray.)

Bulimus antipodarum Gray in Dieffenb. travels I. p. 247.

— — *Gray* in Revue zool. 1844. p. 375.

Habitat in Nova Seelandia (Dieffenbach).

Obs. «Similis B. fulgetro Brod.»

622. B. apicinus Menke. †

T. ovato-acuta, subperforata, apice rufa. — Long. 9‴. (M.)

Bulimus apicinus Menke catal. Malsb. p. 6.

Habitat . . . ?

623. B. auris Malchi (Helix) Müller. †

T. fusiformi, granulata, apertura ovata, axi exciso, patentissimo. — Long. 29, lat. 13 lin. (Müll.)

Helix auris Malchi Müll. verm. II. p. 112. N. 312.
— — — *Chemn.* IX. P. 2. p. 41. t. 121. f. 1037. 38. *)
— — — (Cochlogena) *Fér.* pr. 446.
Voluta auris Malchi Gmel. p. 3437. N. 11.
— — — *Dillw.* descr. cat. I. p. 501. N. 4.
— — — *Wood* ind. t. 19. f. 14.
Bulimus auris Malchi Brug. Enc. méth. I. p. 319. N. 36.
— — — *Küster* p. 17. t. 4. f. 1. 2.
Pupa auris Malachi Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
Auricula Malchi Beck ind. p. 102. N. 2.

Habitat...? — In Brasilia a Princ. Max. de Neuwied detectum esse asserit Cl. Férussac prodr. p. 57.

Obs. Etsi a Férussac et Küster Bulimis adnumerata haec species rarissima duce Beck ad Auriculas referenda videtur.

624. B. clausinus Mighels. †

T. dextrorsa, ovato-conica, crassa, solida, alba, glabra, nitida, interdum fascia angusta, lutescente supra medium anfractus ultimi et ad suturam ornata; anfr. 5 convexi; apertura subovalis; perist. flavidum, incrassatum, callum formans in margine columellari. — Long. $^7/_{10}$, diam. $^2/_5$''. (M.)

Bulimus clausinus Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 20.

Habitat in insula Sandwich. Hawaii.

625. B. corrugatus King. †

T. subalbida, transversim et longitudinaliter rugoso-striata, maculis fuscis obsoletis; apertura purpurascens; columella nigricanti-purpurea. — Long. $1^5/_8$, lat. $^{13}/_{16}$ poll. (K.)

Bulinus corrugatus King in Zool. Journ. V. p. 341.

Habitat prope Concepcion.

626. B. fragilis Lamarck. †

T. oblongo-conica, tenuis, longitudinaliter striata, albido-caerulescens; anfr. 7 convexiusculi; apertura ovata; labrum simplex. — Long. 1 poll. (Lam.) — Long. 30, diam. 12 mill. Ap. 13 mill. longa, 7 lata. (ex ic.)

Bulimus fragilis Lam. 21. p. 123. ed. Dh. p. 231.

---

*) T. ovali-oblonga, alba, subtilissime granulata; anfr. 6, suturis quibusdam marginalibus, elevatis, longitudinalibus, quasi interruptis: apertura auriformi, integra, coarctata, labro crasso, reflexo. (Chemn. l. c.) — Long. 70, diam. 32 mill. Ap. 33 mill. longa, 14 lata. (ex ic.)

Bulimus fragilis Deless. recueil t. 28. f. 2.
Helix fragilis Mont. (Lam.)
Habitat in Britannia?

627. **B. fuscus Guilding.** †

T. nigro-fusca, subdiaphana, epidermide longitudinaliter plicata; striis transversis evanidis. (G.) — Mens.?

Bulimulus fuscus Guild. in Zool. Journ. IV. p. 170.
Habitat in insula Barbados.

628. **B. Jayanus Lea.** †

T. ovato-conica, crassa, supra albida, subtus castanea, perforata; anfr. 6 subconvexi; apertura elliptica; labrum reflexum, albo margine lineatum; columella alba, laevis. (Lea) — Dimens.?

Bulimus Jayanus Lea in Proc. Am. phil. Soc. 1841. II. p. 31.
Habitat in insula Java?

629. **B. luteus (Partula) Lesson.** †

« Affinis P. lineatae. Differt peristomate minus crasso, umbilico obliterato, spira magis inflata, testa tenuiore, corneo-lutea. — Long. 8, diam. 5 lin.» (Less.)

Partula lutea Less. voy. de la Coq. p. 325.
Habitat in insula Borabora.

630. **B. rufescens Gray.** †

T. ovato-conica, perforata, glabra, minutissime striata, luteo-albida; apice acuto fusco; perist. simplice. — Long. 1 unc. (Gr.)

Bulimus rufescens Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
Bulimulus rufescens Beck ind. p. 66. N. 44.
Habitat in insula Jamaica.

631. **B. rufus (Partula) Lesson.** †

« Affinis P. otaheitanae, sed dextrorsa, sordide rufa. Differt spira minus elongata, magis inflata, magis conica, anfractu ultimo majore, apertura magis ovali, minus coarctata, peristomate tenuiore. — Long. 8, diam. 4 lin.» (Less.)

Partula rufa Less. voy. de la Coq. p. 324.
Partulus rufus Beck ind. p. 58. N. 9.
Habitat in insula Oualan Archipelagi Carolinarum.

Obs. Deficiente phrasi diagnostica et icone species dubia remanet. An forte eadem cum B. guamensi Nr. 186?

632. B. trochoides Bruguière. †

T. perforata, conica, apice obtusa, crassa, alba, laevis, basi concentrice striata; anfr. 5 plani, acute carinati; apertura ovalis, basi rotundata, intus alba; perist. subincrassatum, margine acuto, ad umbilicum angustum reflexiusculo. — Long. 3, diam. $2\frac{1}{2}'''$. (Brug.)

Bulimus trochoides Brug. Enc. méth. I. p. 300. N. 8.

Habitat in insula Madagascar.

Obs. Num hujus generis? Cl. auctor tentacula 4 parva animali ascribit.

SPECIES,

QUARUM NONNISI NOMINA MIHI INNOTUERUNT

Bulimus

alpinus Zgl. (Buliminus Beck p. 71. N. 41.) Alp. Austr.
angulatilis (Cochlogena) *Fér.* pr. 399. Prom. bon. spei.
apicatus (Bulimulus) *Beck* p. 65. N. 31. Guinea.
Assumptionis Val. (Bulimulus Beck p. 67. N. 45.) Ins. Assumption.
aurantius Perry t. 29. f. 1. (Cochlogena Fér. pr. 449.) Nov. Seeland.
auris cervina (Cochlogena) *Fér.* pr. 440. Brasil. (Mawe trav. of Bras. f. 4.) An var. goniostomi? (Pupa aur. cerv. Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.)
avellana (Buliminus) *Beck* p. 70. N. 30. An Bul. Jacobi var. Conch. Ill. f. 45 sinistr. Ins. Gallopag.
Babel (Cochlogena) *Fér.* p. 386. (Limicolarius Beck p. 61. N. 8.) Aegypt.
brephos (Obeliscus) *Beck* p. 62. N. 19. (Hel. oryza Moric.) Brasil.
brevis Jay catal. 1839. p. 55. Britannia.
centiquadrus Val. (Gonyostomus Beck p. 53. N. 3.) Paraguay.
chersonesicus Sow. Jay catal. 1839. p. 55. Dalmat.
Chiriguanus Orb. (Bulimulus Beck p. 68. N. 66.) Bolivia.
Christiani Beck p. 52. N. 13. Brasil int.
chrysotrema (Bulimulus) *Beck* p. 63. N. 4. Amer. merid.
columnella Klett. (Menke syn.)
compressus Beck p. 53. N. 26. Amer. merid.
concolor (Gonyostomus) *Beck* p. 53. N. 2. Resp. Argentin.
cylindricus Péron (Cochlogena Fér. pr. 427.) Ins. St. Petri et Francisci.
faunus Parr. (Villa disp. p. 22.) Syria.
feuilleanus Molina saggio sulla storia nat. del Chile. — Isis 1833. p. 828.
figulinus (Bulimulus) *Beck* p. 65. N. 20. Bahia.
gnomon (Obeliscus) *Beck* p. 62. N. 6. Mexico.
gracillimus (Obeliscus) *Beck* p. 62. N. 14.
grossus Beck p. 53. N. 23. Brasil. int.
insularum (Buliminus) *Beck* p. 69. N. 7. Ins. Portosancto.
Johnii (Cochlogena) *Fér.* pr. 444. (Chemn. XI. 2076. 77.) Ind. or. — Species generis dubii.
latilabris (Orthostylus) *Beck* p. 51. N. 17. Arch. ins. austr.
Lyelliae (Buliminus) *Beck* p. 70. N. 31. Ins. Gallopag.
melania (Cochlogena) *Fér.* pr. 448. Nov. Californ. (Melania striata Perry t. 29. f. 5.) — An = Bul. bovinus Brug.?
modestus Jan (Villa disp. p. 21.) Peru.
nemoralis Zgl. (Villa disp. p. 21.) St. Thomas.
niveus (Mastus) *Beck* p. 73. N. 7. Antill.
obvolutus Zgl. (Brephulus Beck p. 72. N. 1.) Chers. Taur.
ochraceus (Bulimulus) *Beck* p. 67. N. 47 Antill.
oscillum (Cochlogena) *Fér.* pr. 428 Bengal.
ovum (Cochlogena) *Fér.* pr. 409. (Beck p. 52. N. 6.)
pugio (Bulimulus) *Beck* p. 66. N. 38. Antill
pulicarius (Plectostylus) *Beck* p. 58. N. 1 Amer. merid.? (Gray Spic. zool. II f. 3.)
pullatus (Cochlostyla) *Fér.* pr. 333. Brasil. (Bul. Taunaisii min. Beck p. 52 N. 3.)
Rawakensis Fér. in Voy. de Freyc. Zool p. 483 in Cochlogenis Stomotoideis. (H. Rawacensis Fér. pr. 465 in Cochlodontis cylindricis.) Ins. Rawak Molucc

rubicundus (Cochlogena) *Fér.* pr. 407. India?

rubidus Zgl. (Villa disp. p. 21.) St. Thomas.

sceptrum (Obeliscus) *Beck* p. 61. N. 2. Madagascar.

Schröteri (Cochlogena) *Fér.* pr. 398. Coromandel. (Bulimulus Beck p. 65. N. 27.)

stylus (Obeliscus) *Beck* p. 62. N. 10. Portorico.

subantiquatus (Cochlicellus) *Beck* p. 63. N. 10. Antill.

tenellus (Cochlicellus) *Beck* p. 63. N. 6. Andalusia.

tingitanus (Mastus) *Beck* p. 73. N. 4. Tingis. (B. pupa Brug.)

tricallosus Mlf. (Chondrula) Beck p. 87. N. 6.

tumidus Parr. Syria.

turgens (Cochlogena) *Fér.* pr. 450. Lusitan.? (Mastus Beck p. 73. N. 5.)

unicallosus (Chondrus) *Kryn.* Bull. Mosc. IX. — An B. assimilis Parr.?

venustus (Bulimulus) *Beck* p. 65. N. 36. Antill.

vermiculatus (Odontostomus) *Beck* p. 54. N. 2. Amer. merid.

VII. Achatinella Swainson.

Conspectus specierum.

I. Solidae, opacae
1. turritae . . . . . §. 1. Nr. 1—7.
2. coniformes . . . . . §. 2. — 8—17.
3. ovatae . . . . . §. 3. — 18—24.
II. Corneae, pellucidae . . . . . §. 4. — 25—28.

---

§. 1.

1. A. bicolor (Achatina) Jay.

T ovato-turrita, longitudinaliter irregulariter striatula, solidiuscula, saturate castanea, unicolor vel fasciis nonnullis pallidis notata; anfr. 6—7, summi planulati, inferiores convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella valde arcuata, abrupte dentato-truncata: denticulo albido; apertura ovalis, intus livida; perist. simplex. — Long. 30, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 1.)

Achatina bicolor Jay catal. 1839. p. 119. t. 6. f. 3.
— *adusta Gould* in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 26.
Achatinella bicolor Pfr. Symb. III. p. 58.

Habitat in insula Sandwichensi Kawi.

2. A. turritella (Helix) Férussac.

T. turrita, solidula, longitudinaliter striato-rugosa, apice obtusiuscula, rufa; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; apertura ovalis; columella torta, lilacina, basi appendicula dentiformi instructa; perist. simplex, margine columellari nitido, reflexiusculo. — Long. 18, diam. 8 mill. Ap. 6½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 2.)

Helix turritella (Cochlogena) *Fér.* pr. 434. Hist. t. 155. f. 13.
— — (Helicteres) *Fér.* in Voy. de Freycinet Zool. p. 481.
Achatina oahuensis Green in Contrib. to Maclurian Lyc. (1827.) I. p. 47.

Helicteres turritellus Beck ind. p. 51. N. 10.
Bulimus turritella Anton Verz. p. 41. N. 1491.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 44.
Achatinella inornata Mighels in Bost. Proc. 1845. p. 21
— *turritella Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.

Habitat in insulis Sandwich.

3. A. picta Mighels.

T. sinistrorsa, ovato-elongata, striatula, carnea, maculis et flammis nigro-fuscis eleganter picta; spira conica, acutiuscula; sutura simplex; anfr. 7 convexi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella valde torta, dente planulato, acute prominente, albo vel lilacino munita; apertura semiovato-oblonga; perist. simplex, acutum, margine intus lividum. — Long. 17½, diam. 9 mill. Ap. 7½ mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 3 juv.)

Achatinella picta Migh. in Bost. Proc. 1845. Jan. p. 21.
— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. Aug. p. 90.

Habitat in insulis Sandwich., Oahu.

4. A. venusta Mighels.

T. sinistrorsa, elongato-conica, striatula, flava, strigis nigricantibus fulgurata; spira turrita, gracilis, apice obtusiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans; columella biplicata: plica inferiore compressa, parum prominente; apertura subrhombeo-ovalis, intus alba; perist. simplex, acutum. — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella venusta Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 21.

Habitat in insulis Sandwich., Oahu.

5. A. citrina Mighels.

T. sinistrorsa, oblongo-conica, solidula, subtilissime striatula, nitida, lutea; spira elongata, gracilis, apice obtusiuscula; anfr. 6, supremi plani, sequentes convexiusculi, ultimus subcarinatus, carina antrorsum evanescente; plica columellaris duplicata, inferior validior, torta, lamelliformis; apertura semiovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari subreflexo. — Long. 17½, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, medio $3^2/_3$ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella citrina Migh. in sched. Cuming.

Habitat in insulis Sandwich.

Obs. An sequentis var. sinistrorsa?

6. A. lutcola (Helix) Férussac. †

T. dextrorsa, elongata, striatula, alba, epidermide luteofugaci; anfr. 5—6?, ultimus vix carinatus: suturae non dupli-

catae; apertura ovato-elongata; columella alba, arcuata; rima umbilicalis non distincta. (Fér.) — Long. 18, diam. 8 mill. Ap. 9 mill. longa, 4 lata. (ex ic. spec. non adulti.)

Helix luteola (Cochlogena) *Fér.* hist. t. 155. f. 12.
— — (Helicteres) *Fér.* in Voy. de Freyc. Zool. p. 480.
Bulimus luteolus Pfr. Symb. I. p. 83.
Achatinella luteola Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

Habitat in insulis Mariannis (Gaudichaud).

* * *

7. A. plicata Mighels.

T. sinistrorsa, turrita, tenuiuscula, liris acutis, elevatis, spiralibus, lineisque longitudinalibus subtilissimis sculpta, fuscescenti-albida; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculi, summi fusco-marmorati; plica columellaris obsoleta; apertura semiovalis; perist. rectum, acutum. — Long. 15, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, medio 3 lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella plicata Migh. in sched. Cuming.

Habitat in ins. Sandwich. Molokai.

Obs. Num revera huic generi adnumeranda?

§. 2.

8. A. spirizona (Helix) Férussac.

T. ovato-acuta, longitudinaliter striata, nigricanti-brunnea, fascia carnea vel fulvida ad suturam ornata; spira conico-acuta; anfr. 7 planiusculi, lente accrescentes, ultimus inflatus, $^2/_5$ longitudinis vix superans, angulatus: angulo antice evanescente; apertura oblongo-ovalis, intus livida; perist. simplex, acutum; columella medio plica acuta, contorta, lamelliformi, albida instructa. — Long. 19, diam. 11 mill. Ap. 8 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 4.)

Helix spirizona (Cochlogena) *Fér.* pr. 433. Hist. t. 155. f. 14. 15.
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 480.
Achatinella acuta Swains. Monogr. in Quart. Journ. 1828. XXV p. 84.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 99. f. 3.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 88.
— *spirizona Jay* catal. 1839. p. 58.
— *baetica Migh.* in sched. Cuming.
Helicteres spirizona Beck ind. p. 51. N. 9.
Bulimus spirizona Pfr. Symb. II. p. 122.

Habitat in insulis Sandwich., Oahu.

9. A. rosea Swainson.

T. sinistrorsa, globoso-ovata, striatula, nitida, roseo-albida; sutura marginata; anfr. 5½ planulati, ultimus spira paulo brevior; plica columellaris compressa, alba; apertura semiovalis; perist. intus purpureo-labiatum, margine columellari subreflexo, patente. — Long. 23, diam. 13 mill. Ap. 12 mill. longa, 6 lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella rosea Swains. Zool. Ill. II. t. 123. f. 1.
— — *Jay* catal. 1839. p. 58.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 89.
— *bulimoides var. rosea Swains.* Monogr. p. 85.

Habitat in insulis Sandwich.

10. A. nubilosa Mighels.

T. ovato-turrita, dextrorsa, tenuiuscula, striata, albida, flammis longitudinalibus castaneis varie picta, interdum pallide fasciata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 infra suturam leviter marginatam subinflati, ultimus spira paulo brevior; columella dente crasso, albo, contorto munita; apertura semiovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 19, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, supra medium 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella nubilosa Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 20.

Habitat in insulis Sandwich., Oahu.

11. A. lorata (Helix) Férussac.

T. dextrorsa, ovato-conica, oblique striata, nitida, albida, virenti-lutea, rufa, fasciis latis vel angustis rufis vel nigricantibus lorata; sutura marginata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira paulo brevior, plerumque obsolete angulatus; apertura ovalis, intus alba; perist. simplex, acutum; columella plica contorta, dentiformi, valida, alba vel violaceà instructa. — Long. 22, diam. 11½ mill. Ap. 11 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 5.)

Helix lorata (Cochlogena) *Fér.* pr. 432. Hist. t. 155. f. 9—11.
— — (Helicteres) *Fér.* in Voy. de Freyc. Zool. p. 479. t. 68. f. 8—12.
Achatinella bulimoides Swains. Monogr. p. 85.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 108. f. 1.
— . . . *Sow.* Conch. Man. f. 287.
Helicteres loratus Beck ind. p. 51. N. 5.
Bulimus loratus Anton Verz. p. 41. N. 1492.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 44.

β. Fusco-cinerea, sutura et apice albis, dextrorsa vel sinistrorsa:
Achatinella mustelina Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 21.

Habitat in insulis Sandwich., var. β in Waianai (Mighels).

12. A. pulcherrima Swainson.

T. dextrorsa, oblongo-pyramidata, oblique striata, nitida, viridis vel luteo-fulvescens, lineis nigricantibus vel castaneis circumdata, apice acutiusculo alba; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus $^1/_9$ longitudinis subaequans; columella brevis, contorta, dente valido rubello instructa; apertura irregularis, semiovalis; perist. rectum, acutum, intus labiatum. — Long. 21, diam. 11 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 6.)

Achatinella pulcherrima Swains. Monogr. p. 86.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 123. f. 2.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 89.
Helix Byronii Wood suppl. t. 7. f. 30.
Achatina Byronii Gray in Wood suppl. p. 29.
Helicteres Byronensis Beck ind. p. 51. N. 7.

β. Major, unicolor olivaceo-fusca: long. 25, diam. 13 mill. Ap. 12 mill. longa, 6 lata. (Mus. Cuming.)

γ. Minor, virenti-lutea, fasciis albis et nigricantibus angustis ornata. (Mus. Cum.)

Habitat in insulis Sandwich., var. γ in ins. Molokai.

Obs. Varietas dextrorsa (et rarior) A. vulpinae esse videtur. Differt tamen anfractibus minus oblique descendentibus.

13. A. vulpina (Helix) Férussac.

T. sinistrorsa, ovato-oblonga, oblique striatula, nitidula, viridula, livida, fusca vel fulva, fusco-fasciata; sutura marginata; anfr. 6 planiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella brevis, contorta, dente valido roseo instructa; apertura irregularis, ovalis; perist. rectum, acutum, intus labiatum. — Long. 20, diam. 11 mill. Ap. 9½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 7.)

Helix vulpina (Cochlogena) *Fér.* pr. 429. Hist. t. 155. f. 1.
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 477. t. 68. f. 13. 14.
Achatina Stewarti Green in Contrib. tu Maclur. Lyc. I. p. 47.
Achatinella livida Swains. Monogr. p. 85.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 108. f. 2.
Bulimus vulpinus Menke syn. ed. 2. p. 20.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 44.
Helicteres lividus Beck ind. p. 51. N. 3.
— *vulpinus Beck* l. c. N. 8.

β. Minor, coloribus maxime varia, tota viridis vel castanea, saepe superne viridis, basi purpurascenti-castanea, dente columellari valido, acutiusculo, albo vel violacescente. — Long. 18, diam. 10 mill. Ap. 8½ mill. longa, 5 lata. (Spec.)
Helix vulpina var. Fér. t. 155. f. 2.

Habitat in insulis Sandwich.

14. A. Mighelsiana Pfr.

T. ovato-coniformis, laevigata, opaca, nitida, nivea, strigis cinereis variegata; spira conica, apice acutiuscula; sutura submarginata; anfr. 5½ convexi, ultimus infra medium linea nigricante (interdum duplicata) cinctus; plica columellaris valida, dentiformis, basi castanea; apertura semiovalis, fusco-marginata; perist. simplex, acutum. — Long. 17, diam. 8 mill. Ap. 8½ mill. longa, 4 lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella Mighelsiana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in ins. Sandwich. Molokai.

Obs. Differt a praecedentibus anfractibus convexis etc.

* * *

15. A. gravida (Helix) Férussac. †

T. sinistrorsa, inflata, striatula; spira conica, acuta; epidermide brunneo-fugaci; anfr. 5½; suturis non duplicatis; apertura semilunata, alba; perist. intus incrassato; columella alba, costa distincta munita; rima umbilicali. (Fér.) — Long. 24, diam. 13 mill. Ap. 10 mill. longa, 6 lata. (ex ic.)

Helix gravida (Cochlogena) *Fér.* hist. t. 155. f. 3.
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 478. t. 68. f. 4. 5.
Bulimus gravidus Pfr. Symb. I. p. 82. II. p. 115.
Achatinella gravida Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

Habitat in insulis Sandwich.

16. A. decora (Helix) Férussac.

T. sinistrorsa, globoso-acuminata, solida, albida, fasciis brunneis cincta; anfr. 5½, superiores plani, 2 ultimi convexi; sutura marginata; columella superne valide dentata; apertura obverse auriformis; perist. subincrassatum, intus violaceo-labiatum. — Long. 18½, diam. 12 mill. Ap. intus 8½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 8.)

Helix decora (Cochlogena) *Fér.* pr. 430. Hist. t. 155. f. 5—7.
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 478.
Achatina decora Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Küster* t. 8. f. 11. 12.
Achatinella perversa Swains. Monogr. p. 84.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 99. f. 2.
— *decora Jay* catal. 1839. p. 58.
— *vestita Mighels* in Bost. Proc. 1845. p. 20. *)

*) Shell sinistral, acuminate-conical, light brown, or white, with beautiful, narrow, dark brown bands, more or less numerous, imperforate; whorls 6, convex; aperture semilunate; lip reflected. Average length 1 inch, diam. ½ inch. (Migh. l. c.)

Helicteres decorus Beck ind. p. 51. N. 4.
Bulimus decorus Anton Verz. p. 41. N. 1490.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 44.
Turbo lugubris sinistrorsus Chemn. XI. p. 317. t. 213. f. 3014. 15.
Habitat in insulis Sandwich., Waianai et Hawaii (Mighels).

Obs. An varietas sinistrorsa A. lugubris?

17. **A. lugubris (Turbo) Chemnitz.**

T. dextrorsa, globoso-conica, laeviuscula, nigra, apice alba; spira conoidea, acuta; sutura marginata; anfr. 6, summi plani, 2 ultimi convexi, ultimus spira multo brevior; apertura perobliqua, irregulariter subquadrangularis; columella brevis, dente valido, obtuso, carneo armata; perist. acutum, intus labiatum, labio juxta dentem introrsum prominente. — Long. 18, diam. 11½ mill. Ap. 7½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 9.)

Turbo lugubris Chemn. XI. p. 278. t. 209. f. 2059. 60.
Helix lugubris (Cochlogena) *Fér.* pr. 431. Hist. t. 155. f. 8.
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 479.
Monodonta seminigra Lam. VII. p. 37. N. 21 ed. Dh. IX. p. 181.
— — *Deless.* recueil t. 37. f. 2.
Achatina lugubris Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
Achatinella pica Swains. Monogr. p. 84.
— — *Swains.* Zool. Ill. II. t. 99. f. 1.
— *lugubris Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.
Bulimus seminiger Menke syn. ed. 2. p. 26.
— *lugubris Pfr.* Symb. I. p. 83.
— — *Küst.* p. 40. t. 8. f. 9. 10.
Helicteres lugubris Beck ind. p. 51. N. 1.
Habitat in insulis Sandwich.

§. 3.

18. **A. taeniolata Pfr.**

T. ovato-oblonga, solida, striatula, nitida, alba, fasciis variis fuscis, deorsum obsoletioribus ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella alba, superne valide dentato-plicata; apertura irregulariter semiovalis, intus alba, nitida; perist. extus brevissime incrassatum, intus valde labiatum, margine columellari dilatato, reflexo, appresso. — Long. 20, diam. medio 11 mill. Ap. 10 mill. longa, intus 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella taeniolata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 38.
Habitat in insulis Sandwich.

19. A. viridans Mighels.

T. ovata, solidula, leviter striata, nitida, viridi et luteo radiata, strigis intercurrentibus nigricantibus; spira conica, obtusiuscula; sutura marginata; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella dente brevi, calloso, rubello munita; apertura oblongo-ovalis; perist. intus fusco-rubello-labiatum. — Long. 19, diam. 10 mill. Ap. 10 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 10.)

Achatinella viridans Migh. in Bost. Proc. 1845. Jan. p. 20.
— *radiata Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. Aug. p. 89.

Habitat in insulis Sandwich., Oahu.

20. A. tristis (Helix) Férussac.

T. ovato-acuta, irregulariter striata, albida, epidermide corneo-fusca induta; spira apice acuta, papillata; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira vix brevior; columella dente valido, oblique truncato munita; apertura ovalis; perist. rectum, intus subincrassatum. — Long. 20, diam. 11 mill. Ap. 9½ mill. longa. 5 lata. (Coll. Nr. 11.)

Helix tristis (Cochlogena) *Fér.* pr. 435 et Mus.!
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 482. t. 68. f. 6. 7.
Bulimus tristis Pfr. Symb. II. p. 52.
Achatinella fuliginosa Gould in Bost. Proc. 1845. p. 28.
— *tristis Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.

Habitat in insulis Sandwich.

21. A. rubens Gould.

T. dextrorsa, ovato-oblonga, crassiuscula, laevigata, carnea, apice fusca, epidermide decidua, fusca irregulariter striata; spira turrito-conica, apice acuta; anfr. 6—7 planiusculi, ultimus convexior, ⅓ longitudinis vix superans; columella plica compressa, subhorizontali munita; apertura subsemiovalis, intus rosea; perist. acutum, intus sublabiatum. — Long. 19, diam. 9 mill. Ap. 8 mill. longa, 4½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella rubens Gould in Bost. Proc. 1845. p. 27.

Habitat in insulis Sandwich.

22. A. textilis (Helix) Férussac. †

T. dextrorsa, ovata, vertice acuminata, striis longitudinalibus et transversalibus coelata; epidermide luteo- vel rufo-fugaci; anfr. 5; apertura semilunata; perist. intus incrassato; columella brevi, costa distincta munita; rima umbilicali vix distincta. — Long. 6⅔, diam. 3¾ lin. (Fér.)

Helix textilis (Cochlogena) *Fér.* pr. 436.

Helix textilis (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 482.
Helicteres textilis Beck ind. p. 51. N. 11.

Habitat in insulis Sandwich.

Obs. Ab auctore inter H. ventulum et tristem enumerata.

23. A. ventulus (Helix) Férussac.

T. ovata, striatula, epidermide fusca induta; anfr. 6, ultimi 2 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella brevis, basi lamella contorta, dentiformi, acuta instructa; apertura ovalis; perist. simplex, intus subincrassatum. — Long. 14½, diam. 8 mill. Ap. 6½ mill. longa, medio 3½ lata. (Coll. Nr. 12.)

Helix ventulus (Cochlogena) *Fér.* pr. 437 et Mus.!
— — (Helicteres) *Fér.* in voy. de Freyc. Zool. p. 481.
Helicteres ventulus Beck ind. p. 51. N. 12.
Bulimus ventulus Pfr. Symb. II. p. 53.
Achatinella microstoma Gould in Bost. Proc. 1845. p. 28.
— *ventulus Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.

Habitat in insulis Mariannis: Guam (Fér.).

24. A. nucleola Gould.

T. ovata, brevis, solida, oblique striatula, nitida, fusca; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans, subglobosus; columella breviter arcuata, acute dentata; apertura rotundato-lunaris; perist. simplex, album. — Long. 11, diam. 6½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella nucleola Gould in Bost. Proc. 1845. Jan. p. 28.
— *brevis Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

Habitat in insulis Sandwich.

§. 4.

25. A. pyramis Pfr.

T. ovato-pyramidata, levissime striata, diaphana, virenticornea; spira pyramidata, apice acuta; sutura linearis, anguste marginata; anfr. 8 plani, ultimus ⅜ longitudinis subaequans; columella brevissime arcuata, plica dentiformi complanata, acuta munita; apertura ovalis; perist. simplex. — Long. 12, diam. 5½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 2¾ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella pyramis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

Habitat . . . ?

26. A. corneola Pfr.

T. ovato-oblonga, levissime striatula, pellucida, nitida, cornea; spira turrito-conica, apice obtusiuscula; sutura subsimplex;

anfr. 8 planiusculi. ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella valde arcuata, dente acuto, prominente, albo, complanato instructa; apertura irregulariter ovalis; perist. intus callo tenui, nitido, albo sublabiatum. — Long. 15, diam. 7 mill. Ap. 6 mill. longa, $3^1/_2$ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella corneola Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

Habitat in insulis Sandwich.

27. A. clara Pfr.

T. oblonga, longitudinaliter plicatulo-striata, pellucida, pallide cornea; spira turrita, apice obtusa; sutura linea rufa marginata; anfr. 8 planiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix aequans; columella vix arcuata, dente parum prominente munita; apertura ovalis; perist. simplex. — Long. 12, diam. $4^3/_4$ mill. Ap. 4 mill. longa, $2^1/_3$ lata. (Mus. Cuming.)

Achatinella clara Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 90.

— *striatula Gould* in Bost. Proc. 1845. p. 28? *)

Habitat in insulis Sandwich.

28. A. cingula Mighels. †

T. dextrorsa, ovato-conica, cornea, glabra, polita, ad suturam fascia angusta, fusca ornata; anfr. 7 convexi; apertura parva, subovalis; labrum simplex. — Long. $^{11}/_{20}$, diam. $^1/_4$''. (M.)

Achatinella cingula Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 21.

Habitat in insula Sandwich. Oahu.

SPECIES NOMINE SOLUM COGNITAE.

Achatinella

alba Nutt. Jay catal. 1839. p. 58. Wahoo.

leucozonalis (Helicteres) *Beck* ind. p. 51. N. 2. Ins. oc. pacif.

pallida Nutt. Jay catal. 1839. p. 58. Wahoo.

Stewartii Nutt. Jay catal. 1839. p. 58. Wahoo.

sulphurata (Helicteres) *Beck* ind. p. 51. N. 6. Ins. oc. pacif.

turbinata Nutt. Jay cat. 1839. p. 58. Wahoo.

*) T. parva, ovato-elongata, nitida, viridi, longitudinaliter concinne et creberrime striato-costata; anfr. 7 convexis, ultimo partem dimidiam spirae aequante; apertura angusta, semilunari; labro albido, incrassato. — Long. $^7/_{20}$, lat. $^3/_{20}$ poll. (Gould l. c.)

VIII. Achatina Lamarck.

Conspectus specierum.

I. Bulimoideae. (Columella vix vel brevissime truncata . . . . . §. 1. Nr. 1—12.
II. Genuinae.
1. Anfractu ultimo spiram superante . . . . . §. 2. — 13—31.
2. Anfractu ultimo $^1/_3 — ^2/_5$ longitudinis subaequante . . . . . §. 3. — 32—40.
3. Turritae, anfr. ult. $^1/_3$ longit. vix aequante,
a. ventrosae . . . . . §. 4. — 41—50.
b. subulatae . . . . . §. 5. — 51—73.
III. Aberrantes, columella intorta, vix truncata.
1. Edentulae . . . . . §. 6. — 74—93.
2. Dentatae (Azeca) . . . . . §. 7. — 94—99.
IV. Glandinae. *)
1. Laevigatae,
a. sutura subsimplice . . . . . §. 8. — 100—118.
b. sutura crenulata . . . . . §. 9. — 119—120.
2. Spiraliter striatae . . . . . §. 10. — 121.
3. Longitudinaliter striatae vel costatae . . . §. 11. — 122—138.
4. Decussatim striatae . . . . . §. 12. — 139—147.
V. Dubiae . . . . . §. 13. — 148—157.

---

§. 1.

1. **A. Saulcydi Joannis.** †

T. sinistrorsa, ovata, griseo-violacea, fasciolis longitudinalibus, irregularibus, fuscis ornata; anfr. 7 convexi, ad suturam tenue plicati, ultimus spiram aequans; apertura ovalis, fusco-fulva; columella obliqua, vix truncata; labrum dextrum brevius; labrum

*) T. oblonga vel ovata, tenuis, anfractu ultimo basi attenuato; apertura oblonga, angusta; columella basi antrorsum arcuata.

simplex, acutum. (J.) — Long. 72, diam. 36 mill. Ap. 36 mill. longa, medio 19 lata. (ex ic.)

Achatina Saulcydi Joannis in Guér. mag. 1834. t. 50.
— — *Müll.* synops. p. 31.
— — *Lam.* ed. Dh. 21. p. 305.

Habitat in insula Principis sinus Guineensis.

2. A. regina (Helix) Férussac.

T. oblongo-subturrita, irregulariter striata, carnea, castaneo strigata et articulatim fasciata; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. $7^1/_2$ planiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella callosa, superne plicato-torta, basi brevissime truncata, area nigricanti-castanea circumdata; apertura semiovalis, intus lilacea; perist. simplex, rectum, acutum, margine externo cum columellari angulatim juncto. — Long. 80, diam. 34 mill. Ap. 40 mill. longa, 20 lata. (Coll. Nr. 1.)

Helix regina (Cochlitoma) *Fér.* pr. 32. Hist. t. 119. f. 3—5.
— — *Orb.* synops. p. 9.
Achatina regina Lam. ed. Dh. 31. p. 310.
Bulimus regina Orb. voy. p. 257. t. 29. f. 4. 5.
Bulinus Adamsonii Gray in Proc. Zool. Soc. 1833. p. 123?
— — *Müll.* synops. p. 30? *)
Orthalicus rex Beck ind. p. 60. N. 10.

A. Dextrorsa:
Schröt. Einleit. t. 4. f. 4.
Achatina regina Reeve Conch. syst. II. t. 177. f. 8.
— *melastoma Swains.* Zool. Ill. II. t. 152.
— *melanostoma Gray* in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

β. Anfractu ultimo nigricante, columella et apertura saturate violaceis, perist. margine nigro.

B. Sinistrorsa:
Helix regina Fér. t. 119. f. 6.
Achatina perversa Swains. Zool. Ill. I. t. 36.
— *melastoma Spix* test. bras. p. 16. t. 8. f. 1.
— *regina Reeve* Conch. syst. II. t. 177. f. 7.

Habitat in Brasilia, Bolivia; var. *β* in Nova Granada, ubi prope Chopo provinciae Pamplonae legit Cl. Funck.

---

*) T. ovato-conica, subtenui, purpurascenti-albida, purpureo-nebulosa, maculis oblongis purpureis albisque bifasciata; anfract. convexiusculis; apertura ovata, antice subeffusa; labro subincrassato, purpureo; labio purpurascenti-nigro; columella antice recta; gula alba; periostraco olivaceo. — Axis $3^3/_4$, diam. 2 unc. — Similis B. phasianellae. — Habitat in Parremo apud vulcanum Tolyma ad Andes orientales. (Gray l. c.).

3. A. undulata Guilding. †

T. ovato-oblonga, cinereo-flavescens, striis undulatis ferrugineo-nigris; spira obtusa, 7-voluta; columella nivea, columellario et peritremate saturate castaneis. — Long. 2″ 1½‴. (G.)

Achatina undulata Guild. in Zool. Journ. III. N. 12. p. 531.

Habitat in insula parva «Union» Caribaea.

Obs. «Species affinis: A. melastoma Swains.»

4. A. flammigera (Helix) Férussac.

T. ovato-elongata, acuminata, solidula, rugoso-striata, albida, strigis angustis, confertis, castaneis ornata; spira conica, apice papillata, alba; anfr. 7½ planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi nigricans; columella verticalis, subtruncata; sutura marginata; apertura ovalis, intus lactea; perist. acutum, nigro-limbatum, marginibus callo tenui, diffuso, opalino junctis. — Long. 66, diam. 31 mill. Ap. 31 mill. longa, 18 lata. (Mus. Cuming.)

Helix flammigera (Cochlitoma) *Fér.* pr. 341. Hist. t. 118. f. 5—7.
Achatina flammigera Desh. in Encycl. méth. II. p. 10. N. 2.
— *Richii Reeve* Conch. syst. II. t. 177. f. 4.
Bulimus Richii Lam. 6. p. 118. ed. Dh. p. 224.
— — *Küst.* p. 9. t. 8. f. 3. 4.
Limicolarius flammiger Beck ind. p. 60. N. 3.

Habitat in Peru.

5. A. Kercadonis Grateloup. †

T. oblongo-conica, tenuis, substriata, lutescente-rosea, flammulis rufo-violaceis obliquis ornata; anfr. 7 convexiusculi ad suturam granulosi; apertura obovata; labrum acutissimum. — Long. 45—50, diam. 25—28 mill. (Gr.)

Achatina Kercadonis Grat. in Act. Bord. XI. p. 414. t. 2. f. 1.
Lister t. 9. f. 4?

Habitat in Brasilia, Peru.

Obs. «An var. Ach. flammigerae?»

6. A. fasciata (Buccinum) Müller.

T. ovato-elongata, striatula, laeviuscula, alba, luteo-strigata, fasciis latis coerulescentibus, saturatius strigatis et castaneo-articulatis, cingulisque castaneis ornata; spira conico-turrita, apice rubra, acutiuscula; anfr. 8—9 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis plerumque subaequans; columella stricta, alba vel rosea, in adultis callosa, distincte truncata; apertura semiovalis; perist. rectum, acutum. — Long. 53, diam. 24 mill. Ap. 24 mill. longa, medio 13 lata. (Coll. Nr. 2.)

Buccinum fasciatum Müll. verm. II. p. 145. N. 334.

Bulla fasciata Chemn. IX. P. 2. p. 13. t. 117. f. 1004—6.
— — *Gmel.* p. 3430. N. 25.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 491. N. 46.
Bulimus vexillum Brug. Encycl. méth. I. p. 362. N. 107.
Helix vexillum (Cochlitoma) *Fér.* pr. 343. Hist. t. 121. f. 3. 6—8.
Achatina vexillum Lam. 10. p. 130. ed. Dh. p. 298.
— — *Küst.* t. 7. f. 1—3.
— *fasciata Swains.* Zool. Ill. III. t. 162.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 178. f. 12.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 172. t. 6. f. 1—7.
— *lineata Val.* in Humb. Zool. II. p. 248. t. 55. f. 2.
Chersina fasciata Beck ind. p. 74. N. 5.
Lister t. 12. f. 7.
Knorr Vergnüg. V. p. 40. t. 25. f. 4.

β. Lutescens unicolor vel fascia unica alba, lineisque viridibus ornata, columella et spirae apice roseis.
Achatina pallida Swains. Zool. Ill. I. t. 42.
— *lutea Mus. Berol.* Ant. Verz. p. 44.
Helix vexillum var. Fér. hist. t. 121. f. 4. 5.

γ. Citrina, apice rosea, fasciis 2 angustis purpureis, albo-marginatis, callo margines aperturae jungente fusco-purpureo, introrsum dilatato. (Mus. Grun.)

δ. Alba, unicolor vel lineis viridibus cincta, apice columellaque albis.
Achatina crenata Swains. Zool. Ill. I. t. 58. *)
— *Anais Lesson* in Revue zool. 1840. p. 356? **)
— *fasciata var. Reeve* l. c. t. 178. f. 11.
Helix vexillum var. Fér. t. 121. f. 1. 2.
Chersina crenata Beck ind. p. 74. N. 4.
Bulimus zebra Orb. cub. t. 6. f. 8.

ε. Elongata: long. 72, diam. 29 mill. Ap. 28 mill. longa, 14 lata. (Spec.)

Habitat in insula Cuba, praesertim in truncis Oreodoxae regiae! Var. γ ex insula Haiti oriunda dicitur.

Obs. 1. Varietates α—δ varie invicem transeunt.
Obs. 2. In speciminibus non adultis truncatio columellae vix perspicitur.

7. A. solida Say. †

T. conica, elongata, glabriuscula vel distanter rugulosa, ponderosa, flavida, apice alba; anfr. 7; apertura parva; columella vix

*) T. alba, fasciis viridibus capillaribus; spira elongata, subattenuata; anfr. 6 convexis; labio exteriore crenato; basi subtruncata. (Swains. l. c.)

**) T. nivea, spira elongata, subattenuata, fasciis viridibus capillaribus 10; anfr. 7 convexis, superioribus immaculatis; labro dextro crenulato; columella verticali, subtruncata. — A. crenatae Swains. affinis. — Hab.? (Less. l. c.)

truncata, intus ad basin margine prominente; labrum intus incrassatum. — Long. 2¼ poll. (Say.)

Achatina solida Say in Philad. journ. V. p. 122.

Habitat in Florida orientali.

8. A. Reeveana Pfr.

T. oblongo-turrita, tenuis, sublaevigata, sub lente spiraliter subtilissime striatula, nitidula, sub epidermide lutescente decidua alba, luteo-bifasciata: fascia altera suturali, altera peripherica; sutura regulariter crenulata; anfr. 7½, omnes convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella tenuis, strictiuscula, brevissime truncata; apertura truncato-ovalis; perist. tenuissimum. — Long. 48, diam. 22 mill. Ap. 22 mill. longa, 13 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Reeveana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Africa occidentali.

Obs. Colore persimilis sequenti; differt spira obtusa, anfract. summis convexiusculis, sutura crenata, aperturae forma etc.

9. A. alabaster (Helix) Rang.

T. ovato-conica, sublaevigata, sub lente minutissime decussata, diaphana, non nitens, alba, fasciis (1 —) 2 fuscescenti-luteis, altera suturali, altera peripherica ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 8, 3 primi plani, reliqui convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; columella strictiuscula, brevissime truncata; apertura lata, subtetragono-ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 31, diam. 15 mill. Ap. 14 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 3.)

Helix alabaster Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 20. t. 1. f. 2.

Achatina alabaster Lam. ed. Db. 34. p. 312.

— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 178. f. 9.

Chersina Alabaster Beck ind. p. 74. N. 3.

Habitat in insula Principis prope littus occidentale Africae.

10. A. tenuis (Liguus) Gray.

T. ovato-turrita, tenuis, oblique striatula, diaphana, albida, epidermide corneo-flavida, decidua munita; spira conica, obtusa; anfr. 7 convexi, ultimus ⅗ longitudinis subaequans, obsolete angulatus; columella recta, simplex, area castanea circumdata, brevissime truncata; apertura ovalis. — Long. 33, diam. 17 mill. Ap. 15 mill. longa, 10 lata. (Coll. Gray.)

Liguus tenuis Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.

— — *Müller* synops. p. 32.

Limicolarius tenuis Beck ind. p. 60. N. 2.

Achatina tenuis Pfr. Symb. II. p. 135.

Habitat in Africa?

11. A. carinata Pfr.

T. conica, laevigata, alabastrino-albida, fasciis 2 latis albis opacis ad suturam et peripheriam ornata; anfr. 6½ plani, ultimus acute angulatus, ⅔ longitudinis subaequans; columella subverticalis, basin non attingens, brevissime truncata; apertura subquadrangularis; perist. simplex. — Long. 31, diam. 17 mill. Ap. 15 mill. longa, 9½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina carinata Pfr. Symb. III. p. 90.

Habitat . . . ?

12. A. unizonata Jan. †

T. conico-ovata, ventricosa, laevis, albida, linea fusca zonata; labium columellare margine interiore albo, exteriore fusco. — Alt. 1″ 10‴, lat. 1″. Ap. 11‴ longa, 6‴ diam. (Jan.)

Achatina unizonata Jan Mantissa p. 2.

Habitat in America meridionali.

Obs. Huic sectioni peraffines sunt Bulimi in § 22 enumerati: zebra Müll. pulchellus Spix et phlogerus Orb. (p. 143 — 145.)

§. 2.

13. A. sinistrorsa (Bulla) Chemnitz.

T. sinistrorsa, ovato-oblonga, longitudinaliter rugosa, striis spiralibus obsolete decussata, rufo-castanea; spira conica, apice obtusa, pallida; anfr. 6 — 7 convexiusculi, summi fusco-flammulati, ultimus spiram paulo superans, rarius obsolete 1 — 2carinatus; columella strictiuscula, oblique truncata; apertura oblongo-semiovalis, intus coerulescens; perist. simplex, acutum, marginibus callo coerulescente, nitido junctis. — Long. 130, diam. 57 mill. Ap. 72 mill. longa, medio 41 lata. (Coll. Nr. 4.)

Bulla achatina sinistrorsa Chemn. IX. P. 1. p. 28. t. 103. f. 875. 76.
— *bicarinata Dillw.* descr. cat. I. p. 496. N. 55.
Bulimus bicarinatus Brug. Enc. méth. I. p. 359. N. 102.
Helix bicarinata (Cochlitoma) *Fér.* pr. 350. Hist. t. 128.
— — *Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 23.
Achatina bicarinata Lam. 6. p. 129. ed. Dh. p. 296.
— — *Beck* ind. p. 76. N. 13.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 178. f. 13.
— — *Küster* t. 15. f. 3. 4.

β. Lactea, epidermide lutea prope marginem sinistrum.

Habitat in insula Principis frequens, var. β rarissima (Rang).

Obs. Nomen Bruguiereanum minus aptum, cum in longe plerisque speciminibus carinae vel omnino desint vel obsoletissimae sint.

14. A. variegata (Buccinum) Fab. Columna.

T. ovato-acuta, obsolete decussata, sub epidermide lutea alba, flammis latis fulguratis et undulatis castaneis ornata; spira conica, apice rosea, acutiuscula; sutura linea impressa marginata et crenulata; anfr. 7 subplanulati, ultimus ventrosus, spiram paulo superans; columella rubra, arcuata, basi oblique truncata; apertura late acuto-ovalis; perist. simplex, rectum. — Long. 160, diam. 80 mill. Ap. 95 mill. longa, 50 lata. (Coll. Nr. 5.)

Bulla achatina Linn. syst. ed. X. N. 343. p. 728. ed. XII. N. 391. p. 1186.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 18. t. 118. f. 1012. 13.
— — *Gmel.* p. 3431. N. 32.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 494. N. 53.
Buccinum variegatum exoticum Fab. Col. aquat. t. 16. f. 3.
— *achatinum Müll.* verm. II. p. 140. N. 332.
Bulimus achatinus Brug. Enc. méth. I. p. 358. N. 101.
Achatina variegata Roissy in Buff. Moll. p. 354.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 4.
— *perdix Lam.* 1. p. 127. ed. Dh. p. 294.
— — *Küster* t. 2. f. 1. 2.
— *zebra Blainv.* Malac. p. 456. t. 40. f. 1?
Helix achatina (Cochlitoma) *Fér.* pr. 253. Hist. t. 131. f. 1—3. t. 131 A. f. 1—3. t. 131 B.
— — *Donovan* Natur. Repos. V. t. 149.
Mus. Gottwald. t. 33. f. 220.

Habitat in sylvis Africae occidentalis (Rang).

15. A. marginata Swainson.

T. ovato-conica, crassa, striatula, sublaevigata, nitida, fulvescenti-lutea, olivaceo-fusco nebulosa, strigis latis nigricanti-castaneis, lineisque fulguratis et maculis rufis variegata; spira conica, apice obtusa, pallida; sutura marginata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis aequans, inflatus; columella callosa, alba, arcuata, breviter truncata, ad basin aperturae ovali-ellipticae, intus coerulescentis, angulum formans; perist. simplex, rectum, acutum. — Long. 120, diam. 63 mill. Ap. 70 mill. longa, medio 40 lata. (Coll. Nr. 6.)

Achatina marginata Swains. Zool. Ill. t. 30.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 2.
— — *Swains.* Malac. p. 170. t. 23.
— *amphora Jay* catal. 1839. p. 58.
Helix amphora var. Fér. pr. 352. p. 70.
— *marginata Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 33.

Habitat in Africa occidentali, littore Malaguettano, Dentium et Auri.

16. A. Knorrii Jonas.

T. ovata, ventricosa, decussata, superne intense rosea, inferne ex roseo albescens, flammis longitudinalibus fuscis, inferne latioribus, ad basin confluentibus, ibique nigrescentibus eleganter picta; anfr. 6 convexi, 2 infimi infra suturam linea impressa circumdati, ultimus spira longior; spira conica, obtusa; apertura oblongo-ovata, intus alba; labrum fusco-marginatum; columella arcuata, callosa, nitida, alba. — Long. 2″ 11‴, lat. 1″ 8‴. Ap. 1″ 10‴ alta. (Jonas. — Coll. Nr. 7?)

Achatina Knorrii Jonas in Wiegm. Arch. 1839. I. p 345.
Knorr Vergnüg. III. t. 3. f. 1.

Habitat . . . ?

17. A. zebra (Bulla) Chemnitz.

T. ovato-conica, crassiuscula, striata, sub epidermide fulvo-lutea alba, strigis crebris angustis, undulatis, castaneis ornata; spira conica, acutiuscula; sutura crenulata, non marginata; anfr. 8 vix convexiusculi, superiores lineis spiralibus decussati, ultimus spiram paulo superans; columella callosa, sordide alba, strictiuscula, breviter et abrupte truncata; apertura oblongo-ovalis, intus livido-albida; perist. rectum, obtusum, margine basali arcuato. — Long. 111, diam. 58 mill. Ap. 63 mill. longa, 34 lata. (Coll. Nr. 8.)

Bulla zebra Chemn. IX. P. 2. p. 22. t. 118. f. 1014.
— *achatina var. Dillw.* descr. cat. I. p. 495.
Bulimus zebra Brug. Enc. méth. I. p. 357. N. 100.
Helix zebra (Cochlitoma) *Fér.* pr. 354. Hist. t. 133.
Achatina zebra Lam. 2. p. 128. ed. Dh. p. 295.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 6.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 179. f. 17.
— — *Küster* t. 2 f. 3.
— *Chemnitziana Pfr.* Symb. II. p. 132.
Achatinus zebra Montf. II. p. 419. t. 105.

Habitat frequens in insula Madagascar. (Brug.)

Obs. Specimina existunt usque 6½″ longa, 3¼″ diam.

18. A. Kraussi Reeve.

T. ovato-conica, crassa, rugosa, nitida, nigricanti-castanea, strigis albis rectis et fulguratis variegata; spira conica, apice alba, obtusa; sutura ruditer crenulata; anfr. 7 vix convexiusculi, summi minutissime decussati, ultimus spiram aequans; columella strictiuscula, albida, arcuatim oblique truncata; apertura ovalis, intus coerulescenti-alba; perist. simplex, rectum. — Long. 72, diam 37 mill. Ap. 37 mill. longa, 20 lata. (Coll. Nr. 9.)

Achatina Kransii Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 55.

Achatina Kransii Reeve Conch. syst. II. t. 179. f. 19.
— *Kraussi Pfr.* Symb. II. p. 133.

Habitat ad Natal Africae meridionalis. (Dr. Krauss.)

19. A. fulva (Bulimus) Bruguière. †

T. ovato-oblonga, obsolete striata; anfr. 8, ultimi fulvo-fusci, maculis fuscis majoribus vel strigis longitudinalibus ornati; apertura spira brevior; columella contorta, alba; labrum intus album. (Dh.) — Long. 140, diam. 60 mill. Ap. 70 mill. longa, 35 lata. (ic. Küst.)

Bulimus fulvus Brug. Enc. méth. I. p. 359.
Helix fulvescens (Cochlitoma) *Fér.* pr. 345.
Achatina fulvescens Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— *maculata Desh.* in Enc. méth. II. p. 12. N. 10.
— *fulva Beck* ind. p. 76. N. 12.
— — *Lam.* ed. Dh. 30. p. 309.
— — *Küst.* t. 11. f. 3. 4.
Lister t. 582. f. 35 a.

Habitat in Senegambia?

20. A. immaculata Lamarck. †

T. maxima, ovato-oblonga, ventricosa, longitudinaliter sulcato-rugosa, fulva, apice albida; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spiram superans; columella rosea; apertura oblongo-ovalis, intus coerulescens: perist. simplex, margine interiore fusco. — Long. 145, diam. 68 mill. Ap. 85 mill. longa, medio 40 lata. (ic. Fér.)

Achatina immaculata Lam. 3. p. 128. ed. Dh. p. 295.
— — *Desh.* Enc. méth. II. p. 9. N. 1.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 5.
Helix immaculata (Cochlitoma) *Fér.* hist. t. 127.

Habitat . . . ?

21. A. acuta Lamarck. †

T. ovato-conica, elongata, apice acuta, tenuissime decussata, alba, flammis longitudinalibus rubro-castaneis, inferne confertis, subcoalitis, superne separatis; anfr. 8½ vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans; apertura ovalis, superne acuta, intus alba; columella fortiter truncata; perist. simplex. — Long. 120, diam. 50 mill. Ap. 58 mill. longa, medio 32 lata. (ic. Fér.)

Achatina acuta Lam. 5. p. 129. ed. Dh. p. 296.
— *mauritiana Lam. var. Beck* ind. p. 76. N. 11.
Helix acuta (Cochlitoma) *Fér.* hist. t. 124 A. f. 2.

Habitat in Africa, prope Sierra Leone.

22. A. panthera (Helix) Férussac.

T. ovato-acuminata, solida, ponderosa, albo-grisea, strigis, flammis undulatis et maculis fusco-violaceis et fulvis ornata; spira elongato-conica, apice acutiuscula; sutura levis, anguste marginata; anfr. 8 — 9 planiusculi, summi minutissime decussati, penultimus lineis impressis distantioribus decussatus, ultimus spira paulo brevior, longitudinaliter confertim plicatus; columella stricta, callosa, alba, subabrupte truncata; apertura oblongo-ovalis, alba; perist. rectum, acutum, marginibus callo albo junctis, dextro basalique leviter arcuato. — Long. 135, diam. 60 mill. Ap. 70 mill. longa, 36 lata. (Coll. Nr. 10.)

Helix panthera (Cochlitoma) *Fér.* pr. 349. Hist. t. 126. f. 1. 2.
Achatina panthera Lam. ed. Dh. 29. p. 309.

Habitat . . . ?

23. A. reticulata Pfr.

T. oblongo-acuta, solida, ponderosa, longitudinaliter confertim plicata, sulcis concentricis profunde reticulata, albida, castaneo-marmorata et maculata; spira elongata, acuta, superne minute granulata; sutura subcrenulata; anfr. 8 parum convexi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella crassa, alba, arcuata, abrupte truncata; apertura utrinque attenuata, oblongo-ovalis. — Long. 160, diam. 70 mill. Ap. 73 mill. longa, 43 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina reticulata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 74.
— . . . *Fér.* hist. fasc. 29. t. 129.

Habitat in Africa.

24. A. lactea Reeve.

T. oblongo-ovata, solida, sordide lactea, longitudinaliter rugoso-striata, lineis transversis granulato-decussata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella incrassata, oblique truncata; apertura ovali-oblonga; perist. crassum, rectum. — Long. 113, diam. 54 mill. Ap. 53 mill. longa, 30 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina lactea Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 55.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 177. f. 6.

Habitat ad Zanzibar Africae.

25. A. tincta Reeve.

T. oblongo-ovata, tenuiuscula, laevigata, alba, maculis rufis latis strigata et fulminata, epidermide fulvida induta; spira oblongo-conica, apice obtusa, rubescens; anfr. 7½ convexiusculi, summi obsolete granulati, ultimus $^1/_3$ longitudinis subaequans;

columella subtorta, oblique truncata; apertura ovalis, intus lactea; perist. simplex. — Long. 80, diam. 35 mill. Ap. 38 mill. longa, 21 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina tincta Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 55.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 179. f. 18.

Habitat in Africa?

26. A. purpurea (Bulla) Chemnitz.

T. ovata, solida, longitudinaliter striata et obsolete decussata, sub epidermide olivacea fulva, fusco strigata et marmorata; spira conoidea, obtusa, nuda, pallida; sutura linea impressa marginata et crenulata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus inflatus, $^4/_7$ longitudinis aequans; columella perarcuata, purpurea, basi oblique truncata; apertura ampla, semiovalis, in fundo lilacina, anterius purpurea; perist. acutum, marginibus callo nitido, purpurascente, introrsum diffuso, junctis. — Long. 87, diam. 50 mill. Ap. 52 mill. longa, infra medium 31 lata. (Coll. Nr. 11.)

Bulla purpurea Chemn. IX. P. 2. p. 25. t. 118. f. 1017. 18.
— — *Gmel.* p. 3433. N. 42.
— — *Dillw.* cat. I. p. 495. N. 54.
Bulimus purpurascens Brug. Enc. méth. I. p. 360. N. 103.
Helix purpurea (Cochlitoma) *Fér.* pr. 351.
— — *Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 27.
Achatina purpurea Lam. 4. p. 128. ed. Dh. p. 296.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 1.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 130. t. 12. f. 3. 4.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 176. f. 1. (Long. 130, diam. 70 mill. Ap. 72 mill. longa, 40 lata.)
— — *Küster* t. 2. f. 6. 7. (ic. Chemn.)

Habitat in Africa; in littore Malaguettano (Rang).

27. A. Lamarckiana Pfr.

T. ovato-conica, solida, ponderosa, ruditer plicata, in fundo albido strigis fulminatis nigricantibus et castaneis, maculisque rufis variegata; spira conica, pallida, apice obtusiuscula; anfr. 8 convexiusculi, supremi lineis spiralibus obsolete decussati, ultimus ventrosus, spiram superans; columella arcuata, purpureo-callosa, supra basin aperturae oblique et breviter truncata; apertura ovalis, intus margaritacea, coerulescens, saturatius marmorata: perist. fusco-limbatum, marginibus callo purpureo junctis. — Long. 103, diam. 52 mill. Ap. 58 mill. longa, medio 34 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Lamarckiana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 115.

Habitat in regionibus intimis insulae Madagascar.

28. A. fulica (Helix) Férussac.

T. ovato-conica, longitudinaliter striata, albido-lutescens, strigis longitudinalibus fuscis confertis ornata; spira apice acutiuscula; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spira paulo brevior; columella leviter arcuata, supra basin aperturae abrupte et anguste truncata; apertura elliptico-ovalis, intus albida; perist. simplex, marginibus callo junctis, dextro intus plerumque fusco-limbato. — Long. 86, diam. 38 mill. Ap. 41 mill. longa, 24 lata. (Coll. Nr. 12.)

Helix fulica (Cochlitoma) *Fér.* pr. 347. Hist. t. 124 A. f. 1.
— *borbonica Fér.* pr. 346.
— *mauritiana Quoy* et *Gaim.* Astrol. II. p. 152. t. 11. f. 10—15.
Achatina mauritiana Lam. 7. p. 129. ed. Dh. p. 297.
— — *Beck* ind. p. 76. N. 11.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 129. t. 11. f. 11. 12.
— *Couroupa Less.* Coq. p. 318. t. 9. f. 2.
— — *Isis* 1833. p. 130. t. 2. f. 2.
— — *Voigt* Cuv. Thierr. III. p. 96.
— *fulica Desh.* in Lam. ed. II. p. 297.

β. Fulva, strigis distantibus, irregularibus, saturatioribus:
Helix zebrina (Cochlitoma) *Fér.* pr. 348. Hist. t. 125. f. 3—5.

γ. «T. ovata, ventricosa, tenuissime striata, nitida, castanea, apice albida; suturis linea alba marginatis, labro intus albo. — Long. 2 poll. 8 lin.»
Achatina castanea Lam. 8. p. 130. ed. Dh. p. 297.

δ. Sinistrorsa: Grat. Bord. XI. p. 415. t. 2. f. 6.

ε? Anfractu ultimo ventroso, fere globoso, juxta columellam umbilico rugoso, non pervio instructo. *) — Long. 96, diam. 53 mill. Ap. 52 mill. longa, 31 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in insula Madagascar, introducta in Ile Bourbon et Ile de France (Lesson).

29. A. papyracea Pfr.

T. ovato-oblonga, tenuis, striis longitudinalibus et concentricis obsolete decussata, diaphana, fulva, castaneo obsolete marmorata; spira conica, apice obtusa; sutura marginata; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spiram vix superans; columella subrecta, basin aperturae fere attingens, oblique truncata, linea purpurea ornata; apertura ovalis, intus margaritacea. — Long. 66, diam. 30 mill. Ap. 35 mill. longa, 19 lata. (Coll. Nr. 13)

Achatina papyracea Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 74.

Habitat in Africa, ad ripas fluvii Nun.

*) Haec testa rarissima, forsan unica («found only in the woods of «Les trois Ilots» South-East district, island of Mauritius». Sir D. Barclay) a charactere generico discrepans, attamen caeterum A. fulicae simillima, nonnisi forma monstrosa hujus speciei mihi esse videtur.

30. A. semisculpta Pfr.

T. ovato-elongata, tenuis, longitudinaliter regulariter striata, fuscescenti-albida, strigis fulgurantibus rufis picta; spira conica, apice obtusiuscula, lineis confertis, concentricis regulariter granulosa; anfr. $7\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus spiram subaequans, usque ad peripheriam lineis impressis, distantioribus decussatus; columella subrecta, abrupte truncata; apertura ovali-acuta; perist. simplex, rectum. — Long. 58, diam. 28 mill. Ap. 30 mill. longa, 16 lata. (Coll. Nr. 14.)

Achatina semisculpta Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 74.
— — *Dunker* in Zeitschr. f. Mal. 1845. Nov. p. 163.

Habitat in Benguela Africae occidentalis. (Dr. Tams.)

31. A. magnifica Pfr.

T. ovato-subfusiformis, tenuiuscula, leviter striatula, haud nitens, lutea, strigis et flammis virentibus et castaneis, fasciaque 1, luteo et castaneo articulata, supramediana variegata; spira conica, apice obtusissima; anfr. $5\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; sutura anguste marginata; columella recta, verticalis, callo introrsum albo, extrorsum nigricante induta, basi rubra, ad basin aperturae ellipticae, intus coerulescenti-albidae oblique truncata. — Long. 47, diam. 21 mill. Ap. 27 mill. longa, medio 13 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina magnifica Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat prope Quito reipublicae Aequatoris (Delattre).

§. 3.

32. A. virginea (Bulla) Linn.

T. ovato-subturrita, solida, laevigata, nitida, alba, fasciis angustis flavis, viridibus, rubris, violaceis et nigricantibus elegantissime cingulata; spira conico-turrita, apice vix obtusiuscula, plerumque rosea; anfr. 7—8 convexi, ultimus subglobosus, $\frac{1}{3}$ longitudinis vix superans, plerumque subangulatus; columella oblique procedens, cum ventre anfractus penultimi angulum subrectum formans, basi abrupte truncata, purpurea, rosea vel alba; apertura obsolete rotundato-tetragona, intus lilacea, basi plica marginem non attingente munita; perist. simplex, rectum, marginibus plerumque callo rubro junctis. — Long. 42, diam. 22 mill Ap. 18 mill. longa, medio 11 lata. (Coll. Nr. 15. Spec. max.)

Bulla virginea Linn. syst. ed. XII. p. 1186. N. 390.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 8. t. 117. f. 1002—3.
— — *Gmel.* p. 3429. N. 24.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 491. N. 45.
— — *Mawe* t. 22. f. 6.

Buccinum virgineum Müll. verm. II. p. 143. N. 333.
Bulimus virgineus Brug. Enc. méth. I. p. 363. N. 109.
Liguus virgineus Montf. p. 423. t. 106.
Helix virginea (Cochlitoma) *Fér.* pr. 344. Hist. t. 118. f. 3. 4. t. 120. f. 2—7.
Achatina virginea Lam. 11. p. 131. ed. Dh. p. 299.
— — *Crouch* p. 19. t. 15. f. 5.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 176. f. 2.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 286.
— — *Küster* t. 7. f. 8. 9.
— *Virginiae Blainv.* Malac. p. 456. t. 38. f. 2.
— *vittata Swains.* Zool. Ill. I. t. 84. *)
Chersina virginea Beck ind. p. 74. N. 6.
β. Sinistrorsa:
Bulla virginea Chemn. X. t. 173. f. 1682. 83.
Helix virginea Fér. hist. t. 120. f. 8.
Achatina virginea Küst. t. 14. f. 9. 10.

Habitat in insulis Haiti, Cuba et in Guyana. (Lam.)

33. A. emarginata Swainson.

T. ovato-acuminata, solida, striata, alba vel flavescens, fasciis viridibus et rubris ornata; spira producta, acutiuscula; sutura submarginata; anfr. 8 planulati, ultimus $^2/_5$ longitudinis fere aequans; columella arcuata, subplicata, purpurea; apertura rhombeo-ovalis, intus violacea; perist. simplex, acutum, marginibus callo purpureo intrante junctis. — Long. 54, diam. 24 mill. Ap. 23 mill. longa, 13½ lata. (Coll. Nr. 16.)

Achatina emarginata Swains. Zool. Ill. I. t. 84. **)
— *virginea Küst.* t. 7. f. 6. 7?
Bulla virginea Chemn. IX. t. 117. f. 1000. 1001?
Helix virginea Fér. hist. t. 120. f. 1!

Habitat in insulis Antillis.

34. A. picta Reeve.

T. ovato-conica, laevis, lutea, strigis latis violaceo-fuscis, remotis ornata, maculisque castaneis ad suturam et peripheriam taeniata; spira conica, apice rosea; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans; columella torta, basin aperturae non attingens, oblique truncata; apertura semiovalis; perist. simplex,

*) T. ovato-oblonga, crassa, albente, vittis nigris fuscisque angustis ornata; apertura ovata, subcontracta; columella tantum non recta, basi subtruncata. — Gualt. t. 6. f. A. (Swains. l. c.)

**) T. producta, subflava, fasciis viridibus flavisque ornata; apertura ovato-rotundata alba; labio exteriore medio inciso, basi emarginato. (Swains. l. c.)

acutum. — Long. 39, diam. 20 mill. Ap. 19 mill. longa, 11 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina picta Reeve in Proc. Zool. Soc. 1842. p. 56.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 178. f. 10

Habitat in insula Cuba.

* * *

35. A. ustulata Lamarck.

T. oblonga, apice attenuata, obtusa, tenuis, superne obsolete granulata, strigis fulminatis fulvis et nigris variegata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata, callo tenui coerulescente induta, oblique truncata; apertura oblongo-ovalis; perist. tenue, acutum. — Long. 84, diam 31 mill. Ap. 36 mill. longa, 18 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina ustulata Lam. 9. p. 130. ed. Dh. p. 297.
— — *Beck* ind. p. 75. N. 9.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 177. f. 5.
Helix ustulata (Cochlitoma) *Fér.* hist. t. 125. f. 1. 2.
β. Minor, unicolor fulva: long. 64, diam. 24 mill. (Mus. Cuming.)

Habitat in Promontorio Bonae Spei (Krauss).

36. A. semidecussata Menke.

T. ovato-turrita, apice obtusa, opaca, nitidula, decussatim granulato-striata (granulorum seriebus infra suturam majoribus), lutea, sparse rufo maculata et flammulata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spira brevior, medio angulatus, infra angulum sublaevigatus, striis spiralibus obsoletissimis; columella subrecta, basi abrupte truncata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplicissimum, tenue. — Long. 70, diam. 29 mill. Ap. 33 mill. longa, medio 16 lata. (Coll. Nr. 17.)

Achatina semidecussata Menke mss.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 91.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 214. t. 1. f. 1.

Habitat ad portum Natal Africae meridionalis.

37. A. Malaguettana (Helix) Rang. †

T. elongata, turrita, tenuis, subdiaphana, exilissime longitudinaliter striata, brunneo-lutescens, apice obtusa; apertura ovalis; columella arcuata, truncata; labrum simplex, acutum. — Long. 22, diam. 8 mill. (R.)

Helix Malaguettana Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 39. t. 3. f. 4.
Subulina Malaguetana Beck ind. p. 77. N. 4.
Achatina Malaguettana Lam. ed. Dh. 25. p. 307.

Habitat in littore Malaguettano Africae occidentalis.

37ª. A. portoricensis Pfr.

T. turrito-oblonga, laevigata, lineis longitudinalibus impressis irregulariter sculpta, nitida, strigis saturatioribus ornata; spira elongata, obtusiuscula; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella antrorsum arcuata, prope basin aperturae abrupte truncata; apertura elliptico-semiovalis; perist. simplex. — Long. 20, diam. 7 mill. Ap. 8 mill. longa, medio 3⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina portoricensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat prope St. Johns insulae Portorico.

38. A. ceylanica Pfr.

T. ovato-oblonga, striatula, sericina, tenuis, fulvo-cornea; spira pyramidata, apice obtusa; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ³/₇ longitudinis aequans, inflatus; columella brevis, arcuata, abrupte truncata; apertura latiuscula, semiovalis; perist. tenue, acutum. — Long. 16, diam. 8 mill. Ap. 7½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 18.)

Achatina ceylanica Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 157.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 215. t. 1. f. 3.

Habitat in insula Ceylon. (Templeton in Mus. Cuming.)

39. A. curvilabris Pfr.

T. oblongo-turrita, solidiuscula, confertissime costulata, diaphana, nitida, luteo-cornea, remote albido-strigata; spira turrita; sutura marginata; anfr. 8 planiusculi, ultimus ³/₇ longitudinis subaequans, antice medio impressus; columella verticalis, ad basin aperturae abrupte truncata; apertura angusta, oblonga; perist. albido-limbatum, margine dextro antrorsum curvato. — Long. 16, diam. 5 mill. Ap. 6¾ mill. longa, 2⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina (Glandina) *curvilabris Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 137.

Habitat in Jamaica (Gosse).

40. A. hyalina (Helix) Rang. †

T. ovato-elongata, tenuissima, hyalina, laevigata, luteo-pallida, apice obtusa; apertura ovalis; columella convexa, extrinsecus reflexa; labrum simplex, acutum. — Long. 7—9, diam. 3—4 mill. (R.)

Helix hyalina Rang in Ann. sc. nat XXIV. p. 40. t. 3. f. 5.
Achatina hyalina Lam. ed. Dh. 26. p. 308.

Habitat ad Mesurade Promontorii viridis.

§. 4.

41. A. cyanostoma Rüppell.

T. turrita, apice obtusa, lutea, strigis longitudinalibus fuscis variegata; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; columella arcuata, oblique truncata; apertura oblongo-ovalis, intus lactea; perist. simplex, cyaneo-marginatum. — Long. 48, diam. 15 mill. Ap. 18 mill. longa, medio 8½ lata. (Coll. Nr. 19.)

Achatina cyanostoma Rüpp. mss.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 58.
Subulina cyanostoma Beck ind. p. 76. N. 1.
Glandina? cyanostoma Phil. Icon. I. 6. p. 134. t. 1. f. 4.

Habitat in Abyssinia (Rüppell).

42. A. Pfeifferi Dunker.

T. ovato-turrita, solidiuscula, longitudinaliter confertissime plicatulo-striata, nitida, fulvescenti-albida, strigis undulatis et flammis fuscis ornata; spira turrita, apice obtusa; anfr. 8 convexi, infra suturam lineis 4—5 confertis obsolete decussati, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella valde arcuata, abrupte truncata; apertura semiovalis, intus lactea, strigis subpellucentibus; perist. acutum. — Long. 35, diam. 13 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 20.)

Achatina Pfeifferi Dkr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 163.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 214. t. 1. f. 2.

Habitat in montibus arenosis prope Loanda Africae occidentalis (Tams).

43. A. Hügeli Pfr.

T. ovato-turrita, fragilis, longitudinaliter striata, nitida, pallide cornea; spira elongata, apice obtusiuscula; sutura profunda; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans; apertura triangulari-semiovalis; columella valde arcuata, ad basin aperturae abrupte truncata; perist. rectum, acutum. — Long. 35, diam. 11½ mill. Ap. 12 mill. longa, fere 6 lata. (Coll. Nr. 21.)

Achatina Hügeli Pfr. Symb. II. p. 58.
Glandina? Hügeli Phil. Icon. I. 6. p. 135. Gld. t. 1. f. 8.

Habitat...? (Ex itinere Hügeliano communicavit Mus. Caes. Vindob.)

44. A. turritellata Deshayes. †

T. turrita, elongata, angusta, apice obtusiuscula, candidissima, laevigata; anfr. 10 convexiusculi; apertura brevissima, ¼ longitudinis paulo superans; columella medio sinuata, basi

oblique truncata; perist. simplex, tenue, basi subpatulum. — Long. 33, diam. bas. 9 mill. (Dh.)

Achatina turritellata Desh. in Enc. méth. II. p. 11. N. 8.
Subulina turritellata Beck ind. p. 77. N. 2.

Habitat . . . ?

45. A. clavus Pfr.

T. oblongo-turrita, solidula, oblique confertim striata, fulvescens, basi saturatior; spira turrita, apice acuta; anfr. 9½ planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis non aequans; columella valde arcuata, oblique truncata; apertura oblongo-ovalis, intus sordide albida; perist. simplex. — Long. 33, diam. 10 mill. Ap. 11 mill. longa, medio 5½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina clavus Pfr. Symb. III. p. 90.

Habitat . . . ?

46. A. clavata Gray.

T. oblongo-turrita, tenuiuscula, longitudinaliter costulata, sub epidermide cornea albida; spira turrita, apice obtusa, remotius costata; anfr. 10 convexiusculi, ultimus obsolete angulatus, ¼ longitudinis subaequans; columella arcuata, abrupte truncata; apertura ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 28, diam. 13 mill. Ap. 7½ mill. longa, 4½ lata. (Mus. Brit.)

Achatina clavata Gray in Loud. mag. New ser. I. p. 487.
— — *Wiegm.* Arch. 1838. II. p. 275.

Habitat in Sierra Leone.

47. A. Perrotteti Pfr.

T. elongato-conica, apice obtusiuscula, nitide cornea, diaphana; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; columella valde incurvata, abrupte truncata; apertura ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 22, diam. 9 mill. Ap. 8 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 22.)

Achatina Perrotteti Pfr. in Revue zool. 1842. p. 305.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 59.
Glandina? Perrotteti Phil. Icon. I. 6. p. 135. Gld. t. 1. f. 12.

Habitat in montibus Nilagiricis Indiae orientalis (Perrottet, Guérin).

48. A. nitens Gray.

T. turrita, nitida, pellucida, cornea, apice obtusa; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; columella brevis, curvata, abrupte truncata; apertura oblique truncato-ovalis; perist.

simplex, acutum. — Long. 15, diam. 6½ mill. Ap. 5 mill. longa, 3½ lata. (Mus. Brit.)

Achatina nitens Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 415. *)
— — *Gray* Spicil. zool. p. 5. t. 6. f. 18.
— — *Fér.* in Bull. sc. nat. 1829. XVI. p. 468.
— — *Lam.* ed. Dh. 24. p. 307.

Habitat in insula Ceylon. (Bens. in As. journ. V. p. 353.)

49. A. crassilabris Benson. †

T. turrito-conica, laevis, cornea, longitudinaliter striata; anfr. convexi; sutura excavata; labrum intus incrassatum; columella praearcuata; apex obtusus. — Long. 0,7; lat. 0,3 poll. (B.)

Achatina crassilabris Bens. in Journ. As. Soc. V. p. 353.

Habitat in Bengalia.

Obs. «Similis A. nitenti Gray. Accedit ad Achatinellam columella arcuata, sed differt plica deficiente et labro incrassato in ipso margine».

50. A. arcuata Pfr.

T. fusiformi-turrita, tenuiuscula, nitida, subarcuatim et confertim costulata, succineo-flavida, strigis angustis, remotis, arcuatis, rufis, pallide marginatis ornata; spira subulata, acuta; sutura crenulata; anfr. 9 plani, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella strictiuscula, breviter truncata; apertura oblonga; perist. simplex. — Long. 13, diam. 3½ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 2 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina (Glandina) *arcuata Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 138.

Habitat in Jamaica (Gosse).

§. 5.

51. A. turricula Mighels. †

T. cylindrica, turrita, saturate vel laete fusca; anfr. 10 convexi, transversim magis minusve distincte striati; striae incrementi rudes; apertura oblonga; labrum simplex, acutum. — Long. 2¾, diam. ⅘ poll. (M.)

Achatina turricula Migh. in Bost. Proc. 1845. p. 20.

Habitat in insula Sandwich. Oahu.

52. A. Rangiana Pfr.

T. elongata, turrita, solida, ponderosa, levissime arcuatim substriata, lineis spiralibus distantibus notata, straminea, apice

*) T. ovato-conica, turrita, hyalina, cornea, laevi, polita, apice obtusiuscula; anfr. 8 convexis; apertura ovata; perist. tenui. — Axis 7/10, diam. 3/10 unc. (Gray l. c.)

alba, obtusiuscula; sutura levissima; anfr. 11 planulati, ultimus ¼ longitudinis paulo superans, basi rotundatus; columella recta, callosa, ad basin aperturae breviter et oblique truncata; apertura subsemiovalis, intus margaritacea; perist. simplex, acutum. — Long. 39, diam. 11 mill. Ap. 11½ mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming)

Achatina Rangiana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 115.

Habitat in republica mexicana (Lindon).

53. A. sylvatica (Columna) Spix.

T. elongata, turrita, tenuis, laevigata, nitida, pellucida, cerea; spira elongata, apice obtusa; sutura impressa, sub lente crenulata; anfr. 11—12 vix convexiusculi, ultimus obsoletissime angulatus, ¼ longitudinis non aequans; columella strictiuscula, tenuis, ad basin aperturae breviter truncata; apertura subtriangulari-ovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 32, diam. 7⅔ mill. Ap. 7 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 23.)

Columna sylvatica Spix test. bras. t. 10. f. 4.
— — *Villa* disp. syst. p. 20.
Bulimus sylvaticus Wagn. in Spix p. 11.
— — *Lam.* ed. Dh. 63. p. 250.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 156. t. 15. f. 17. 18?
Helix sylvatica Moric. Mém. Gen. VII. p. 424.
Obeliscus sylvaticus Beck ind. p. 62. N. 7.
Achatina sylvatica Pfr. Symb. II. p. 135.

Habitat in Brasilia.

54. A. tenuispira Benson.

T. elongato-turrita, tenuis, longitudinaliter striata, pellucida, cornea; spira turrita, apice obtusa; sutura impressa; anfr. 12 planulati, ultimus ¼ longitudinis subaequans; columella valde arcuata, ad basin aperturae semiovalis breviter truncata; perist. simplex, acutum. — Long. 28, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, medio 3 lata (Mus. Cuming.)

Achatina tenuispira Bens. in Journ. As. Soc. V. p. 353.

Habitat in Bengalia. (Durgiling: Bens. in Mus. Cuming.)

55. A. terebraster (Helix) Férussac.

T. cylindrico-turrita, tenuis, striatula, nitidula, sub epidermide lutescente alba; spira elongata, apice acutiuscula; anfr. 9 — 10 planulati, ultimus vix ventrosior, ¼ longitudinis aequans; columella brevis, oblique truncata, basin aperturae non attingens; apertura subtrigono-semiovalis, basi dilatata; perist. tenue, acu-

tum. — Long. 26, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, supra basin 3 lata. (Coll. Nr. 24.)

Helix terebraster (Cochlicopa) *Fér.* pr. 370 et Mus.!
Bulimus terebraster Lam. 28. p. 124. ed. Dh. p. 234.
Achatina terebraster Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Voigt* Cuv. Thierr. III. p. 98.
Subulina terebraster Beck ind. p. 77. N. 7.
Lister t. 20. f. 15? (Fig. rud.)

Habitat in insula Portorico.

56. A. semitarum (Helix) Rang.

T. subulata, apice obtusa, pallide cornea, longitudinaliter substriata, nitida; anfr. 10 subplanulati, ultimus ¼ longitudinis vix superans; columella valde arcuata, ad basin aperturae oblique truncata; apertura oblongo-acuminata, basi lata; perist. simplex, margine dextro antrorsum subarcuato. — Long. 28, diam. 6½ mill. Ap. 7 mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 25.)

Helix semitarum Rang in Mus. Paris.
Achatina semitarum Jay catal.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 59.
— *octona Turt.* Man. f. 72?
— — *Gray* Man. p. 18. t. 6. f. 72?

Habitat in Antillis (Petit de la Saussaie).

Obs. Differt a praecedente sutura distinctiore, apice obtuso et columella angusta, arcuatim ad basin aperturae producta, etc.

57. A. Fraseri Pfr.

T. turrito-subulata, apice obtusa, subtilissime striatula, nitida, corneo-brunnea, strigis saturatioribus obsolete variegata; sutura levis; anfr. 12 planulati, ultimus distincte angulatus, ¼ longitudinis non aequans; columella strictiuscula, basi oblique truncata; apertura subtetragono-semiovalis; perist. rectum, acutum. — Long. 25, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 26.)

Achatina Fraseri Pfr. Symb. III. p. 90.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 216. t. 1. f. 6.
— *involuta Gould* in sched. Cuming.

Habitat in ripis fluvii Nun Africae (Sowerby), in Promontorio Palmarum (Gould).

58. A. striatella (Helix) Rang.

T. turrito-subulata, tenuiuscula, oblique confertissime costulato-striata, diaphana, cerea; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 10 convexiusculi, ultimus obsolete angulatus, ¼ longitudinis

non aequans; columella leviter arcuata, basin fere attingens, subverticaliter truncata; apertura elliptica, intus albida; perist. simplex, acutum. — Long. 22, diam. 5 mill. Ap. 4⅔ mill. longa, medio 2¾ lata. (Coll. Nr. 27.)

Helix striatella Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 38. t. 3. f. 7. *)
Subulina striatella Beck ind. p. 77. N. 3.
Achatina striatella Pfr. Symb. II. p. 135.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 217. t. 1. f. 7.

Habitat in insula Principis (Rang), Senegal (Mus. Cuming.).

59. A. vivipara Sowerby.

T. turrito-subulata, solidiuscula, longitudinaliter confertim costulato-striata, nitidula, cereo-albida; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 10 convexi, ultimus ¼ longitudinis aequans, angulatus; columella leviter arcuata, basin non attingens, oblique truncata; apertura semiovalis; perist. rectum, acutum. — Long. 20, diam. 5½ mill. Ap. 5 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 28.)

Achatina vivipara Sow. in Malac. and Conch. Mag. I. p. 27.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 91.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 217. t. 1. f. 5.

Habitat . . . ?

Obs. Differt ab A. striatella costulis validioribus, minus confertis, verticalibus, aperturae et columellae forma, etc.

60. A. bacilliformis Jonas.

T. elongato-turrita, tenuis, fragilis, lactea, epidermide lutea induta, subtilissime striatula; anfr. (supremis mutilatis exceptis) 9 convexiusculi, sensim crescentes, sutura impressa, sub lente crispa, separati, ultimus parvus; apertura parva, ovalis; columella arcuata, abrupte truncata; labrum simplex. — Long. 27, diam. 7 mill. Ap. 6½ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Jonas.)

Achatina bacilliformis Jonas in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 13.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 216. t. 1. f. 8.

Habitat in Guinea.

61. A. Phillipsii Adams.

T. fusiformi-cylindracea, longitudinaliter striatula, nitida, pallide cornea, strigis castaneis, in ultimo anfractu basin non attingentibus, irregulariter dispositis, ornata; spira elongata, apice obtusiuscula; sutura marginata, subcrenulata; anfr. 8 subplanu-

*) T. elongato-turrita, tenui, subdiaphana, exilissime longitudinaliter striata, brunneo-lutescente, apice subacuta; ultimo anfractu subcarinato; apertura ovali; columella arcuata; labro simplice, acuto, intus albido. — Long. 2—2,2 c. Lat. 4 — 5 m. (Rang l. c.)

lati, ultimus $^1/_3$ longitudinis vix superans; columella leviter antrorsum arcuata, oblique truncata; apertura angusta, semiovalis; perist. simplex, acutum. — Long. 20, diam. $5^1/_2$ mill. Ap. 7 mill. longa, $2^2/_3$ lata. (Coll. Nr. 29.)

Achatina Phillipsii Ad. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 13. *)

— — (Glandina) *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 158.

— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 216. t. 1. f. 4.

Bulimus Phillipsii Adams olim in sched. Cuming.

Habitat in Jamaica: Savannah la Mar (Attanasio).

62. **A. propinqua Adams.** †

«Praecedenti affinis, forsan varietas, sed testa lineis longitudinalibus crebris instructa, sine linea infrasuturali; anfr. 6; columella recta. — Div. 18°; spirae long. 0,32; long. tot. 0,48; lat. 0,13 poll.» (A.)

Achatina propinqua Ad. in Bost. Proc. 1845. p. 13.

Habitat in insula Jamaica.

63. **A. vicina Adams.** †

«Forsan A. Phillipsii var.; sed t. striis longitudinalibus crebris instructa, nusquam fusco-fasciata; linea infrasuturali a sutura plus remota; spira breviore. — Div. 22°; long. spirae 0,3; long. tot. 0,54; lat. 0,175 poll.» (Ad.)

Achatina vicina Ad. in Bost. Proc. 1845. p. 14.

Habitat in insula Jamaica.

64. **A. erecta Benson.**

T. subulato-turrita, apice obtusa, striatula, pallide lutescens; sutura mediocris; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus $^2/_7$ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata, torta, ad basin aperturae verticaliter truncata; apertura ovali-elliptica; perist. simplex, acutum. — Long. 20, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 30.)

Achatina erecta Bens. in Ann. and mag. nat. hist. IX. p. 487. **)

Habitat in China prope Nanking (Largilliert); ins. Chusan et frequens prope Macao. (Bens.)

---

*) T. tenui, diaphana, elongata, subfusiformi, pallide fuscescente, lineis atro-fuscis paucis, distantibus, longitudinalibus ornata; anfr. 7, supra a linea infra-suturali impressis, striatis, striis distantibus; labro tenui, infra retracto; columella haud multum arcuata. Div. 20°; spirae long. 0,5″; long. tot. 0,73″; lat. 0,13″. (Ad. l. c.)

**) T. albida, solidiuscula, subulato-turrita, epidermide foeda, scabra; anfr. 8 planulatis, suturis impressis; apice obtuso. — Long....? (Bens. l. c.)

65. A. octona (Helix) Chemnitz.

T. cylindraceo-turrita, tenuiuscula, subtilissime striatula, diaphana, cerea; spira elongata, apice obtusa; anfr. 8—10 convexiusculi, ultimus subglobosus, ¼ longitudinis non aequans; columella arcuata, basin aperturae non attingens, oblique truncata; apertura truncato-ovalis, basi lata; perist. rectum, acutum. — Long. 20, diam. 4⅔ mill. Ap. 4½ mill. longa, supra basin 2⅓ longa. (Coll. Nr. 31.)

Helix octona Chemn. IX. P. 2. p. 190. t. 136. f. 1264.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 954. N. 152.
— — *Wood* ind. t. 35. f. 150?
Bulimus octonus Brug. Enc. méth. I. p. 325. N. 47.
— — *Lam.* 27. p. 124. ed. Dh. p. 233.
Achatina octona Gray in Ann. Phil. New ser. IX. p. 414.
— — *Menke* syn. ed. 2. p. 29.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 129. t. 11. f. 13.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 168. t. 11. f. 4—6.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 514.
— *novenaria Ant.* Verz. p. 44. N. 1601.
— *panamensis Mlf.* Mus.
Columna octona Jan catal. p. 4.
— — *Villa* disp. syst. p. 20.
Subulina octona Beck ind. p. 77. N. 8.
Macrospira octona Swains. Malac. p. 335.

Habitat in Antillis: Cuba! Haiti, Guadeloupe (Brug.); in Columbia occidentali et insula Opara (Mus. Cuming).

66. A. trochlea Pfr.

T. turrita, subcylindrica, apice obtusa, tenuis, diaphana, cerea, oblique minutim striata, nitida; anfr. 10 convexi, 4 primi conum obtusum formantes, 5 sequentes subaequales, ultimus basi attenuatus, ⅕ longitudinis non aequans; sutura profunda; columella arcuata, ad basin aperturae oblique brevissime truncata; apertura ovali-elliptica; perist. simplex, acutum. — Long. 23, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, medio 2½ lata. (Coll. Nr. 32.)

Achatina trochlea Pfr. Symb. II. p. 59.

Habitat in republica mexicana.

Obs. Differt ab A. octona anfractibus latioribus, magis convexis, columella magis arcuata et aperturae forma.

67. A. californica Pfr.

T. subulata, tenuis, oblique confertissime rugoso-striata, cereo-albida; anfr. 12—13, summi convexi, 3—4 ultimi planati, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans, basi acute carinatus, infra carinam subexcavatus; columella arcuata, basin attingens, incras-

sata, subtruncata; apertura subtetragona; perist. simplex, acutum. — Long. 23, diam. 3½ mill. Ap. 4 mill. longa, 2¼ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina californica Pfr. Symb. III. p. 89.

Habitat ad Monterey Californiae.

68. A. sulcata Gray. †

T. turrita, pellucida, cornea, apice obtusa; anfr. 8—9 convexi, medio concentrice sulcati, basi laeves; labrum tenue. — Long. 7/10, diam. 2/10 unc. (Gr.)

Achatina sulcata Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 415.

Habitat . . . ?

69. A. Gossei Pfr.

T. subulata, tenuis, diaphana, cerea, remote costata, inter costas in anfractibus ultimis deorsum obsolescentes subtilissime striata; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus ¼ longitudinis vix superans; columella obliqua, basin aperturae attingens, breviter truncata; apertura angusta, oblonga; perist. simplex, margine dextro deorsum dilatato. — Long. 12, diam. 2⅔ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 1⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Gossei Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 138.

Habitat in insula Jamaica (Gosse).

70. A. subulatoides Orbigny. †

T. elongato-subcylindrica, tenuis, alba, longitudinaliter striata; spira elongatissima, apice obtusa, subtruncata; anfr. 9 minime distincti; apertura subrhomboidalis; columella recta, truncata. — Long. 10, diam. 2 mill. (O.)

Achatina subulatoides Orb. moll. cub. I. p. 168. t. 11. f. 1—3.

Habitat in insula Cuba.

Obs. «Forma Bul. subuliformis Moric., sed columella distincte truncata.»

71. A. costulata Adams.

T. fusiformi-turrita, longitudinaliter distincte costata, inter costas basi anfractus ultimi evanescentes subtilissime striata, cornea, strigis rufis irregulariter ornata; spira turrita, apice acuta; anfr. 8 convexi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella subrecta, basi oblique truncata; apertura subrhombea. — Long. 7, diam. 2½ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 1 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina costulata Ad. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 13. *)

*) T. parva, conica, tenui, diaphana, fuscescente, atro-fusco bifasciata; sutura profunda; anfr. 8, supra subangulatis, costulis gracillimis crebris instructis; labro tenui, infra retracto; columella haud multum arcuata. — Div. 20°; spirae long. 0,23″; long. tot. 0,335″; lat. 0,1″. (Ad. l. c.)

Achatina Adamsi Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 138.
Bulimus costulatus Ad. in sched. olim.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. Forma persimilis Bulimo gracillimo Pfr.

72. A. exilis Pfr.

T. exilis, acicularis, apice obtusa, hyalina vel pallidissime cornea, sub lente longitudinaliter subarcuatim costulato-striata; anfr. 8—9 angusti, planulati, ultimus $\frac{1}{5}$ longitudinis paulo superans; columella subarcuata, ad basin aperturae ovali-ellipticae oblique truncata; perist. simplex, acutum. — Long. $5\frac{1}{3}$, diam. $1\frac{1}{2}$ mill. Ap. 1 mill. longa, $\frac{1}{2}$ lata. (Coll. Nr. 33.)

Achatina exilis Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.

Habitat in insula Cuba prope Matanzas!

73. A. Michaudiana Orbigny. †

T. elongato-annulata, tenuis, pellucida, longitudinaliter striata; spira elongato-turrita, apice subacuta; anfr. 8 convexi; sutura excavata; apertura ovalis; columella recta, truncata. — Long. 4, diam. 1 mill. (O.)

Achatina Michaudiana Orb. moll. cub. I. p. 170. t. 11. f. 10—12.

Habitat in insula Cuba.

§. 6.

74. A. columna (Buccinum) Müller.

T. sinistrorsa, elongato-turrita, tenuiuscula, minutim granulato-decussata, lutescenti-fulva, strigis, flammis et maculis rufis ornata; spira elongata, apice obtusa, rufescens; anfr. 7 convexiusculi, infra medium impressi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis paulo superans; columella torta, callo albo prominente, spiraliter descendente munita, prope basin aperturae subtruncata; apertura angusta, obverse auriformis; perist. simplex, rectum, acutum. — Long. 55, diam. 15 mill. Ap. 21 mill. longa, infra medium 8 lata. (Coll. Nr. 34. Spec. non plane adult.) — Long. 64, diam. 15 mill. Ap. 20 mill. longa, 9 lata. (Spec. Reevean.) Long. 84, diam. 18 mill. (Spec. Küsterian.)

Buccinum columna Müll. verm. II. p. 151. N. 341.
Limax flammeus Martyn univ. Conch. III. 122. Ed. Chenu (bibl. conch. II. p. 28.) t. 41. f. 1.
Helix columna Chemn. IX. P. 1. p. 112. t. 112. f. 954. 55. XI. t. 213. f. 3020. 21.
— — *Gmel.* p. 3653. N. 122.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 955. N. 153.

Helix columna (Cochlicopa) *Fér.* pr. 367.
— — *Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 34. t. 1. f. 1. (c. anim.)
— — *Burr.* elem. of Conch. p. 171. t. 20. f. 4.
— *pyrum Gmel.* p. 3665. N. 204.
Bulimus columna Brug. in Enc. méth. I. p. 332. N. 51.
Columna marmorea et *grisea Perry* Conchology.
— *flammea Schum.* essai p. 188.
— *columna Beck* ind. p. 76. N. 1.
Lymnea columnaris Lam. N. 1. p. 159.
— — Encycl. méth. t. 459. f. 5.
Achatina columna Voigt Cuv. Thierr. III. p. 99.
— *columnaris Blainv.* Malac. p. 456. t. 40. f. 3.
— — *Lam.* ed. Dh. 20. p. 305.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 178. f. 14.
— — *Küster* t. 10. f. 10—13.

Habitat frequentissima in insula Principis (Rang).

75. A. Lattrei Pfr.

T. glandiformis, solida, laevissima, nitida, fulva, strigis castaneis leviter arcuatis irregulariter ornata; spira brevis, conoidea, acutiuscula; anfr. 7 plani, ultimus $^3/_4$ longitudinis fere aequans; columella callosa, contorta, extus subtruncata; apertura angustissima, basi dilatata; perist. simplex, obtusum, margine dextro antrorsum leviter arcuato. — Long. 38, diam. 14 mill. Ap. 29 mill. longa, basi $5^1/_2$ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Lattrei Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 138.

Habitat in America centrali (Lattre).

76. A. streptostyla Pfr.

T. subfusiformis, tenuis, laevigata, alba sub epidermide fulva, irregulariter saturatius strigata; spira brevis, conica, obtusiuscula; sutura linearis, impressa; anfr. 7 angusti, planiusculi, ultimus $^2/_3$ longitudinis aequans, obconicus; columella valde contorta, lamina prominente munita, vix truncata; apertura angustissima, fere linearis; perist. simplex, margine dextro superne sinuoso, infra medium antrorsum dilatato. — Long. 19, diam. max. 8 mill. Ap. $13^1/_2$ mill. longa, basi $2^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 35.)

Achatina streptostyla Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 159.

Habitat in republica mexicana (Liebmann).

77. A. cylindracea Pfr.

T. subcylindracea, utrinque breviter attenuata, laevigata, nitida, lutescenti-cornea; sutura linearis, albo-marginata; spira brevis, conoidea, obtusiuscula; anfr. 5 planulati, ultimus $^3/_5$ lon-

gitudinis aequans; columella torta, lamina callosa, alba, acute prominente per longitudinem munita, subtruncata; apertura angusta, acuminato-oblonga, basi rotundata; perist. simplex, margine dextro medio antrorsum dilatato. — Long. 13, diam. 5½ mill. Ap. 10½ mill. longa, ad columellam 2 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina cylindracea Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 31.

Habitat ad Tortilla Americae centralis.

78. A. Dysoni Pfr.

T. oblongo-conica, tenuissima, glabra, pellucida, nitida, lutescenti-cornea; spira conica, obtusiuscula; sutura simplex; anfr. 5 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, deorsum subdilatatus; columella arcuatim torta, subcallosa, vix truncata; apertura angusta, acuminato-oblonga, basi rotundata; perist. simplex, tenue, margine dextro medio antrorsum dilatato. — Long. 9½, diam. 4 mill. Ap. 5½ mill. longa, medio 1¾ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Dysoni Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat in Honduras (Dyson).

79. A. aberrans Pfr.

T. subulata, tenuis, nitida, lineis impressis longitudinalibus, regulariter distantibus notata, pallide succinea, strigis rufulis, angustis, obliquis, sparsis ornata; spira subulata, apice acutiuscula; sutura leviter crenulata; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans; columella callosa, torto-subtruncata; apertura oblonga; perist. simplex. — Long. 7, diam. 2 mill. Ap. 2⅓ mill. longa, medio 1 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina aberrans Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 138.

Habitat in Jamaica (Gosse).

* * *

80. A. anomala Pfr.

T. subperforata, oblongo-conica, tenuis, subtilissime striata, pellucida, nitida, cereo-hyalina; anfr. 6½ convexi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans; columella brevis, basin non attingens, intorto-truncata; apertura semiovalis; perist. rectum, simplex, margine columellari duplicato, reflexo, perforationem fingente. — Long. 9½, diam. 4 mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 36.)

Achatina anomala Pfr. Symb. III. p. 89.

— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 215. t. 1. f. 12.

Habitat in Peru.

81. **A. splendida Anton.**

T. ovato-conica, tenuis, striatula, nitida, olivaceo-cornea; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 6—7 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella torta, obsoletissime truncata; apertura oblongo-ovalis; perist. simplex, acutum, margine columellari saepe in callum extrorsum diffusum reflexo. — Long. 7½, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 37.)

Achatina splendida Ant. Verz. p. 44. N. 1590.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 215. t. 1. f. 11.

Habitat in insula Juan Fernandez (Cuming).

82. **A. bulimoides Pfr.**

T. ovato-conica, tenuis, striata, epidermide corneo-lutea, pellucida induta; spira conica, acuta; anfr. 5½ vix convexi, ultimus ventrosior, spiram aequans; columella superne torta, filaris, supra basin aperturae late semiovalis obsoletissime truncata, callo tenui ventrem anfractus penultimi vestiente munita; perist. simplex, tenue. -- Long. 11, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina bulimoides Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 116.

Habitat in insula Juan Fernandez.

83. **A. accincta Mighels.**

T. ovato-conica, solidula, oblique striata, subopaca, sordide cornea; spira conica, obtusiuscula; sutura linea impressa marginata; anfr. 6½ planulati, ultimus ⅓ longitudinis vix superans; columella arcuata, plicato-torta; apertura lata, semiovalis; perist. simplex, margine dextro obtuso, columellari subreflexo, appresso. — Long. 7, diam. 3½ mill. Ap. 2¾ mill. longa, 2 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina accincta Migh. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 20.
— *Sandwicensis Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat in insulis Sandwich.

Obs. 1. Fere omnes hujus sectionis species Achatinellis affines sunt.

Obs. 2. Conf. praeterea Bulimus achatinaceus Nr. 407 et pellucidus Nr. 408.

* * *

84. **A. Funcki Pfr.**

T. subperforata, ovato-conica, tenuis, striatula, nitida, pellucida, stramineo-hyalina; spira conica, acuta; anfr. 6 convexi, ultimus spira paulo brevior; apertura semiovalis; paries aperturalis medio plica levi intrante munitus; columella medio lamel-

latim truncata; perist. simplex, acutum. — Long. 12½. diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Funcki Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in provincia Merida Novae Granadae. (Funck.)

85. A. lamellata Potiez et Michaud.

T. oblongo-conica, tenuis, striata, cerea, subdiaphana; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix convexi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; paries aperturalis lamella 1 intrante, magis minusve prominente munitus; columella torta, in medio aperturae subovalis lamellato-truncata; perist. acutum, margine columellari subduplicato, reflexo. — Long. 13, diam. 5½ mill. Ap. 5⅔ mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 38. Spec. max.)

Achatina lamellata Pot. et *Mich.* gal. I. p. 128. t. 11. f. 7. 8. *)

Habitat prope Lima (Delattre in Mus. Cuming.)

Obs. Conf. Tornatellina? Ferussaci Nr. 11.

* * *

86. A. lubrica (Helix) Müller.

T. ovato-oblonga, apice obtusiuscula, laevigata, lubrica, pellucida, cornea; anfr. 6 convexi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, basi rotundatus; columella leviter arcuata, subcallosa, basi introrsum obsolete truncata; apertura ovali-elliptica; perist. rectum, margine dextro plerumque callo tenui intus munito, subinflexo. — Long. 6, diam. 2½ mill. Ap. 2½ mill. longa, medio 1½ lata. (Coll. Nr. 39.)

Helix lubrica Müll. verm. II. p. 104. N. 303.
— — (Cochlicopa) *Fér.* pr. 374.
— *subcylindrica Chemn.* IX. P. 2. p. 167. t. 135. f. 1235.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 952. N. 147.
— *splendidula Gmel.* p. 3655. N. 201? **)
Bulimus lubricus Brug. Enc. méth. I. p. 311. N. 23.
— — *Lam.* 34. p. 126. ed. Dh. p. 237.
— — *Drap.* tabl. d. moll. p. 67. N. 5.
— — *Drap.* hist. p. 75. t. 4. f. 24.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 4. T. 14.
— — *C. Pfr.* I. p. 50. t. 3. f. 7.

*) T. ovata, ventricosa, fragili, vitrea, pellucida, obsolete striata; anfr. 6 convexis, ultimo maximo; apertura ovoidea; columella lamellata; perist simplici. acuto; apice obtuso. — Long. 15, diam. anfr. ult. 6 — 7 mill. — Hab.? (P. et M. l. c.) — Long. 10, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa. (ex ic.)

**) T. tenella nitida pellucida dilute fusca: apertura oblonga. — Habitat in Gallia et Thuringia, testa vix ¼ poll. longa, anfr. 6. (Gmel. l. c.)

Bulimus lubricus Turt. Man. p. 82. f. 65.
— — *Kryn.* Bull. Mosc. VI. p. 419.
— — (Folliculus) *Charp.* cat. moll. Suisse p. 14.
— ? — *Porro* Malac. p. 53.
— — *Gould* report p. 193. f. 124.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 73.
— *subcylindricus Dupuy* moll. du Gers p. 33.
Achatina lubrica Menke syn. ed. 2. p. 29.
— — *Mich.* compl. p. 51.
— — *Rossm.* I. p. 88. f. 43.
— — *Brumati* Monf. p. 30.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 115.
— *subcylindrica Ant.* Verz. p. 44. N. 1591.
Cochlicopa lubrica Risso hist. IV. p. 80. N. 179.
Cionella lubrica Jeffr. in Linn. transact. XVI. p. 347.
— — *Beck* ind. p. 80. N. 5.
Zua lubrica Leach moll. p. 114.
— — *Gray* Man. p. 188. t. 6. f. 65.
Columna lubrica Jan catal. p. 5.
— — *Graells* cat. de los moluscos terr. p. 7.
Styloides lubricus Fitzing. syst. Verz. p. 105.
Bulinus lubricus Hartm. in Neue Alpina I. p. 222.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 285.

β. Major, nitidissima, anfr. $6\frac{1}{2}$, columella distincte truncata: long. 7, diam. 3 mill.
Achatina nitens Kokeil mss.
Bulimus nitens Schmidt Land- u. Süssw. Conch. in Krain p. 13.

γ? Testa aperturaque angustiore, minus ventricosa, magis elongata:
Helix lubrica Lowe Faun. Mader. p. 61. t. 6. f. 29.
— *lubricoides* (Cochlicopa) *Fér.* pr. 372? *)
Achatina lubricoides Pot. et *Mich.* gal. I. p. 129. t. 11. f. 9. 10?**)
— *polita Mühlf.?*
Cionella lubricoides Beck ind. p. 80. N. 4?

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Lusitania, Britannia, Suecia, Italia, prope Charkow (Kryn.); in America boreali (Oak island, Chelsea: Gould). Var. β in Illyria; var. γ in insula Madera et in Italia prope Rimini.

Obs. Variat magnitudine, interdum dimidio minor. — Huc referendae: A. intermedia et lubricella Zgl. (testibus Rossm. et Beck), nec non A. glabrata Mlf.

---

*) An haec potius = A. Hohenwarti? Férussac dicit (prodr. p. 51.): l'H. lubricoides, si voisine de l'acicula, est elle-même fort analogue à l'H. folliculus, et celle-ci à l'H. lubrica.

**) Peraffinis A. lubricae, sed magis elongata et habitu diversa. An ejus varietas? (Pot. et Mich. l. c.)

87. A. vitrea Webb et Berthelot. †

T. elongata, cylindrica, tenuis, fragilis, alba, vitrea, obtusiuscula; anfr. 5½; apertura obovata. — Axis 3, diam. 1½ lin. (WB.)

Achatina vitrea Webb et *Berth.* syn. p. 320.
Bulimus vitreus Orb. canar. p. 72. t. 2. f. 28.

Habitat in insula Teneriffa.

88. A. aciculoides (Columna) Jan. †

T. fusiformis, imperforata, gracilis, laevis, nitida, alba; anfr. rotundati; apertura ovata; perist. simplex. — Long. 2½, lat. ¾ lin. Ap. ¾ lin. longa, ¼ lin. diam. (Jan.)

Columna aciculoides Jan Mantissa p. 2.

Habitat ... ?

89. A. Hohenwarti Rossmässler.

T. subfusiformi-oblonga, polita, splendida, lutescens; spira turrita, apice obtusa; sutura marginata; anfr. 6 subplanulati, ultimus spiram vix aequans; columella verticalis, intorta, vix truncatula; apertura angusta, oblongo-acuminata; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro medio subdilatato. — Long. 6½, diam. 2½ mill. Ap. 3 mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 40.)

Achatina Hohenwarti Rossm. Ic. X. p. 34. f. 657.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 115.
— *Hochenwarthii Schmidt* syst. Verz. p. 13.
— *acicula? Phil.* Sicil. I. p. 142. t. 8. f. 26.
— *folliculus var. Mich. Terv.* cat. p. 31. t. 4, f. 16. 17?
Helix pusilla Scacchi osserv. zool. 1833. p. 26?
Polyphemus aciculoides Villa disp. syst. p. 20.
Pegea carnea Risso hist. IV. p. 88. t. 3. f. 29? *)

Habitat in Carniolia, Apulia (Phil.), Algeria?

Obs. An eadem ac praecedens? — Specimina existunt ultra 8 mill. longa.

90. A. acicula (Buccinum) Müller.

T. fusiformi-cylindracea, acicularis, apice attenuata, obtusa, hyalina, polita, albida; sutura anguste marginata; anfr. 6 — 7 plani, ultimus ⅔ longitudinis aequans; columella arcuata, basi anguste et abrupte truncata; apertura angusta, lanceolata; perist. simplex, rectum, acutum. — Long. 4⅔, diam. 1¼ mill. Ap. 2 mill. longa, ¾ lata. (Coll. Nr. 41.)

Buccinum acicula Müll. verm. II. p. 150. N. 340.

*) T. oblongo-ovata eburnea, vitrea, nitidissima, tenuissima; anfr. 6 convexiusculis; apertura elongato-triangulari; peritr. ad sinistram uniplicato. — Long. 0,010. (Risso l. c.)

Buccinum acicula Dillw. descr. cat. II. p. 652.
— *terrestre Mont.* test. brit. p. 248. t. 8. f. 3.
Helix octona Gmel. p. 3653. N. 120.
— *acicula Stud.* in Coxe trav. (Hartm.)
— — (Cochlicopa) *Fér.* pr. 371.
Bulimus acicula Brug. Enc. méth. I. p. 311. N. 22.
— — *Drap.* tabl. d. moll. p. 67. N. 7.
— — *Drap.* hist. p. 75. t. 4. f. 25. 26.
— — *C. Pfr.* I. p. 51. t. 3. f. 8. 9.
— — (Polyphemus) *Charp.* cat. moll. Suisse p. 13.
Bulinus acicula Hartm. in Neue Alpina I. p. 222.
Achatina acicula Lam. 19. p. 133. ed. Dh. p. 304.
— — *Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 99.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 142. t. 8. f. 25. II. p. 115.
— — *Gray* Man. p. 191. t. 6. f. 77.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 138.
— — *Rossm.* X. p. 35. f. 658.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 13.
— *alba Brown.*
— *pusilla Scacchi* olim. (teste Scac. cat. p. 16.)
Cionella acicula Jeffr. in Linn. tr. XVI. p. 348.
Acicula eburnea Risso hist. IV. p. 81. N. 182.
— *acicula Beck* ind. p. 79. N. 1.
Columna acicula Jan catal. p. 4.
Styloides acicula Fitz. syst. Verz. p. 105.
Polyphemus acicula Villa disp. syst. p. 20.
— — *Graells* cat. de los moluscos terr. p. 7.
Cecilioides acicula Beck in Amtl. Ber. Vers. in Kiel (1846.) p. 122.
β? Var., anfr. 4, alt. 2, diam. ½ mill.
Achatina acicula var. festuca Porro Mal. p. 52.

Habitat passim in plerisque terris Europae, nec non in insula Madera (Lowe).

Obs. 1. Num forte duce Herrmannsen (ind. gen. Mal. I. p. 349.) Crenea vitrea Risso (hist. IV. p. 83.) ad hanc speciem vel affinem referenda?

Obs. 2. Férussac dicit (prodr. p. 51): l'H. fulminea et Acicula sont peut-être les seules espèces (des Styloides), qui puissent entrer avec les polyphèmes érigés en genre distinct.

91. A. pygmaea Pfr.

T. cylindracea, laevigata, pellucida, hyalina, apice obtusiuscula; anfr. 5 planiusculi, sutura levi obliqua discreti, ultimus ⅖ longitudinis aequans; columella subrecta, cum ventre anfractus penultimi angulum formans, ad basin aperturae ovali-ellipticae subtruncata; perist. acutum, margine dextro antrorsum dilatato. — Long. 2¼, diam. ⅔ mill. Ap. ⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 42.)

Achatina pygmaea Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 148.

Habitat in insula Cuba, unde misit Dr. Gundlach.

92. A. miliaris (Columna) Jan. †

T. fusiformi-ovata, imperforata, laevis, nitida, gracilis, albida, ultimo anfractu ventricoso; apertura ovalis. — Long. 1⅓, lat. ½ lin. Ap. 1 lin. longa, ⅓ lin. diam. (Jan.)

Columna miliaris Jan Mantissa p. 2.
Acicula miliaris Beck ind. p. 79. N. 2.

Habitat . . . ?

Obs. Cl. Beck A. aciculam Phil. Sicil. ad hanc speciem refert.

93. A. pusilla Pfr.

T. linearis, solidula, nitida, laete cornea; anfr. 6 planulati, fulvo-fasciati, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella oblique torta, subtruncata; apertura ovalis; perist. simplex, acutum, saepe nigro-limbatum, margine columellari subreflexo. — Long. 2⅔, diam. 1 mill. Ap. ⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 43.)

Achatina pusilla Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 252.

Habitat in insula Cuba, ubi in arena littorali legi prope Matanzas.

Obs. An hujus generis? Animal observare haud mihi contigit.

§. 7.

94. A. tridens (Turbo) Pulteney.

T. ovali-elliptica, corneo-fulva, splendida, pellucida; anfr. 8 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; columella in lamellam compressa, basi truncata, transverse unidentata; apertura oblique pyriformis, angustata; paries aperturalis plica 1 antice curvata cum denticulo opposito munitus; perist. callo flexuoso connexum, margine exteriore producto, strictiusculo, labiato, unidentato; palatum 2—3 denticulatum. — Long. 7, diam. 3 mill. Ap. oblique 2⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 44.)

Turbo tridens Pult. cat. dors. p. 46. t. 19. f. 12.
— — *Montagu* p. 338. t. 11. f. 2.
Helix Goodallii (Cochlodonta) *Fér.* pr. 492 ter.
Pupa tridens Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
— *Goodallii Mich.* compl. p. 68. t. 15. f. 39. 40.
— — *Lam.* ed. Dh. 54. p. 193.
— — *Jay* catal. 1839. p. 52.
— — *Anton* Verz. p. 46. N. 1702.
— — *Dupuy* Moll. du Gers p. 42. N. 7.
— *Menkeana C. Pfr.* III. p. 62. t. 7. f. 7. 8.
— *britannica Kenyon* Mag. nat. hist. II. p. 426.
Carychium Menkeanum C. Pfr. I. p. 70. t. 3. f. 42.
Azeca tridens Leach moll. p. 122. t. 8. f. 8.
— — *Beck* ind. p. 80. N. 1.

Azeca tridens Gray Man. p. 189. t. 5. f. 52.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 290.
— *Matoni Turt.* Man. p. 68. f. 52.
— — *Villa* disp. syst. p. 20.
— *Goodallii Alder* Mag. Zool. and Bot. II. p. 110.
Achatina Goodallii Rossm. X. p. 33. f. 654.
— *tridens Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 152.
β. Ilyalina, albida.

Habitat in montosis (solo calcareo) Germaniae (prope Cassellas, Gottingam, in sylva hercynica!), Galliae et Britanniae rara.

95. A. pupaeformis (Bulimus) Cantraine.

T. elliptico-ovata, corneo-fulva, splendida, pellucida; anfr. 7 planulati, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; apertura oblique semiovalis; columella torta, basi profunde dentato-truncata; perist. rectum, marginibus callo albo, filiformi junctis, dextro infra medium obsolete unidentato. — Long. 7, diam 3 mill. Ap. 2½ mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 45.)

Bulimus pupaeformis Cantr. in Bull. Brux. II. p. 380.
— — *Cantr.* Malacol. p. 137. t. 5. f. 11.
Mastus Canthraini Beck ind. p. 73. N. 8.
Achatina dentiens Rossm. X. p. 33. f. 655.
— *pupaeformis Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 152.
Columna dentiens Villa disp. syst. p. 20.
Azeca pupaeformis Pfr. Symb. II. p. 136.

Habitat in Dalmatia (prope Zara et Spalatro) et in Graecia. (Rollet, Rossm.)

96. A. tornatellina (Helix) Lowe.

T. oblonga, solida, laevigata, nitida, pellucida, fuscescenti-cornea; spira conica, apice mammillata, hyalina; sutura marginata; anfr. 7 planulati, ultimus ⅗ longitudinis subaequans; columella alba, callosa, oblique truncata; apertura angusta, acuminato-oblonga, superne callo pliciformi in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. obtusum, intus callosum, margine dextro subinflexo, deorsum arcuatim dilatato. — Long. 8, diam. 3 mill. Ap. 4½ mill. longa, medio 1½ lata. (Coll. Nr. 46.)

Helix tornatellina Lowe Faun. Mader. p. 59. t. 6. f. 23.
Achatina tornatellina Lam. ed. Dh. 22. p. 306.
Cionella tornatellina Beck ind. p. 80. N. 2.
Glandina tornatellina Pfr. Symb. II. p. 136.
β. Major, ventrosior, columella obsoletiore:
Helix melampoides Lowe Mader. p. 60. t. 6. f. 24

Habitat in insula Madera.

97. A. triticea (Helix) Lowe. †

T. obovato-cylindrica, nitida, laevis; spira acutiuscula, dimidium testae aequans; anfr. 6 plani; sutura obsoletiuscula; apertura obovata, biplicata: plica altera transversa, inter columellam et angulum labri in medio posita, altera magis interna minore in columellam; columella antice lata, subexpansa, plana, vix truncata, in labrum simplex, rectum, aequale attenuata. — Long. 3, diam. 1 ½ lin. (L.)

Helix triticea Lowe Faun. Mader. p. 60.
Glandina triticea Pfr. Symb. II. p. 136.
Cionella triticea Beck p. 80. N. 3.
α. Biplicata: Lowe l. c. t. 6. f. 25.
β. Edentula, plicis obsoletis: Lowe l. c. t. 6. f. 26.

Habitat in insula Portosancto.

98. A. ovuliformis (Helix) Lowe. †

T. angusto-elliptica, subpupaeformis, nitida, laevis; spira obtusissima, dimidium testae aequans; anfr. 4 convexiusculi; sutura distincta; apertura obovata, angusta, biplicata: plica altera transversa, abrupta, prominente, inter columellam et angulum labri in medio posita, altera ad columellam, magis obsoleta, obliqua; columella expansa, tenuis, torta, oblique truncata. — Long. 2, diam. 1 lin. (L.)

Helix ovuliformis Lowe Faun. Mader. p. 61. t. 6. f. 27.
Achatina ovuliformis Pfr. Symb. II. p. 134.

Habitat in cacumine montis «Pico de Facho» in insula Portosancto.

99. A. Paroliniana Webb et Berthelot. †

T. ovata, acuta, laevis, nitida, pallide succinea; anfr. 6; apertura longe obovata, margine bidentata. — Axis 3, diam. 1‴. (W. et B.)

Achatina Paroliniana Webb et *Berth.* syn. p. 320.
Bulimus Parolinianus Orb. canar. p. 73. t. 2. f. 29. t. 3. f. 27.

Habitat in insulis Teneriffa, Canaria et Palma.

Obs. «Affinis A. ovuliformi Lowe. Distinguitur spira obtusiuscula, anfractuum numero, sutura marginata, etc.» (WB.)

§. 8.

100. A. Priamus (Helix) Meuschen. †

T. ovata, ventricosa, tenuis, laevis, diaphana, fulvo-rosea, punctis quadratis rubro-castaneis remotis, per lineas transversas dispositis ornata; spira brevis, labrum acutum. (Lam.) — Long. 68, diam. 34 mill. Ap. 48 mill. longa, medio 25 lata. (ex ic. Chemn.)

Helix Priamus Meuschen in cat. Mus. Gron. N. 1355.
— — *Gronovii* Zoophyl. fasc. 3. t. 2. f. 10. 11.

Helix Priamus (Cochlicopa) *Fér.* pr. 355. Hist. t. 135. f. 5.
— *Priapus Gmel.* p. 3654. N. 198.
Buccinum ficus Martyn univ. Conch. ed. Chenu (Bibl. conch. II.) p. 25. t. 28. f. 3.
— *stercus pulicum Chemn.* IX. P. 2. p. 35. t. 120. f. 1026. 27.
Bulla stercus pulicum Gmel. p. 3434. N. 45.
— *Priamus Dillw.* descr. cat. I. p. 493. N. 51.
Bulimus Priamus Brug. in Enc. méth. I. p. 360. N. 104.
Achatina Priamus Lam. 12. p. 131. ed. Dh. p. 299.
— — *Küster* t. 3. f. 7. 8.
— *maculata Swains.* Exot. Conch. t. 23.
Priamus stercus pulicum Beck. (teste Desh. p. 300.)
— .... *Sow.* Conch. Man. ed. II. f. 545.
Halia stercus pulicum Herrm. ind. gen. Mal. I. p. 495.

Habitat in Hispania (Martyn), in littore Guineensi? (Fér.)

Obs. Beck (teste Desh. l. c.) hanc testam marinam et operculatam, e maribus Hispaniae et Lusitaniae provenientem declaravit, novumque genus Buccineis et Struthiolariae affine pro ea proposuit. Herrmannsen speciem generi Haliae, a Risso (hist. IV. p. 52.) pro testa fossili in Acerarum familia instituto injungendam censet. — Attamen usque ad ulteriores indagationes speciem in collectionibus rarissimam silentio hic praeterire nolui.

* * *

101. A. voluta (Bulla) Chemnitz.

T. oblongo-subfusiformis, solidula, laevigata, sub epidermide virenti-cornea rufescens; spira brevis, conica, obtusiuscula; anfr. 7—8 planulati, ultimus $^2/_3$ longitudinis fere aequans, deorsum attenuatus; sutura linearis, albo-marginata; columella valde arcuata, ad basin aperturae angustae, acuminato-oblongae abrupte truncata; perist. acutum. — Long. 51, diam. supra medium 19 mill. Ap. 30 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 47.)

Bulla voluta Chemn. IX. P. 2. p. 16. t. 117. f. 1009. 10.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 486. N. 34.
Bulimus glans Brug. Enc. méth. I. p. 365. N. 111.
Helix glans (Cochlicopa) *Fér.* pr. 362.
Achatina glans Lam. 13. p. 132. ed. Dh. p. 300.
— — *Blainv.* Malac. t. 40. f. 2?
— — *Küster* t. 7. f. 4. 5.
Polyphemus glans Montf. II. p. 415. t. 104.
— — *Villa* disp. syst. p. 19.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 288. (err. 298.)
Glandina olivacea Schumacher p. 202.
— *glans Beck* ind. p. 78. N. 10.
— *voluta Pfr.* Symb. II. p. 136.
Cochlycopa glans Swains. Malac. p. 335.

Habitat in insulis Antillis.

102. A. nigricans (Glandina) Pfr.

T. ovato-oblonga, solidiuscula, minutissime striatula, nitidissima, nigricans, strigis remotis, angustis, fulvis ornata, basi corneo-lutea; spira conica; sutura virenti-marginata; anfr. 7 planulati, ultimus $^3/_5$ longitudinis aequans; columella arcuata, callosa, oblique truncata, basin aperturae non attingens; apertura angusta, semiovalis, intus concolor. — Long. 35, diam. 16 mill. Ap. 21 mill. longa, 7 lata. (Mus. Cuming.)

Glandina nigricans Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 75.

Habitat prope Vera Cruz Americae centralis (Lattre).

103. A. leucozonias (Voluta) Walch.

T. subfusiformi-oblonga, subtilissime longitudinaliter striata, castanea, lineis albis, undatis, remotis irregulariter strigata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spiram aequans, angulosus: labiis anterioribus albidis, prominentibus; columella leviter arcuata, costata, oblique truncata; apertura irregulariter oblonga, angusta; perist. simplex, album, margine dextro basin versus angulatim dilatato. — Long. 46, diam. 17 mill. Ap. 24 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Martini IV. p. 220. t. 148. f. 1371. 72.
Voluta leucozonias Walch in Naturforscher IV. p. 40. t. 1. f. 3. 4.
— — *Gmel.* p. 3453. N. 56.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 547. N. 110. (inter Mitrae species.)
Helix leucozonias (Cochlicopa) *Fér.* pr. 363.
Achatina albolineata Lam. 15. p. 132. ed. Dh. p. 301.
— — *Crouch* p. 19. t. 15. f. 5 a.
— — *Küster* t. 14. f. 7. 8.
— *leucozonias Sow.* gen. shells N. 14.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 176. f. 3.
Polyphemus leucozonias Jan catal. p. 4.
Glandina leucozonias Beck ind. p. 78. N. 7.

Habitat in insula Martinique (Fér.).

104. A. oleacea (Helix) Férussac.

T. subfusiformi-oblonga, tenuis, laevigata, nitidissima, virenticornea, pellucida; spira conica, apice acutiuscula; sutura submarginata; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans, basi subattenuatus; columella brevis, arcuata, supra basin aperturae acuminato-oblongae, versus basin dilatatae, oblique truncata; perist. acutum, margine dextro medio antrorsum dilatato. — Long. 29, diam. 10 mill. Ap. 15½ mill. longa, supra basin 5 lata. (Coll. Nr. 48.)

Helix oleacea (Cochlicopa) *Fér.* pr. 360 et Mus.!

Achatina oleacea Desh. in Enc. méth. II. p. 11. N. 6.
— — *Desh.* in Guér. mag. 1831. t. 3.
— — *Lam.* ed. Dh. 23. p. 307.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 165. t. 10. f. 15. 16.
— *fulgens Mus. Berol.* olim.
Polyphemus oleaceus Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.
Glandina oleacea Beck ind. p. 78. N. 9.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 131. t. 1. f. 1.

Habitat in insula Cuba, frequens circa Matanzas!

105. A. glabra (Glandina) Pfr.

T. ovato-conica, tenuis, glabra, nitida, pallide cornea, strigis angustis, rufis, distantibus, in medio anfractus ultimi evanescentibus ornata; spira conica, apice obtusa; sutura subtilissime crenulato-marginata; anfr. 8 planulati, ultimus spiram vix superans; columella perobliqua, fortiter arcuata, ad basin aperturae subtriangularis truncata; perist. simplex, margine dextro regulari. — Long. 28, diam. 11 mill. Ap. 14 mill. longa, in angulo columellae 5 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina glabra (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 90.

Habitat . . . ?

106. A. obtusa (Glandina) Pfr.

T. ovata, utrinque attenuata, apice obtusa, laevigata, solidula, pellucida, carnea; sutura marginata, obsolete crenulata; anfr. 5½ vix convexiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella subverticalis, abrupte truncata; apertura latiuscula; perist. simplex, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro medio vix dilatato. — Long. 26, diam. 11 mill. Ap. 12½ mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 49.)

Achatina obtusa (Glandina) *Pfr.* in Phil. Icon. I. 6. p. 132. t. 1. f. 3.
Glandina obtusa Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 42.

Habitat ad Real Llejos provinciae Nicaraguae Americae centralis (Cuming).

107. A. Lindoni Pfr.

T. oblonga, utrinque attenuata, solidula, laevigata, nitida, pallide fulva, lineis incrementi arcuatis, vix prominentibus, saturatioribus notata; spira conica, acutiuscula; sutura submarginata; anfr. 8 planiusculi, 2 ultimi oblique descendentes, ultimus spiram aequans, supra columellam intus gibbosus; columella brevis, ad basin aperturae oblique truncata; apertura angustissima, basi subcanaliculata; perist. simplex, marginibus callo junctis, dextro an-

trorsum arcuato-dilatato. — Long. 21, diam. medio 6 mill. Ap. 10½ mill. longa, medio 2 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Lindoni (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 116.

Habitat in insula Cuba (Lindon).

108. A. cubaniana Orbigny. †

T. ovato-oblonga, pellucida, diaphana, laevigata, lucida, virescens, longitudinaliter eleganterque lineis fuscis ornata; spira brevis, acuminata; anfr. 6 convexiusculi; apertura angustata, angulosa; columella angulosa, contortissima; labrum acutum. — Long. 17, diam. 7 mill. (O.)

Achatina cubaniana Orb. moll. cub. I. p. 166. t. 10. f. 17—19.
Glandina cubana Pfr. Symb. II. p. 135.

Habitat in insula Cuba.

Obs. «Differt ab A. oleacea statura minore, forma antrorsum minus acuminata, spira breviore, columella angulum intrantem formante et flammulis longitudinalibus.» (Orb.)

109. A. solidula Pfr.

T. subfusiformi-oblonga, solidula, nitide fulva, subpellucida; spira conica, obtusiuscula; sutura submarginata; anfr. 6 vix convexi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella fortiter et oblique truncata; apertura angusta, longe acuminata; perist. simplex, obtusum, margine dextro medio antrorsum arcuato. — Long. 13, diam. 4½ mill. Ap. 6⅔ mill. longa, infra medium 2 lata. (Coll. Nr. 50.)

Polyphemus solidulus Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 252.
Glandina solidula Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 131. t. 1. f. 6.

β. Tenuior, subhyalina, spira paulo acutiore.

Habitat in insula Cuba, circa Matanzas etc.; var. *β* in republ. mexicana?

Obs. Pervariabilis magnitudine et forma.

110. A. subulata Pfr.

T. subcylindrica, utrinque attenuata, laevigata, corneo-fulva, pellucida; spira elongato-conica, acutiuscula; anfr. 6—7, supremi convexiusculi, reliqui subplanulati, infra suturam linea opaca notati, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella vix obliqua, anguste truncata; apertura oblonga; perist. simplex, margine dextro medio antrorsum arcuato. — Long. 12, diam. 2⅔ mill. Ap. 6 mill. longa, infra medium 2 lata. (Coll. Nr. 51.)

Polyphemus subulatus Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 352.
Glandina subulata Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 132. t. 1. f. 10.

Helix orysaca Rang teste Orb.
Achatina orysacea Orb. moll. cub. I. p. 167. t. 10. f. 20—25? *)
Habitat in insula Cuba, circa Matanzas, El Fundador etc.

Obs. Formae existunt intermediae inter hanc et praecedentem.

111. A. folliculus (Helix) Gronov.

T. oblonga, solidula, laevigata, subpellucida, corneo-lutescens; spira elongato-conica, acutiuscula; sutura linearis, linea opaca notata; anfr. 6—7 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, basi vix attenuatus; columella subrecta, subverticalis, callosa, supra basin aperturae elliptico-ovalis obsolete truncata; perist. rectum, marginibus callo junctis, dextro obtuso, antrorsum valde arcuato. — Long. 10, diam. $3^1/_3$ mill. Ap. 4 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 52.)

Helix folliculus Gronov. Zoophyl. fasc. 3. p. 296. t. 19. f. 15. 16.**)
— — *Gmel.* p. 3654. N. 199.
— — (Cochlitoma) *Fér.* pr. 373.
Achatina folliculus Lam. 18. p. 133. ed. Dh. p. 303.
— — *Mich.* compl. p. 52. t. 15. f. 44. 45.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 141. t. 8. f. 27. II. p. 114.
— — *Webb* et *Berth.* syn. p. 320?
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 138.
— — *Terv.* moll. Alg. p. 31.
— — *Rossm.* X. p. 34. f. 656.
— — *Deless.* recueil t. 28. f. 9.
— *Risso Desh.* Enc. méth. II. p. 12. N. 9.
— *follicula Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 127.
Ferrusacia Gronoviana Risso hist. IV. p. 80. N. 180. t. 3. f. 27.
Columna folliculus Jan catal. p. 4.
Cionella folliculus Beck ind. p. 79. N. 1.
Pupa splendidula Costa. (teste Scacchi catal. p. 16.)
Polyphemus folliculus Villa disp. syst. p. 20.
— — *Graells* catal. de los moluscos etc. p. 7.
Glandina folliculus Pfr. Symb. II. p. 135.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 134. t. 1. f. 13.
— — *Küster* t. 18. f. 16—19.
Bulimus folliculus Morelet moll. du Port. p. 73.
β. Major: long. $12^1/_2$, diam. 4 mill. (Coll. Rossm.)

---

*) T. elongata, subcylindrica, pellucida, laevigata, lucida, lutescens; spira elongata, turrita, acuminata; anfr. 7 complanati, ultimus elongatus; apertura angusta, sinuosa; columella contorta, truncata. — Long. 19, diam. 6 mill. — Var.: long. 12, diam. 4 mill. (Orb. l. c.)

**) T. oblongo-ovata, pellucida, glabra, columella subplicata: labio exteriori tenui. (Gron. l. c. — Schröt. Einl. II. p. 237.)

Forma juvenilis:

Physa scaturiginum Drap. p. 56. t. 3. f. 14. 15.

Vediantius eristalius Risso hist. IV. p. 82. N. 183. t. 3. f. 24.

Habitat in Gallia meridionali, Lusitania, Italia, Sicilia; in Africa boreali (Algeria, Oran, Constantine etc.: Terver).

112. A. gracilis (Helix) Lowe. †

T. elongato-obovata, gracilis, tenuis, vitrea, nitida, laevis, imperforata; spira subattenuata, obtusa, dimidium testae excedens; anfr. 5 planiusculi; sutura obsoletiuscula; apertura obovata, edentula; columella lata, expansa, vix truncata, in labrum tenue, submarginatum attenuata. — Long. 2, diam. 1 lin. (L.)

Helix gracilis (Cochlicopa) *Lowe* Faun. Mader. p. 61. t. 6. f. 28.

Habitat in monte « Pico Branco » insulae Portosancto.

Obs. An varietas praecedentis?

113. A. nitidissima (Bulimus) Krynicki. †

T. ovato-oblonga, acuminata, imperforata, solidula, pellucida, glaberrima, nitidissima, flavescenti-cornea; anfr. 6 planiusculi, suturis superficialibus duplicatis; apertura elongata, angulata, antice obtusa; columella labro duplo brevior, subcontorta; perist. simplex, albescens. — Alt. $4\frac{1}{2}$, diam. $1\frac{3}{4}'''$. (Kr.)

Bulimus nitidissimus Kryn. in Bull. Mosc. VI. (1833.) p. 420.

Achatina nitidissima Pfr. Symb. II. p. 134.

Habitat in Tauria.

Obs. An eadem species ac Ach. folliculus?

114. A. nitidissima Forbes. †

T. cylindracea, pellucida, laevissima, nitidissima, corneo-lutescens; apertura oblonga; anfr. 5, ultimus major; apex obtusus. — Long. $\frac{1}{4}''$. (F.)

Achatina nitidissima Forbes in Jard. Ann. II. (1838.) p. 250.

— — *Wiegm.* Arch. 1839. II. p. 223.

Glandina nitidissima Küster t. 18. f. 20. 21.

Habitat in Algeria.

115. A. suturalis Pfr.

T. ovata, virenti-cornea, tenuis, pellucida, nitida; spira conica, acutiuscula; sutura profunda, rufa vel nigricans; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus $\frac{1}{7}$ longitudinis subaequans; columella subrecta, alba, ad basin aperturae oblongo-acuminatae oblique vix truncata; perist. acutum, margine dextro medio sinuato. — Long. $10\frac{1}{2}$,

diam. 4½ mill. Ap. 6⅓ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 53. Spec. max.)

Polyphemus suturalis Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
Glandina suturalis Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 132. t. 1. f. 7.
— — *Küster* t. 18. f. 22. 23.

Habitat in insula Cuba, prope El Fundador districti Canimarensis!

116. A. paludinoides Orbigny. †

T. ovato-conica, tenuis, diaphana, alba, laevigata; spira elevata, conica; anfr. 5 curti, convexi; apertura ovalis; columella acuta, contorta, truncata. — Long. 3, diam. 1½ mill. (O.)

Achatina paludinoides Orb. moll. cub. I. p. 171. t. 11. f. 13—15.
Glandina? paludinoides Pfr. Symb. II. p. 134.

Habitat in insula Cuba.

117. A. Antoniana Pfr.

T. ovato-conoidea, pellucida, nitida, lutescenti-grisea, minutim striata; anfr. 5 convexi, ultimus ⅖ longitudinis aequans; sutura profunda; apertura oblongo-ovalis; perist. acutum; columella fortiter truncata. — Long. 2½, diam. 1¼ lin. (A.)

Achatina hyalina Anton Verz. p. 41. N. 1589. Nec Rang.

Habitat in America meridionali.

118. A. consobrina Orbigyny. †

T. oblongo-pupoidea, subcylindrica, pellucida, glabra, lucida, alba; spira subaequalis, obtusissima; anfr. 5 minime convexi, ultimus oblongus; apertura ovato-oblonga; columella contorta, truncata. — Long. 2, diam. ⅔ mill. (O.)

Achatina consobrina Orb. moll. cub. I. p. 170. t. 11. f. 7—9.

Habitat in regionibus interioribus insulae Cubae.

§. 9.

119. A. crenulata (Sowerby?) Anton.

T. fusiformi-ovata, solidula, rubello-cornea, nitida; spira apice obtusa; anfr. 6½ convexiusculi, ultimus descendens, spira brevior; sutura marginata et minutissime crenulata; apertura subtus dilatata; columella subarcuata, fortiter truncata; perist. simplex. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. 11 mill. longa. (Coll. Anton.)

Achatina crenulata (Sow.?) Ant. Verz. p. 44. N. 1595.
Glandina crenulata Pfr. Symb. II. p. 59.

Habitat in America centrali.

120. A. Ottonis Pfr.

T. subfusiformis, solidula, lutescenti-cornea, nitida; anfr. 6½ planulati, sensim accrescentes, superiores plicis longitudinalibus confertis subtilibus, in ultimo suturam vix transgredientibus ornata; sutura impressa, eleganter crenulata; columella arcuato-truncata; apertura angusta; perist. simplex, margine dextro medio ampliato. — Long. 12, diam. 4 mill. (Spec. Mus. Berol.)

Cochlicopa Ottonis Pfr. Symb. I. p. 47.
Glandina Ottonis Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 6. p. 132. t. 1. f. 5.

Habitat in insula Cuba (E. Otto).

§. 10.

121. A. isabellina (Glandina) Pfr.

T. fusiformi-oblonga, tenuis, nitida, sub lente spiraliter confertim striata, isabellina, pellucida; sutura linea impressa marginata; anfr. 6 convexiusculi, ultimus spira conica, obtusa vix brevior; columella obliqua, strictiuscula, supra basin aperturae elliptico-oblongae breviter truncata; perist. simplex. — Long. 26, diam. medio 10 mill. Ap. 13 mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina isabellina (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat in republica mexicana.

§. 11.

122. A. ornata Pfr.

T. ovato-fusiformis, longitudinaliter confertim et regulariter costulata, diaphana, fulvo-rubella, strigis sparsis saturatioribus ornata; spira pyramidata, acuta; sutura sulco parallelo crenulato-marginata; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus spiram vix aequans; columella subrecta, abrupte truncata; apertura oblonga, utrinque attenuata, intus margaritacea. — Long. 72, diam. 31 mill. Ap. 37 mill. longa, 14 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina costulata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 75. Nec Adams.
— *ornata Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 117.

Habitat in montibus Quendeu Novae Granadae.

123. A. truncata (Bulla) Gmelin.

T. oblongo-ovata, solida, longitudinaliter confertissime plicato-striata, cinerascenti-rosea; spira conica, acutiuscula; sutura subcrenulato-marginata; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella leviter arcuata, basi abrupte truncata; apertura ovali-oblonga, utrinque angustata; perist. acutum. —

Long. 59, diam. 24 mill. Ap. 31 mill. longa, medio 12 lata. (Coll. Nr. 54.)

Kämmerer Conch. p. 128. t. 10. f. 5.
Bulla truncata Gmel. p. 3434. N. 49.
— — *Dillw.* descr. cat. I. p. 493. N. 50.
Buccinum striatum Chemn. IX. P. 2. p. 36. t. 120. f. 1028. 29.
Bulimus striatus Brug. Enc. méth. I. p. 366. N. 113.
Helix rosea (Cochlicopa) *Fér.* pr. 356. Hist. t. 135. f. 3.
Achatina rosea Desh. in Encycl. méth. II. p. 10. N. 3.
— *striata Lam.* ed. Dh. 35. p. 313.
— — *Küster* t. 3. f. 3. 4.
— *truncata Orb.* moll. cub. I. p. 163. t. 10. f. 13. 14? *)
Polyphemus glans Say in Philad. journ. I. p. 282.
Glandina truncata Say Amer. Conch. t. 20. Ed. Chenu (Bibl. conch. III.) p. 28. t. 7. f. 2 et 2 a.
— — *Beck* ind. p. 78. N. 15.

Habitat in Florida. In insula Cuba? (Orb.)

Obs. Cl. Orbigny, cujus iconem non vidi, figuras Ferussaci t. 136. f. 6—10 huc refert.

124. A. striata (Buccinum) Müller.

T. fusiformi-oblonga, solida, longitudinaliter tenue striata, albo-fuscescens, strigis angustis, rufis irregulariter ornata; spira turrito-conica, apice obtusiuscula; sutura marginata, subdenticulata; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus spiram subaequans, basi attenuatus; columella vix arcuata, basi abrupte truncata; apertura elliptico-ovalis; perist. rectum, acutum. (Coll. Nr. 55.) — Long. 56, diam. 20 mill. Ap. 29 mill. longa, 10 lata. (ex ic. Reev.)

Buccinum striatum Müll. verm. II. p. 149. N. 339.
— — *Chemn.* IX. t. 120. f. 1030.
Helix tenera Gmel. p. 3653. N. 121.
— *incumbens Dillw.* descr. cat. II. p. 955. N. 154.
— *Mülleri* (Cochlicopa) *Fér.* pr. 357.
— — *Orb.* synops. p. 9.
Achatina striata Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— *Mülleri Griff.* anim. kingd. t. 27. f. 5.
— — *Lam.* ed. Dh. 33. p. 312.
— — *Küster* t. 3. f. 9.
— — *Guérin* Iconogr. Moll. t. 6. f. 14?
— *dactylus Brod.* in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 32.
— — *Müll.* synops. p. 31.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 179. f. 16.

*) T. ovato-oblonga, rosea, longitudinaliter tenuissime striata; spira elevata, anfr. 7, apice obtusa; apertura ovato-acuta, angusta; labro tenui, acuto, sinuato. — Long. 40, diam. 14 mill. (Desh. et Orb. l. c.)

Glandina striata Beck ind. p. 77. N. 2.

Habitat in America meridionali: Cayenne (Fér.), Yuracares Boliviae (Orb.), insula Tumaco (Cuming, Broderip).

125. A. Marminii Deshayes. †

T. ovato-oblonga, subfusiformis, tenuis, pellucida, alba, apice obtusa, longitudinaliter plicata; apertura spira longior; sutura eleganter crenata. — Long. 53, diam. 21 mill. (Dh.)

Achatina Marminii Desh. in Encycl. méth. II. p. 11. N. 5.
— — *Desh.* in Guér. mag. 1831. t. 19.
— — *Küster* t. 3. f. 2. (fig. Guér.)
Glandina Marminii Beck ind. p. 78. N. 16.

Habitat . . . ?

126. A. turris Pfr.

T. oblongo-turrita, confertim et leviter costulato-striata, tenuiuscula, diaphana, carnea; sutura marginata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans; columella verticalis, basin non attingens, abrupte truncata; apertura semiovalis, deorsum subdilatata. — Long. 43, diam. 15 mill. Ap. 19 mill. longa, medio 8 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina turris (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 91.

Habitat . . . ?

127. A. algira (Bulimus) Bruguière.

T. oblongo-acuminata, tenuis, confertim striata, sub epidermide lutescente, decidua albida; spira conico-turrita, apice acutiuscula; sutura marginata, minute crenulata; anfr. 6—7 celeriter accrescentes, subplanulati, ultimus spiram subaequans vel paulo superans; columella leviter arcuata, abrupte truncata; apertura acuminato-semiovalis; perist. simplex, acutum, marginibus callo tenui junctis, dextro medio antrorsum dilatato. — Long. 40, diam. 12 mill. Ap. 19 mill. longa, prope basin 7 lata. (Coll. Nr. 56.)

Bulimus algirus Brug. Enc. méth. I. p. 364. N. 110.
— *Poireti C. Pfr.* III. p. 34. t. 7. f. 3. 4.
Helix Poireti (Cochlicopa) *Fér.* pr. 158. Hist. t. 136. f. 1—5.
Polyphemus striatus Montf. II. p. 415.
— *algirus Jan* catal. p. 4.
Achatina algira Desh. Expéd. de Morée p. 165.
— — *Lam.* ed. Dh. 28. p. 308.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 139.
— *Boreti Gray* in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
— *Poireti Rossm.* II. p. 18. f. 123.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 130.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 13.

Achatina cornea Brumati Monfalc. p. 35. f. 5.
Glandina Algira Beck ind. p. 78. N. 19.
— *Poiretii Beck* l. c. N. 20.
— — *Küster* t. 11. f. 1. 2. t. 17. f. 22—24.

Habitat in provincia Austriae littorali (in valle Isontii etc.), in Carniolia, Dalmatia, Italia, insula Zante, Morea, Algeria.

128. A. dilatata Ziegler.

T. ovato-conica, tenuiuscula, confertim costulato-striata, sub epidermide lutescente alba; spira conica, obtusa; sutura albo-marginata, subtiliter crenulata; anfr. 6—7 planiusculi, ultimus spiram superans; columella valde arcuata, abrupte truncata; apertura irregulariter ovalis; perist. simplex, acutum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 36, diam. 14 mill. Ap. 20 mill. longa, medio 9 lata. (Coll. Nr. 57.)

Achatina dilatata Zgl. Mus.
— *algira β Phil.* Sicil. I. p. 141.
Cochlicopa algira Phil. Sicil. II. p. 115.
Polyphemus dilatatus Jan catal. p. 4.
— *tumidus Villa* disp. syst. p. 19.
Glandina dilatata Beck ind. p. 78. N. 18.
— — *Küster* t. 17. f. 19—21.
Helix rosea var. Fér. hist. t. 136. f. 6. 7?

Habitat in Sicilia.

129. A. dominicensis (Bulla) Gmelin.

T. ovato-fusiformis, tenuis, subtiliter et confertissime costulato-striata, nitida, rufescenti-rosea, strigis latis castaneis, distantibus ornata; spira conoidea, obtusa; anfr. 7 convexiusculi, ultimus spira vix brevior, strigis versus basin interruptis, maculatis; columella leviter arcuata, ad basin aperturae semiovalis oblique truncata; perist. simplex, margine dextro infra medium angulatim dilatato. — Long. 34, diam. 12 mill. Ap. 18 mill. longa, medio 6½ lata. (Mus. Cuming.)

Bulla turrita et maculata Chemn. IX. P. 2. p. 17. t. 117. f. 1011.
— *dominicensis Gmel.* p. 3433. N. 41.
— — *Dillw.* cat. I. p. 487. N. 35.
Helix dominicensis (Cochlicopa) *Fér.* pr. 364.
Bulimus maculatus Brug. Enc. méth. I. p. 365. N. 112.
Achatina fusco-lineata Lam. 16. p. 133. ed. Dh. p. 302.
— — *Küster* t. 7. f. 12.
— *dominicensis Desh.* in Lam. p. 302.
— — *Anton* Verz. p. 44. N. 1593.
Polyphemus Bruguiereus Bowd. elem. t. 12. f. 11.

Glandina maculata Beck ind. p. 77. N. 3.
— *dominicensis Pfr.* Symb. II. p. 135.

Habitat in insula Haiti.

130. A. semisulcata Deshayes. †

T. elongata subturrita, apice obtusa, fulva, flammulis distantibus fuscis instructa, regulariter striata, basi laevigata; apertura minima subtriangulari; columella maxime contorta. — Long. 37 mill. (Desh.)

Achatina semisulcata Desh. in Enc. méth. II. p. 11. N. 7.
— *dominicensis var.? Desh.* in Lam. p. 302.
Glandina semisulcata Beck ind. p. 77. N. 4.

Habitat . . . ?

131. A. monilifera (Glandina) Pfr.

T. fusiformi-ovata, tenuis, pellucida, regulariter costulato-striata, costulis in medio anfractus penultimi evanescentibus, fulvo-rosea, lineis remotis, rufis, pallide marginatis ornata; spira brevis, conica; sutura eleganter et confertim granulosa; anfr. 7 planiusculi, ultimus $^3/_5$ longitudinis subaequans, ventrosus; columella vix arcuata, basi abrupte truncata; apertura angusta, semiovalis. — Long. 29, diam. 14½ mill. Ap. 19 mill. longa, 6½ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina monilifera (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 75.

Habitat in America centrali: Coban prope Vera Cruz (Lattre).

132. A. Griffithsii Adams.

T. fusiformi-turrita, longitudinaliter confertim costulato-striata, corneo-straminea, strigis rufis sparsis ornata; spira elongata, turrita, apice acutiuscula; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis vix aequans, medio impressus, basi subgibbus; columella oblique procedens, torta, ad basin aperturae oblique truncata; apertura irregularis, sinuoso-oblonga; perist. intus subincrassatum, album, margine dextro medio angulatim dilatato. — — Long. 22, diam. 6½ mill. Ap. 9 mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 58.)

Achatina Griffithsii Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14.
Bulimus Griffithii Adams in sched. olim.
Glandina Griffithii Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 158.

Habitat in insula Jamaica.

133. A. jamaicensis (Glandina) Pfr.

T. fusiformi-turrita, confertim et verticaliter costata, nitida, albida, strigis raris, rufis ornata; spira turrita, acutiuscula; sutura

crenulata, submarginata; anfr. 10 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, plurivaricosus, infra medium sublaevigatus, attenuatus; columella subrecta, basi oblique truncata; apertura angusta, semiovalis. — Long. 22, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina jamaicensis (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 137.

Habitat in insula Jamaica: Bluefields (Gosse).

134. A. Philippiana (Glandina) Pfr.

T. ovato-subfusiformis, tenuis, nitida, confertissime costulata, lutescenti-grisea, strigis latis decurrentibus, saturate castaneis ornata; spira conoidea, obtusiuscula; anfr. 8, ultimi infra suturam subtumidi, ultimus ⅘ longitudinis aequans; columella leviter arcuata, oblique truncata; apertura oblongo-ovalis, intus concolor; perist. simplex, castaneo-latemarginatum. — Long. 22, diam. 9 mill. Ap. 10½ mill. longa, medio 4 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Philippiana (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 90.

Habitat . . . ?

135. A. tortillana (Glandina) Pfr.

T. subfusiformi-ovata, solidula, striis longitudinalibus, confertis regulariter sculpta, nitida, pellucida, pallide cornea, maculis et strigis opacis, lutescentibus irregulariter signata; sutura submarginata; anfr. 7½ convexiusculi, ultimus spiram conicam, obtusam vix superans; columella fortiter arcuata, supra basin aperturae elliptico-oblongae abrupte truncata; perist. simplex, obtusum, margine dextro medio subdilatato. — Long. 20, diam. medio 8 mill. Ap. 10 mill. longa, 3⅔ lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Tortillana (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat in Tortilla Americae centralis.

136. A. yucatanensis (Glandina) Pfr.

T. ovato-oblonga, solidula, longitudinaliter confertim plicatula, fulvescenti-hyalina; spira elongato-conica, apice obtusa; sutura levis, marginata, denticulata; anfr. 6 convexi, ultimus ⅘ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata; prope basin aperturae abrupte truncata; apertura subrhombeo-ovalis, superne acuminata; perist. simplex. — Long. 23, diam. 9½ mill. Ap. 11 mill. longa, medio 4½ lata. (Coll. Nr. 59.)

Achatina yucatanensis (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 92.

Habitat in Yucatan (Largilliert).

137. A. venusta Pfr.

T. ovato-turrita, tenuis, longitudinaliter confertim striata, pellucida, rosea, strigis longitudinalibus, angustis albidis et fuscis

(fuscis in medio anfractus ultimi evanescentibus) ornata; spira turrita, acutiuscula; sutura marginata; anfr. 7 planiusculi, ultimus spira brevior; columella subverticalis, torta, ad basin aperturae elliptico-oblongae oblique truncata; perist. simplex, interdum albo-marginatum. — Long. 18, diam. 7 mill. Ap. 8 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 60.)

Cochlicopa venusta Pfr. Symb. I. p. 46.

Glandina venusta Phil. Icon. I. 6. p. 133. t. 1. f. 9.

β. Anfractu ultimo ventrosiore.

γ. Unicolor roseo-lutescens.

Habitat in insula Jamaica, var. *γ* in Demerara.

138. A. sericina Jonas.

T. ovato-turrita, tenuiuscula, longitudinaliter confertim plicata, pellucida, nitida, straminea; spira turrita, apice obtusissima; anfr. 6 — 6½ convexi, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, medio obsolete angulatus, infra angulum laevigatus; columella perarcuata, alte et late truncata; apertura subovalis. — Long. 17, diam. 7 mill. Ap. 7½ mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 61.)

Achatina sericina (Glandina) *Jonas* in Phil. Icon. I. 6. p. 134. t. 1. f. 11.

Habitat in Guinea.

§. 12.

139. A. fusiformis Pfr.

T. ovato-fusiformis, tenuis, longitudinaliter confertim costulata, lineis transversis minute reticulata, fulvida, saturatius strigata; spira conica, acutiuscula, apice rubescens; sutura marginata; anfr. 7 — 8 convexiusculi, ultimus spiram paulo superans, basi attenuatus ; columella leviter arcuata, abrupte truncata, rubella; apertura angusta, oblonga; perist. simplex, repandum, margine rubicundo. — Long. 87, diam. 35 mill. Ap. 50 mill. longa, 16 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina fusiformis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 75.

Habitat in monte Coban prope Vera Cruz Americae centralis (Lattre).

140. A. Sowerbyana Pfr.

T. ovato-fusiformis, tenuiuscula, diaphana, longitudinaliter confertim plicata, striis spiralibus, inaequaliter distantibus decussato-granulata, fulvo-rubella, strigis remotis fuscis ornata; spira conica, apice acuta; sutura albo-marginata, crenulata; anfr. 7½ planiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella arcuata, basi abrupte truncata; apertura acuminato-oblonga; perist. sim-

plex, marginibus callo tenui junctis, dextro repando. — Long. 88, diam. 38 mill. Ap. 52 mill. longa, medio 20 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Sowerbyana (Glandina) *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 32.

Habitat prope Totontepec reipublicae mexicanae.

141. A. coronata Pfr.

T. ovato-oblonga, tenuiuscula, subdiaphana, longitudinaliter confertim plicata, lineis spiralibus impressis, distantibus, infra medium anfractus ultimi evanescentibus irregulariter decussata, carnea, maculis fuscidulis, singulis antrorsum dilutis ornata; spira conica, acutiuscula; sutura dentibus validis, distantibus coronata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $^5/_9$ longitudinis subaequans; columella valde arcuata, basi abrupte truncata; apertura oblonga, semiovalis. — Long. 88, diam. 35 mill. Ap. 52 mill. longa, inferne 20 lata. (Coll. Nr. 62.)

Achatina coronata Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 158.

Habitat in republica mexicana (Liebmann).

142. A. Liebmanni Pfr.

T. subfusiformi-oblonga, solida, longitudinaliter plicata, interstitiis lineis spiralibus, confertis obsolete decussatis, albida; spira conica, obtusiuscula; sutura eleganter crenulata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spiram subaequans; columella strictiuscula, subverticalis, supra basin aperturae angustae, semiovalis abrupte truncata. — Long. 67, diam. 26 mill. Ap. 35 mill. longa, medio 12 lata. (Coll. Nr. 63.)

Achatina Liebmanni Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 159.

Habitat in republica mexicana (Liebmann).

143. A. fulminea (Helix) Férussac. †

T. turrita, subtilissime decussata, maculis oblongo-quadratis, strigisque angulato-flexuosis, rubro-violascentibus, alternis, fundo albido separatis ornata; sutura crispa; spira apice obtusa; anfr. 8 — 9 convexiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis paulo superans; columella leviter arcuata, ad basin aperturae oblique truncata; apertura angusta, ovali-oblonga. — Long. 64, diam. 19 mill. Ap. 25 mill. longa, 10 lata. (ex ic. Deless.)

Helix fulminea (Cochlicopa) *Fér.* pr. 366.

Achatina fulminea Lam. 17. p. 133. ed. Dh. p. 303

— — *Deless.* recueil t. 28. f. 6.

Glandina fulminea Beck ind. p. 77. N. 1.

Habitat . . . ?

144. A. rosea (Helix) Férussac.

T. ovata, utrinque attenuata, diaphana, fulvo-rosea, unicolor, confertim striata et inter strias granulata; spira conica, obtusiuscula; sutura marginata et denticulata; anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, supremi glabri, ultimus spiram superans; columella strictiuscula, subcallosa, abrupte truncata; apertura elliptico-oblonga, superne acuminata. — Long. 60, diam. 24 mill. Ap. 32 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 64.)

Helix rosea (Cochlicopa) *Fér.* pr. 356 p. p. Hist. t. 136. f. 8. 9.
Achatina rosea Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.
Glandina rosea Pfr. in Phil. Icon. I. 6. p. 133. t. 1. f. 2.
— *Cumingii Beck* ind. p. 78. N. 13. (ex ic. cit.)

β. Unicolor flavescens.

γ. Subelongata, ovato-fusiformis, sutura et apertura rubro-marginatis. — Long. 47, diam. 18 mill. Ap. 27 mill. longa, medio 9 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat in America centrali; var. γ in Honduras (Dyson).

145. A. Vanuxemensis Lea.

T. ovato-fusiformis, tenuis, pellucida, fulvo-rosea, albido-maculata, striis longitudinalibus et transversis ab apice ad medium anfractus ultimi decussata; sutura crenulata, papillata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculi, ultimus $\frac{3}{5}$ longitudinis aequans; columella arcuata, abrupte truncata; apertura ovali-oblonga. — Long. 53, diam. 24 mill. Ap. 34 mill. longa, 12 lata. (Mus. Cuming.)

Achatina Vanuxemensis Lea obs. I. p. 196. t. 19. f. 78.
— — (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 91.

Habitat in republica mexicana.

146. A. peruviana Lamarck. †

T. cylindraceo-fusiformis, tenuis, pellucida, longitudinaliter elegantissime striata, striis transversis subdecussata, alba, flammulis lineolisque rufo-fuscis variegata; sutura subcanaliculata; anfr. 9 planiusculi, ultimus spiram superans, costulis incumbentibus instructus; columella subarcuata, basi truncata, transverse lamellosa; apertura angusta, oblonga; perist. simplex. — Long. 48, diam. 18 mill. Ap. 25 mill. longa, 8 lata. (ex ic. Deless.)

Achatina peruviana Lam. 14. p. 132. ed. Dh. p. 301.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 10. N. 4.
— — *Deless.* recueil t. 28. f. 5.
Helix pretiosa (Cochlicopa) *Fér.* pr. 362 bis. Hist. t. 135. f. 4.
Glandina peruviana Beck ind. p. 78. N. 8.

Habitat in Peru.

147. A. Largillierti Pfr.

T. oblongo-attenuata, tenuis, longitudinaliter tenuissime et confertissime plicatula, lineis impressis, concentricis obsolete decussata, pellucida, fulvescenti-hyalina; spira elongata, obtusa; sutura levis, denticulata; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis vix superans; columella arcuata, supra basin aperturae breviter truncata; apertura acuminato-ovalis, basi rotundata; perist. simplex. — Long. 28, diam. 10 mill. Ap. 12 mill. longa, infra medium 5 lata. (Coll. Philippi.)

Achatina Largillierti (Glandina) *Pfr.* Symb. III. p. 90.

Habitat in Yucatan (Largilliert).

§. 13.

148. A. diaphana King. †

T. subcylindracea, diaphana, transversim striata. — Long. $^5/_6$, lat. $^5/_{32}$''. (K.)

Achatina diaphana King in Zool. Journ. V. p. 342.

Habitat in insula Juan Fernandez.

149. A. Donellii King. †

T. subalbida, transversim substriata; anfractus basalis ventricosus. — Long. $^7/_{16}$, lat. $^3/_8$''. (K.)

Achatina Donellii King in Zool. Journ. V. p. 342.

Habitat prope Lima.

150. A. iota Adams. †

T. minima, gracilis, cornea; anfr. 4 latissimi, laeves; apertura elongata, supra acutissima; columella arcuata. — Div. 12°. Spirae long. 0,08, long. tot. 0,135, lat. 0,07''. (A.)

Achatina iota Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 13.

Habitat in insula Jamaica.

151. A. pellucens Adams. †

T. parva, nitida, gracilis, cornea, striis exilissimis longitudinalibus, supra crebris, infra distantibus ornata; anfr. 7; labrum tenue, infra retractum; columella arcuata. — Div. 14°. Spirae long. 0,19, long. tot. 0,27, lat. 0,07''. (A.)

Achatina pellucens Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 13.

Habitat in insula Jamaica.

152. A. Sayca (Ferrusacia) Risso. †

T. pellucida, glaberrima, nitida, vitrea, anfr. 5; epidermide cornea; apertura sinistrorsa. — Long. 0,002. (R.)

Ferrusacia Sayea Risso hist. IV. p. 80. N. 181.

Habitat circa Nizza.

153. A. Sellovii King. †

T. cylindracea, transversim striata, subdiaphana. — Long. $^5/_{16}$, lat. $^2/_{16}$''. (K.)

Achatina Sellovii King in Zool. Journ. V. p. 343.

Habitat in Brasilia.

154. A. sordida King. †

T. subdiaphana, subconica; anfractus basalis ventricosus. — Long. $^6/_8$, lat. $^3/_8$''. (K.)

Achatina sordida King in Zool. Journ. V. p. 343.

Habitat prope Rio Janeiro.

155. A. striata Lea. †

T. subcylindracea, cornea, tenuis, longitudinaliter elegantissime striata; sutura impressa; anfr. 8 subconvexi; apertura parva, elliptica; columella incurvata. (L.) — Dimens.?

Achatina striata Lea in Proc. Am. phil. Soc. 1841. II. p. 31.

Habitat in Liberia.

156. A. strigata King. †

T. diaphana, subalbida, creberrime transversim substriata, strigis longitudinalibus castaneis raris; anfractus basalis subangulatus. — Long. $^{11}/_{16}$, lat. $^6/_{16}$ poll. (K.)

Achatina strigata King in Zool. Journ. V. p. 343.

Habitat in Brasilia.

157. A. turbinata Lea. †

T. turbinata, albida, oblique fasciata et maculata, striis minutis decussata, subcarinata; sutura impressa; anfr. 6 convexi, infra suturam impressi; apertura parva, ovata; columella incurva. (L.) — Dimens.?

Achatina turbinata Lea in Proc. Am. phil. Soc. 1841. II. p. 31.

Habitat in Liberia.

SPECIES,

QUARUM NONNISI NOMINA MIHI INNOTUERUNT.

Achatina

aperta Guild. (Macrospira) Swains. Malac. p. 335. f. 97. e. f.

australis Mich. (Villa disp. p. 19.) Am. bor.

Borniana Beck p. 75. N. 8. Cap. bon. sp. (Bul. zebra Perry, Born t. 10. f. 1 et Bul. lineatus Perry Conch. t. 30. f. 5.)

Bruguierea (Cochlicopa) *Fér.* pr. 359. (Glandina Beck p. 77. N. 5.) Antill.

cantheriata (Cochlitoma) *Fér.* pr. 340. An Bonann. Mus. Kirch. cl. III. f. 178. jun.?

carinulata (Subulina) *Beck* p. 77. N. 10. Patria?

Coulteri Gray Spicil. zool. II. 1. (Glandina Beck p. 78. N. 6.)

crotallaria Schum. p. 202. (Subulina Crotalariae Beck p. 77. N. 9. Tranquebar.) An Chemn. XI. f. 2084. 85? (Styliferum corallinum Petit exhibens.)

fimbriata (Glandina) *Beck* p. 78. N. 12. Amer. centr.

glandula (Cochlicopa) *Fér.* pr. 361. (Glandina Beck p. 78. N. 11.) Antill.

gracilis (Glandina) *Beck* p. 78. N. 17. Amer. merid.?

imperialis (Chersina) *Beck* p. 74. N. 2. Afr. occ.

integra (Chersina?) *Beck* p. 74. N. 1.

lacryma (Leptinaria) *Beck* p. 79. N. 2. Ins. Juan Fernandez.

marmorea Perry Conch. t. 51. f. 2. (Cochlicopa) Fér. pr. 368.

monoceros (Subulina) *Beck* p. 77. N. 5. Columbia et Bolivia.

obsoleta Mus. Caes. Vindob.

propinqua (Subulina) *Beck* p. 77. N. 6. Amer. centr.

pulchra (Linn.) *Jay* catal. 1839. p. 58. Africa.

pupaeformis (Subulina) *Beck* p. 77. N. 11. Ceylon.

sericata (Subulina?) *Beck* p. 77. N. 12. Guinea.

serpentina Beck p. 76. N. 10. Africa occid.?

shorgum (Leptinaria) *Beck* p. 79. N. 5. Guinea.

soluta (Leptinaria) *Beck* p. 79. N. 4. Guinea.

succinealis (Leptinaria) *Beck* p. 79. N. 3. Ins. Juan Fernandez.

tiarella (Cochlicopa) *Fér.* pr. 365.

tigrina Cum. Beck p. 75. N. 7. Amer. centr.? (Fér. t. 133.)

IX. Gibbus Montfort.

1. Lyonetianus (Helix) Pallas.

T. profunde rimata, compresso-triangularis, solida, subobliqué rugoso-striata, sub epidermide corneo-lutescente alba; spira conica, obtusa; anfr. 7 planiusculi, ultimus latere compressus, medio et basi subangulatus; apertura axi parallela, vix declivis; perist. incrassatum, reflexum, marginibus callo dentem 1 mediocrem gerente junctis. — Long. axis 30, diam. maj. 29, min. 18 mill. Ap. 17 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 1.)

Helix lyonetiana Pallas Spic. zool. I. fasc. 10. p. 33. t. 3. f. 7. 8.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 959. N. 163.
— — (Cochlodonta) *Fér.* pr. 472.
— — *Wood* ind. t. 35. f. 161.
— *distortus Burr.* elem. of Conch. p. 181. t. 23. f. 3.
Trochus monstrosus lyonetianus Chemn. V. p. 21. t. 160. f. 1513.
— *distortus Gmel.* p. 3580. N. 82.
Bulimus Lyonetianus Brug. Enc. méth. I. p. 299. N. 6.
— — *Lam.* 18. p. 122. ed. Dh. p. 229.
— — *Jay* catal. 1839. p. 56.
Gibbus Lyonnettii Montf. p. 303. t. 76.
Pupa Lyonetianus Blainv. Malac. p. 458. t. 40. f. 4.
Pupa Lyonetiana Pot. et *Mich.* gal. I. p. 162. t. 16. f. 7. 8.
— — *α Küster* p. 73. t. 10. f. 12. 13.
— *modiolinus Bowd.* elem. of Conch. t. 6. f. 34. (teste Dh.)
Gibbulina Lyonetiana Beck ind. p. 81. N. 2.
Bulinus Lyonetianus Sow. Conch. Man. ed. II. p. 88. f. 284.

Habitat in insula Isle de France.

2. G. Antoni Pfr.

T. aperte umbilicata, conica, striata et costulata, nitidiuscula, alba, diaphana, epidermide flava; spira obtusa; anfr. 7—8 vix convexiusculi, ultimus dilatatus, basi obsolete pluricarinatus; apertura subtetragono-oblonga, ampla, patens; perist. reflexum, albo-labiatum, marginibus callo edentulo junctis. — Long.

axis 29, diam. maj. 31, min. 20 mill. Ap. oblique 16 mill. longa, 11 lata. (Coll. Anton.)

Gibbus Antoni Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 149.
Pupa Lyonetiana Küster p. 72. t. 10. f. 9—11.

Habitat in Isle de France.

Obs. Differt a praecedente umbilico infundibuliformi, pervio et apertura edentula. — Synonyma nonnulla in specie praecedente allegata forsan ad hanc referenda sunt.

X. Pupa Draparnaud. *)

Conspectus specierum.

I. Margine dextro peristomatis edentulo.
1. Pariete aperturali edentulo.
a. Margine dextro regulari:
α. ovatae . . . . . §. 1. Nr. 1—5.
β. cylindricae . . . . . §. 2. — 6—17.
γ. conicae . . . . . §. 3. — 18—25.
b. Margine dextro impresso . . . . . §. 4. — 26.
2. Pariete aperturali dentato,
a. dente plicaeformi, interdum obsoleto,
α. columella simplice vel obsolete plicata
* corneae (vel hyalinae) . . . . . §. 5. — 27—35.
** calcareae
† regulares . . . . . §. 6. — 36—47.
†† irregulares . . . . . §. 7. — 48.
β. columella distincte plicata
* plica obliqua . . . . . §. 8. — 49—58.
** plicis 1 vel pluribus transversis. . §. 9. — 59—66.
b. dente lamelliformi . . . . . §. 10. — 67—69.
c. dente angulari . . . . . §. 11. — 70—74.
II. Margine exteriore dentato vel plicato.
1. Peristomate recto . . . . . §. 12. — 75—78.
2. Peristomate expanso.
a. Dentibus palatalibus lamellaribus intrantibus.
α. Cylindraceae, apice obtuso . . . . . §. 13. — 79—80.

---

*) Plicae (vel dentes) in variis testarum partibus observandae sequentibus terminis a me designatae sunt:

1. parietales, quae in ipso ventre anfractus ultimi positae sunt.

2. angularis (plerumque 1 vel nulla) quae ex angulo insertionis marginis dextri oriens in pariete aperturali magis minusve oblique intrat.

3. columellares, quae in ipso margine columellari (plerumque sinistro) aperturae, nec in pariete aperturali locum habent.

4. palatales, quae in palato, i. e. parte interna marginis externi anfractus ultimi conspiciuntur. Tales observamus magis minusve elongatas, fere lamelliformes (plerumque lineis albis extus designatas) in §. §. 12—19, abbreviatas (dentiformes) in §. §. 20—24.

β. Fusiformi-cylindraceae
* apertura 4—6 plicata . . . . . §. 14. — 81—87.
** apertura 7- vel multiplicosa . . . §. 15. — 88—104.
γ. Conico-fusiformes . . . . . §. 16. — 105—110.
δ. Bulimoideae . . . . . §. 17. — 111—115.
ε. Ovatae . . . . . §. 18. — 116.
ζ. Streptaxoideae . . . . . §. 19. — 117.
b. Dentibus palatalibus brevibus.
α. Peristomate calloso, extus scrobiculato §. 20. — 118—120.
β. Peristomate subsimplice.
* Dentibus marginalibus . . . . . §. 21. — 121—122.
** Dentibus profundis,
† dextrorsae
a. 2—4 dentatae . . . . . §. 22. — 123—133.
b. 5—pluridentatae . . . . . §. 23. — 134—147.
†† sinistrorsae . . . . . §. 24. — 148—149.
III. Species dubiae . . . . . §. 25. — 150—156.

---

§. 1.

1. P. grandis Pfr.

T. breviter et profunde rimata, ovato-oblonga, latere aperturae compressa, opposito inflata, laevigata, nitida, alba; spira oblongo-conica, apice obtusa; anfr. 7 convexiusculi, ultimus antice subascendens; columella plicata, recedens; apertura semiovalis; perist. subincrassatum, breviter reflexum, marginibus parallelis, subaequalibus. — Long. 42, diam. 21 mill. Ap. 16 mill. longa. (Coll. Nr. 1.)

Pupa grandis Pfr. Symb. III. p. 95.
— — *Phil.* Icon. II. 12. p. 156. Bul. t. 6. f. 4.

Habitat in insula Socotora; Madagascar (Petit).

2. P. sulcata (Helix) Müller.

T. profunde rimata, oblongo-conica, solida, oblique confertim costata, alba; spira conica, apice obtusa; anfr. 8 convexiusculi, ultimus antice ascendens; columella simplex, subverticalis; apertura verticalis, semioblonga; perist. undique expansum, reflexum, saepe intus flavo-virens, marginibus subparallelis, callo tenui junctis, columellari perdilatato, patente. — Long. 30, diam. 16 mill. Ap. c. perist. 12 mill. longa, 10½ lata. (Coll. Nr. 2.)

Helix sulcata Müll. verm. II. p. 108. N. 307.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 165. t. 135. f. 1232.
— — (Cochlodonta) *Fér.* pr. 471.

Turbo sulcatus Gmel. p. 3610. N. 91.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 863. N. 113.
— — *Wood* ind. t. 32. f. 115.
Bulimus sulcatus Brug. Enc. méth. I. p. 300. N. 7.
Pupa sulcata Lam. 3. p. 105. ed. Dh. p. 170.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 161. t. 16. f. 5. 6.
— — *Küster* p. 67. t. 9. f. 1—3.
Otala sulcata Schumacher essai p. 192.
Gibbulina sulcata Beck ind. p. 81. N. 6.
Plicadomus sulcata Swains. Malac. p. 332.

Habitat in insula Ceylon.

* * *

3. **P. Lamarckii Audouin.** †

T. minuta, ovata, laeviuscula; anfr. 6 convexi, ultimus acute carinatus; apertura brevis, lunaris, edentula; perist. expansum. — Long. 3, diam. 2 mill. (Descript. ex icone aucta.)

Pupa Lamarckii Aud. in Descr. de l'Eg. XXII. p. 161.
Savigny Descr. de l'Egypte. Hist. nat. II. Coq. t. 2. f. 1.

Habitat . . . ?

4. **P. simplex Gould.** †

T. minima, cylindracea, obtusa, laevis; anfr. 6 subplanulati; apertura orbicularis, edentula. — Long. $^1/_{15}$, diam. $^1/_{30}$ poll. (G.)

Pupa simplex Gould in Bost. Journ. III. p. 403. t. 3. f. 21.
— — *Gould* report p. 190. f. 121.

Habitat prope Cambridge, Massachusetts.

5. **P. admodesta Mighels.** †

T. minuta, ovata, virenti-fusca; anfr. $3^1/_2$ convexi; striae incrementi subtilissimae; apertura circularis, inermis; labrum simplex, tenue, subreflexum; umbilicus parvus. — Long. $^1/_{20}$, diam. $^1/_{40}$ poll. (M.)

Pupa admodesta Migh. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 19.

Habitat in insula Sandwich. Oahu.

Obs. Hoc loco conferatur P. muscorum (Nr. 29.) var. edentula

§. 2.

6. **P. dealbata Webb et Berthelot.**

T. breviter et profunde rimata, cylindracea, apice rotundata, oblique confertissime et argute costulato-striata, alba absque nitore; anfr. 8 planiusculi, ultimus antice breviter ascendens; columella simplex, leviter arcuata; apertura semiovalis; perist. sub-

incrassatum, breviter reflexum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari perdilatato, patente. — Long. 18, diam. 7 mill. Ap. 6⅓ mill. longa, 5⅓ lata. (Coll. Nr. 3.)

Pupa dealbata Webb et *Berth.* syn. p. 321.*)
— — *Orb.* moll. canar. p. 74.

Habitat in insulis Canariis.

Obs. Conf. P. fusus (Nr. 44.) var.

7. P. fusulus (Helix) Müller. †

T. cylindracea, obtusa, curvatim sulcata; apertura edentula; anfr. undecim. — Long. 7½, lat. 3 lin. (M.)

Helix fusulus Müll. verm. II. p. 109. N. 309.
Turbo fusulus Gmel. p. 3610. N. 89.
Pupa fusulus Beck ind. p. 82. N. 7.

Habitat in insulis Antillis? (Beck.)

Obs. «Ab H. fuso, quam prima facie crederes, differt, quod sit minor, plures anfractus habeat, dente in pariete aperturae opposito careat, striaeque sulcorum subarcuatae sint.» (Müll.)

8. P. funicula Valenciennes.

T. profunde rimata, cylindracea, apice obtuse conoidea, oblique et confertim costulato-striata, sordide alba; anfr. 8 convexiusculi, ultimus antice vix ascendens; columella simplex, leviter arcuata; apertura verticalis, truncato-oblonga; perist. subsimplex, marginibus callo junctis, dextro brevissime expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 4.)

Helix funicula Val. in Mus. Paris.!
Pupa funicula Pfr. Symb. II. p. 54.
— — *Küster* p. 80. t. 11. f. 16. 17.

Habitat in insula Isle de France.

Obs. Differt a P. dealbata praeter magnitudinem anfractibus convexioribus, costulis filiformibus, apice magis conoideo et aperturae forma.

* *
*

9. P. Truncatella Pfr.

T. rimata, cylindracea, apice obtusa, tenuis, diaphana, verticaliter et eleganter costulata, cereo-albida; anfr. 6—7 planiusculi, ultimus basi rotundatus, ¼ longitudinis vix superans; apertura subverticalis, oblique semiovalis, edentula; perist. subsimplex, reflexiusculum, margine dextro antrorsum arcuato, colu-

*) T. semipollicari, argute striata, albula. (Webb et B. l. c.)

mellari breviore. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. 1⅓ mill. longa. (Coll. Nr. 5.)

Pupa Truncatella Pfr. Symb. I. p. 46.
— — *Rossm.* XI. p. 12. f. 733.
— — *Küst.* p. 34. t. 4. f. 20. 21.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.

β. Major, subtilius costulata, anfr. 8, peristomatis margine dextro extus impresso: long. 5½, diam. 2 mill. (Spec.)

Pupa formosa Parr. in sched.
— *Truncatella var. Küst.* t. 4. f. 22. 23.

Habitat in monte Karst, prope Castelnuovo inter Tergestum et Fiume! In Carniolia, Dalmatia, Turcia.

10. P. columella Benz.

T. perforata, cylindrica, obtusa, laevigata, cornea (?); sutura profunda; anfr. 7—8 convexi, sensim accrescentes, ultimus ventrosior; apertura parva, lunato-rotundata, edentula; perist. acutum, vix reflexiusculum. — Long. 3½, diam. 1¼ mill. Ap. ¾ mill. longa. (Coll. Nr. 6.)

Pupa columella Benz Würtemb. Fauna 1830. p. 49.
— — *Rossm.* XI. p. 11. f. 731.
— — *Küster* p. 19. t. 3. f. 4. 5.
— *inornata Mich.* compl. p. 63. t. 15. f. 31. 32.
— — *Lam.* ed. Dh. 47. p. 190.
Alaea inornata Beck ind. p. 85. N. 9.
Cylindrus inornatus Hartm. (teste Villa disp. syst. p. 23.)

Habitat...? an subfossilis? — Testae inanes repertae sunt prope Stuttgart et in alluviis Rhodani prope Lyon.

11. P. dilucida Ziegler.

T. minutissime perforata, cylindrica, obtusa, fulvo-cornea, glabra; anfr. 6 convexi, ultimus spiram fere aequans; apertura subsemiovalis, edentula; perist subtilissime expanso-limbatum, margine columellari strictiusculo. — Long. 3⅔, diam. 1⅔ mill. Ap. 1½ mill. longa. (Coll. Nr. 7.)

Pupa dilucida Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* V. p. 15. f. 326.
— — *Küster* p. 55. t. 7. f. 8—10.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 15.
— *edentula Turt.* Man. f. 80? (Rm.)
Pupilla dilucida Beck ind. p. 84. N. 10.

Habitat in alpibus Tyroliae (Stentz) et in Britannia? — Rara in «Schneegrotte auf der St. Primasalpe» (Schmidt).

12. P. alpicola Charpentier.

T. subperforata, cylindracea, tenuiuscula, striatula, corneofusca; spira apice in conum obtusum attenuata; anfr. 6—7 convexiusculi, ultimus ¼ longitudinis vix superans, antice callo albo subincrassatus; apertura lata, semicircularis; perist. tenue, vix expansiusculum. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. 1⅓ mill. longa et lata. (Coll. Nr. 8.)

Pupa alpicola Charp. cat. moll. Suisse p. 16. t. 2. f. 5.
— — *Wiegm.* Arch. 1838. II. p. 277. *)
— — *Küster* t. 14. f. 3—5.

Habitat rarissima in monte »Gédroz, vallée de Bagne».

13. P. edentula Draparnaud.

T. subperforata, cylindrico-ovata, cornea, nitida, laevis; sutura mediocris; anfr. 5—6 convexiusculi, ultimus ¼ longitudinis paulo superans; apertura semiovalis, edentula; perist. sejunctum, rectum, acutum, simplex. — Long. 2⅔, diam. 1½ mill. Ap. ⅔ mill. (Coll. Nr. 9. Spec. cassellan.)

Pupa edentula Drap. hist. p. 59. t. 3. f. 28. 29.
— — (Sphyradium) *Charp.* catal. p. 15.
— *muscorum var. edentula? Hartm.* in Neue Alpina I. p. 220?
Nerita doliolum Schranck? (Held.)
Helix exigua Stud. in Coxe travels. (Hartm.)
Vertigo nitida Fér. pr. 1. p. 68.
— *edentula Stud.* syst. Verz. p. 89.
— — *C. Pfr.* III. p. 42. t. 7. f. 28. 29.
— — *Mich.* compl. p. 72.
— — *Porro* Malac. p. 67.
— — *Rossm.* X. p. 28. f. 646.
— — *Gray* Man. p. 199. t. 7. f. 80?
— — *Held* in Isis 1836. p. 277.
— *lepidula Held* in Isis 1837. p. 307. **)
Jaminia edentula Risso hist. IV. p. 89. N. 203.
Turbo Offtonensis Shepp. in Linn. tr. XIV. p. 155? (Gray.)
Alaea nitida Jeffr. in Linn. tr. XVI. p. 358. 515.
— *edentula Beck* ind. p. 85. N. 4.

---

*) T. cylindrica, obtusa; anfr. 6; sutura profundissima; apertura subrotunda, non dentata. (ex ic.) — P. marginata Drap. paulo major. (Charp. l. c.)

**) T. cylindrico-ovata, obtusa, breviter rimata; apertura semiovata; perist. simplici, acuto; anfr. 5; long. ⅔, lat. ⅓‴. (Held l. c.) — Species ab auctore e Vert. edentulae C. Pfr. descriptione proposita. At species a C. Pfeiffer Cassellis observata (cujus figuram ipse nimis cylindricam dicit), a vera Draparnaudiana non diversa est.

Stomodonta edentula Mermet moll. pyr. p. 54. N. 15.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia etc.

Obs. Num species cognominis auctorum anglicorum huc referenda sit, an ad P. dilucidam, incertum adhuc videtur.

14. P. lucida (Vertigo) Jan. †

T. dextrorsa, conico-cylindrica, obtusa, diaphana, lucidissima; apertura ovalis; labium columellae coarctatum; perist. edentulum. (Jan.) — Dimens.?

Vertigo lucida Jan Mantissa p. 3.

Habitat in Italia boreali.

15. P. minutissima Hartmann.

T. profunde rimata, cylindrica, obtusa, eleganter et confertim striata, tenuis, pellucida, cornea; anfr. 5—6 convexi, ultimus $^1/_3$ longitudinis fere aequans; apertura oblongo-subcircularis, edentula; perist. reflexiusculum, margine dextro superne arcuato. — Long. 2, diam. $^2/_3$ mill. Ap. fere $^2/_3$ mill. longa. (Coll. Nr. 10.)

Pupa minutissima Hartm. in Neue Alpina I. p. 220. t. 2. f. 5.
— — *C. Pfr.* III. p. 38. t. 7. f. 12. 13.
— — *Rossm.* I. p. 84. f. 38.
— — *Porro* Malac. p. 62.
— — *Lam.* ed. Dh. 46. p. 189.
— — *Dupuy* moll. du Gers p. 39. N. 1.
— — *Küster* t. 13. f. 27. 28.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 15.
— *muscorum Drap.* tabl. d. moll. p. 56. N. 1. *)
— — *Drap.* hist. p. 59. t. 3. f. 26. 27.
— — (Sphyradium) *Charp.* catal. p. 15.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 74.
— *minuta Charp.* (teste Rossm.)
— *obtusa Flem.* brit. anim. p. 269. (Gray.)
Vertigo cylindrica Fér. pr. 2.
— — *Gray* Man. p. 200. t. 12. f. 140.
— *muscorum Mich.* compl. p. 70.
— *pupula Held* in Isis 1837. p. 308.
— *minutissima Graells* catal. de los moluscos etc. p. 7.
Jaminia muscorum Risso hist. IV. p. 88. N. 201? **)
Alaea cylindrica Jeffr. in Linn. tr. XVI. p. 359. 515.

---

*) Coq. grêle, torse, exactement cylindrique; ouverture sub-1-plissée. — Long. $1^1/_2$—2, diam. $^2/_3$ mill. — Pli très petit, situé à la partie supérieure de l'ouverture intérieurement; 6—7 tours. (Drap. l. c.)

**) T. ventricosa, glaberrima, nitida, pellucida; anfr. 7, lineis exiguissimis obliquis sculptis; epidermide fusco-pallida, peritremate eburneo, postice ad dextram lamella brevissima instructo. — Long. 0,003. — Nizza. (Risso l. c.)

Alaea minutissima Beck ind. p. 85. N. 5.
Eruca muscorum Swains. Malac. p. 334.
Stomodonta muscorum Mermet moll. pyr. p. 55. N. 18.
β. Sublaevigata, nitida, striis subobsoletis:
Pupa laeviuscula Küst. in litt. et Monogr. t. 14. f. 6—8.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Lusitania, etc.; var. *β* prope Triest (Küster).

16. P. Callicratis Scacchi. †

T. minima, cylindrica, cornea, umbilicata; anfr. 5 rotundati, oblique striati; apertura ovata, edentula; labrum paulum reflexum. — Long. vix 1, diam. ½ lin. (Sc.)

Turbo Callicratis Scacchi osserv. zool. 1833. p. 11.
Pupa Callicratis Scacchi cat. conch. regni Nap. p. 16. (P. muscorum Drap.?)
— — *Arad.* et *Magg.* catal. p. 118.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 220.

Habitat prope Neapolim (Scac.) et in Sicilia.

Obs. 1. Aradas et Maggiore aperturam edentulam, unidentatam, bi- vel tridentatam vocant. (Phil. l. c.)
Obs. 2. Ad hanc sectionem conf. P. muscorum Nr. 29.

17. P. Parraiana Orbigny. †

T. oblongo-ovata, subcylindrica, perforata, fusca, laevigata; spira elongata, apice acuminato obtusa; anfr. 6 convexi; apertura ovalis; labrum margine lato reflexum, album. — Long. 4, diam. 1½ mill. (O.)

Pupa Parraiana Orb. moll. cub. I. p. 181. t. 12. f. 9—11.

Habitat in insula Cuba.

Obs. Num huc referenda? Iconem nondum vidi.

§. 3.

18. P. insularis Ehrenberg. †

T. subcylindrica, apice attenuata, subacuta, nitida, albido-cornea, subtilissime transverse striata, striis apicem versus angustioribus, pellucida; apertura semiovata, margine paululum reflexo, leviter calloso; anfr. 7—8, 3 primi diametro subaequales. — Long. 5½, lat. 1¾ lin. (E.)

Pupa insularis Ehrenb. Symb. phys.
Mastus insularis Beck ind. p. 73. N. 6.

Habitat in insula Cameran maris rubri.

Obs. «Pupae obtusae affinis, sed spirae apice acuto diversa».

19. P. bulimoides Pfr.

T. oblique et profunde rimata, cylindrico-subfusiformis, apice attenuata, laevigata, nitida, carneo-cinerea, apice pallide cornea; anfr. 8—9 planiusculi, supremi convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix aequans; apertura oblongo-ovalis, intus fulva; perist. album, late expansum, simplex, marginibus subapproximatis. — Long. 16—17, diam. 5 mill. Ap. 6 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 11.)

Pupa bulimoides Pfr. Symb. II. p. 53.
— — *Küst.* p. 84. t. 12. f. 8. 9.
Helix sidoniensis (Cochlogena) *Fér.* pr. 426?
Buliminus Sidonensis Beck ind. p. 71. N. 47?
Bulimus sidoniensis Charp. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 141? *)

Habitat in Syria.

Obs. Nonne forsan eadem species ac praecedens? — Nomine erroneo Hel. subulae Fér. quondam e Mus. Paris. accepi. — Nonne potius inter Bulimos in fine §. 10 enumeranda? Sed peristomatis margines fere aequales sunt!

20. P. pallida Philippi.

T. rimata, subfusiformis, striatula, nitidula, violascenti-cinerea; spira elongata, apice acuta, cornea; anfr. 8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi subcompressus; apertura semiovalis, edentula, intus fuscula; columella callosa; perist. patulum, acutum, simplex. — Long. 10, diam. 3 mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 12.)

Pupa pallida Phil. mss. Rossm. XI. p. 11. f. 732.
— — *Küster* p. 86. t. 12. f. 12. 13.

Habitat in Italia boreali (Phil.).

21. P. Farinesii Desmoulins.

T. profunde rimata, fusiformi-conica, substriata, sericina, diaphana, brunnea; spira turrito-conica, apice acuta; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; apertura oblongo-ovalis; perist. acutum, simplex, vix expansiusculum, marginibus subconniventibus. — Long. 6, diam. 2½ mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Nr. 13.)

Pupa Farinesii Desm. Bull. Soc. Linn. Bord. VII. p. 156. t. 2. f. E.
— — *Potiez* et *Mich.* gal. I. p. 165. t. 16. f. 17. 18.
— — *Rossm.* X. p. 25. f. 639.
— — *Küster* p. 51. t. 6. f. 21. 22.
— *Farenesii Jay* catal. 1839. p. 52.

*) T. turrito-cylindracea, rimata, glabra, nitidiuscula, pallide cornea; apertura elliptica, edentula; peristomate acuto, reflexo, plano, intus albo labiato, marginibus callo tenui ad angulos incrassato junctis; anfr. 9½ regulariter crescentibus. — Diam. 4½, alt. 17 mill. — Prope Beirut Syriae. (Charp. l. c.)

Torquilla Farinesii Beck ind. p. 85. N. 6.
Stomodonta Farinesii Mermet moll. pyr. p. 49. N. 6.

Habitat in Pyrenaeis.

22. P. pacifica Pfr.

T. profunde rimata, ovato-cylindracea, apice obtusiuscula, solidula, sublaevigata, fusco-cornea; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis subaequans; apertura semiovalis, edentula; perist. breviter expansum, intus albo-labiatum, margine dextro superne breviter curvato, tuberculo calloso interdum juxtaposito, columellari latiore, patente. — Long. $4\frac{1}{3}$, diam. $2\frac{1}{3}$ mill. Ap. $1\frac{1}{3}$ mill. longa. (Mus. Cuming.)

Pupa pacifica Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 31.

Habitat in insulis oceani pacifici: Sir Charles Hardy's island (Tucker).

23. P. fallax Say.

T. rimato-perforata, fusiformi-oblonga, subtilissime striata, nitidula, cornea; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis vix superans; apertura semiovalis, edentula; perist. expansum, intus albo-callosum, margine dextro superne valde curvato. — Long. $5\frac{1}{2}$, diam. 2—$2\frac{1}{4}$ mill. Ap. $1\frac{2}{3}$ mill. longa. (Coll. Nr. 14.)

Pupa fallax Say in Philad. journ. V. p. 121. *)
— — *Gould* report p. 192. f. 123.
— — *Gould* in Bost. journ. IV. p. 357. t. 16. f. 15.
— — *Küst.* p. 88. t. 12. f. 20. 21.
— *albolabris Ward* } in sched. Americ.
— *simplex Binn.* }

Cyclostoma marginata Say in Philad. journ. II. p. 172. (teste Gould.).

β? Major, rugosula:

Pupa placida Say in New-Harmony disseminator.
— — *Say* descr. of new terr. shells p. 24. **)

Habitat in America boreali: Massachusetts (Say, Gould).

24. P. Paredesii Orbigny. †

T. pupoidea, oblonga, cylindrica, subperforata, tenuis, longitudinaliter striata, fusca; spira aequalis, apice truncata; anfr. 6;

*) T. anguste umbilicata, turrita, apice obtusiuscula, pallide cornea, minutim striata; sutura impressa; anfr. 7 convexiusculis; apertura inermi, subovali, spira plus quam duplo breviore; columella reflexa, recta, angulum obtusum formante; labro vix expanso. — Long. $\frac{3}{10}$ poll. (Say l. c.)

**) T. dextrorsa, cylindrico-conica, pallide corneo-lutescente, apice obtusa, albida; anfr. $6\frac{1}{2}$ subrugosis; sutura mediocri; apertura edentula, lunato-ovali; columella recurvata, umbilicum angustum fere occultante; perist. subreflexo. — Long. superat $\frac{3}{10}$''. (Say l. c.)

sutura profunda; apertura amplissima, ovalis, albescens; columella recta, complanata; labrum crassum, reflexum. — Long. 5. lat. 2 mill. (Orb.)

Helix Paredesii (Cochlodon) *Orb.* syn. p. 21.
Pupa Paredesii Orb. voy. p. 322. t. 41. f. 3—6.
Alaea Paredesii Beck ind. p. 85. N. 8.

Habitat in provincia Pazensi Boliviae et Limacensi Peruviae.

25. P. rupestris Philippi.

T. subperforata, turrita, costulato-striata, fusco-cornea, non nitens; spira turrita, acutiuscula; anfr. 5—6 valde convexi, ultimus ventrosus, ⅓ longitudinis superans; apertura ovali-subrotundata, edentula; perist. simplex, acutum, expansiusculum, marginibus conniventibus. — Long. 5, diam. 2¼ mill. Ap. 1⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 15.)

Bulimus rupestris Phil. Sicil. I. p. 141. t. 8. f. 15.
Pupa rupestris Rossm. X. p. 25. f. 637.
— — *Bivon. fil.* monogr.
— — *Arad.* et *Magg.* catal. p. 129.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 113.
— — *Küst.* p. 19. t. 3. f. 1—3.
— *unicarinata Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 175. t. 17. f. 11. 12?
Cochlicellus rupestris Beck ind. p. 63. N. 9.
Vertigo Dupotetii Terv. p. 32. t. 4. f. 12. 13.

Habitat in Sicilia (Phil.) et Algeria (Terver).

Obs. 1. Huic sectioni affines sunt Bulimi species Nr. 200—208, quae conferantur.

Obs. 2. Conf. Pupa umbilicata Drap. Nr. 70.

§. 4.

26. P. pagodula Desmoulins.

T. subumbilicata, ovata, obtusa, costulata, sericina, fulvo-cornea; anfr. 8 convexiusculi, ultimus antice ascendens, ⅖ longitudinis subaequans, basi compressus; umbilicus infundibuliformis, magis minusve intrans; apertura irregularis, truncato-oblonga; perist. simplex, reflexiusculum, marginibus subparallelis, dextro medio impresso, intus tuberculato-incrassato. — Long. 4, diam. 2¼ mill. Ap. 1½ mill. longa. (Coll. Nr. 16.)

Pupa pagodula Desmoul. in Act. Bord. IV. p. 158.
— — *Mich.* compl. p. 59. t. 15. f. 26. 27.
— — *Lam.* ed. Dh. 32. p. 183.
— — *Rossm.* V. p. 15. f. 325.
— — *Porro* Malac. p. 63.
— — *Pfr.* in Wiegm. Arch. 1841 I. p. 222.

Pupa pagodula Küst. p. 21. t. 3. f. 8. 9.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
Pupilla pagodula Beck ind. p. 84. N. 7.

Habitat in Germania, Illyria et Gallia passim.

Obs. Variat costulis filiformibus confertis vel membranaceis distantioribus, praeterea anfractu ultimo magis minusve deviante, umbilicum clausum vel perforationem apertam formante. — Palatum plica spirali, profunda, in apertura haud conspicua, munitum.

§. 5.

27. P. Parreyssii Frivaldsky.

T. rimato-perforata, cylindrica, gracilis, tenuis, longitudinaliter confertim costulata, diaphana, albida, apice obtusissima; anfr. 7 — 8 plani, inferiores celeriter accrescentes, ultimus ⅓ longitudinis aequans, basi subcompressus; apertura oblonga, basi dilatata, plica 1 intrante parietis aperturalis, alteraque obsoleta in parte supera columellae coarctata; perist. simplex, vix expansiusculum, edentulum, marginibus lamina callosa junctis. — Long. 5⅔, diam. 1¾ mill. Ap. 1¾ mill. longa. (Coll. Nr. 17.)

Pupa Parreyssii Friv. in sched.
— *Truncatella var. Rossm.* XI. f. 734?
— — *var. Küst.* t. 4. f. 24. 25?

Habitat in Turcia.

Obs. Similis P. Truncatellae (Nr. 9) et biplicatae (Nr. 79). A priore differt ratione anfractuum, apertura oblonga et pariete aperturali plicato, ab altera plicis in fundo anfractus ultimi omnino deficientibus.

28. P. vulcanica Küster. †

T. aperte perforata, ovata, obtusa, glabriuscula, sericina, tenuis, diaphana, corneo-lutescens; anfr. 7 planiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; paries aperturalis denticulo munitus; apertura ampla, ovalis; perist. acutum, parum expansum. — Alt. 1⅓, lat. ⅔‴. (K.)

Pupa vulcanica Küster p. 18. t. 2. f. 23. 24.
— *rupestris Küst.* olim. Ant. Verz. p. 47.

Habitat prope Nurri Sardiniae.

29. P. muscorum (Turbo) Linn.

T. breviter et profunde rimata, ovato-cylindrica, sublaevigata, corneo-fusca, nitidula, apice obtusa; anfr. 6 — 7 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; apertura subsemicircularis; paries aperturalis edentulus vel denticulo obtuso, raro 2 obsoletis munitus; perist. subsimplex, extus pone aperturam callo

albido cinctum. — Long. 3½, diam. vix 2 mill. Ap. 1⅓ mill. longa. (Coll. Nr. 18.)

Turbo muscorum L. syst. ed. X. p. 767. ed. XII. p. 1240. N. 651.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 61. t. 123. f. 1076. no. 1. 2.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 878.
Helix muscorum Müll. verm. II. p. 105. N. 304.
— — (Cochlodonta) *Fér.* pr. 475.
Bulimus muscorum Brug. Enc. méth. I. p. 334. N. 63. (ex parte.)
Pupa marginata Drap. tabl. d. moll. p. 58. N. 6.
— — *Drap.* hist. p. 61. t. 3. f. 36—38.
— — *C. Pfr.* I. p. 59. t. 3. f. 23. 24.
— — *Gray* Man. p. 196. t. 7. f. 79.
— *muscorum Lam.* 27. p. 111. ed. Dh. p. 180.
— — *Nilss.* p. 49. N. 1.
— — *C. Pfr.* I. p. 57. t. 3. f. 17. 18. III. p. 61.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 165. t. 235. f. 4109—12.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 405. N. 11.
— — *Rossm.* I. p. 83. f. 37. V. f. 323.
— — *Porro* Malac. p. 62.
— — *Dupuy* moll. du Gers. p. 40. N. 2.
— — *Küster* p. 12. t. 2. f. 1—5.
— *unidentata C. Pfr.* I. p. 58. t. 3. f. 19. 20.
— — (Sphyradium) *Charp.* catal. p. 15.
— *bidentata C. Pfr.* I. p. 59. t. 3. f. 21. 22.
— *badia Adams* in Bost. Journ. III. p. 331. t. 3. f. 18.
Alaea marginata Jeffr. Linn. trans. XVI. p. 357.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 292.
Pupilla marginata Leach moll. p. 127.
— *muscorum Beck* ind. p. 84. N. 11.
Jaminia marginata Risso IV. p. 89. N. 202.
Torquatella muscorum Held in Isis 1837. p. 919.
Stomodonta marginata Mermet moll. pyr. p. 53. N. 14.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia etc.

30. P. Neumeyeri Küster. †

T. minima, umbilicata, obtusa, ovato-cylindrica, paucispira, opaca, pallide cornea, subdiaphana; anfr. 7 planiusculi, angusti; sutura subprofunda; apertura oblique ovata; paries aperturalis unidentatus. — Long. 1½, diam. 1‴. (K.)

Pupa Neumeyeri Küster Monogr. p. 56. t. 7. f. 15. 16.

Habitat in Dalmatiae insula Lissa rarissima.

31. P. aridula Held.

T. perforata, fusiformis, glabriuscula, tenuis, diaphana, rubello-fusca; anfr. 7 convexi; cervix gibba; apertura rubella, ro-

tundata, denticulo unico immerso in pariete aperturali; perist. sejunctum, acutum, reflexiusculum. — Alt. 1½, lat. ⅔‴. (K.) — Long. 3, diam. 1½ mill. (Coll. Nr. 19.)

Pupa aridula Held in Küst. Pupa p. 14. t. 2. f. 8—10.

Habitat in Bavaria. (Auf Anhöhen an trocknen Felsen bei Eichstädt, Regensburg, spärlich auch unweit München: Held.)

32. P. Sterrii Voith.

T. subconica, obtusa, pallide brunnea, tuberculis 2 rotundis obtusis palato insertis, lamella alba interposita, in pariete aperturali constanter unidentata; perist. ovale, extus callo albo ornatum; tenerrime striata; P. muscorum simillima. (V.) — Long. 3¾, diam. 2 mill. (Coll. Nr. 20.)

Pupa Sterrii Voith in Fürnrohr naturhist. Topogr. v. Regensb. 1838. p. 469. *)

— *Steerii Küst.* Pupa p. 14. t. 2. f. 5. 6.

Habitat in Bavaria. (Abach prope Regensburg: Voith.)

33. P. costulata Nilsson.

T. subperforata, cylindracea, regulariter et confertim costulata, subpellucida, fulvido-cinerascens; spira cylindrica, apice in conum brevissimum obtusata; anfr. 6½ convexi, ultimus rotundatus; apertura subovalis, dente unico parietis aperturalis profundiusculo coarctata; perist. expansum, subincrassatum, marginibus callo junctis, dextro sinuoso. — Long. 2, diam. ⅘ mill. Ap. ½ mill. longa. (Coll. Nr. 21.)

Pupa costulata Nilss. hist. p. 51. N. 3. **)

— — *Küster* Pupa t. 13. f. 29. 30.

Habitat in sylvis inter folia putrida rarissime. Ad Esperöd Scaniae reperit Landgren.

Obs. Species a Cl. C. Pfeiffer (III. p. 37.) inter synonyma P. dolioli laudatur; sed descriptio Nilssoniana et specimina Küstero a Cl. Siebold communicata cum illa minime congruunt.

---

*) T. pusilla, subpellucida, laevis, striis obliquis, oculo armato tantum perspicuis, subnitida. Spirae anfractus 6 convexi, quorum superiores 4 sensim angustiores et minores, in apicem obtusum decrescentes. Sutura profunda. Apertura semilunaris. Columella denticulo parvo, obtuso, margini laterali approximato, constanter notata. Peristoma reflexum, album, pone marginem aperturae callo albo margini subparallelo, unde anfractus inferius subangustatus, introrsum basi tuberculis 2 intus et extus protuberantibus albidis, lamellaque transversa interjecta, excavationi fuscae insidentibus, tuberculo columellari majore Fissura distincta. (Voith l. c.)

**) T. dextrorsa, cylindrica, obtusa, subcinerea, costulis striata; apertura unidentata, dilatata; perist. patulum. — Long. 2, lat. vix 1 mill. — T. obtusa, subpellucida, obscura, striis elevatis pulchre costulata. Anfr. 6½ — 7 convexi, subaequales. Sutura satis profunda. Fissura umbilicalis perspicua. Apertura

34. P. monodon (Vertigo) Held.

T. cylindrica, obtusa, dextrorsa, sublaevis, nitidula, fusca; anfr. 6; apertura semiovata; perist. reflexum, margine laterali subdepresso; paries aperturalis uniplicatus. — Long. 1, lat. vix $\frac{1}{2}'''$. (H.) — Long. 2—2½ mill. (Coll. Nr. 22.)

Vertigo monodon Held in Isis 1837. p. 304.

Habitat in Bavaria.

35. P. anconostoma (Helix) Lowe. †

T. cylindrica, pupaeformis, laeviuscula, nitida, corneo-rufescens; spira obtusa; anfr. convexi, rotundati, aequi, striis transversis, obliquis, obsoletis, indistinctis; sutura distincta, impressa; apertura unidentata, elliptica, subangustata, longior quam lata, subtrigona, antice angulata; columella recta, supra cubito vel flexura abrupto, acuto, cum labro tenui, reflexo conjuncta: dente lamellato in ventrem juxta labrum obsoletiusculo, a labro distincto. — Pupae umbilicatae Drap. proxima, praesertim per var. β. (L.)

α. gyrata: testa elongata, aperturae cubito distinctissimo. Long. 1¾, diam. 1‴. Anfr. 7.

β. curta: testa abbreviata, aperturae cubito obsoletiore. Long. 1¼, diam. ¾‴. Anfr. 6. (L.)

Helix anconostoma Lowe Mader. p. 62. t. 6. f. 30.

Pupa anconostoma Lam. ed. Dh. 40. p. 187.

— — *Graells* catal. de los moluscos etc. p. 7.

Habitat in insula Madera, et in Galicia (Graells). — In littore Catanensi detectam esse affirmant Arad. et Magg., sed de nomine recto non omne dubium iis sublatum est.

Obs. In hac sectione conf. P. pacifica (Nr. 22.) var.

§. 6.

36. P. Chrysalis (Helix) Férussac.

T. profunde rimata, elongato-turrita, subcylindrica, solida, longitudinaliter et distanter valide plicata, griseo-albida, strigis denticulatis et angulatis, corneis variegata; spira sensim attenuata, acutiuscula; anfr. 10—12 vix convexiusculi, ultimus antice ascendens, basi subcompressus; plica columellaris obsoleta; apertura oblonga, oblique truncata, intus fulvo-carnea, dente mediocri parietis aperturalis coarctata; perist. incrassatum, late expansum, marginibus callo crasso junctis, columellari superne subito reflexo.

---

fere rotunda; columella dente parvulo plicaeformi notata. An P. doliolum Dp. t. 3. f. 41. 42? — Fig. 43 et 44 ejusdem tabulae formam testae nostrae melius referunt. At nostra differt magnitudine multo minori, anfractibus paucioribus etc. (Nilss. l. c.)

— Long. 44, diam. 14 mill. Ap. c. perist. 16 mill. longa, 12 lata. (Coll. Nr. 23.)

Helix Chrysalis (Cochlodonta) *Fér.* hist. t. 153. f. 1—3!
Pupa chrysalis Beck ind. p. 82. N. 13.
— — *Lam.* ed. Dh. 29. p. 181.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 179. t. 12. f. 1—5.
— — *Küster* p. 6. t. 1. f. 7. 8.
Lister t. 588. f. 48.

β. Abbreviata, cylindracco-ovata: long. 36, diam. 14 mill. Ap. 16 mill. longa, 14 lata. (Spec. cub.)

γ. Ovato-acuminata, minor.
Pupa chrysalis Potiez et *Mich.* gal. I. p. 163. t. 16. f. 9. 10.

δ? Testa tenuiore, plicis longitudinalibus destituta:
Pupa chrysalis var. A. Desh. l. c. p. 181.

Habitat in insula Cuba! In littore sinus Matanzani frequentem legi Coccolobis adhaerentem. — Guadeloupe et Martinique? (Desh.)

Obs. Formam monstrosam inter normales reperi anfractu ultimo subdeviante, apertura sublaterali, angusta, fere pyriformi distinctam.

37. P. calcarea Pfr.

T. profunde rimata, subcylindracea, solida, irregulariter striata, nitida, calcarea; spira elongata, apice obtuse conica; anfr. 12 planiusculi, ultimus inflatus, antice rugoso-plicatus, ascendens; columella simplex; apertura semiovalis, intus alba, in fundo fuscula; perist. valde incrassatum, undique expansum, album, marginibus callo nitido junctis, columellari superne sinuato-reflexo. — Long. 38, diam. 12 mill. Ap. c. perist. 14 mill. longa, 12 lata. (Coll. Philipp.)

Pupa calcarea Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 83.

Habitat . . . ?

38. P. alvearia (Turbo) Dillwyn.

T. rimata, subcylindrica, apice attenuata, obtusiuscula, purpurascenti-nigro et albo irregulariter strigata, valide costata: costis planiusculis, subremotis, albis; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans; plica columellaris obsoleta; apertura semiovalis, intus nitida, saturate livido-rufa, dente parvulo intrante parietis aperturalis coarctata; perist. subincrassatum, album, breviter expansum, marginibus callo nitido subjunctis, columellari dilatato, intus concavo, patente. — Long. 25, diam. 8½ mill. Ap. 8½ mill. longa, 7 lata. (Coll. Nr. 24.)

Turbo alvearia Dillw. descr. cat. II. p. 862. N. 110.
Helix alvearia (Cochlodonta) *Fér.* pr. 460.
Pupa alvearia Beck ind. p. 82. N. 1.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 45.

Pupa alvearia Küster p. 80. t. 11. f. 18!
Bulimus fusus Brug. Enc. méth. I. p. 348? (Dillw.)
Lister t. 588. f. 49?

β. Major, cinerea, sursum rosea, costis confertioribus, filiformibus.
Pupa rubicunda Menke catal. Malsb. p. 8. *)
— — *Küst.* p. 76. t. 9. f. 8. 9. t. 10. f. 3. 4.

Habitat in insulis Antillis.

39. P. cyclostoma Küster.

T. profunde rimata, ovato-cylindrica, apice conica, acutiuscula, tenuiuscula, costulis confertis, filiformibus, rectis munita, albida, pallide fulvo variegata; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, antice ascendens; plica columellaris profunda, obsoleta: apertura subrotundata, dente mediocri (interdum parvulo) parietis aperturalis coarctata; perist. expansum, reflexum, incrassatum, marginibus callo continuo junctis. — Long. 21, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 25.)

Pupa cyclostoma Küst. in Chemn. ed. II. Pupa p. 6. t. 1. f. 5. 6.

Habitat in insula Cuba!

40. P. dimidiata Pfr.

T. rimata, cylindraceo-ovata, solida, distanter et arcuatim plicata, sordide alba; spira alveariformis, apice breviter conica; sutura levis; anfr. 11 angusti, planiusculi, supremi laevigati, ultimus dimidiatus, medio subcarinatus, infra angulum lineis nonnullis impressis, confertis, spiralibus notatus et excentrice confertim striatus, basi gibbus; apertura subsemicircularis; perist. incrassatum, expansum, marginibus callo stricto junctis, dextro subauriculato. — Long. 30, diam. 16 mill. — Ap. c. perist. 13 mill. (oblique) longa, 11 lata. (Coll. Nr. 26.)

Pupa dimidiata Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 16.

Habitat in insula Cuba (Gruner).

Obs. Variat carina et lineis impressis basalibus obsoletis.

41. P. glans Küster.

T. rimata, ovato-acuminata, roseo-alba, fortiter costata, costis confertis, albis; anfr. 10 convexiusculi, angusti, ultimus (interdum) fusco-subfasciatus; apertura semiovata, intus nitida, pallide flava; perist. recurvum, incrassatum; paries aperturalis uniplicatus. (K.) — Long. 23, diam. 10 mill. Ap. 9 mill. longa, superne 8 lata. (Coll. Nr. 27.)

Pupa glans Küst. in Chemn. ed. II. Pupa p. 74. t. 11. f. 1. 2.

---

*) T. cylindracea, attenuata, obtusa, cinerea, superius rosea, sulcis longitudinalibus tenuibus, confertis; apertura uniplicata. (Mke l. c.)

Helix uva (Cochlodonta) *Fér.* hist. t. 153. f. 8.

Habitat . . . ?

42. P. uva (Turbo) Linn.

T. profunde rimata, ovata vel cylindraceo-ovata, supra medium ventrosa, apice obtuse conica, tota alba, costis validis distantibus munita; sutura levissima; anfr. 10—11 planiusculi, angusti, ultimus attenuatus, basi subcompressus, $^1/_3$ longitudinis vix aequans; apertura parvula, ovalis, intus fulvida, plica profunda, dentiformi parietis aperturalis juxta columellam coarctata; perist. subincrassatum, breviter reflexum, marginibus callo nitido junctis, columellari sinuoso. — Long. 22, diam. max. 10 mill. Ap. 7½ mill. longa, 6⅓ lata. (Coll. Nr. 28.)

Turbo uva Linn. syst. ed. X. p. 765. N. 553. *)
— — *Gmel.* p. 3604. N. 68.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 861. N. 108.
— — *Wood* t. 31. f. 110.
Bulimus uva Brug. Enc. méth. I. p. 349. N. 88.
Helix uva (Cochlodonta) *Fér.* pr. 458. Hist. t. 153. f. 9—14.
Pupa uva Lam. 2. p. 105. ed. Dh. p. 169.
— — *Chemn.* XII. p. 173. t. 235. f. 4122. 23.
— — *Beck* ind. p. 82. N. 8.
— — *Küster* p. 5. t. 1. f. 3. 4.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 291.
Petiv. gazoph. p. 6. t. 27. f. 2.
Knorr Vergnüg. VI. p. 49. t. 25. f. 4.

Habitat in insula Guadeloupe.

43. P. utriculus Menke. †

T. ovata, obtusissima, alba, pellucida; anfr. turgidi, superiores longitudinaliter striati, infimus reticulato-venosus; umbilicus compressus, linearis; apertura ovata; labium columellare unidentatum; labrum margine reflexum. — Long. 1″ 3‴, diam. 10‴. (M.)

Pupa utriculus Menke cat. Malsb. p. 8.

Habitat . . . ?

* * *

44. P. fusus Lamarck.

T. rimata, cylindracea, apice rotundato-obtusata, solidula, suboblique confertim striata, albida; anfr. 8 planiusculi, ultimus

*) T. cancellata ovata obtusa: anfractibus contiguis: striis longitudinalibus imbricatis. — Pet. gaz. t. 27. f. 2. Gualt. test. t. 58. f. D. (Linn. l. c.)

⅓ longitudinis non aequans; plica columellaris profunda, obsoleta; apertura subobliqua, oblonga, dente valido intrante parietis aperturalis coarctata; perist. subincrassatum, breviter expansum, marginibus lamina superne soluta junctis, dextro subsinuato, columellari patente. — Long. 26, diam. 8 mill. Ap. 8 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 29.)

Helix fusus Müll. verm. II. p. 108. N. 308?*)
— *palanga* (Cochlodonta) *Fér.* pr. 464.
Turbo fusus Gmel. p. 3610. N. 90?
Bulimus fusus Brug. Enc. méth. I. p. 348. N. 86?**)
Pupa fusus Lam. 6. p. 106. ed. Dh. p. 171?***)
— — *Beck* ind. p. 82. N. 6?
— — *Potiez* et *Mich.* gal. I. p. 166. t. 16. f. 21. 22!
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 170. f. 5!
— — *Küst.* p. 71. t. 10. f. 5. 6!
— *palanga Less.* voy. Coq. II. p. 328. t. 8. f. 8!
— — *Lam.* ed. Dh. 34. p. 184.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 171. t. 17. f. 5. 6!
Gibbulina palanga Beck ind. p. 81!
Gonospira polanga Swains. Malac. p. 333.
β. Dente parietis aperturalis obsoleto:
Pupa fusus Küster t. 11. f. 5.

Habitat in insula Isle de France (Less.), in insulis Haiti et Guadeloupe? (Bul. fusus Brug.)

Obs. Species descripta absque dubio est P. palanga Less. — Helix fusus Müll., Bul. fusus Brug. et Pupa fusus Lam. sunt species ex descriptionibus et figuris citatis vix agnoscendae. — Cl. Beck P. palangam Less. subgeneri Gibbulinae, Helicem fusum Mülleri subgeneri Pupae adnumerat et Bul. fusum Brug. ad Pupam alveariam Dillw. refert.

---

*) T. cylindracea, obtusa, recte sulcata, alba, apertura dentata, anfr. 9. — Long. 9, lat. 4 lin. — Bonan. rier. p. 202. t. 140 — T. subfusiformis, i. e. extremitate utraque amplitudine decrescente, candida, glabra, profunde sulcata, striis eminentibus, non uti in H. sulcata obliquis, sed fere perpendicularibus, rectis. Anfr. 9. Apertura lunata. Labrum reflexum, pone labium sinisturm rima obliqua; in parte anfractus aperturae opposita dens in faucem descendens. (Müll. l. c.)

**) T. cylindrica, utrinque obtusata, oblique striata, apertura semiovata, unidentata. — Long. 12—15, diam. 3½—4‴. — (T. rimata, cylindracea, sursum parum attenuata, alba, tenui, utrinque obtusa; anfr. 8 — 9 vix convexi, oblique confertim et minute striati; apertura semiovalis, latior quam longa [?], intus subquadrangularis; perist. simplex, subpatulum; columella uniplicata: plica longitudinali, exserta. — List. 588. 49. Seba III. p. 151. t. 55. N. 21. fig. ultima ad dextram. (Brug. l. c.)

***) T. cylindrica, obtusa, alba; striis tenuibus, longitudinalibus obliquis confertis; apertura unidentata: dente columellari; labro margine subreflexo. — Long. 13 lin. (Lam. l. c.)

45. P. modiolus (Helix) Férussac.

T. profunde rimata, cylindracea, apice rotundato-obtusata, tenuiuscula, oblique confertim costulata, albida; anfr. 7—8 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis fere aequans, basi rotundatus; plica columellaris nulla; apertura oblongo-rotundata, intus flavida; perist. simplex, breviter expansum, marginibus callo tenui junctis, columellari patente; dens parietis aperturalis minutus. — Long. 25, diam. 10½ mill. Ap. 10 mill. longa, 7½ lata. (Coll. Nr. 30.)

Helix modiolus (Cochlodonta) *Fér.* pr. 466 et Mus.!
Gibbulina modiolus Beck ind. p. 81. N. 10.
Pupa modiolus Pfr. Symb. I. p. 45.
— — *Küst.* p. 78. t. 11. f. 8.

β. Minor: long. 18, diam. 8½ mill. (Spec.)
Pupa modiolus Küst. t. 11. f. 9.

Habitat in insula Isle de France.

46. P. farinosa Mus. Berol. †

T. rimata, ovato-oblonga, subcylindracea, obtusa, opaca, alba, subtiliter oblique costata: costis arcuatis, remotis; anfr. 7 convexiusculi, ultimus basi subcompressus; apertura truncato-ovata, subtetragona, pariete aperturali uniplicato; perist. simplex, subreflexum, marginibus callo nitido junctis. — Alt. 7, lat. 3½ lin. (Küster in litt.)

Pupa farinosa Mus. Berol. teste Küst.
— — *Küst.* Monogr. t. 14. f. 34—36.

Habitat . . . ?

Obs. «P. modiolo var. min. affinis, spira obtuse conica statim distinguenda.»

47. P. versipolis (Helix) Férussac.

T. profunde rimata, ovato-cylindracea, tenuis, oblique confertim costulata, sordide flavida; spira apice acuminata; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis paulo superans; plica columellaris nulla; apertura lunato-subcircularis, intus nitida; perist. sublabiatum, expansum, reflexiusculum, marginibus callo obsoleto interdum junctis; dens parietis aperturalis mediocris. — Long. 14½, diam. 7 mill. Ap. 5⅔ mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 31.)

Helix versipolis (Cochlodonta) *Fér.* pr. 468 et Mus.!
Gibbulina versipolis Beck ind. p. 81. N. 12.
Pupa versipolis Pfr. Symb. I. p. 45.
— — *Küst.* p. 79. t. 11. f. 10.
— *modiolus Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 169. t. 16. f. 23. 24.

β. Minor, spira magis conoidea: long. 11, diam. 5 mill. (Spec.)
Pupa versipolis Küst. t. 11. f. 11. 12.

Habitat in insula Isle de France.

§. 7.

48. P. pagoda (Helix) Férussac.

T. profunde rimata, irregulariter globoso-ovata, oblique confertim sulcata, sub epidermide flavescente vel fusco-cornea alba; spira conica, magis minusve elongata, obtusa; anfr. 7, superiores convexiusculi, penultimus inflatus, ultimus angustatus, $^2/_3$ — $^3/_7$ longitudinis subaequans; plica columellaris profunda, obsoleta; apertura obliqua, ovali-subtetragona; perist. subincrassatum, breviter reflexum, marginibus callo unidentato junctis, dextro superne sinuato, utroque medio introrsum prominente. — Long. 33, diam. 22 mill. Ap. 16 mill. longa, 13 lata. (Coll. Nr. 32.)

Helix pagoda (Cochlodonta) *Fér.* pr. 470.
— *concamerata Wood* suppl. p. 40. t. 7. f. 21.
— — *Jay* catal. 1839. p. 44.
Pupa idolum Menke syn. ed. II. p. 34.
— *pagoda Lesson* voy. Coq. II. p. 326. t. 8. f. 6.
— — *Sow.* genera of shells. Pupa f. 1.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 170. f. 1.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 519.
— — *Küster* p. 68. t. 9. f. 4. 5.
— *pagodus Lam.* ed. Dh. 37. p. 185.
Gibbulina pagoda Beck ind. p. 81. N. 3.
Gonidomus pagodus Swains. Malac. p. 166. f. 21.

Habitat in Isle de France (Fér.), ins. Mauritii (Lesson).

Obs. 1. Variat anfractibus convexis et angulatis. (Beck.)

Obs. 2. Affinitatem evidentem hujus speciei cum Streptaxis nonnullis speciebus recte jam indicavit Swainson l. c.

§. 8.

49. P. decumana (Helix) Férussac.

T. umbilicata, ovato-turrita, apice conica, solida, crassa, irregulariter et valide costata, alba; anfr. 11 — 12 plani, ultimus antice descendens, basi compressus; umbilicus infundibuliformis, non pervius; apertura verticalis, semiovalis, intus fulva, plica profunda columellari et dente obsoleto in ventre anfractus penultimi coarctata; perist. incrassatum, nitidum, album, reflexum, marginibus callo nitido junctis, dextro arcuato. — Long. 44, diam. 21 mill. Ap. intus 14 mill. longa, 9 lata. (Spec. coll. Metcalf.)

Helix decumanus (Cochlodonta) *Fér.* pr. 462.
Pupa decumana Gray in Ann. of Phil. New ser. p. 413.
— — *Beck* ind. p. 82. N. 9.
— *decumanus Lam.* ed. Dh. 28. p. 181.
— — *Orb.* moll. cub. I. p. 178. t. 11. f. 25. 26?
— *pinguis Humphr.* 1175?

Pupa mumia Sow. Gen. Pupa f. 2.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 170. f. 2.
Lister t. 588. f. 47.
Habitat in insula St. Thomas (Beck), Cuba (Orbigny)?

50. P. Mumia (Bulimus) Bruguière.

T. breviter et profunde rimata, cylindrica, solida, costis validis, remotis, aequidistantibus munita, albida, apice attenuata, acutiuscula; anfr. 10—12 subplanulati, lente accrescentes, ultimus antice subascendens, basi juxta rimam compresso-subexcavatus; plica columellaris profunda, magis minusve distincta, dentiformis; apertura oblique subovalis, intus fulva; perist. subincrassatum, late expansum; dens parietis aperturalis profundus, distinctus. — Long. 35, diam. 10 mill. Ap. 12 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 33.)

Bulimus mumia Brug. in Encycl. méth. I. p. 348. N. 87. *)
Pupa mumia Lam. 1. p. 105. ed. Dh. p. 168. **)
— — *Crouch* p. 28. t. 15. f. 2.
— — *Beck* ind. p. 82. N. 11.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 169. t. 17. f. 1. 2?
— — *Küster* p. 4. t. 1. f. 1. 2.
— *manica Desh.* in Encycl. méth. II. p. 401. (Maillot.)
— *striata Schum.* essai p. 230.
— *sulcata Sow.* genera of shells 41. Pupa f. 4.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 170. f. 4.
Helix mumia (Cochlodonta) *Fér.* pr. 459.
— *chrysalis var. Fér.* hist. t. 153. f. 4—6?
Turbo mumia Dillw. descr. cat. II. p. 861. N. 109.
— — *Wood* ind. t. 32. f. 111. (fig. Martiniana.)
Martini IV. t. 153. f. 1439. (monstrosa?)
Lister t. 588. f. 49?

Habitat in India occidentali, Cuba, etc.

Obs. 1. Species pervariabilis quoad longitudinem spirae, dentem columellarem magis minusve prominentem, peristoma album vel fulvidum.

Obs. 2. Speciem descriptam in collectione Lamarckiana hoc nomine designatam vidi; attamen inter specimina unum erat ad P. decumanam pertinens,

*) T. subcylindrica, oblique sulcata, apertura semiovata, bidentata, fulva. — Long. 17, diam. 6 lin. — T. perforato-rimata, cylindrica, apice trochiformis, alba, superne rubella; anfr. 12, primi 5 conum formantes, 1/3 longitudinis aequantes, omnes costati: costis obliquis, rotundatis, aequidistantibus; apertura late semiovalis, intus fulva; perist. incrassatum, reflexum; columella medio et basi plicata. — List. 588. 48. Mart. IV. 1439 a, b. — In oceano americano. (Brug. l. c.)

**) T. cylindracea, attenuata, obtusa, crassa, alba; sulcis anfractuum longitudinalibus obliquis; apertura rufo-fusca, biplicata; labro margine reflexo. — Long. 16—17‴. (Lam. l. c.)

a Lamarck vel serius cum illis confusum. — Bul. mumia Br. plures verisimiliter hujus sectionis species complectitur. — Figurae Martinii et Listeri rudes vix ad speciem aliquam laudari possunt.

51. P. Gruneri Pfr.

T. profunde rimata, cylindracea, solidiuscula, confertim plicata, albo, fulvo et castaneo amoene marmorata: plicis confertis, filaribus, subrectis, interstitia aequantibus; apex conicus, obtusiusculus; anfr. 11 vix convexiusculi, apicales laevigati, ultimus infra rimam subcompressus; apertura semiovalis, intus carneolivida, dente 1 intrante parietis aperturalis et dente columellae profundo coarctata; perist. expansum, reflexum, marginibus vix junctis. — Long. 29, diam. 11 mill. Ap. 10½ mill. longa, 9 lata. (Coll. Gruner.)

Pupa Gruneri Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 15.

Habitat . . . ?

52. P. maritima Pfr.

T. rimato-perforata, cylindraceo-conica, solida, oblique confertim plicata, cretacea; anfr. 10—11 planiusculi, sensim in apicem conicum attenuati, ultimus antice ascendens, basi compressus; apertura oblongo-semicircularis, intus fulvida, biplicata: plica altera profunda, compressa in ventre anfractus penultimi, altera ad columellam; perist. late expansum, reflexiusculum, marginibus callo albo junctis. — Long. (plerumque) 30, diam. 12 mill. Ap. 11—13 mill. longa et lata. (Coll. Nr. 34.)

Pupa maritima Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
— — *Küster* p. 70. t. 9. f. 10. 11.
Puppa mumia Blainv. Malac. t. 39. f. 5.
Turbo alveare Wood ind. t. 32. f. 112?

β. Anfractibus summis subtiliter costatis, reliquis laevigatis, vel irregulariter rugulosis, cretacea vel corneo-variegata. (Spec.)

Pupa maritima var. Küst. t. 9. f. 12. 13.

Habitat in insula Cuba, ubi in littore sinus Matanzani frequentissimam legi; var. *β* etiam ad Cayo blanco Cubae ab amico Gundlach lecta.

53. P. Sagraiana Pfr.

T. rimato-perforata, cylindracea, apice conica, tenuiuscula, subtiliter striata, nitida, carneo-albida, corneo eleganter marmorata; anfr. 10 plani, supremi costulati, ultimus basi compressiusculus; apertura semiovalis, intus albida, bidentata: dentibus profundis, altero compresso in ventre anfractus penultimi, altero minore ad columellam; perist. expansum, extus subincrassatum,

marginibus callo tenui junctis. — Long. 23—24, diam. 9 mill. Ap. 9 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 35.)

Pupa Sagraiana Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 15.

β. Major, fusco-marmorata, laevigata, anfractu ultimo confertim plicatulo: long. 26, diam. 10 mill. (Coll. com. de Seckendorff.)

Habitat in Cayo Galindo insulae Cubae, unde speciminum prorsus aequalium copiam misit Dr. Gundlach.

54. P. marmorata Pfr.

T. rimato-perforata, subcylindraceo-ovata, solida, striatula, nitida, nivea, flammis longitudinalibus castaneis, diaphanis ornata; spira sursum sensim attenuata, apice obtusa; anfr. 10 subplanulati, ultimus antice plicatus; columella obsolete et profunde unidentata; plica parietis aperturalis mediocris, profunda; apertura semiovalis, intus livido-fusca; perist. incrassatum, reflexum, marginibus superne convergentibus. — Long. 24, diam. vix 10 mill. Ap. 9 mill. longa, 8 lata. (Coll. Philipp.)

Pupa marmorata Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 83.

Habitat . . . ?

Obs. Differt a praecedente colore, apertura latiore, dente parietis aperturalis obsoletiore, dente columellari minimo, etc.

55. P. multicosta Küster. †

T. rimata, cylindrico-ovata, solida, nitidiuscula, sordide alba, plicata: plicis confertis, acutis; anfr. 11 angusti, convexiusculi; sutura subcrenulata; apertura semiovalis, carnea; perist. album, labiatum, reflexum, marginibus callo nitido junctis; paries aperturalis unidentatus; columella subuniplicata. — Long. 13, diam. 5½‴. (K.) Long. 28, diam. 12 mill. Ap. 9 mill. longa. (ex ic.)

Pupa multicosta Küster Monogr. p. 77. t. 11. f. 6. 7.

β. Major, fulvescens: long. 34, diam. 13 mill. ex ic.

Pupa multicosta var. Küst. l. c. t. 10. f. 1. 2.

Habitat in India occidentali.

Obs. Varietati *β* Pupae maritimae peraffinis esse videtur.

56. P. striatella (Helix) Férussac.

T. profunde rimata, oblongo-ovata, solida, candida, strigis sparsis longitudinalibus fuscis, interruptis ornata, cónfertim costata: costis filiformibus, rectis; spira apice obtuse conica, laevigata, pallide cornea; anfr. 9—10 planiusculi, angusti, ultimus antice ascendens, basi vix compressus; apertura semiovalis, intus alba vel fulvida, dentibus 2 profundis, altero in pariete aperturali, altero ad columellam coarctata; perist. subincrassatum, brevissime

reflexum, marginibus callo junctis, columellari patente. — Long. 21, diam. 10 mill. Ap. oblique 8½ mill. longa. (Coll. Nr. 36.)

Helix striatella Fér. Mus.!
Pupa striatella Guérin Iconogr. Moll. p. 16. t. 6. f. 12.
— — *Desh.* in Encycl. méth. II. p. 404. N. 9.
— — *Lam.* ed. Dh. 30. p. 182.
— — *Griff.* anim. kingd. t. 27. f. 3.
— — *Küst.* p. 91. t. 10. f. 14. 15. t. 11. f. 13. 14. 15.
— *variegata Ziegl.*? (Beck ind. p. 82.)

Habitat in insulis Antillis, Haiti, Portorico, etc.

Obs. Pervariabilis quoad magnitudinem et formam magis minusve cylindraceam. Specimina in Guér. Iconogr. et a Küstero delineata meis multo majora, alia collectionis meae minora et graciliora sunt. — Cl. Beck Pupam striatellam Desh. non ad nostram speciem, sed ad P. rubicundam Mke refert.

57. **P. Mumiola Pfr.**

T. breviter et profunde rimata, oblongo-ovata, solidula, corneo et albido subtiliter marmorata, remote costata: costis subrectis, validis, interstitiis costas multo superantibus; spira subcylindrica, apice subito in conum obtusiusculum attenuata; anfr. 9 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, antice ascendens; apertura lata, sublunaris, dentibus 2 profundis, altero intrante in ventre anfractus penultimi, altero minuto superne ad columellam coarctata; perist. subincrassatum, undique expansum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 20, diam. 9 mill. Ap. oblique 9 mill. longa, 8 lata. (Coll. Nr. 37.)

Pupa Mumiola Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
— — *Küst.* p. 90. t. 13. f. 1. 2!
Helix chrysalis var. Fér. hist. t. 153. f. 7?

Habitat in insula Cuba.

58. **P. Martiniana Küster.**

T. rimata, ovata, solida, costis validis, subconfertis, verticalibus munita; spira sensim in conum obtusiusculum abiens; anfr. 9 convexiusculi, linea impresso-punctata infra suturam cingulati, ultimus antice ascendens; apertura semiovalis, alba, dente profundo parietis aperturalis et distincto columellae coarctata; perist. incrassatum, labiatum, breviter expansum. — Long. 21, diam. 9½ mill. Ap. 8 mill. longa, 7 lata. (Coll. Küst.)

Pupa Martiniana Küster Monogr. p. 75. t. 11. f. 3. 4.
Bonanni recreat. III. f. 140.

Habitat . . . ?

§. 9.

59. P. dolium Draparnaud.

T. profunde rimata, oblongo-cylindrica, oblique striata, nitidula, fulvo-fusca; apex conicus, acutiusculus; anfr. 10—11 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis aequans, antice ascendens, intus albo-callosus; apertura semiovalis; plica parietalis 1 intrans, columellares 2 horizontales, introrsum elongatae; perist. breviter expansum, albo-sublabiatum. — Long. 9, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa. (Coll. Nr. 38.) — Alt. 2½—3¼, lat. 1¼ lin. (Rm.)

Pupa dolium Drap. tabl. d. moll. p. 58. N. 8.
— — *Drap.* hist. p. 62. t. 3. f. 43.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 4. T. 12.
— — *Lam.* 25. p. 110. ed. Dh. p. 179.
— — *C. Pfr.* III. p. 37. t. 7. f. 9.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 169. t. 235. f. 4114
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 405. N. 12.
— — (Sphyradium) *Charp.* catal. moll. p. 16.
— — *Rossm.* V. p. 17. f. 330. 331.
— — *Küster* p. 11. t. 1. f. 21—24.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
Helix dolium (Cochlodonta) *Fér.* pr. 477.
Pupilla dolium Beck ind. p. 83. N. 2.
Orcula dolium Held in Isis 1837. p. 919.
Eruca dolium Swains. Malac. p. 334.
β. Plica columellari altera obsoleta:
Pupa uniplicata (Ziegl.) Pot. et *Mich.* gal. I. p. 176. t. 17. f. 13. 14.

Habitat in montosis Bavariae, Salisburgiae, Styriae, Illyriae, Helvetiae, Galliae; var. *β* L. Pfeiffer in monte Camor Helvetiae legit (simul cum spec. albino).

Obs. Species quoad magnitudinem et formam pervariabilis. Pleraque specimina multo minora sunt, multaque leguntur magis ovata.

60. P. conica Rossmässler.

T. profunde rimata, plerumque perforata, ovato-conica, striatula, fusco-cornea, tenuis, pellucida, nitidula; anfr. 9—10 convexi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, antice valde ascendens, basi subcompressus; apertura oblique semiovalis, fere triangularis; plicae parietalis et columellares sicut in P. dolio; perist. simplex, vix expansiusculum. — Long. 6⅓, diam. 3⅓ mill. Ap. oblique 2 mill. longa. (Coll. Nr. 39.) — Alt. 2½—3, lat. 1½‴. (Rm.)

Pupa conica Rossm. V. p. 17. f. 332.
— — *Küster* p. 23. t. 3. f. 13. 14.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.

Pupilla conica Beck ind. p. 84. N. 6.
Orcula conica Held in Isis 1837. p. 919.
Torquilla conica Villa disp. syst. p. 24.

Habitat in Styria et Illyria.

61. P. gularis Rossmässler.

T. profunde rimata, subperforata, oblongo-cylindrica, substriata, nitida, fulvo-fusca; apex conicus; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, antice breviter ascendens; apertura verticalis, oblongo-semiovalis; plica parietalis 1 intrans, columellaris 1 dentiformis, palatalis 1 incurva e callo albo transversali exiens; perist. expansiusculum. — Long. 6½; diam. 3 mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Nr. 40.) — Alt. 2¼—3, lat. 1‴. (Rm.)

Pupa gularis Rossm. V. p. 17. f. 333.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
Pupilla gularis Beck ind. p. 83. N. 3.
Orcula gularis Held in Isis 1837. p. 919.

Habitat in monte Loibl Carinthiae.

61ª. P. scyphus Frivaldsky.

T. rimata, cylindrica, striatula, nitida, diaphana, fusco-cornea; spira in conum brevissimum acutiusculum terminata; anfr. 11 planiusculi, ultimus antice ascendens, basi subcompressus; columella profunde uniplicata; apertura semiovalis, plica 1 compressa, parietali coarctata; perist. breviter expansum, labiatum, margine dextro intus dentato-incrassato. — Long. 9, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 41.)

Pupa scyphus Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 7.
— *Lindermeyeri Parr.* teste Rossm.

Habitat prope Brussa Natoliae.

62. P. doliolum (Bulimus) Bruguière.

T. rimata, obovato-cylindrica vel obovata, oblique lamellosocostulata, lutescens vel hyalina; apex rotundatus; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis plerumque non aequans; apertura rotundato-semiovalis; plica parietalis 1 intrans, columellaris 1 profunda (interdum altera obsoletiore juxtaposita); perist. expansum, albo-labiatum. — Long. 6½, diam. 2⅔ mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Nr. 42. Spec. max.) — Alt. 2—2¾, lat. 1¼ mill. (Rm.)

Bulimus doliolum Brug. Enc. méth. I. p. 351.
Pupa doliolum Drap. tabl. d. moll. p. 58. N. 7.
— — *Drap.* hist. p. 62. t. 3. f. 41. 42.

Pupa doliolum Hartm. in Neue Alpina I. p. 221.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 6. T. 11.
— — *C. Pfr.* III. p. 37. t. 7. f. 10. 11.
— — *Lam.* ed. Dh. 31. p. 182.
— — (Sphyradium) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 15.
— — *Rossm.* V. p. 16. f. 328. 329.
— — *Roth* dissert. p. 18.
— — *Küst.* p. 20. t. 3. f. 6. 7.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
Helix doliolum (Cochlodonta) *Fér.* pr. 473.
— *coronata Stud.* in Coxe trav.
Pupilla doliolum Beck ind. p. 84. N. 5.
Orcula doliolum Held in Isis 1837. p. 919.
β. Status juvenilis:
Helix spinosa Fér. olim. (teste Hartm.)

Habitat passim in Germania, Helvetia, Gallia; praeterea frequens in Graecia et prope Smyrnam (Roth), in insula Thermia et Lycia (Forbes)!

63. P. cupa Jan. †

T. cylindrica, obtusa, pallido-fulva; apertura subrotunda superius callosa; labium columellare edentulum; perist. reflexum. (Jan.) — Dimens.?

Pupa cupa Jan Mantissa p. 3.
— *doliolum var. Rossm.* V. f. 329? (Beck.)
Pupilla cupa Beck ind. p. 83. N. 4.

Habitat in Italia boreali.

Obs Num revera duce Beckio hic collocanda?

64. P. Schmidtii Küster.

T. perforata, subcylindrica vel ovato-conica, opaca, oblique costulata, obscure cornea; spira tumida, in conum brevem, acutiusculum exiens; apertura semiovalis, albida, plica 1 parietali valida, intrante, binisque columellaribus brevibus coarctata; perist. tenue, breviter expansum, album. — Long. 5, diam. medio 3 mill. Ap. vix 2 mill. longa. (Coll. Küst.) — Alt. $1\frac{4}{5}$—$2\frac{1}{2}'''$, lat. $1\frac{1}{3}'''$. (K.)

Pupa Schmidtii Küst. in Chemn. ed. II. Pupa p. 26. t. 3. f. 20—23.

Habitat prope Cettigne in Montenegro.

Obs. «Affinis P. conicae, a qua differt costis membranaceis et forma magis cylindrica».

65. P. cheilogona (Helix) Lowe. †

T. subovata, cornea, laevis vel obsolete striata; anfr. 6; apertura triplicata, coarctata, antice prominula; plica unica in columellam, 2 parallelae in ventrem positae, intermedia minor;

labrum expansum, intus marginatum, sinuato-angulatum; umbilicus magnus, profundus, patulus. — Long. 1¾, diam. 1‴. (L.)

Helix cheilogona Lowe Faun. Mader. p. 63. t. 6. f. 31.

Pupa cheilogona Lam. ed. Dh. 53. p. 193.

Habitat in Madera.

66. P. Hoppii Möller. †

T. dextrorsa, cylindracea, obtusa, laevis; columella bidentata. — Long. 1,2‴. (M.)

Pupa Hoppii Möll. ind. moll. Groenl. p. 4.

— — *Trosch.* in Arch. f. Nat. 1843. II. p. 126.

Habitat in Groenlandia.

§. 10.

67. P. clavulata Lamarck.

T. curvato-rimata, obovata, solidiuscula, confertim costata, fusca vel albida; spira sursum ventrosior, apice obtuse conica; anfr. 10 planiusculi, ultimus ⅓ longitudinis non aequans; apertura angusta, suboblonga; plica parietalis 1 lamelliformis, valida, elevata, intrans juxta insertionem labri; perist. simplex, breviter expansum, margine dextro repando. — Long. 8, diam. 4 mill. Ap. 2⅓ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Nr. 43.)

Pupa clavulata Lam. 12. p. 107. ed. Dh. p. 174.

— — *Deless.* recueil t. 27. f. 5.

— — *Küst.* p. 81. t. 11. f. 19—21.

— *modiolina Pfr.* Symb. I. p. 46.

Helix modiolinus (Cochlodonta) *Fér.* pr. 469.

Gibbulina modiolina Beck ind. p. 81. N. 11.

Habitat in insula Isle de France.

* * *

68. P. corticaria (Odostomia) Say.

T. subperforata, ovato-oblonga, tenuissima, striatula, hyalina; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 5 — 5½ convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura semiovalis, plica una lamelliformi (rarius obsoleta) parietis aperturalis coarctata; columella subplicata; perist. tenue, margine dextro expanso, columellari stricto, reflexo. — Long. 2¾, diam. 1⅓ mill. Ap. 1 mill. longa. (Coll. Nr. 44. Spec. Griffith.)

Odostomia corticaria Say in Nichols. Enc. t. 4. f. 5.

Pupa corticaria Gould in Bost. journ. III. p. 397. t. 3. f. 19.

Pupa corticaria Küst. t. 13. f. 19. 20.

Habitat in Pennsylvania.

Obs. Testa quam olim sub hoc nomine ex America acceperam et in Symb. descripsi, ad P. contractam Say referenda est. Conf. Nr. 133.

* * *

69. P. nana (Vertigo) Michaud. †

T. minima, sinistrorsa, cylindrico-acuminata, ventricosa, subperforata, nitida, pellucida, cornea; anfr. 5 obtusi, 2 superiores minimi; apertura semilunaris; perist. album, reflexum; labrum angulatum; columella subcallosa, biplicata, plica altera interior; apex obtusus. — Long. 1, diam. ½‴. (M.)

Vertigo nana Mich. compl. p. 71. t. 15. f. 24. 25.

— — *Beck* ind. p. 84. N. 3.

Pupa nana Lam. ed. Dh. 48. p. 190.

Habitat in Gallia: Lyon.

§. 11.

70. P. umbilicata Draparnaud.

T. perforata, cylindrico-oblonga, glabra, nitida, diaphana, fulvo-cornea; spira oblonga, apice obtusiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅔ longitudinis subaequans, basi compressus, excavationem infundibuliformem formans; apertura oblique semiovalis; plica angularis 1 parvula, interdum obsoleta; perist. expansum, albo-labiatum. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. 1¾ mill. longa. (Coll. Nr. 45.)

Pupa umbilicata Drap. tabl. d. moll. p. 58. N. 5.
— — *Drap.* hist. p. 62. t. 3. f. 39. 40.
— — *Lam.* 26. p. 111. ed. Dh. p. 179.
— — (Sphyradium) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 15.
— — *Rossm.* V. p. 15. f. 327.
— — *Brumati* Monfalc. p. 38.
— — *Porro* Mal. p. 66.
— — (Lauria) *Gray* Man. p. 193. t. 7. f. 78?
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 143.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 114.
— — *Dupuy* moll. du Gers p. 40. N. 3.
— — *Küster* p. 22. t. 3. f. 10—12.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 74.

Bulimus muscorum Brug. Enc. méth. I. p. 334. N. 63. (ex parte.)
Helix umbilicata (Cochlodonta) *Fér.* pr. 474.
Odostomia muscorum Flem. Edinb. Enc.?
Turbo cylindraceus Da Costa p. 89. t. 5. f. 16? } Gray.
Pupilla Draparnaudii Leach moll. p 26? }

Pupilla umbilicata Beck ind. p. 84. N. 8.
Eruca umbilicata Swains. Malac. p. 334.
Stomodonta umbilicata Mermet moll. pyr. p. 53. N. 13.

Habitat in Gallia meridionali, Helvetia (Hartm.), Britannia (?), Norvegia (Sars), Illyria (prope Monfalcone!), Italia (Phil.), Hispania (Graells), Lusitania (Mor.), Corfu (Ziegl.), insula Thermia (Forbes)!

Obs. Conf. P. anconostoma Lowe Nr. 35.

71. P. Villae Charpentier. †

T. umbilicata, subcylindrica, obtusa, nitida, corneo-flava, subtiliter oblique striata; anfr. 6 convexiusculi; apertura subovata; perist. albido-carneum, reflexum; paries aperturalis uniplicatus. — Alt. 2, lat. $^3/_5$ lin. (Küster in litt.)

Pupa Villae Charp. mss. teste Küster.
— — *Küster* Monogr. t. 14. f. 32. 33.

Habitat in Helvetia (Rogeno près du lac de Pusano dans le Brienze: Charp.).

Obs. «Differt a valde affini P. umbilicata statura majore, forma cylindracea, atrio umbilici lato, infundibuliformi, striis distinctioribus, etc.»

72. P. umbilicus Roth. †

T. anguste umbilicata, ovato-cylindrica, paucispira, cornea, subtilissime striata; apertura obliqua, subtriangularis; paries aperturalis unilamellatus; inferior pars anfractus ultimi acute angulata; perist. late reflexum, sublabiatum. — Long. $1^1/_2'''$. (R.) — Alt. 1 — $1^3/_4$, lat. vix $1'''$. (Küst.)

Pupa umbilicus Roth diss. p. 20. t. 2. f. 3.
— — *Küster* p. 25. t. 3. f. 18. 19.

Habitat in insula Syra (Roth), in Dalmatia merid. et Albania (Küst.).

73. P. Sempronii Charpentier.

T. pusilla, umbilicata, cylindracea, obtusa, glabra, nitida, corneo-flava, pellucida; anfr. 5 convexi; apertura ovata; paries aperturalis uniplicatus; perist. reflexum, planum. — Alt. $1^1/_4$ — $1^1/_2'''$, lat. $^3/_4'''$. (Küst.) Coll. Nr. 46?

Pupa Sempronii (Sphyradium) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 15. t. 2. f. 4. *)
— — *Trosch.* in Wiegm. Arch. 1838. II. p. 277.
— — *Küst.* p. 55. t. 7. f. 11—14.

Habitat in monte Simplon.

Obs. «Affinis P. umbilicatae Drap., dimidio minor».

* * *

*) T. cornea, nitida, cylindrica, obtusa; apertura unidentata; perist. albo, reflexo, plano; umbilico patulo. (Charp. l. c.)

74. P. infundibuliformis Orbigny. †

T. pyramidalis, conica, tenuis, striata, grisea; umbilicus infundibuliformis; spira elevata, apice obtusa; sutura profunda; anfr. 6; apertura vix lateralis, obliqua, oblonga, unidentata; labrum crassum, subreflexum. — Long. $2^1/_2$, lat. $1^1/_2$ mill. (O.)

Helix infundibuliformis (Cochlodon) *Orb.* syn. p. 21.
Pupa infundibuliformis Orb. voy. p. 323. t. 41 bis. f. 7—9.
Gibbulina infundibuliformis Beck ind. p. 81. N. 1.

Habitat in provincia Lagunacensi Boliviae.

Obs. «Affinis P. Moricandi Fér.» (? Conf. Nr. 120.)

§. 12.

75. P. Kurrii Krauss.

T. sinistrorsa, profunde rimata, ovato-conica, sublaevigata, nitide alba (detrita fusca); spira conica, acutiuscula; anfr. 9 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis fere aequans, ascendens, basi subcompressus; apertura semiovalis, intus fusco-aurantia, 5—6 plicata: plicis parietalibus 2 lamelliformibus, columellari 1 profunda, dentiformi, palatalibus 2—3 profundis; perist. simplex, subrectum. — Long. 10, diam. $4^2/_3$ mill. Ap. $3^2/_3$ mill. longa, $2^3/_4$ lata. (Coll. Nr. 47.)

Pupa ovularis Kurr in Küst. Pupa p. 10. t. 1. f. 16—18. Nec Lam.
— *Kurrii Krauss* in Pfr. Symb. II. p. 54.

Habitat in districto Zwellendam Promontorii bonae spei (Krauss).

76. P. capensis Kurr.

T. sinistrorsa, rimata, cylindrico-ovata, striatula, sub lente reticulata, alba, nitidula; spira subcylindrica, apice conica, acutiuscula; anfr. 8 planiusculi, ultimus $^2/_5$ longitudinis subaequans, antice vix ascendens; apertura angusta, oblonga, 5-plicata: plicis parietalibus 2 lamelliformibus (altera subangulari, altera profunda), columellari 1 profunda, dentiformi, palatalibus 2 profundis; perist. simplex. — Long. 7, diam. 4 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 48.)

Pupa capensis Kurr in Küst. Pupa p. 10. t. 1. f. 19. 20.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 53.

Habitat in districto Zwellendam Promontorii bonae spei (Krauss).

77. P. Pottebergensis Krauss.

T. sinistrorsa, breviter rimata, oblonga, regulariter subtilissime striata, alba, sericina; spira apice obtuse conica; anfr. 8—9 planiusculi, ultimus $^1/_3$ longitudinis paulo superans, antice arcuatim ascendens, basi compressus, subcarinatus; apertura semi-

ovalis, basi effusa, 5-plicata: plica angulari 1 lamelliformi, parietali 1 profunda, columellari 1 et palatalibus 2 profundis, denticuliformibus; perist. simplex, margine externo repando. — Long. 6, diam. 3 mill. Ap. 2⅓ mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 49.)

Pupa Pottebergensis Krauss in Küst. Pupa p. 17. t. 2. f. 20—22.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 54.

Habitat in monte Pottenberg districti Zwellendam Promontorii bonae spei (Krauss).

* * *

78. P. Mühlfeldtii Küster.

T. perforata, ovato-conica, subtilissime costulato-striata, brunnea vel purpurascenti-fusca; spira turrito-conica, acutiuscula; anfr. 7 convexi, celeriter accrescentes, ultimus vix ascendens; apertura subrotundata, 6-plicata: plica angulari exigua, interdum obsoleta, parietali majore profunda, columellaribus 2, palatalibus 2 brevibus profundis; perist. rectum, marginibus fere contiguis, dextro vix subincrassato, columellari brevissime patente. — Long. 6, diam. 3 mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 50.)

Pupa Mühlfeldtii Küst. p. 28. t. 4. f. 1—3.
— *quinqueplicata Mühlf. Ant.* Verz. p. 47. N. 1713.
— *avena minor? Rossm.* VI. p. 13. f. 320.
Torquilla quinqueplicata Villa disp. syst. p. 24.
— *spelta Beck* ind. p. 86. N. 9?

β. Major, plicis interdum 7, septima in basi aperturae: long. 7, diam. 3 mill. (Spec.)

Pupa Mühlfeldtii var. Küst. p. 29. t. 4. f. 4. 5.

γ. Minor, gracilior, plica angulari plerumque obsoleta: long. vix 5, diam. 2½ mill. (Spec.)

Pupa obscura Mühlf. Mus.
— *Mühlfeldtii var. Küst.* p. 29. t. 4. f. 6. 7.

Habitat in Dalmatia, prope Almissa, Ragusa, Spalato, in ins. Lesina, Brazza, Bua (Küst.).

Obs. Conf. P. avenacea (Nr. 108.), megacheilos (Nr. 107) etc.

§. 13.

79. P. biplicata Michaud.

T. subperforata, cylindrica, apice obtusa, laevigata, nitida, corneo-lutescens; sutura impressa; anfr. 9 planiusculi, ultimus basi compressus; apertura angusta, oblonga, plicis 4 validis coarctata: parietali 1 longissima, columellari 1 transversa, longa, 2 palatalibus; perist. expansum, marginibus disjunctis, dextro

supra medium introrsum incrassato. — Long. 5, diam. 2 mill. Ap. 1½ mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 51.)

Pupa biplicata Mich. compl. p. 62. t. 15. f. 33. 34. *)
— — *Lam.* ed. Dh. 42. p. 187.
— — *Küst.* p. 35. t. 5. f. 1—3.

Habitat in Dalmatia meridionali (Neumeyer, Botteri), Buccowina (Ziegl.), in alluviis Rhodani (Michaud).

80. P. Ferrari Porro.

T. perforata, cylindracea, apice obtusa, capillaceo-costulata, sericina, cornea; anfr. 7—9 vix convexiusculi, ultimus basi compresso-carinatus; apertura oblonga, utrinque subangulata, dente 1 marginis dextri et plicis 4 coarctata: plica 1 parietali, 1 columellari, 2 palatalibus; perist. continuum, solutum, albo-labiatum, undique expansum. — Long. 5, diam. 2 mill. Ap. 1⅔ mill. longa, medio 1 lata. (Coll. Nr. 52. Spec. max.)

Pupa Ferrari Porro Mal. com. p. 57. t. 1. f. 4. **)
— — *Villa* disp. syst. p. 56.
— — *Küster* p. 59. t. 7. f. 22—25.
— *biplicata Rossm.* X. p. 26. f. 641.
Sphyradium Ferrari Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 53. t. 14. f. 1. 2.

β. Abbreviata, cylindraceo-ovata, anfr. 7: long. 4, diam. 2 mill. (Spec.)
Pupa guttula Porro olim.
Sphyradium guttula Hartm. l. c. t. 14. f. 3. 4.

Habitat frequens prope Valgana provinciae Comensis (Porro).

Obs. Species sculptura, basi carinata, periomphalo lato et aperturae characteribus a praecedente facillime distinguenda.

§. 14.

81. P. ovularis (Bulimus) Olivier. †

T. minuta, ovata, sordide albida; anfr. 6 [convexiusculi et glabri]; vertex obtusissimus; [umbilicus parvulus;] apertura obli-

---

*) T. elongata, cylindrica, pellucida, nitida, glabra, umbilicata, albida; anfr. 9 subplanis, superioribus minimis, aliis aequalibus; apertura triangulari; columella uniplicata; labio uniplicato; labro tumido; perist. reflexo, albo; apice obtusissimo. — Long. 2½, diam. ¾‴. — Outre les deux plis il en existe 2 autres très légers dans la cavité de l'ouverture. (Mich. l. c.)

**) T. plus minusve elongato-cylindrica, duriuscula, brunneo-fulva, crebre et minutim transverse striolata; anfr. superioribus minimis, subsequentibus aequalibus, ultimo compresso; cervice carinata; apertura subtriangulari, labio laterali unicalloso, columellari recto, intus uniplicato, plica altera palatali, parieti laterali interne bicostata; perist. continuo, soluto, albo, reflexo, basi acuto; umbilico magno, conico. — Alt. 4 — 5, lat. 1½ mill. (Porro l. c.)

que oblongiuscula, sexdentata [dentibus subaequalibus, distinctis, utrinque 3]. — Long. 3 — 3½ lin. (Oliv.)

Bulimus ovularis Oliv. voy. I. p. 225. t. 17. f. 12.
Pupa ovularis Lam. 13. p. 108. ed. Dh. p. 174.
— — *Küster* t. 14. f. 21—24.
— *ovalaris Desh.* Encycl. méth. II. p. 403. N. 5.
Vertigo ovularis Fér. pr. 9. p. 65.
— — *Kryn.* Bull. Mosc. 1837. p. 54.
Chondrus pupoides Kryn. Bull. Mosc. VI. p. 410.
Cyclodontina ovularis Beck ind. p. 88. N. 9.

Habitat prope Ghemlek Syriae (Olivier).

Obs. Num haec species forsan ad Bulimi §. 20 referenda? Conf. Bulimus septemdentatus Roth (Nr. 352. p. 135.)

82. P. affinis Aradas et Maggiore. †

T. conico-cylindrica, cinerea, laevis, solida; apertura 5-dentata, margine albo, vix reflexo. — Long. 3¾, diam. 1⅔ lin. (A. et M.)

Pupa affinis Arad. et *Magg.* catal. p. 116
— — *Phil.* Sicil. II. p. 220.

Habitat in littore Catanensi Siciliae.

Obs. Differre dicitur a simili P. variabili forma per bis tertiam longitudinis partem prorsus cylindrica et situ dentium, quorum 1 in insertione marginis labri, secundus in labro, 2 contigui minuti in columella, quintus laminaris in labio.

83. P. hassiaca Pfr.

T. subperforata, ovato-oblonga, subtilissime striatula, fusco et griseo variegata; spira cylindraceo-turrita, apice obtusiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus basi subcompressus; apertura subrotundato-ovalis, intus fusca, 5-plicata: plica parietali 1 profunda, minuta, columellaribus 2 dentiformibus, palatalibus 2 usque ad marginem emersis; perist. subincrassatum, margine dextro expansiusculo, columellari reflexo. — Long. 5½, diam. 2⅖ mill. Ap. 1⅔ mill. longa, 1⅕ lata. (Coll. Nr. 53.)

Pupa hassiaca Pfr. Symb. I. p. 45.
— — *Küst.* p. 85. t. 12. f. 10. 11.

Habitat rarissima in monte Habichtswald prope Cassellam Hassiae.

Obs. In specimine meo hucusque unico rudimentum plicae angularis conspicitur.

84. P. Braunii Rossmässler.

T. breviter rimata, ovato-oblonga, subtilissime et confertissime striatula, pellucida, nitida, lutescenti-cornea; spira apice attenuata, acutiuscula; anfr. 8 vix convexi; apertura semiovalis,

6-plicata: plica angulari 1 curvata, parietali 1 profunda juxta illam, columellari 1 profunda, dentiformi, alteraque minutissima, infera, palatalibus 2 longis (binisque punctiformibus supra et infra eas); perist. breviter expansum, albo-labiatum, margine dextro intus supra medium unituberculato. — Long. 7, diam. 2⅔ mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Küst.)

Pupa Braunii Rossm. Ic. XI. p. 10. f. 726.
— — *Küst.* p. 86. t. 12. f. 14—16.

Habitat prope Carcassonne.

85. **P. nitida Anton.** †

T. parva, rimata, fusiformi-ovata, obtusa, minutissime costulato-striata, nitida, fulva, diaphana; anfr. 6 convexi; apertura magna, subquadrata, fauce 4-plicata, singulis plicis in columella et pariete aperturali, 2 in palato. — Long. 2¼, diam. ¾‴. (Küst.)

Pupa nitida (Fér.?) Anton Verz. p. 47. N. 1714.
— — *Küster* p. 50. t. 6. f. 17. 18.

Habitat in Helvetia (Anton).

86. **P. sphinctostoma (Helix) Lowe.** †

T. cylindrica, fusca; anfr. 7 plani transverse substriati; apertura 4—6-plicata: plicis 2 in columellam, postica obsoleta, 2 in ventrem, quarum anterior plicae anteriori columellari aequalis, posterior magna, complicata, cum dente ad angulum inferiorem labri posito in unum conjuncta; labrum reflexum, postice subangulatum vel sinuatum, ad angulum intus dentatum, antice 1—2-plicatum; umbilicus patulus, profundus. — Long. 2, diam. 1‴. (L.)

Helix sphinctostoma (Cochlodon) *Lowe* Faun. Mader. p. 63. t. 6. f. 32.

Habitat in insula Madera.

87. **P. monticola (Helix) Lowe.** †

T. cylindrica, castanea, pallido fasciata; anfr. 6 convexi, tumidi, striis elevatis, aequidistantibus, transversis sculpti; sutura impressa; apertura sub-6-dentata; columella 2-plicata, plica posteriore obsoletissima; plicae 2 approximatae, parallelae, in ventrem, quarum anterior minor, posterior magna, cum labro continua; labrum subreflexum, aequale, 3-plicatum: plica intermedia majore, anteriore et posteriore minutis. — Long. 1½, diam. vix 1‴. (L.)

Helix monticola (Cochlodon) *Lowe* Faun. Mader. p. 63. t. 6. f. 33.

Pupa monticola Lam. ed. Dh. 45. p. 189. *)

Habitat in summo cacumine montis «Pico de Facho» insulae Portus Sancti (Lowe).

Obs. 1. Nonne haec species et antecedens Vertiginibus potius (vide infra §. 23.) adnumeranda?

Obs. 2. In hac sectione conf. Pupa gularis Rm. Nr. 61.

§. 15.

88. **P. polyodon Draparnaud.**

T. oblique et profunde rimata, ovato-oblonga, subtilissime costulato-striata, pallide cornea; spira subfusiformis, apice acuta; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus attenuatus, basi subcompressus; apertura oblongo-subrotundata, multiplicosa: plicis angularibus 2 confertis, parietali 1 profunda, columellaribus 2 (superiore longiore), palatalibus 3 validis, emersis; perist. album, expansiusculum, undique plicatulum. — Long. 10, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 54.)

Pupa polyodon Drap. tabl. d. moll. p. 60. N. 13.
— — *Drap.* hist. p. 67. t. 4. f. 1. 2.
— — *Lam.* 18. p. 109. ed. Dh. p. 176.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 170. t. 235. f. 4117.
— — *Desh.* Enc. méth. II. p. 402. N. 3.
— — *Rossm.* V. p. 12. f. 316.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 170. f. 9.
— — *Küster* p. 42. t. 5. f. 24. 25.
— *frumentum var. Cantr.* Mal. méd. p. 142.
Chondrus polyodon Cuvier règne anim. II. p. 408.
— — *Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 89.
— *variabilis δ Hartm.* in Neue Alpina I. p. 218.
Helix polyodon (Cochlodonta) *Fér.* pr. 490.
Torquilla polyodon Beck ind. p. 86. N. 18.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 8.
Granaria polyodon Held in Isis 1837. p. 918.

β. Minor, apertura oblonga, basi subangulata, pliculis peristomatis distinctis: long. 8, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata.
Pupa ringicula Mich. teste Dupuy in coll. Philipp.
— — *Küst.* t. 14. f. 9—12.

γ. Minor, pliculis peristomatis obsoletioribus:
Pupa polyodon var. Rossm. XI. p. 10. f. 727.
— — — *Küst.* p. 42. t. 5. f. 25 *.

Habitat in Gallia, prope Marseille, Montpellier, Toulouse, et in Hispania; β in Pyrenaeis; γ prope Barrège et Figueras.

*) T. cylindracea, castanea, pallido fasciata, spira obtusa; anfr. convexis, regulariter striatis, striis elevatis; apertura sub-6-dentata; columella biplicata, labio bidentato; labro incrassato, albo, tridentato. — Long. 3 mill. (Desh. l. c.)

89. P. cylindrica Michaud.

T. aperte perforata, cylindrica, solidiuscula, confertim capillaceo-costulata, sericina, corneo-lutescens; spira apice in conum acutiusculum abiens; anfr. 11—12 convexi, ultimus basi compressus, antice ascendens; apertura oblonga, multiplicosa: plicis 1—2 angularibus, parietali 1 profunda, columellaribus 2 (vel 3), palatalibus 3 longissimis ad marginem porrigentibus, quartaque supera minuta; perist. incrassatum, expansum, album, margine columellari plicatulo. — Long. 8, diam. 3⅓ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 54. Spec. max.)

Pupa cylindrica Mich. in Bull. Bord. III. 4ᵉ livr. p. 9. f. 17. 18.
— — *Desh.* in Enc. méth. II. p. 404. N. 10.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 164. t. 16. f. 15. 16.
— — *Lam.* ed. Dh. 55. p. 194.
— — *Rossm.* X. p. 27. f. 643.
— — *Küster* t. 13. f. 12—15.
Helix Dufourii (Cochlodonta) *Fér.* pr. 478. (teste Beck.)
Pupilla cylindrica Beck ind. p. 83. N. 1.

Habitat prope Bascara, Figuères.

90. P. ringens Michaud.

T. profunde rimata, ovato-oblonga, subtiliter costulato-striata, cornea vel cinerascens; spira sursum conica, acutiuscula; anfr. 8—9 convexi, ultimus basi subcompressus; apertura subrotundata, multiplicosa: plica angulari 1 valida, parietalibus 2 exiguis externis, tertiaque valida profunda, columellaribus 2 longis intrantibus, palatalibus 3 emersis; perist. album, expansiusculum. — Long 6, diam. 3 mill. Ap. 2 mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Nr. 55.)

Pupa ringens Mich. compl. p. 64. t. 15. f. 35. 36.
— — *Lam.* ed. Dh. 44. p. 188.
— — *Küster* p. 50. t. 6. f. 19. 20. t. 13. f. 24—26.
— *bigoriensis Rossm.* V. p. 14. f. 321.
Torquilla ringens Beck ind. p. 85. N. 2.
— *bigorriensis Villa* disp. syst. p. 24.
Granaria bigoriensis Held in Isis 1837. p. 918.
Stomodonta ringens Mermet moll. pyr. p. 51. N. 9.

Habitat frequens prope Bagnères de Bigorre in Pyrenaeis.

91. P. pachygastra Ziegler.

T. oblique rimata, cylindrico-fusiformis, costulato-striata, corneo-lutescens; spira supra medium in conum acutiusculum attenuata; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi subcompressus; apertura semiovalis, multiplicosa: plica angulari 1 valida, subduplicata, parietali 1 immersa, columellaribus 2 approximatis, dentiformibus, palatalibus 5—6 inaequalibus; perist. expansum,

reflexiusculum, intus albo-labiatum. — Long. 11½, diam. 4 mill. Ap. 3½ mill longa, 3 lata. (Coll. Nr. 56.)

Pupa pachygastra Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* V. p. 11.
— — *Küster* p. 38. t. 5. f. 11—14.
— *oblongata Rossm.* V. f. 314.
— *appenina Charp.*
Torquilla polyplicata Mühlf. (teste Rm.)
— *pachygastra Beck* ind. p. 86. N. 14.

Habitat in Dalmatia.

Obs. An varietas eximia sequentis?

92. P. frumentum Draparnaud.

T. oblique rimata, ovato-cylindrica, tenuiuscula, subtiliter costulato-striata, corneo-lutescens; spira apice acuminata, acutiuscula; anfr. 8½—10 convexiusculi, ultimus basi subcompressus, pone aperturam (plerumque) albo-callosus; apertura semiovalis, 8-plicata: plica angulari 1 valida, parietali 1 profunda, columellaribus 2 profundis, dentiformibus, palatalibus 4 subaequalibus (tertia validiore), longis, emersis; perist. expansum, simplex vel albo-labiatum. — Long. 8, diam. 3½ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 57. Spec. typo Draparnaudiana congrua.)

Pupa frumentum Drap. tabl. d. moll. p. 59. N. 11. *)
— — *Drap.* hist. p. 65. t. 3. f. 51. 52. **)
— — *Lam.* 20. p. 109. ed. Dh. p. 177.
— — *C. Pfr.* I. p. 54. t. 3. f. 13.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 173. t. 235. f. 4121.
— — *Desh.* Enc. méth. II. p. 402. N 2.
— — *Rossm.* I. p. 81. f. 34. V. p. 11. f. 310—13.
— — (Chondrus) *Charp.* catal. p. 16.
— — *Porro* Mal. p. 59.
— — *Cantr.* Mal. méd. p. 141.
— — *Küster* p. 40. t. 5. f. 15—17.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
— *curta Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 164. t. 16. f. 13. 14?
Chondrus frumentum Cuvier règne anim. II. p. 408.
— — *Voigt* in Cuv. III. p. 89.
— *variabilis γ Hartm.* in Neue Alpina I. p. 218.
Helix frumentum (Cochlodonta) *Fér.* pr. 487.
Torquilla frumentum Fitzing. syst. Verz. p. 107.
— — *Beck* ind. p. 86. N. 15.

---

*) Coq. un peu grisâtre; ouverture 8-plissée; péristome garni extérieurement d'un bourrelet blanc; 9 tours. — Long. 6—7, diam. 3 mill. (Drap. l. c.)

**) T. conico-cylindrica; apertura 8-plicata; perist. reflexo, extrinsecus marginato; anfr. 9. (Drap. l. c.)

Torquilla callosa Ziegl. (teste Rm.)
Granaria frumentum Held in Isis 1837. p. 918.
Pupella frumentum Swains. Malac. p. 334.

β. Major, subcylindracea vel fusiformis, anfract. planioribus, callo cervicis subnullo: long. 10—11, diam. 4 mill. Ap. 3½ mill. longa, 3 lata. (Spec.)
Pupa adjuncta Ziegl. Mus.
— *frumentum var. illyrica* et *elongata Rossm.* V. p. 11. f. 312. 313.
— — — *Küst.* p. 41. t. 5. f. 18. 19. 22. 23.

γ. Minima, ventrosa, plicis validis: long. 2½ — 3, diam. 1½‴.
Pupa frumentum var. curta Küst. p. 41. t. 5. f. 20. 21.

δ? Maxima:
Clausilia Charlotia Risso IV. p. 86. N. 194. t. 3. f. 22? *)
Pupa patula Menke syn. ed. 2. p. 32.

ε? Maxima, glaberrima:
Clausilia polita Risso IV. p. 87. N. 199. t. 4. f. 36? **)

Habitat passim in Germania, in Austria, Illyria, Helvetia, Gallia, Hispania; var. *β* in Carinthia, Carniolia, prope Triest, Fiume!

Obs. Species pervariabilis quoad magnitudinem, formam, colorem interdum saturate corneum, imo castaneum, callum cervicis interdum gibboso-prominentem et labium magis minusve incrassatum.

93. P. cylindracea Ziegler.

T. rimata, cylindracea, acuta, glabriuscula, corneo-lutescens; anfr. 11, ultimus basi subangulatus; apertura semiovato-rotundata; sub-9-plicata: plica angulari subduplicata, tertia parietali, columellaribus 2 profundis, palatalibus 4; perist. breviter expansum, subalbo-labiatum, margine columellari patente, superne incurvato. — Long. 13, diam. 3¾ mill. Ap. 3½ mill. longa. (Coll. Küst.)

Pupa cylindracea Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* V. p. 12. f. 315.
— — *Küst.* p. 37. t. 5. f. 9. 10.
Torquilla cylindracea Beck ind. p. 86. N. 13.

Habitat prope Almissa Dalmatiae (Küst.)

Obs. An praecedentis varietatibus adnumeranda?

*) T. subcylindrica, superne valde abrupte acuminata; anfr. 13, sutura profunda, epidermide grisea; peritrem. eburneo, postice ad dextram dentibus 2 lamelliformibus ornato. — Long. 0,013. (Risso l. c.) — An potius haec et sequens varietas P. pachygastrae adnumeranda? An species?

**) T. glaberrima nitida lucida, superne valde abrupte acuminata; anfr. 12, striis tenuissimis obliquis subcurvatis sculptis; sutura profunda; epidermide cornea; peritrem. eburneo, postice et ad dextram dentibus 2 lamelliformibus armato. — Long. 0,014. (Risso l. c.)

94. P. fusiformis Küster.

T. subrimata, elongata, fusiformis, subtilissime transversim striata, nitida, flavo-cornea; anfr. 13 angusti, convexiusculi; apertura semiovata, alba; perist. album, labiatum, reflexum; palatum 3-plicatum; paries aperturalis columellaque biplicata. — Long. 6, diam. $1\frac{1}{3}'''$. (K.) — Long. 13, diam. $3\frac{2}{3}$ mill. Ap. $3\frac{2}{3}$ mill. longa. (Coll. Küst. spec. max.)

Pupa fusiformis Küst. p. 83. t. 12. f. 4—7.

Habitat rarissima prope Budua Dalmatiae.

95. P. Micheli Terver. †

T. punctiformi-umbilicata, elongata, subcylindrica, nitidiuscula, subtiliter costulato-striata, corneo-flava; anfr. 9 angusti, subplani; apertura semiovata, 8-plicata: plicis 4 in palato, suprema brevissima, profunda, 2 in pariete aperturali et reliquis in columella; perist. albo-labiatum, reflexum. — Alt. $2\frac{1}{2}$, lat. $\frac{1}{3}$ lin. (Küst. in litt.)

Pupa Micheli Terv. Küst. Mon. t. 14. f. 29—31.

Habitat prope Toulon Galliae.

96. P. variabilis Draparnaud.

T. oblique rimata, cylindraceo- vel ovato-turrita, glabriuscula, nitidula, cornea; spira sensim attenuata, acutiuscula; anfr. 9—10 vix convexiusculi, ultimus vix angustior; apertura semiovalis, multiplicosa: plica angulari 1 valida, parietali 1 profunda, longe intrante, columellaribus 2 confertis, aequalibus, dentiformibus, palatalibus sub 4 (superis 2 brevibus, tertia longa, emersa, quarta punctiformi); perist. breviter expansum, albo-labiatum. — Long. 10, diam. $3\frac{1}{2}$ mill. Ap. 3 mill. longa, $2\frac{1}{2}$ lata. (Coll. Nr. 58.)

Pupa variabilis Drap. tabl. d. moll. p. 60. N. 14.
— — *Drap.* hist. p. 66. t. 3. f. 55. 56.
— — *Lam.* 19 p. 109. ed. Dh. p. 176.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 172. t. 235. f. 4120.
— — (Chondrus) *Charp.* catal. p. 16.
— — *Rossm.* V. p. 10. f. 309. XI. p. 10. f. 725.
— — *Küster* p. 43. t. 6. f. 1. 2.
Chondrus variabilis Cuvier règne anim. II. p. 408. Ed. Voigt III. p. 89.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 7. T. 2.
— — *a Hartm.* in Neue Alpina I. p. 218.
— — *Guérin* Iconogr. t. 6. f. 10.
Helix mutabilis (Cochlodonta) *Fér.* pr. 489.
Torquilla variabilis Stud. Verz. p. 19.
— — *Fitzing.* syst. Verz. p. 106.

Torquilla variabilis Beck ind. p. 86. N. 19.
Granaria variabilis Held in Isis 1837. p. 918.
Pupella variabilis Swains. Malac. p. 334.

Habitat in Gallia, Helvetia, Hispania. Rarissima prope Vindobonam. (Fitz.)

* * *

97. P. secale Draparnaud.

T. profunde rimata, subcylindrico-turrita, subtilissime costulato-striata, rufo-cornea; spira superne sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus basi compressus; apertura semioblonga, 7 plicata: plica 1 angulari, magna, parietali 1 profunda, columellaribus 2 extrorsum elongatis et palatalibus 3 emersis; perist. album, breviter expansum. — Long. 8, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 59. Spec. hass.)

Pupa secale Drap. tabl. d. moll. p. 59. N. 12.
— — *Drap.* hist. p. 64. t. 3. f 49. 50.
— — *Lam.* 21. p. 110. ed. Dh. p. 177.
— — *C. Pfr.* I. p. 55. t. 3. f. 14.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 171. t. 235. f. 4119.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 401. N. 1.
— — *Rossm.* I. p. 82. f. 35. V. p. 13. f. 317.
— — (Chondrus) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 16.
— — *Küster* p. 44. t. 6. f. 3—5.
— — *Dupuy* moll. du Gers p. 42. N. 6.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 518.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 74.
— *frumentum Gärtn., Brown.* (teste Beck.)
— *Juniperi Fleming* brit. anim. p. 268.
— — (Abida) *Gray* Man. p. 197. t. 7. f. 81.
Turbo Juniperi Mont. test. brit. p. 340. t. 12. f. 12.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 877.
— *cylindricus Hartm.* in Alpina II. p. 212.
Chondrus secale Cuvier règne anim. II. p. 408. Ed. Voigt III. p. 89.
— — *Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 7. T. 4.
— — *a Hartm.* in Neue Alpina I. p. 218.
Helix cylindrica Stud. in Coxe trav.
— *secale* (Cochlodonta) *Fér.* pr. 488.
Torquilla secale Stud. Verz. p. 19.
— — *Fitzing.* syst. Verz. p. 107.
— — *Beck* ind. p. 86. N. 11.
— *similis Hartm.* in sched.
Abida secale Leach moll. p. 165.
Jaminia secale Risso IV. p. 89. N. 204.
Vertigo secale Turt. Man. p. 101. f. 81.

Granaria secale Held in Isis 1837. p. 918.
Stomodonta secale Mermet moll. pyr. p. 51. N. 10.
β. Gracilior, anfr. 9½ — 10, plica palatali 1 saepe obsoleta:
Pupa variabilis C. Pfr. I. p. 56. t. 3. f. 15.
— *hordeum* (Chondrus) *Charp.* cat. p. 16. t. 2. f. 7?
γ. Minor, long. 7, diam. 2⅔ mill. (Spec.)
Torquilla secale Hartm. in sched.

Habitat in Germania (Hassia, Pyrmont.), Austria (Baden b. Wien, Salzburg, Ischl!), Helvetia, Gallia, Britannia, Lusitania, Hispania.

Obs. Cl. Deshayes Turbinem Juniperi Mont. errore ad P. avenam refert.

98. P. clausilioides Boubée.

T. subverticaliter rimata, cylindrica, utrinque attenuata, costulato-striata, diaphana, sericina, cornea; spira elongata, obtusiuscula; anfr. 10—11 convexiusculi, ultimus basi vix compressus; apertura oblongo-ovalis, fere clausa, 8-plicata: plica 1 angulari valida, adjacente altera parvula, parietali 1 profunda, mediocri, columellaribus 2 emersis (superiore longiore), palatalibus 3 longis, emersis, quartaque supera punctiformi; perist. expansiusculum, carneo-sublabiatum. — Long. 9, diam. 2¾ mill. Ap. 2¾ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 60.)

Pupa clausilioides Boubée.... (teste Dupuy in coll. Philipp.)
— — *Jay* catal. 1839. p. 52.
— — *Graells* catal. de los moluscos etc. p. 7.
— *affinis Rossm.* X. p. 26. f. 642.
— — *Küst.* p. 82. t. 12. f. 1—3.

Habitat in Pyrenaeis Cataloniae.

Obs. Descriptio Rossmässleriana e specimine non omnino adulto facta esse videtur.

99. P. pyrenaearia Michaud.

T. perforata, subcylindracea, confertim costulato-striata, sericina, pallide fusca; spira elongata, obtusiuscula; anfr. 9 convexi, ultimus basi compressus, antice solutus; apertura subcircularis, coarctata: plica angulari 1, parietali 1 profunda prope illam, columellaribus 2 (infera minutissima), palatalibus 3 (infima basali minore); perist. solutum, continuum, simplex, expansiusculum. — Long. 7, diam. 2½ mill. Ap. 1⅕ mill. longa. (Coll. Nr. 61.)

Pupa pyrenaearia Mich. compl. p. 66. t. 15. f. 37. 38. *)
— — *Lam.* ed. Dh. 43. p. 188.
— *Vergnesiana Charp. Küster* t. 14. f. 13—16.

*) T. oblonga, subcylindrica, umbilicata, fulva, nitida, subpellucida, oblique striata, striis regularibus; anfr. 9 convexiusculis; apertura 5 — 6 plicata, rotundata, coarctata; perist. albo, reflexo, submarginato, continuo; labro sinuato; columella callosa, 1 plicata; apice obtuso. — Alt. 3, lat. 1 lin. (Mich. l. c.)

Clausilia pyrenaica Boubée in Bull. d'hist. nat. de France p. 11.
Torquilla pyrenaica Beck ind. p. 85. N. 3.
Stomodonta pyrenaearia Mermet moll. pyr. p. 51. N. 8.

Habitat in Pyrenaeis.

Obs. Specimina descripta, descriptioni et figurae Michaudianae bene congrua saepius sub nomine P. pyrenaeariae, nuperrime autem a Küstero sub nomine *P. Vergnesianae Charp.* accepi. — Specimina vidi collectionis Küsterianae a Michaud ipso communicata, apertura majore, latiore, peristomate superne non soluto distincta, a Küstero nondum figurata. Num haec typica P. pyrenaeariae forma?

100. P. granum Draparnaud.

T. rimata, subcylindrica, subtilissime costulato-striata, sericina, cornea; spira superne sensim attenuata, acutiuscula; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura semiovalis, 7-plicata: plica parietali 1, columellaribus 2 parvulis, dentiformibus, palatalibus 4 (superis 2 brevibus, inferis 2 longioribus); perist. expansiusculum, marginibus conniventibus. — Long. 5, diam. 2 mill. Ap. vix 1½ mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 62.)

Pupa granum Drap. tabl. d. moll. p. 59. N. 9.
— — *Drap.* hist. p. 63. t. 3 f. 45. 46. *)
— — *Lam.* 23. p. 110. ed. Dh. p. 178.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 405. N. 13.
— — (Chondrus) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 16.
— — *Rossm.* V. p. 14. f. 322. XI. p. 11. f. 730.
— — *Dupuy* moll. du Gers p. 41. N. 5.
— — *Küster* p. 33. t. 4. f. 17—19.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 114.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 74.
— *secale? Phil.* Sicil. I. p. 138.
Torquilla granum Stud. Verz. p. 19.
— — *Beck* ind. p. 85. N. 1.
Jaminia granum Risso IV. p. 90. N. 206.
Chondrus granum Hartm. in Neue Alpina I. p. 219.
— — *Voigt* Cuv. III. p. 90.
Stomodonta granum Mermet moll. pyr. p. 52. N. 12.

Habitat in Gallia (Drap.), in Helvetia rara (Charp.), prope Nizza (Risso), in Dalmatia (Küst.), Sicilia (Phil.), Algarbia (Morelet), Hispaniae provinciis orientalibus, Murcia (Graells).

101. P. subulata Bivona.

T. breviter rimata, cylindraceo-ovata, subtilissime costulato-striata, sericina, cornea; spira sensim attenuata, apice acutiuscula; anfr. 6—7 convexi, ultimus angustior; apertura subrotun-

*) T. cylindracea, oblonga; apertura interius 4 plicata; anfr. 7. (Drap. l. c.)

data, 8-plicata: plica parietali 1, columellaribus 2 dentiformibus, approximatis, palatalibus sub 5 inaequalibus; perist. simplex, expansiusculum, marginibus approximatis. — Long. 4, diam. 1⅔ mill. Ap. 1¼ mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 63.)

Pupa subulata Biv. Monogr. p. 11.
— — *Arad.* et *Magg.* cat. p. 130.
— — *Phil.* in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 105.
— — *Küster* p. 94. t. 13. f. 5. 6.

Habitat in Sicilia.

102. P. contorta Calcara. †

T. cylindraceo-conica, striata, corneo-cinerascens; anfr. 8 plano-convexi, ultimus ante finem notabiliter contortus; apertura alba, 8-dentata, margine crassiusculo, subreflexo. — Long. 3 lin. (C.)

Pupa contorta Calc. in Effem. scient. per la Sicil. N. 75. p. 101.
— — *Arad.* et *Magg.* catal. p. 132.

Habitat circa Palermo Siciliae.

103. P. cassida (Helix) Lowe. †

T. ovata, ventricosa, abbreviata, subimperforata; anfr. 7—8 plani, striis elevatis, crebris, aequidistantibus, transversis; sutura subindistincta; apertura 7—8-plicata; columella biplicata, plica posterior minor; plicae 2 subaequales, parallelae in ventrem positae, exterior paulo major, cum labro continua, sinum efficiens; labrum expansum, 5-plicatum, plica anterior minor, aliquando obsoleta, 3 intermediae laterales, approximatae, superior magna, 2 inferiores minores, quarum infima subdentiformis, quinta infima, minima, ad angulum labri posita; perforatio minima. — Long. 2, diam. 1½ lin. (L.)

Helix Cochlodon cassida Lowe Faun. Mader. p. 64. t. 6. f. 35.
Pupa cassida Lam. ed. Dh. 41. p. 187. *)
Cyclodontina cassida Beck ind. p. 88. N. 10.

Habitat in insula Madera, recens rarissima, frequentior semifossilis.

104. P. calathiscus (Helix) Lowe. †

T. cylindrico-ovata, abbreviata, castanea, pallide fasciata; anfr. 7 convexi, subtumidi, costulis transversis crebris sculpti; sutura impressa; apertura sub 7-plicata; columella uniplicata; plicae 2 in ventre, quarum anterior valde interna, minuta, dentiformis, altera posterior magna, cum labro continua; labrum ex-

*) T. ovato-ventricosa, tenuissime et regulariter striata, fusco-castanea, brunneo-unizonata; anfr. 7—8 plani, ultimus basi subperforatus; apertura angusta, obliqua, bisplicata plicis inaequalibus. — Long. 4, lat. 3 mill. (Dh. l. c.)

pansum, subsinuatum, callo intus labri margini parallelo, postice in dentem duplicem desinente, antice dente minuto, simplice et plica unica intermedia, magna instructum. — Long. 1¾, diam. 1 lin. (L.)

Helix Cochlodon calathiscus Lowe Faun. Mader. p. 64. t. 6. f. 34.

Habitat in cacumine montis Pico de Facho insulae Portosancto.

§. 16.

105. P. quinquedentata (Turbo) Born.

T. vix rimata, cylindrico-fusiformis, solidula, striatula, opaca, cinerea, subunicolor, vel fusco-nebulosa et strigata; spira elongata, sensim attenuata, acuta; anfr. 10 planiusculi, ultimus basi subcompressus; apertura ovalis, intus fuscula, 6-plicata: plica angulari 1 brevi, parietali 1 longiore, emersa, columellaribus 2 dentiformibus, inferiore interdum exigua, palatalibus 2 longis, marginem non attingentibus; perist. simplex, expansum. — Long. 12, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 64.)

Turbo quinquedentatus Born Mus. p. 359. t. 13. f. 9.*)
— — *Gmel.* p. 3612. N. 100.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 876.
Bulimus similis Brug. Enc. méth. I. p. 355. N. 96.
Pupa cinerea Drap. tabl. d. moll. p. 61. N. 17.
— — *Drap.* hist. p. 65. t. 3. f. 53. 54.
— — *Lam.* 15. p. 108. ed. Dh. p. 174.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 170. t. 235. f. 4116.
— — *Rossm.* V. p. 19. f. 336.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 141.
— — *Küster* p. 36. t. 5. f. 4—8.
Chondrus cinereus Cuvier règne anim. (II. p. 408.) Ed. Voigt III. p. 89.
— — *Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 7. T. 7.
— — *Hartm.* in Neue Alpina I. p. 218.
Helix cinerea (Cochlodonta) *Fér.* pr. 484.
Clausilia cinerea Risso IV. p. 85. N. 192.
Torquilla cinerea Beck ind. p. 87. N. 20.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 8.
β. Minor, anfr. 8: long. 9½, diam. 3 mill. (Spec.)
Pupa variegella Ziegl. Mus.

Habitat in Gallia meridionali, Hispania, Helvetia, Italia.

106. P. goniostoma Küster.

T. oblique profunde rimata, cylindrico-subfusiformis, subtilissime striata, nitida, diaphana, rufo-cornea; spira elongata,

*) T. turrita, subpellucida, labio tridentato, labro biplicato. — Long. 6, lat. 1‴. (Born l. c.)

attenuata, acutiuscula; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus basi compressus; apertura magna, rotundato-trigona, basi angulata, intus 8-plicata: plica 1 angulari longa, parietali 1 brevi, columellaribus 2 subelongatis, marginem non attingentibus, palatalibus 4, suprema minuta; perist. acutum, intus tenuiter labiatum, margine dextro expansiusculo, columellari reflexo, patente. — Long. 9, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, $2^1/_3$ lata. (Coll. Küster.)

Pupa goniostoma Küst. Monogr. p. 53. t. 7. f. 4. 5.
— *megacheilos Moq.-Tand.* (teste Küst.)

Habitat in Pyrenaeis orientalibus.

107. P. megacheilos (Chondrus) Jan.

T. umbilicata, turrito-subfusiformis, solida, striatula, nitida, purpurascenti-fusca; spira turrita, acutiuscula; anfr. 7—9 vix convexiusculi, ultimus circa umbilicum angustum, pervium carinatus; apertura ovali-oblonga, multiplicosa: plica angulari 1 callosa, parietalibus 2 profundis, columellaribus 2 (supera longiore, infera dentiformi), palatalibus sub 5 inaequalibus (1—2 superis minutis, tertia et quarta validis, emersis, quinta breviore); perist. expansum, incrassatum, carneo-labiatum. — Long. 11, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 65.)

Chondrus megacheilos Jan Mantissa p. 3. *)
Pupa megacheilos Rossm. V. p. 13. f. 318.
— — *Porro* Mal. p. 60.
— — *Küster* p. 46. t. 6. f. 6—8.
— *pyrenaica Farin.* (teste Porro.)
Torquilla megacheilos Beck ind. p. 86. N. 10.
— — *Graells* catal. mol. Esp. p. 8.
— *tricolor Villa* disp. syst. p. 57. **)
Stomodonta megacheilos Mermet moll. pyr. p. 50. N. 7.

β. Minor, umbilico non pervio: long. $7^1/_2$, diam. 3 mill. (Spec.)

γ? Gracilis.
Pupa megacheilos var. Rossm. XI. p. 10. f. 728. Conf. P. cereana Nr. 110.

δ? Pusilla:
Pupa bigorrensis Charp. teste Porro.

Habitat in Italia boreali et in Hispania; var. γ? prope Montpellier. Barrège (Rossm.).

---

*) T. dextrorsa, conico-cylindrica, vertice obtusiusculo (alt. $4^1/_2$, lat $1^1/_2$‴), apertura septemplicata (alt. $1^1/_2$, lat. 1‴), perist. lato albo. (Jan l. c.)

**) T. dextrorsa, crassa, fusiformis, brunnea vel nigro-brunnea, vertice dilutiori, substriata; anfract. convexiusculis; apertura obovata, basi subangulata, 8 plicata, plicis inaequalibus; perist. albo dilatato; umbilico magno, profundo. — Alt. 11—13, lat. 5 mill. (Villa l. c.)

108. P. Moquiniana Küster.

T. rimato-perforata, conico-cylindrica, confertim et oblique costulato-striata, brunnea; spira obtusiuscula; anfr. 8 convexiusculi, ultimus basi subcarinato-compressus; apertura ampla, oblonga, fuscula, 9-plicata: plica angulari 1 longa, parietali 1 profunda, columellaribus 2 profundis (supera longiore), palatalibus 5 (3 mediis validis, suprema et infima basali minoribus); perist. breviter expansum, simplex, marginibus superne convergentibus. — Long. 8, diam. 2¾ mill. Ap. 2½ mill. longa, vix 2 lata. (Coll. Küst.)

Pupa Moquiniana Küst. Monogr. p. 52. t. 7. f. 1—3.

β. Plicis palatalibus suprema et minima subobsoletis.

Pupa bigorriensis Charp. (teste Küster.)

Habitat in monte Beudar prope Pau Galliae.

108a. P. lusitanica Rossmässler.

T. breviter et profunde rimata, cylindraceo-conica, oblique confertim costulata, brunnea; spira elongata, obtusa; anfr. 8 convexi, ultimus basi compressus; apertura oblonga, fuscula, 7-plicata: plica angulari 1 longa, parietali 1 profunda juxta illam, columellaribus 2 mediocribus, palatalibus 3 aequalibus, marginem fere attingentibus; perist. simplex, breviter expansum, marginibus approximatis, dextro superne repando, columellari stricto. — Long. 7, diam. 3 mill. Ap. vix 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Rossm. spec. max.)

Pupa lusitanica Rossm. in litt.

Habitat in Lusitania: Sierra de Arjabida (teste Parreyss).

109. P. avenacea (Bulimus) Bruguière.

T. perforata, subfusiformi-conica, substriata, saturate brunnea; spira turrita, acutiuscula; anfr. 8 convexi, ultimus tumidus, antice ascendens; apertura oblonga, 7—8-plicata: plica maxima angulari, parietali 1 profunda, columellaribus 2, palatalibus 2 — 3 brevibus, marginem non attingentibus, suprema minima, saepe obsoleta; perist. album, expansiusculum, marginibus convergentibus. — Long. 7, diam. 2½ mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 66.)

Bulimus avenaceus Brug. Encycl. méth. I. p. 355. N. 97.
Pupa avena Drap. p. 64. t. 3. f. 47. 48.
— — *Lam.* 22. p. 110. ed. Dh. p. 177.
— — *C. Pfr.* III. p. 39. t. 7. f. 5. 6.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 171. t. 235. f. 4118.
— — *Rossm.* I. p. 82. f. 36. V. p. 13. f. 319.
— — (Chondrus) *Charp.* catal. moll. p. 16.

Pupa avena Porro Malac. p. 55.
— — *Küster* p. 48. t. 6. f. 12—14.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
— *lucana Briganti* et *Delle Chiaje* (Phil. Sicil. II. p. 114.)
Chondrus avena Cuvier règne animal II. p. 408.
— — *Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 90.
— *avenaceus Guér.* Icon. Moll. t. 6. f. 9.
— *secale γ Hartm.* in Neue Alpina I. p. 219.
— — *var. avenaceus Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 7. T. 6.
Torquilla avena Stud. Verz. p. 19.
— — *Fitzing.* syst. Verz. p. 107.
— — *Beck* ind. p. 86. N. 8.
Helix avena (Cochlodonta) *Fér.* pr. 485.
Jaminia septemdentata Risso hist. IV. p. 91? *)
Granaria avena Held in Isis 1837. p. 918.
Stomodonta avena Mermet moll. pyr. p. 52. N. 11.

β. Minor, sublaevigata, plicis palatalibus semper 2:
Torquilla hordeum Stud. Verz p. 19.
— — *Beck* ind. p. 86.
Helix hordeum (Cochlodonta) *Fér.* pr. 486.
Pupa avena minor Küst. p. 49. t. 6. f. 15. 16.
— *hordeum Cantr.* Malac. méd. p. 140? **)
Chondrus secale var. hordeum Hartm. in Sturm Fauna VI. H. 7. T. 5.
Granaria hordeum Held in Isis 1837. p. 918.

γ. Minor, plica angulari extus obsoleta, in fundo juxta parietalem distinctissima: long. 5, diam. 2 mill. (Coll. Küst.)
Pupa duplicata Küst. in litt. et Monogr. t. 14. f. 37—39.

Habitat in rupibus calcareis Bavariae (Berchtesgaden etc.!), Austriae (Salzburg, Baden, Ischl!) Würtembergiae (Mergentheim) Illyriae, Helvetiae, Galliae.

Obs. Conf. P. Mühlfeldtii Küst. Nr. 78.

110. **P. cereana Mühlfeldt.**

T. subperforata, cylindrico-subfusiformis, leviter rugulosostriata, nitida, purpurascenti-fusca; spira turrita, acutiuscula; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus basi subcompressus; apertura oblonga, fusca, intus 8-plicata: plica angulari et parietali profunda mediocribus, columellaribus 2 (inferiore dentiformi), palatalibus 4.

*) T. glabra, nitida; anfr. 8, lineolis obliquis elevatis sculptis; apertura multidentata; epidermide brunneo-purpurascente. — Long. 0,006. (Risso l. c.) — An potius ad P. Mühlfeldtii Küst. referenda?

**) T. ovato-conica, rimata, subumbilicata, corneo-fusca; anfr. 7 convexis, costulato-striatis; apertura semiovata, compressa, 6 plicata: pl. 2 in columella, in labro et in pariete aperturali; perist. reflexo, — Long. 3, diam. 1¼ lin. (Cantr. l. c.)

supera minuta vel obsoleta, reliquis subaequalibus, marginem fere attingentibus; perist. simplex, breviter expansum, marginibus conniventibus. — Long. 7, diam. 2⅔ mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 67.)

Pupa cereana Mühlf. Mus.
— — *Küst.* p. 47. t. 6. f. 9—11.
— *megacheilos var. Rossm.* IX. p. 10. f. 728? (Küst.)

Habitat in Germania meridionali et Gallia.

Obs. Habitu persimilis P. avenaceae, plicarum formatione ad P. megacheilam magis accedens, tamen varietatibus prioris forsan adnumeranda.

§. 17.

111. P. Michaudi Terver.

T. rimata, subfusiformis, gracilis, costulato-striata, cornea; spira subulata, acutiuscula; anfr. 8 convexi, ultimus non ascendens; apertura ovalis, 6-plicata: plica 1 angulari, parietali 1 profundiore et columellaribus 2 validioribus approximatis, palatalibus 2 breviter intrantibus; perist. simplex, tenue, vix expansiusculum. — Long. 6⅖, diam. anfr. penult. 2 mill. Ap. 2 mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 68. Spec. max.)

Pupa Michaudi Terv. cat. p. 31. t. 4. f. 14. 15. *)
— — *Rossm.* X. p. 25. f. 640.
— — *Küster* p. 30. t. 4. f. 8—10.
Torquilla Michaudi Villa disp. syst. p. 24.

Habitat prope Bugia Africae borealis.

112. P. occulta Parreyss.

T. subrimata, fusiformi-turrita, costulato-striata, fusco-cornea; spira turrita, acuta; anfr. 5—7 convexi, ultimus rotundatus; apertura ovalis, triplicata: plica parietali 1, columellari 1 prope illam, palatali 1 brevi, dentiformi; perist. tenue, expansiusculum, marginibus approximatis. — Long. 6, diam. 2¼ mill. Ap. 2 mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 69.)

Pupa occulta Parr. in sched.
— — *Rossm.* X. p. 25. f. 638.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 114.
— — *Küster* p. 18. t. 2. f. 25. 26.
— *meledana Stentz* teste Villa.
Torquilla occulta Villa disp. syst. p. 24.

Habitat in Sicilia.

---

*) T. minima, elongata, gracili, fusca, minutissime striata, umbilicata; apertura ovali, 6 plicata; anfr. 7—8; sutura profunda; perist. reflexo. — Long. 2—3, diam. vix ¾ lin. (Terv. l. c.)

113. P. rhodia Roth.

T. subperforata, fusiformi-turrita, confertim striato-costulata, sericina, fusca; spira turrita, acuta; anfr. 6—6½ convexi, ultimus basi rotundatus; apertura ovalis, 5-plicata: plica angulari nulla, parietali 1 intrante, columellaribus 2 (superiore majore, inferiore exigua), palatalibus 2 mediocribus; perist. simplex, expansiusculum, marginibus conniventibus. — Long. 4½, diam. anfr. penult. fere 2 mill. Ap. 1½ mill. longa, 1 lata. (Coll. Nr. 70.)

Pupa rhodia Roth diss. p. 19. t. 2. f. 4.*)
— — *Küster* p. 31. t. 4. f. 11.

Habitat in insula Rhodo (Roth), Thermia (Forbes), in Dalmatia meridionali, prope Spalato et in ins. Meleda (Küster).

114. P. Philippii Cantraine.

T. vix rimata, fusiformi-turrita, tenera, striata, corneo-rufa; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 6 convexi, ultimus basi rotundatus; apertura ovalis, 4-plicata: plica parietali 1 immersa (rarius adjacente 1 angulari minuta), columellari 1 dentiformi, palatalibus 2 immersis, brevibus; perist. simplex, expansiusculum, marginibus conniventibus. — Long. 4½, diam. 2 mill. Ap. 1½ mill. longa, vix 1 lata. (Coll. Nr. 71.)

Pupa Philippii Cantr Malac. médit. p. 140.**)
— — *Phil.* Sicil. II. p. 114. t. 21. f. 3.
— *Caprearum Phil.* in litt. olim.
— — *Rossm.* XI. p. 11. f. 729.
— — *Küster* p. 32. t. 4. f. 14—16.
— *Savi Charp.?*
— *nana Mühlf.* Mus.
— — *Pot.* et *Mich.* gal I. p. 169. t. 17. f. 3. 4. (an secale var.?)
Torquilla humilis Beck ind. p. 85. N. 4?

Habitat in insula Capri (Phil.), prope Pisa (Charp., Rm.), rarius in Dalmatia et Montenegro (Parr., Küster).

Obs. 1. Cantraine Bulimum rupestrem Phil. (conf. p. 310.) hujus speciei testis junioribus constitutum errore asserit.

Obs. 2. Conf. P. Mühlfeldtii Küst. Nr. 78.

115. P. sardoa Cantraine. †

T. parva, ovato-cylindrica, subumbilicata, costulato-striata, corneo-fusca; anfr. 7 convexi; apertura semiovata, 5-plicata: plica

*) T. fusiformis umbilicata; anfr. 6—6½ valde convexis, teretibus, longitudinaliter exacte strigato-costulatis; fusca, sericina; apertura ovata, intus 5 plicata; perist. subreflexo, acuto. — Alt. 2‴; lat. ⅓ — ½‴. (Roth l. c.)

**) T. ovato-conica, acutiuscula, rimata, costulato-striata, nitida, fusca; anfr. 7 convexis; apertura semiovata, subcoarctata, 5 plicata: pl. columellar. 2 valde inaequalibus, inferna minima, 2 in labro, una parietali; perist. reflexiusculo. — Alt. 2, diam ⅗‴. (Cantr. l. c.)

unica in columella sicut in pariete, 3 in labro, quarum infera majore; perist. reflexiusculum. — Alt. 2, diam. $^2/_3$‴. (C.)

Pupa sardoa Cantr. Malac. médit. p. 142.

Habitat in Sardinia.

Obs. «Affinis P. occultae et Philippii.»

§. 18.

116. P. anglica (Vertigo) Férussac.

T. perforata, globoso-conica, solidula, vix striatula, pellucida, nitidissima, castanea; spira obtusa; anfr. 7 planiusculi, ultimus basi antice subcompressus; apertura subsemicircularis, 5-plicata: plica angulari 1 valida, flexuosa, parietali 1 immersa, columellaribus 2 (supera longa, infera minutissima), palatali 1 basali longissima; perist. carneo-labiatum, expansiusculum, margine dextro superne sinuoso, infra sinum incrassato. — Long. 4, diam. 2 mill. Ap. vix 1 mill. longa. (Coll. Nr. 72.)

Vertigo anglica Fér. pr. 8. p. 64.
— — *Turt.* Man. p. 102.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 195. t. 20. f. 1. 2.
Turbo sexdentatus Mat. et *Rack.* cat. 55? (Fér.)
— *anglicus Wood* suppl. t. 6. f. 12.
Pupa ringens Jeffr. in Linn. trans. XVI. p. 356?
— *anglica* (Lauria) *Gray* Man. p. 195. t. 7. f. 82. (excl. plur. synon.)
— — *Morelet* moll. du Port. p. 75.

Habitat in Britannia: Northumberland, Lancashire; in Lusitania (Mor.) et in Algeria (teste Dupuy in coll. Philippiana),

Obs. Conf. P. antivertigo (Nr. 144.), Venetzii (Nr. 149.) etc.

§. 19.

117. P. elegantula Pfr.

T. breviter rimata, subcylindracea, apice obtusa, laevigata, nitida, hyalina; anfr. 7 planiusculi, ultimus praecedente paulo angustior, extus medio sulcatus, intus lamellis 2 validis, suturae parallelis, plicaque profunda columellae parallela munitus; apertura subsemicircularis, lamella parietis aperturalis intrante juxta insertionem marginis dextri coarctata; perist. expansiusculum, margine dextro flexuoso, medio subincrassato. — Long. $6^2/_3$, diam. 3 mill. Ap. 2 mill. longa et lata. (Mus. Cuming.)

Pupa elegantula Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 115.

Habitat . . . ?

Obs. Species persingularis, Streptaxis nonnullis speciebus habitu similis, tamen ob affinitatem cum sequentibus Pupae adnumeranda. Forma subirregularis, similiter ac in P. pagoda.

§. 20.

118. **P. Wahlbergii Krauss.**

T. arcuato-rimata, oblongo-ovata, glaberrima, nitida, pellucida, virenti-hyalina, apice obtuse conoidea; anfr. 8 planiusculi. 2 ultimi celeriter accrescentes, ultimus attenuatus, basi compressus, antice biscrobiculatus; apertura subtriangulari-semicircularis, intus 5-dentata: plica angulari 1 lamelliformi, intrante, columellari 1 profunda, palatalibus 3 prominentibus, subaequalibus; perist. albidum, reflexum, marginibus divergentibus, utroque sinuato. — Long. 9, diam. medio 5 mill. Ap. $3\frac{1}{2}$ mill. longa, $2\frac{2}{3}$ lata. (Coll. Krauss.)

Pupa Wahlbergii Krauss mss.

Habitat ad Natal Africae meridionalis.

119. **P. bicolor Hutton.**

T. rimata, cylindrico-turrita, laevigata, nitida, lutescenti-hyalina; spira elongata, apice obtusa; sutura subtiliter crenulata; anfr. 7 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis vix attingens, plicatulus, latere dextro et basi scrobiculatus; apertura semiovalis, dentibus 4 coarctata: dente 1 pliciformi ad insertionem labri, secundo triangulari in margine dextro, tertio minore in basi, quarto profundo, linguiformi ad columellam; perist. breviter expansum, nitidum, album, marginibus disjunctis, dextro superne sinuoso. — Long. 7, diam. $2\frac{1}{4}$ mill. Ap. 2 mill. longa, $1\frac{2}{3}$ lata. (Coll. Nr. 73.)

Pupa bicolor Hutt. in Journ. As. Soc. III. p. 86. *)

— — *Küster* p. 95. t. 13. f. 9. 10.

— *Largillierti Phil.* in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 165.

Habitat in India orientali: Mirzapoor (Hutt.); in insula Bourbon (Largilliert).

120. **P. Pfeifferi Krauss.**

T. rimata, cylindrica, solidula, confertim costulato-striata, alabastrina; spira sursum incrassata, apice rotundata; anfr. 7—8 convexiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis aequans, latere profunde, basi subtiliter scrobiculatus; apertura subsemicircularis, 4-dentata: dente 1 lamelliformi juxta insertionem labri, 1 triangulari in latere dextro, tertio in basi, quarto in columella; perist. sublabia-

*) Shell thin, vermilion-coloured when living, but diaphanous and colourless when cleared of the animal, cylindrical, obtuse at the summit; whorls 7—8; aperture rather subquadrate, with 4 teeth and corresponding indentations externally; length about 3 lines, margins of the mouth reflected. (Hutt. l. c.)

tum, breviter reflexum, marginibus disjunctis. — Long. 5½, diam. 2⅓ mill. Ap. 1⅔ mill. longa et lata. (Coll. Nr. 74.)

Pupa Pfeifferi Krauss in *Küst.* Pupa p. 87. t. 12. f. 17—19.
β. T. distinctius costulata, miniato-variegata:
Pupa miniata Krauss in litt.

Habitat ad Zoetendals Valley, distr. Zwellendam Prom. bonae spei (Krauss).

§. 21.

121. P. Rossmässleri Schmidt.

T. flexuoso-rimata, e basi globosa conica, costulato-striata, diaphana, lutescenti-cornea; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans, inflatus, basi subcompressus, antice subconstrictus; apertura semicircularis, 7-dentata: dentibus 2 lamelliformibus in pariete aperturali, 2 minutis approximatis in margine dextro, 3 majoribus in basali et columellari; perist. tenue, albidum, breviter expansum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 5, diam. max. 3½ mill. Ap 2¼ mill. longa et lata. (Coll. Nr. 75.)

Pupa Rossmässleri Schmidt mss. (Conf. syst. Verz. p. 14.)
— — *Rossm.* X. p. 27. f. 644.
— — *Küster* p. 16. t. 2. f. 13—15.

Habitat in Carniolia (monte Nanas: Schmidt), et in provincia Austriae littorali (prope Caporeto in valle Isontii)!

Obs. Tentacula superiora prope apicem subfracta et incrassata apparent: Schmidt l. c.

122. P. Kokeilii Rossmässler.

T. aperte umbilicata, conica, tenuis, subtiliter striata, sericina, fusco-cornea vel hyalina; spira conica, acutiuscula; anfr. 7 convexi, ultimus ⅓ longitudinis vix superans, antice valde ascendens; apertura rotundata, multidentata: dentibus 2 lamelliformibus in pariete aperturali et 4 majoribus (interjectis pluribus minoribus) in margine peristomatis; perist. vix expansum, albidum, marginibus callo albido junctis. — Long. 4, diam. max. 3 mill. Ap. 1¾ mill. longa, 1½ lata. (Coll. Nr. 76.)

Pupa Kokeilii Rossm. V. p. 18. f. 335.
— — *Küster* p. 16. t. 2. f. 16—19.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 14.
Torquilla Kokeilii Beck ind. p. 86. N. 16.
Helix Moricandi (Cochlodonta) *Fér.* pr. 480.

Helix Moricandi Moric. Mém. 3^e^ suppl. p. 60.

Habitat in Carniolia: circa Laibach et in monte Loibl (Rossm., Schmidt), prope Idria (Moricand).

Obs. Hanc speciem esse H. Moricandi Fér. (nunquam descriptam), a se 1812 prope Idria Carnioliae detectam, asserit Cl. Stephano Moricand l. c.

§. 22.

123. P. bigranata Rossmässler. †

T. minutissime perforata, pygmaea, ovali-cylindrica, opaca, fusca; anfr. 6—7; apertura semiovata, bidentata: dente 1 in pariete aperturali, altero in palato; perist. sejunctum, in limbum subtilissimum reflexum; cervix callo cincta. — Alt. 1½, lat. ¾‴. (Rm.)

Pupa bigranata Rossm. X. p. 27. f. 645.
— — *Hartm.* Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 176. t. 61.

Habitat in Saxonia? (Rm.), Hauteville prope Neuchâtel (Hartmann.)

124. P. nodosaria Orbigny. †

T. pupoideo-oblonga, subumbilicata, tenuis, laevigata, fulvo-brunnea; spira inflata, truncata; anfr. 6; apertura ovalis, bidentata; labrum latum, reflexum; sutura profunda. — Long. 2, lat. 1 mill. (O.)

Helix nodosaria (Cochlodon) *Orb.* syn. p. 22.
Pupa nodosaria Orb. voy. p. 322. t. 41 bis. f. 12—14.

Habitat in provincia Lagunacensi Boliviae.

125. P. triplicata Studer.

T. subperforata, ovata, tenuis, subtilissime striatula, sericina, fulva; spira supra medium ventrosa, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexi, ultimus antice subconstrictus; apertura lunato-rotundata, tridentata; dente 1 profundo in pariete aperturali, 1 minuto in columella, tertio in palato (extus scrobiculum leve formante); perist. tenue, reflexiusculum. — Long 3, diam. 1⅔ mill. Ap. vix 1 mill. longa. (Coll. Nr. 77.)

Pupa triplicata Stud. Verz. p. 89.
— — (Sphyradium) *Charp.* cat. d. moll. de la Suisse p. 16. t. 2. f. 6.
— — *Rossm.* V. p. 14. f. 324.
— — *Küster* p. 15. t. 2. f. 11. 12.
— *tridentalis Mich.* compl. p. 61. t. 15. f. 28—30.
— — *Lam.* ed. Dh. 52. p. 192.
Helix triplicata (Cochlodonta) *Fér.* pr. 476.
Pupilla triplicata Beck ind. p. 84. N. 12.

Torquatella triplicata Held in Isis 1837. p. 919.

Habitat in Helvetia, Gallia, Illyria (in monte Loibl: Rossm.), Hispania (Graells).

126. P. curta Anton.

T. anguste umbilicata, abbreviato-cylindrica, minutim striata, epidermide fusca induta; anfr. 4½ convexi; apertura denticulis 3 lamelliformibus coarctata; perist. subsimplex, margine dextro impresso. — Long. 2, diam. 1⅕ mill. (Coll. Anton.)

Pupa curta Anton Verz. p. 47. N. 1731.

— *annaaensis Pfr.* Symb. II. p. 125.

Alaea Annaaensis Beck ind. p. 85. N. 7. (Anton in litt.)

Habitat in Chile (Anton).

127. P. miliola Orbigny. †

T. oblonga, brevis, subumbilicata, crassa, laevigata, albida; spira brevis, inflata, apice obtuso, truncato; anfr. 6; sutura profunda; apertura subrotunda, tridentata; labrum latum, subreflexum. — Lat. 2, long. 4 mill.? (O.)

Helix miliola (Cochlogena) *Orb.* syn. p. 17.

Pupa miliola Orb. voy. p. 323.

Habitat in Brasilia.

128. P. fontana Krauss.

T. profunde rimata, cylindraceo-ovata, tenuis, sublaevigata, cornea, sericina, apice conoidea; anfr. 6 convexiusculi; apertura rotundata, intus 4-dentata: dentibus profundis, 1 in pariete aperturali, 1 ad columellam, 2 brevibus lamelliformibus in palato, superiore extus sulcum formante; perist. tenue, reflexum, marginibus conniventibus, dextro superne arcuato. — Long. 3, diam. 1⅔ mill. Ap. ⅘ mill. longa. (Coll. Nr. 78.)

Pupa fontana Krauss mss.

Habitat ad fontem fluvii Moie Africae meridionalis.

Obs. Persimilis P. triplicatae.

129. P. Shuttleworthiana Charpentier.

T. profunde rimata, ovata, striatula, nitida, pellucida, lutescenti-cornea; spira sensim attenuata, obtusissima; anfr. 5 convexiusculi, ultimus juxta rimam subcompressus; apertura semiovalis, quadridentata: dente 1 compresso, intrante in pariete aperturali, columellari 1 acuto, palatalibus 2 brevibus; perist. album, margine dextro subsinuato, brevissime expanso, columel-

lari paulo latiore, patente. — Long. 2, diam. 1¼ mill. Ap. ⅔ mill. longa. (Coll. Küster.)

Pupa Shuttleworthiana Charp. mss.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 148.

Habitat prope Bex Helvetiae.

130. P. tenuidens Adams. †

« P ovatae Say affinis, et magnitudinis ejusdem; apertura supra dente magna lamelliformi intus producta, infra altera simili, minore, opposita; duobus alteris, una utrinque, oppositis. » (Ad.)

Pupa tenuidens Adams in Bost. Proc. 1845. p. 15.

Habitat in insula Jamaica.

131. P. marginalba Pfr.

T. breviter rimata, subperforata, oblongo-ovata, tenuis, nitida, cornea; spira subturrita, apice obtusiuscula; anfr. 5 convexi; apertura subrotundata, 4-dentata: dente 1 in pariete aperturali, 1 in columella, 2 callosis in palati infera parte; perist. album, breviter expansum, marginibus callo tenui junctis. — Long. 2½, diam. 1⅓ mill. Ap. ¾ mill. longa. (Coll. Nr. 79.)

Pupa marginalba Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 253.
— — *Küster* p. 89. t. 12. f. 22. 23.

Habitat in insula Cuba.

Obs. Specimina a meis omnino non distinguenda in insula Taiti legit H. Cuming.

132. P. minuta Say.

T. vix rimata, cylindracea, nitida, pellucida, cornea; spira apice obtusa; anfr. 6 convexiusculi, ultimus basi subcompressus; apertura subsemicircularis, 4-dentata: dentibus subaequalibus, 1 parietali, 1 columellari, 2 palatalibus; perist. expansum, sublabiatum, marginibus disjunctis, dextro superne arcuato. — Long. 2⅔, diam. 1¼ mill. Ap. oblique ¾ mill. longa. (Coll. Nr. 80.)

Pupa minuta Say teste Parreyss.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 54.
— *gibbosa Say* (in Mus. Cuming.)

Habitat in Pennsylvania.

Obs. An forte varietas P. procerae Nr. 141?

133. P. contracta Say.

T. rimato-perforata, ovato-conica, subtilissime striata, tenuissima, hyalina; spira conica, acutiuscula; anfr. 5½ convexi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi compressus, gibbus; apertura subrotunda, coarctata: plica 1 magna, curvata, parietali,

secunda valida, columellari, dentibusque 2 palatalibus; perist. simplex, expansum, marginibus callo subsoluto junctis. — Long. 3, diam. 1⅔ mill. Ap. 1 mill. longa. (Coll. Nr. 81.)

Pupa contracta Say in Philad. journ. II. P. 2. p. 374. *)
— — *Gould* in Bost. journ. III. p. 399. t. 3. f. 22.
— — *Gould* report p. 186. f. 117.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 54.
— — *Küster* p. 96. t. 13. f. 16—18.

β? Pupa corticaria Pfr. Symb. II. p. 54.

Habitat in Virginia (Say), Massachusetts (Gould).

Obs. Cl. Say hanc speciem ad genus Carychium referendam putat.

§. 23.

133ª. **P. squalina Rossmässler.**

T. rimato-subperforata, turrito-oblonga, solida, striata, opaca, fusco-cornea; spira apice obtusiuscula; anfr. 7½ convexi; apertura semiovalis, 5—6-dentata: dente 1 exiguo juxta insertionem marginis dextri, secundo elongato, intrante, parietali, 2 columellaribus, 2 in margine dextro; perist. expansiusculum, intus crasse albo-labiatum. — Long. 6½, diam. 2½ mill. Ap. 2 mill. longa, 1½ lata. (Coll. Rossm.)

Pupa squalina Rossm. mss.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 7.

Habitat prope Brussa Natoliae (Frivaldsky).

134. **P. armifera Say.**

T. rimata, ovata, striatula, nitidula, pellucida, hyalina; anfr. 6—6½ convexiusculi, summi 4 conum acutiusculum formantes, ultimus basi subcompressus; apertura truncato-ovalis, coarctata: plica parietali 1 (subangulari, medio emarginata, in fundo elevatiore), columellari 1 valida, subtriangulari, palatalibus 3—4 inaequalibus; perist. simplex, vix expansiusculum, marginibus disjunctis. — Long. 4⅔, diam. 2⅔ mill. Ap. 1⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 82.)

Pupa armifera Say in Philad. journ. II. P. 1. p. 162. **)

*) Shell dextral, short, subovate, white; apex obtuse; whorls 5; umbilicus distinct; aperture irregularly orbicular, complete, the lamina of the labium being elevated above the surface of the preceding whirl and joining the extremities of the labia; labium with a large, elongated, prominent tooth, which is concave on the side towards the labrum; labrum bidentate; a large tooth or fold far within the throat, caused by the fold of the umbilicus; throat much contracted by the large tooth of the labrum into the form of a horse shoe. — Total length less than $^1/_{10}$ of an inch. (Say l. c.)

**) Shell dextral; oblong-oval or somewhat obtusely fusiform; suture distinct; whirls 6, obsoletely wrinkled; aperture longitudinally subovate; ex-

Pupa armifera Gould in Bost. journ. III. p. 400. t. 3. f. 10.
— — *Küster* p. 57. t. 7. f. 17—19.
— *armigera Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 159. t. 16. f. 1. 2.
— *rupicola Pfr.* Symb. II. p. 55. (e specim. ex America hoc nomine missis.)

β. Peristomatis marginibus lamina elevata junctis:
Pupa armifera Pfr. Symb. II. p. 53.

Habitat in America boreali: Pennsylvania, Missouri.

Obs. Variat dentibus palatalibus nonnullis obsoletis vel deficientibus.

135. P. rupicola Say. †

T. a basi ad apicem obtusum sensim attenuata, alba, laevigata; anfr. 6; sutura profunda; labium bidentatum; labrum tridentatum. — Long. $^1/_{10}$ poll. (S.)

Pupa rupicola Say in Philad. journ. II. P. 1. p. 163. *)
— — *Gould* in Bost. journ. IV. p. 355. t. 16. f. 13.

Habitat in Florida orientali.

136. P. Gouldii Binney.

T. breviter rimata, ovato-cylindrica, tenuis, laevigata, nitida, castaneo-cornea; spira apice obtusa; anfr. 5 convexi, ultimus basi rotundatus; apertura semiovalis, 5-dentata: dente 1 linguiformi, magno in pariete aperturali, 2 minutis in columella, 2 mediocribus in palato; perist. tenue, expansiusculum. — Long. 2, diam. 1 mill. Ap. $^2/_3$ mill. longa. (Coll. Nr. 83.)

Pupa Gouldii Binn. in Proc. Bost. Soc. 1843. p. 105.
— — *Gould* in Bost. journ. IV. p. 352. t. 16. f. 9. **)

Habitat in America boreali: Newyork, Baltimore, Cambridge, etc.

---

terior lip reflected, but not flattened, interrupted above by the penultimate whirl, and with 5 teeth, of which the superior one, and that which precedes the basal one, are smallest; labrum with an undulated lamelliform tooth, its anterior extremity little elevated, but elongated, so as to join the superior extremity of the exterior lip. — Length $^3/_{20}$ of an inch. (Say l. c.)

*) Shell dextral, attenuated to an obtuse apex, white; whorls 6, glabrous; suture deeply impressed; labium bidentate; superior tooth lamiform, emarginate in the middle, and at the anterior tip obsoletely uniting with the superior termination of the labium; inferior tooth placed upon the columella, and extending nearly at a right angle with the preceding; labrum tridentate, teeth placed somewhat alternately with those of the labium, inferior tooth situated at the base and immediately beneath the inferior tooth of the labium. — It is about the size of P. corticaria, and considerably resembles that species, etc. (Say l. c.)

**) T. minuta, ovato-cylindrica, subcastanea; anfr 4 et pluribus, apice obtuso; apertura subcordata, bilobata, dentibus 5 armata; labro subreflexo. — Long. $^1/_{14}$, lat. $^1/_{26}$ poll. (Gould l. c.)

137. P. pentodon (Vertigo) Say.

T. subperforata, ovato-conica, apice obtusiuscula, subtilissime striatula, pellucida, corneo-albida; anfr. $4\frac{1}{2}$—5 convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura subsemicircularis, 5—8-dentata: dente 1 parietali, 1 transverso columellari (saepe adstante minore), palatalibus 3—5; perist. simplex, expansiusculum. — Long. 2, diam. 1 mill. Ap. $\frac{2}{3}$ mill. longa. (Coll. Nr. 84.)

Vertigo pentodon Say in Philad. journ. II. P. 2. p. 376. *)

Pupa Tappiana Ward, Adams in Sillim. journ. XL. Suppl.

— — *Pfr.* Symb. II. p. 55.

— *pentodon Gould* in Bost. journ. IV. p. 353. t. 16. f. 10. **)

β. Dentibus usque 9, parietali et basali maximis, incurvis.

Pupa curvidens Gould report p. 189. f. 120. ***)

— *pentodon β Gould* in Bost. journ. IV. p. 353. t. 16. f. 11.

Habitat in America boreali: Pennsylvania, Massachusetts, Vermont.

138. P. carinata Gould. †

T. minima, ovato-conica, luteo-cornea; anfr. 5 laeves, subcarinati, ultimus acute carinatus; sutura profunda; apertura ampla, oblique semiovalis, dentibus 5 instructa, quorum major posticus, torsus et bifurcatus, 2 ad columellam, 1 in faucem et 1 in labrum positi; perist. late et inaequaliter reflexum; umbilicus minimus. — Long. 0,08, lat. 0,05 poll. (G.)

Pupa carinata Gould in Bost. journ. 1842. IV. Nr. 1.

Habitat in America boreali: Maryland.

139. P. Schultzii Philippi.

T. rimata, subcylindrica, tenuis, glabra, nitida, fulva; spira sensim attenuata, apice obtusa; anfr. $5\frac{1}{2}$ perconvexi; apertura lunato-rotundata, 5-dentata: dente 1 compresso in pariete aperturali, 1 in columella, 3 in palato profundis, infimo minimo;

---

*) Shell dextral, subovate, whitish horn-colour; apex obtuse; whorls 5, glabrous, convex; suture not very deeply impressed; aperture semioval; labium two-toothed, of which a single very prominent one is on the middle of the transverse portion or true labium, and the other is remote, much smaller, and placed in the basal angle of the columella; labrum regularly arquated, tridentate, tooth nearest the base very small and placed near the smaller tooth of the columella, the two others larger, subequal; umbilicus distinct. — Length less than $\frac{1}{10}$''. (Say l. c.)

**) T. ovato-oblonga, albida, umbilicata; anfr. 5 convexis, apice subacuta; apertura oblique semiovata, dentibus 5—8 instructa, quorum 1—2 postice, 2 ad columellam, 2—5 ad labrum positis; labro expanso. — Long. vix $\frac{1}{10}$ poll. (Gould l. c.)

***) Shell elongated-ovate, obtuse at apex, smooth; whorls 5; aperture subtriangular, armed with 9 teeth, the two largest of which are curved; lip white, broadly everted; umbilicated. Length $\frac{1}{13}$, breadth $\frac{1}{10}$ inch. (Gould l. c.)

perist. expansiusculum, margine dextro arcuato, columellari patente. — Long. 2½, diam. 1⅓ mill. Ap. ¾ mill. longa. (Coll. Philipp.)

Pupa Schultzii Phil. in Zeitschr. f. Mal. 1844. p. 106.
— — *Küster* p. 93. t. 13. f. 3. 4.

Habitat prope Palermo Siciliae.

140. P. pellucida Pfr.

T. subperforata, cylindracea, tenuis, pellucida, nitida, pallide flavida; spira parum attenuata, apice obtusa; anfr. 5 convexi, ultimus praecedente planior; apertura semiovalis, 5-dentata: dentibus singulis validis in pariete aperturali et columella, 2 mediocribus in margine dextro, quinto minimo in basi palati; perist. simplex, margine dextro expanso, columellari reflexo. — Long. 2, diam. vix 1 mill. Ap. vix ⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 85.)

Pupa pellucida Pfr. Symb. I. p. 46.
— — *Küster* p. 89. t. 12. f. 24. 25.

Habitat in insula Cuba.

Obs. Interdum denticulus quartus palatalis adest.

141. P. procera Gould. †

T. cylindracea, elongata, apice obtusa; anfr. 6 convexi, oblique striati; apertura semiovalis, dentibus 6 armata, quorum posterior emarginatus. — Long. 1/10, diam. 1/30″. (G.)

Pupa procera Gould in Bost. Journ. III. p. 401. t. 3. f. 12.
— — *Küster* p. 58. t. 7. f. 20. 21.

Habitat in America boreali: Baltimore.

142. P. servilis Gould. †

T. ovato-elongata, glabra, rufescens, umbilicata; anfr. 5 convexi; apertura semielliptica, dentibus 5 armata, quorum unus contortus postice, unus ad basin, 2 ad labium affixi; labrum reflexum. — Long. 1/10, diam. 1/20″. (G.)

Pupa servilis Gould in Bost. journ. IV. p. 356. t. 16. f. 14.

Habitat in insula Cuba: Santa Cruz (Griffiths), Matanzas (Bartlett).

143. P. ovata (Vertigo) Say.

T. subperforata, ovata, glabriuscula, nitida, fusco-cornea; spira apice obtusiuscula; anfr. 5 — 5½ convexi, ultimus latere impressus; apertura semiovalis, multidentata: dentibus 2 — 3 parietalibus (medio maximo, sinistro saepe deficiente), columellaribus 1 — 2, palatalibus 2 profundis; perist. intus rufulum, ex-

pansiusculum, margine dextro flexuoso. — Long. 3, diam. 1½ mill. Ap. 1 mill. longa. (Coll. Nr. 86.)

Vertigo ovata Say in Philad. journ. II. P. 2. p. 375.*)
Pupa ovata Adams in Sillim. journ. XL. p. 271.
— — *Gould* in Bost. journ. IV. p. 351. t. 16. f. 7. 8.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 54.
— *modesta Say* in Long's sec. exped. App. II. 259. t. 15. f. 5.
— — *Gould* report p. 188. f. 119.
— *ovulum Pfr.* Symb. I. p. 46.
— — *Küster* t. 14. f. 1. 2.

Habitat in America boreali: Pennsylvania, Massachusetts; prope Veracruz (Hegewisch).

144. P. antivertigo Draparnaud.

T. rimata, ovata, laevigata, splendida, castaneo-fulva; spira subconica, obtusiuscula; anfr. 5 planiusculi, penultimus convexior, ultimus pone aperturam tumidus, subcristatus, extus impressus; apertura oblique subcordata, 7-dentata: dentibus parietalibus 2, columellaribus 3, palatalibus 2 sublamelliformibus; perist. vix expansiusculum, marginibus callo tenui junctis, dextro angulatim producto. — Long. 2⅓, diam. fere 1½ mill. Ap. ⅔ mill. longa. (Coll. Nr. 87.)

Pupa antivertigo Drap. tabl. d. moll. p. 57. N. 3.
— — *Drap.* hist. p. 60. t. 3. f. 32. 33.
— — *Lam.* ed. Dh. 51. p. 192.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 74.
— *vertigo α* et *γ Hartm.* in Neue Alpina I. p. 219.
— *octodentata Hartm.* ibid.
— *sexdentata Flem.* brit. anim. p. 268?
Turbo sexdentatus Mont. p. 337. t. 12. f. 8?
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 879.
Vertigo septemdentata Fér. pr. 7. p. 64.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 18.
— — *Rossm.* X. p. 28. f. 647.
— *octodentata Stud.* Verz.
— *sexdentata C. Pfr.* I. p. 71. t. 3. f. 43. 44.

*) Shell dextral, subobovate, brown; apex obtuse; whorls 5, glabrous; suture not very deeply impressed; body whorl indented near and upon the labrum; apertura semioval; labium five-toothed, of which three are situate on the transverse portion of the lip, parallel to each other, equidistant, the superior and inferior ones being small, the latter sometimes obsolete, the intermediate one lamelliform, prominent, and the two others situate on the columella, approximate, extending at right angles to the three preceding ones, the superior one oblique and smaller; labrum reflected, but not flattened, bidentate, teeth lamelliform, prominent; umbilicus distinct. — Length less than 1/10, breadth nearly 1/20 inch. (Say l. c.)

Vertigo sexdentata Wagn. in Chemn. XII. p. 175. t. 235. f. 4124.
— *antivertigo Mich.* compl. p. 72
— — *Graells* cat. mol. Esp. p. 7.
— *palustris Leach* moll. p. 128. t. 8. f. 10.
— — *Gray* Man. p. 204. t. 7. f. 85!
Alaea palustris Jeffr. in Linn. trans. XVI. p. 360.
— *antivertigo Beck* ind. p. 85. N. 2.
Stomodonta antivertigo Mermet moll. pyr. p. 54. N. 16.
β? Minor:
Pupa pusilla Bivon. fil. Monogr. p. 14. N. 9.
— — *Arad.* et *Magg.* cat. p. 131.*)

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Suecia, Lusitania; var. β? in Sicilia juxta flumen Oreto.

Obs. Saepe denticulus parvulus palatalis infra suturam, aliusque minutissimus infra dentem secundum palatalem observantur. Raro dentes 6 modo adsunt. — Differt a P. ovata Say praecipue anfractibus planioribus et peristomate angulatim producto.

145. P. milium Gould. †

T. minutissima, ovalis, castanea; anfr. 4 convexi, oblique striati; apertura cordata, dentibus 6 compressis armata, quorum 2 labio affixis. — Long. $^1/_{30}$, diam. $^1/_{40}$''. (G.)

Pupa milium Gould in Bost. journ. III. p. 402. t. 3. f. 23.
— — *Gould* report p. 187. f. 118.

Habitat in America boreali: Chelsea, Vermont.

Obs. Ex icone persimilis videtur praecedenti.

146. P. pygmaea Draparnaud.

T. subperforata, cylindraceo-ovata, laevigata, nitida, fulva; spira sensim attenuata, apice obtusa; anfr. 5 convexiusculi, ultimus antice tumido-subcristatus; apertura semiovalis, 5-dentata: dente parietali 1, columellaribus 2 (altero minimo), palatalibus 2; perist. albidum, expansum, marginibus callo tenui junctis. — Long. $2^1/_2$, diam. $1^1/_2$ mill. Ap. $^2/_3$ mill. longa. (Coll. Nr. 88.)

Pupa pygmaea Drap. tabl. d. moll. p. 57. N. 2.
— — *Drap.* hist. p. 60. t. 3. f. 30. 31.
— — *Flem.* brit. anim. p. 268.
— — *Lam.* ed. Dh. 49. p. 190.
— — *Dupuy* moll. du Gers. p. 41. N. 4.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 221.
— *quinquedentata* et *pygmea Hartm.* in Neue Alpina I. p. 219

*) T. valde parva, ovato-conica, apice obtusa, corneo-rufescente; anfr. 4 — 5 convexis, suturis impressis; apertura 6- vel 7 dentata, latere dextro sinuosa; margine reflexo. — Long. $^1/_2$ lin. (Ar. et Magg. l. c.)

Helix Isthmia cylindrica Gray in Medic. Repos. 1821. p. 239.
Vertigo quinquedentata } *Stud.* Verz.
— *quadridentata* }
— *pygmaea Fér.* pr. 5. p. 64.
— — *Mich.* compl. p. 71.
— — *C. Pfr.* I. p. 72. t. 3. f. 47. 48.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 176. t. 235. f. 4125.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 18.
— — *Gray* Man. p. 201. t. 7. f. 83.
— — *Rossm.* X. p. 29. f. 648.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 7.
— *vulgaris Leach* moll. p. 201.
Alaea vulgaris Jeffr. in Linn. trans. XVI. p. 359.
— *pygmaea Beck* ind. p. 85. N. 3.
Stomodonta pygmaea Mermet moll. pyr. p. 55. N. 17.
β. Magis cylindrica et leviter striata: long. $^1/_{10}$, lat. $^1/_{20}$ poll.
Vertigo alpestris Fér. mss. *Alder* in Mag. Zool. and Bot. II. p. 112.
— — *Gray* Man. p. 202. t. 12. f. 141.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia etc.; in Sicilia detexerunt Arad. et Magg. cat. p. 128.

147. P. substriata (Alaea) Jeffreys.

T. subperforata, breviter ovata, striata, subopaca, flavido-fusca; spira subconica, obtusiuscula; anfr. $4^1/_2$ convexiusculi, ultimus basi vix compressus; apertura oblique subpyriformis, 6-dentata: dentibus 2 parietalibus, 2 columellaribus, 2 palatalibus, plicaeformibus; perist. expansiusculum, margine dextro sinuoso, supra medium extus impresso. — Long. 2, diam. $1^1/_3$ mill. Ap. $^3/_5$ mill. longa. (Coll. Nr. 89. Spec. bavar.)

Alaea substriata Jeffr. in Linn. trans. XVI. p. 315.
Vertigo substriata Gray Man. p. 202. t. 7. f. 84. *)
— *curta Held* in Isis 1837. p. 304. **)

Habitat in Britannia: Suffolk, Preston, Newcastle (Gray) et in Bavaria (Held).

Obs. 1. Huic sectioni adnumerari possunt P. occulta Parr. (Nr. 112) et Philippii Cantr. (Nr. 114.)

Obs. 2. Conf. P. sphinctostoma Nr. 86 et monticola Nr. 87.

---

*) Shell subcylindrical, ventricose, shining, striated, yellow horn-colour; mouth orbicular lunate, rather sinuated, with two or three plaits on the pillar, and three on the outer lip. (Gray l. c.)

**) T. ovato-globosa, dextrorsa, flavido-fusca, concinne striata, subopaca; sutura profunda; apertura transverse pyriformi; perist. reflexo, intus 6 plicato; pliculis binis in marginibus et pariete aperturali; margine laterali subdepresso; anfr. $4^1/_2$. — Long. $^3/_4$, lat. $^1/_2$‴. (Held l. c.)

§. 24.

148. P. pusilla (Vertigo) Müller.

T. sinistrorsa, subperforata, ovata, subtilissime striatula, nitida, pellucida, corneo-lutea; spira sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 5 parum convexi, ultimus basi compressus, latere subtiliter scrobiculatus; apertura semiovalis, 6-dentata: dentibus 2 parietalibus, 2 columellaribus acutis, 2 palatalibus e callo transverso exeuntibus; perist. tenue, vix reflexiusculum. — Long. 2, diam. 1 mill. Ap. $^2/_3$ mill. longa. (Coll. Nr. 90.)

Vertigo pusilla Müll. verm. II. p. 124. N. 320.
— — *Fér.* pr. 10. p. 65.
— — *Mich.* compl. p. 72.
— — *C. Pfr.* I. p. 72. t. 3. f. 45. 46.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 177. t. 235. f. 4126.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 18
— — *A. Müller* in Wiegm. Arch. 1838. I. p. 211. t. 4. f. 5.
— — *Beck* ind. p. 84. N. 1.
— — *Porro* Malac. p. 68.
— — *Rossm.* X. p. 29. f. 649.
— — *Gray* Man. p. 205. t. 7. f. 86.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 293.
Helix vertigo Gmel. p. 3664. N. 155.
Pupa vertigo Drap. tabl. d. moll. p. 57. N. 4.
— — *Drap.* hist. p. 61. t. 3. f. 34. 35.
— — *Flem.* brit. anim. p. 272.
— — *Lam.* ed. Dh. 50. p. 191.
— — *β Hartm.* in Neue Alpina I. p. 219.

Habitat passim in Germania (Hassia, Borussia, Saxonia etc.), Helvetia, Gallia, Britannia, Suecia.

Obs. Denticuli aperturae accessorii sicut in P. antivertigine interdum observantur. Attamen ex toto habitu et formatione labri, colore etc. pro varietate sinistrorsa illius haberi non potest.

149. P. Venetzii (Vertigo) Charpentier.

T. sinistrorsa, subrimata, ovata, striata, fulva; spira superne conica, obtusiuscula; anfr. $4^1/_2$—5 vix convexiusculi, ultimus basi compresso-gibbus, latere sulcatus; apertura subcordato-triangularis, 4-dentata: dentibus 2 parietalibus, 1 columellari, obliquo (lamellae Clausiliarum inferae simili), 1 plicaeformi elongato palatali; perist. reflexiusculum, margine sinistro angulatim producto. — Long. vix 2, diam. vix 1 mill. Ap. $^3/_5$ mill. longa. (Coll. Nr. 91.)

Vertigo Venetzii Charp. Fér. pr. 11. p. 65.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 18. t. 2. f. 11.
— — *Rossm.* X. p. 30. f. 650.

Vertigo hamata Held in Isis 1837. p. 304. *)
— *plicata A. Müller* in Wiegm. Arch. 1838. I. p. 210. t. 4. f. 6. **)
— *angustior Jeffr.* in Linn. trans. XVI. p. 361?
— — *Gray* Man. p. 205 ***) absque figura?
— — *Beck* ind. p. 84. N. 2?
Turbo vertigo Mont. test. brit. p. 363. t. 12. f. 6?
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 880?

Habitat passim in Germania, Helvetia (teste Rossmässler frequentior praecedente); in Britannia?

§. 25.

150. P. maculosa Lamarck. †

T. cylindracea, attenuato-acuta, pallide cornea, apice rufa, maculis fulvis longitudinalibus sparsis picta; apertura [in fundo] quadridentata; labrum tenue, margine reflexo. — Long. 5¼ lin. (Lam.)

Pupa maculosa Lam. 11. p. 107. ed. Dh. p. 173.
— — *Blainv.* in Dict. sc. nat. tome 28. p. 97.
— — *Webb* et *Berth.* syn. p. 321.
— — *Orb.* canar. p. 74.

Habitat in insula Teneriffa (Maugé).

Obs. Cl. Anton (Verz. p. 47. N. 1746.) hanc speciem cum P. inflata Wagn. (brasiliensi) eandem esse suspicatur.

* *
*

151. P. sulculata (Jaminia) Risso. †

T. inflata, glabra, nitida, subpellucida; anfr. 9 lineolis obliquis sculpti; peritrema eburneum, postice ad dextram dente 1, ad dextram lamellis 3 inaequalibus, antice lamella 1 valde elongata, ad sinistram lamella angusta, tuberculisque 2 inaequalibus armatum; epidermis testacea. — Long. 0,007. (R.)

Jaminia sulculata Risso IV. p. 90. N. 207.

Habitat circa Nizza.

---

*) T. ovata, sinistrorsa, fusca; sutura profunda; cervice cum oris margine laterali perdepressa; apertura transverse cordata; peristom. reflexo; palato plica ornato longa, recurvata; pariete aperturali 2 plicato; anfr. 5. — Long. ⅞, lat. ½ lin. — Bavaria. (Held l. c.)

**) T. sinistrorsa, ovali, striata, labro profunde plicato; apertura inde coarctata, labio dente majori, columella minoribus 2 instructa; anfr. 6. (Müll. l. c.)

***) Shell ventricose, barrel-shaped, pale fulvous, very slightly and sharply striated; whorls 4 or 5, last broad; mouth subtriangular; teeth 4 or 5, two on the column and 2 or 3 on the outer lip; peristome rather thickened. (Gray l. c.)

152. P. trilamillata (Jaminia) Risso. †

T. inflata, glabra, nitida, subpellucida; anfr. 9, lineolis obliquis antiquatis sculpti; peritrema eburneum, ad sinistram lamellis 2 inaequalibus elongatis et postice 1 elongata instructum; epidermis fuscescens. — Long. 0,006. (R.)

Jaminia trilamillata Risso IV. p. 91. N. 208.

Habitat circa Nizza.

153. P. quinquelamellata (Jaminia) Risso. †

T. glabra, nitida, pellucida; anfr. 10, striolis obliquis curvatis sculpti; peritrema eburneum, postice lamellis 3 inaequalibus, antice lamellis 2 aequalibus armatum; epidermis testacea. — Long. 0,012. (R.)

Jaminia quinquelamellata Risso IV. p. 91. N. 210.

Habitat circa Nizza.

154. P. septemdentata (Jaminia) Risso. †

T. glabra, nitida; anfr. 8, lineolis obliquis elevatis sculpti; apertura multidentata; epidermis brunneo-purpurascens. — Long. 0,006. (R.)

Jaminia septemdentata Risso IV. p. 91. N. 211.

Habitat circa Nizza. (« Bois du Var. »)

155. P. heptodonta (Jaminia) Risso. †

T. glabra, nitida; anfr. 11, lineolis obliquis impressis sculpti; apertura septemdentata; epidermis fuscescens. — Long. 0,009. (R.)

Jaminia heptodonta Risso IV. p. 92. N. 212.

Habitat circa Nizza.

156. P. multidentata (Jaminia) Risso. †

T. glabra, nitida; anfr. 10, lineolis obliquis transversalibus sculpti; apertura multidentata; epidermis fusca. — Long. 0,007. (R.)

Jaminia multidentata Risso IV. p. 92. N. 213.

Habitat circa Nizza.

Obs. 1. Pupa exigua Say (Philad. journ. II. p. 375.) ad Carychia certo referenda est. Conf. Pfr. in Wiegm. Arch. 1841. I. p. 224.

Obs. 2. Num species a Risso in genere Saraphia incomplete descriptae, huc pertineant, plane ignoro.

SPECIES,

QUARUM NONNISI NOMINA MIHI INNOTUERUNT.

Pupa

acina (Helix) *Fér.* pr. 482.
binotata Stentz, Villa disp. p. 23. — Ins. St. Thom.
brasiliensis (Hel.) *Fér.* pr. 492. (Mawe trav. of Bras. t. 5. f. 6.) — Cyclodontina Beck p 88. N 8.
cancellata (Hel.) *Fér.* pr. 461.
canistrum (Cyclodontina) *Beck* p. 88. N. 12. (Guinea.)
capillaris Beck p. 82. N. 3. (Antill.)
cerealis Zgl. (Porro cat.)
cinerosa (Hel.) *Fér.* pr. 463.
clathrata Humphr. 1174.
concolor Zgl.
conus Beck p. 82. N. 10. Antill.
corcyrensis Parr. (Pupilla Beck p. 84. N. 9.) Ins. Corcyra.
costata Zgl. Villa disp. p. 23. St. Thomas.
elegans Beck p. 82. N. 2. Antill. (Turbo alvearia Wood ind. t. 32. f. 112?)
filosa Val. (Gibbulina Beck p. 81. N. 4.) Madagascar.
gastrodes Zgl. (Chondrus Jan, Torquilla Beck p. 85. N. 5. Dalmat. (Jay cat. 1839. p. 52. Italia.)
gracillima (Torquilla) *Beck* p. 86. N. 17. Hel. polyodon var. Fér.) Hispan.
guineensis (Cyclodontina?) *Beck* p. 88. N. 11. Guinea.
inflata Val. (Gibbulina Beck p. 81. N. 5.) Madagascar. — An = P. grandis Pfr.?
iulus (Gibbulina) *Beck* p. 81. N. 8. Ins. Mauritii.
? *Listeri Gray* Ann. of Phil. (Hel. Fér. pr. 491. — Cyclodontina Beck p. 88. N. 4. — List. t. 31. f. 29.) Brasil.
millium (Alaea) *Beck* p. 85. N. 6. Ins. Pitcairn.
Moricandi (Granaria) *Held* Isis 1837. p. 918.
palangula (Hel.) *Fér.* pr. 467. (Gibbulina Beck p. 81. N. 9.) Ins. Mauritii.
perturbata (Hel.) *Fér.* pr. 479. Archip.?
Pitcairnensis (Alaea) *Beck* p. 85. N. 1. Ins. Pitcairn.
proxima Rossm. (Torquilla Villa disp. p. 24.)
pulchella Hutt. (Wiegm. Arch. 1839. II. p. 205.)
pusillima Zgl.
Rawacensis (Helix Cochlodonta) *Fér.* pr. 465.
rubra Humphr. 1173.
rufescens (Turbo) *Wood* suppl. t. 6. f. 13.
Stenbuckii Möll. (Pupilla Beck in Amtl. Ber. Kiel 1846. p. 122.)
striatella Humphr. 1172.
strobilus Beck p. 82. N. 12. St. Domingo.
triticum Zgl. (Porro cat. — Torquilla Villa disp. p. 24.)
turgida Parr. Ant. Verz. p. 47. N. 1710. Helvetia.
unidentata Mühlf. (Villa disp. p. 23.) Austria.

XI. Cylindrella Pfeiffer.

Conspectus specierum.

A. Genuinae,
1. truncatae
a. ventricosae (pupaeformes) . . . . . §. 1. Nr. 1—9.
b. graciles (clausiliaeformes)
α. dextrorsae
* laevigatae . . . . . §. 2. — 10—11.
** costulato-striatae . . . . . §. 3. — 12—21.
*** costatae . . . . . §. 4. — 22—34.
β. sinistrorsae . . . . . §. 5. — 35—36.
2. integrae, apice conico . . . . . §. 6. — 37—41.
B. Anomalae,
1. imperforatae (bulimoideae) . . . . . §. 7. — 42—46.
2. pervio-umbilicatae . . . . . §. 8. — 47.
C. Dubiae . . . . . §. 9. — 48—50.

---

§. 1.

1. C. decollata (Pupa) Nyst.

T. decollata, turrita, basi subventrosa, solidula, sub epidermide olivaceo-fusca albida; anfr. 10 convexiusculi, regulariter accrescentes, arcuatim costulato-striati, ultimus vix solutus, dorso carinatus; apertura obliqua, ovalis, superne angulata, intus plica columellari coarctata; perist. brevissime reflexum. — Long. 69, diam. 19 mill. Ap. 16 mill. longa, 12 lata. (Mus. Cuming.)

Pupa decollata Nyst in Bull. Brux. 1841. VIII. p. 344. f. 2. *)

Cylindrella decollata Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 47. t. 2. f. 1.

β. Minor: long. 46, diam. 14 mill. Ap. 10 mill. longa, 9 lata. (Coll. Nr. 1.)

---

*) T. crassa, cinereo-pallida, turriculato-cylindracea, apice truncata, basi subumbilicata; anfr. convexiusculis, striatis; apertura suborbiculari; columella uniplicata; labro reflexo. — Long. 75, latit. 20 mill. (Nyst l. c.) — Figura rudis!

Cylindrella speciosa Dunker in Phil. Icon. I. 8. p. 186. t. 1. f. 19.

Habitat in reipublicae mexicanae provincia Tabasco (Nyst), var. *β* in Columbia (Funck, Nyst).

2. C. hyalina Pfr.

T. rimata, truncata, ovato-oblonga, sursum subito attenuata, tenuiuscula, diaphana, hyalina; anfr. 10 vix convexiusculi, angusti, subaequales, subarcuatim tenuiter costato-striati, ultimus breviter protractus, dorso subangulatus, basi obsolete compressus; apertura subverticalis, subcircularis; perist. undique liberum, breviter expansum. — Long. 37, diam. 12 mill. Lat. anfr. med. 3⅔ mill. Ap. 9 mill. longa, 8 lata. (Mus. Cuming.)

Cylindrella hyalina Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 47. t. 2. f. 2.

Habitat . . . ?

3. C. recticosta Pfr.

T. rimata, subcylindrica, versus apicem truncatum attenuata, solida, albida; anfr. 8 angusti, longitudinaliter et confertim costati (costis rectis), penultimus supra suturam, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, infra angulum sublaevigatus, antice non protractus; apertura subverticalis, oblique ovalis; perist. subsimplex, brevissime expansum, superne appressum. — Long. 36, diam. 12 mill. Lat. anfr. med. vix 5 mill. Ap. 9½ mill. longa, 7½ lata. (Mus. Cuming.)

Cylindrella recticosta Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 48. t. 2. f. 3.

Habitat . . . ?

Obs. Similis C. decollatae *β*; differt costis rectis, anfractibus angustis, subaequalibus, ultimo non protracto, etc.

4. C. fasciata (Helix) Chemnitz.

T. subrimata, truncata, cylindracea, tenuis, albida, striatula, nitida; sutura crenata; anfr. 6 convexiusculi, medii violaceo-fusco late unifasciati, ultimus vix solutus, dorso carinatus; apertura obliqua, subcircularis; perist. vix reflexum. — Long. 30, diam. 11 mill. Ap. diam. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Helix (decollata et) *fasciata Chemn.* IX. P. 2. p. 187. t. 186. f. 1256. 57.
— *fasciata* (Cochlodina) *Fér.* prodr. 503.
— *truncata Dillw.* descr. catal. II. p. 948. N. 137.
— — *Wood* ind. t. 34. f. 136.
Cyclostoma fasciata Lam. 14. p. 146. ed. Dh. p. 358.
— — *Desh.* in Encycl. méth. II. p. 42. N. 10.
— (?) *fasciatum Sow.* Thesaur. p. 108. t. 24. f. 65.
Pupa truncata Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.

Siphonostoma fasciata Swains. Malac. p. 333.
Cylindrella fasciata Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 48. t. 2. f. 7.

Habitat in insula Haiti. (Chemn.)

Obs. Beck (ind. p. 83. N. 3.) synonyma hujus speciei et Cyl. cylindri confundere videtur.

5. C. Liebmanni Pfr.

T. subrimata, cylindrico-ovata, solida, oblique striatula, versus apicem truncatum subito attenuata, distinctius striata, fulvida, basi saturatius unifasciata; anfr. 7 subaequales, ultimus angustior, basi rotundatus, antice breviter protractus, dorso subangulatus; columella profunda, subplicata; apertura subverticalis, oblique et irregulariter ovalis; perist. continuum, breviter expansum, incrassatum, sinuosum. — Long. 32, diam. 13—14 mill. Anfr. antepenult. 4⅔ mill. latus. Ap. diam. longior 9½, brevior 7½ mill. (Coll. Nr. 2.)

Cylindrella Liebmanni Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 159.
— — *Phil.* Icon. III. 17. p. 5. Cyl. t. 3. f. 1.

Habitat in republica mexicana. (Legit Cl. Liebmann.)

6. C. Gruneri Dunker.

T. rimata, truncata, oblongo-ovata, crassiuscula, nitida, pallide coerulescens; anfr. 7 planiusculi, supremi minute, inferiores distinctius et remotius arcuato-striati, ultimus versus aperturam late costatus, haud protractus, basi angulatus; apertura axi subparallela, circularis; perist. expansum, breviter reflexum, superne appressum. — Long. 28, diam. 11 mill. Ap. diam. 8—9 mill. (Coll. Nr. 3.)

Cylindrella Gruneri Dunker in Phil. Icon. I. 8. p. 185. t. 1. f. 20.

Habitat prope Port au Prince insulae Haiti.

7. C. cylindrus (Turbo) Chemnitz.

T. rimata, truncata, ovato-cylindracea, tenuis, sericina, pulchre violacea, striis confertissimis obliquis elegantissime sculpta; sutura levis, marginata; anfr. 9 convexiusculi, ultimus breviter solutus, basi carina obtusa distinctus; columella intus subtorta; apertura subobliqua, subcircularis, basi canaliculata; perist. undique expansum. — Long. 26, diam. 9 mill. Aperturae diam. 7 mill. (Coll. Nr. 4.) — Variat paulo major et minor.

Turbo cylindrus Chemn. XI. p. 279. t. 209. f. 2061. 62.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 862. N. 111.
Helix cylindrus Wood ind. t. 32. f. 113.
— — (Cochlodina) *Fér.* pr. 500.
Pupa cylindra Gray in Ann of Phil. New ser. IX. p. 413.

Pupa cylindrus Lam. ed. Dh. 56. p. 194.
— — *Jay* catal. 1839. p. 52.
— *purpurea Gray* in Ann. of nat. hist. V. p. 244?
— *rubella Adams* in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 15.
Urocoptis cylindrus Beck ind. p. 83. N. 3.
Clausilia torticollis Crouch p. 18. t. 15. f. 3.
Cylindrella cylindrus Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 185. t. 1. f. 2. et II. 10. p. 49. t. 2. f. 11 med.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. 1. Juniorum spira valde elongata, gracillima, subulata. Specimen Musaei Cumingiani non truncatum anfractus exhibet 25, quorum 16 spiram gracilem formant.

Obs. 2. Figura in Encycl. méth. t. 461. f. 7. (ex apertura fracta vix cognoscenda) huc potius, quam ad Cyl. fasciatam Chemn. referenda mihi videtur.

8. C. sanguinea Pfr.

T. rimata, truncata, ovato-cylindracea, solida, nitida, fusco-sanguinea; sutura linearis; anfr. 10 subaequales, planiusculi, subarcuatim oblique et confertim costulato-striati, ultimus non solutus, basi obsolete angulatus, antice paulo validius costulatus; apertura subverticalis, circularis; perist. album, vix continuum, late expansum, breviter reflexum, superne appressum. — Long. 26, diam. 9 mill. Apert. c. perist. diam. transv. 7½ mill. (Coll. Nr. 5.)

Cylindrella sanguinea Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 48. t. 2. f. 15.
β. Minor: long. 19, diam. 7 mill.

Habitat in insula Jamaica (Adams).

Obs. 1. Spira juniorum sensim attenuata, multo minus elongata, quam praecedentis. Specimen completum non ultra 20 anfractus habere videtur.

Obs. 2. Peristomatis forma Cyl. Maugeri similis, quare ad §. 7. forsan transferenda.

9. C. brevis Pfr.

T. rimata, truncata, cylindraceo-ovata, apice rotundato-obtusa, confertissime oblique costulato-striata, pallide fusca, nitidiuscula; anfr. 7 planuli, ultimi subaequales, ultimus breviter solutus, basi interdum obsoletissime carinatus; apertura circularis; perist. late expansum, reflexiusculum. — Long. 16½, diam. 7 mill. Ap. diam. 5 mill. (Coll. Nr. 6.)

Helix brevis Férussac in Mus.!
Cylindrella brevis Pfr. Symb. I. p. 47.
— — *Pfr.* in Phil. Icon. I. 8. p. 185. t. 1. f. 1. et Ibid. II. 10. p. 49. t. 2. f. 18.

Pupa obesa Adams in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 15. *)

— *brevis Orb.* moll. cub. I. p. 182. t. 12. f. 12—14? **)

β. densestriata, testa majore, striis exilissimis creberrimis ornata. (Ad.

Habitat in insula Martinique (teste Petit); Jamaica, Cuba?

Obs. Spira juniorum brevis, conica, obtusiuscula. (Phil. Ic. t. 2. f. 18.)

§. 2.

10. C. porrecta (Pupa) Gould.

T. gracillima, subtruncata, fusiformis, a medio utrinque valde attenuata, subtilissime striatula, pallide cornea, nitida; anfr. 18—24 planiusculi, ultimus disjunctus, deorsum longe porrectus, costulato-striatus, basi obsolete angulatus; apertura obliqua, circularis; perist. undique breviter expansum. — Long. 13, diam. medio 2⅓ mill. Ap. diam. 1⅔ mill. (Coll. Nr. 7.)

Pupa (Siphonostoma) *porrecta Gould* in Bost. Journ. IV. 4. p. 490. t. 24. f. 12.

Cylindrella porrecta Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 50. t. 2. f. 10.

Habitat in insula Cuba, prope Retiro (Gould).

11. C. Lavalleana (Pupa) Orbigny. †

T. elongata, cylindrica, tenuis, fusca, diaphana, laevigata; spira elongatissima, cylindrico-acuminata, truncata (junior acuta); anfr. 12 convexi, angusti, ultimus striatus, antice carinatus; suturae crenulatae; apertura obrotunda, obliqua, labris continuis, simplicibus, acutis. — Long. 21, diam. 4 mill. (Orb.)

Pupa Lavalleana Orb. moll. cub. I. p. 183. t. 12. f. 18—20.

Habitat in insula Cuba.

§. 3.

12. C. Sowerbyana Pfr.

T. truncata, cylindraceo-subulata, solidiuscula, oblique subarcuatim costulato-striata, opaca, cinnamomeo et albo radiata; anfr. (spec. trunc.) 16 angusti, convexiusculi, ultimus basi subcarinatus (carina parum prominente, fere rectangula), antice vix

*) T. tenui, diaphana, pallide fuscescente, subfusiformi, striis obliquis costiformibus ornata, supra concave et breviter tereti, decollata; anfr. 6 vel 7 perditis; anfr. 7—8 reliquis; labro tenui, albo, reflexo, continuo, ab anfr. penultimo disjuncto. — Long. part. amissae 0,13 poll. Long. post decoll. 0,57, lat. 0,235 poll. (Ad. l. c.)

**) T. oblonga, cylindrico-inflata, tenui, fusca, oblique striata; spira elongata, antice angustata, apice acuminata (adulta truncata); anfr. 8 planis, angustatis; apertura circulari, dilatata, labiis reflexis, albis. — Long. 16, diam. 6 mill. — Cuba. (Orb. l. c.)

protractus, subtilius striatus; apertura subcircularis; perist. undique liberum, tenue, breviter expansum, margine supero sursum dilatato. — Long. 35, diam. 8 mill. Ap. diam. 7 mill. (Mus. Cuming. et Gruner.)

Cylindrella Sowerbyana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 116.
— — *Phil.* Icon. II. 16. p. 218. Achat. t. 1. f. 13. et III. 17. Cyl. t. 3. f. 10.

Habitat in insula Cuba (Lindon).

13. C. Binneyana (Pupa) Adams.

T. subrimata, cylindracea, sursum attenuata, solida, regulariter et confertissime oblique costulata, sericina, pallide fulva; anfr. 11 convexiusculi, ultimus antice subascendens, basi filocarinatus, non protractus; apertura subverticalis, angusta, circularis; perist. incrassatum, albo-callosum, undique late expansum, breviter reflexum, superne appressum. — Long. 30, diam. 9 mill. Ap. intus 4½, c. perist. 9 mill. diam. (Coll. Nr. 8.)

Pupa Binneyana Adams in sched.
— *nobilior Adams* in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 15. *)
Cylindrella Binneyana Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 49. t. 2. f. 11.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. Juniorum testa in apicem elongatum, gracilem producta, tenuis, albida. (Phil. Ic. l. c. f. 17.) — Conf. Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 117.

14. C. Humboldtiana Pfr.

T. cylindrico-fusiformis, truncata, tenuis, pellucida, fulvocornea; anfr. 11 planulati, confertissime oblique striati, ultimus acutius striatus, subrugulosus, parum protractus, basi obtuse carinatus: carina filiformi; apertura oblique ovalis; perist. breviter expansum. — Long. 22, diam. 5½—6½ mill. Ap. diam. 5 mill. (Coll. Nr. 9.)

Cylindrella Humboldtiana Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 252.
— — *Pfr.* in Phil. Icon. I. 8. p. 184. t. 1. f. 4.
Helix columnella Fér. Mus.?
β. Sinistrorsa: Phil. Icon. III. 17. p. 8. Cyl. t. 3. f. 11.

Habitat in insulae Cubae regione occidentali (E. Otto); var. *β* in Jamaica.

Obs. Columella in testa fracta spiraliter et acute triplicata.

---

*) T. magna, crassa, opaca, straminea, striis obliquis creberrimis parallelis eleganter insculpta, infra cylindracea, supra tereti; spira longissima, decollata; anfr. perditis 15! anfr. reliquis 10; labro lato, crasso, continuo, albo, anfr. penultimo appresso. — Long. partis amissae 0,6 poll. Long. post decoll. 1,18, tot. 1,78, lat. 0,37 poll. (Ad. l. c.)

15. C. rosea Pfr.

T. cylindrico-subfusiformis, truncata, tenuis, diaphana, rosea, minutissime oblique striata; anfr. 10 convexiusculi, ultimus brevissime protractus, basi obsolete carinatus; apertura circularis; perist. undique breviter reflexum. — Long. 16, diam. 5 mill. Ap. diam. $3\frac{1}{2}$ mill. (Coll. Nr. 10.)

Cylindrella rosea Pfr. in Phil. Icon. I. 8. p. 184. t. 1. f. 3.

Habitat in insula Jamaica (Gosse).

16. C. variegata Pfr.

T. fusiformi-cylindracea, truncata, subrecte costulato-striata, albido et corneo undulatim longitudinaliter denticulato-strigata, apice rufescens vel fusca; anfr. 12 convexiusculi, ultimus parum protractus, basi carinatus; apertura circularis; perist. expansum, album. — Long. 17, diam. 4 mill. Apert. diam. $3\frac{1}{2}$ mill. (Coll. Nr. 11.)

Clausilia subula? Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
Cylindrella variegata Pfr. Symb. II. p. 60.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 180. t. 1. f. 11.
Pupa (Siphonostoma) *lactaria Gould* in Bost. Journ. IV. 4. p. 491. t. 24. f. 13.*)

β. Minor: long. 10, diam. 3 mill.
γ. Subunicolor albida.

Habitat in insula Cuba! Frequentissima ad radices palmarum et in sylvis viciniae urbis Matanzas, etc. Var. *γ* in Jamaica.

Obs. Magnitudo pervariabilis. Inter var. *α* et *β* omnes transitus occurrunt. — Columella in testa fracta haud plicata.

* * *

17. C. elegans Pfr.

T. decollata, cylindracea, apice truncato vix attenuata, nitida, hyalina, versus apicem rubella vel fusca, peroblique et confertim elegantissime striata; anfr. 16 convexi, subaequales, ultimus angustatus, protractus, subteres; apertura circularis; perist. simplex, undique expansum. — Long. 19, diam. 4 mill. Ap. c. perist. $3\frac{1}{4}$ mill. diam. (Coll. Nr. 12.)

Clausilia elegans Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
Cylindrella elegans Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 42.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 80. t. 1. f. 12.
— *nobilis Stentz* in sched. (teste Villa.)

*) T. fusiformi, apice truncata, tenui, albida, sursum fuscescente, rivulis lacteis longitudinaliter undique notata; anfr. superstitibus 10, convexiusculis, concinne striatis, ultimo carinato; apertura circulari, ampla, expansa; perist albo, modice everso: collo brevi. — Long. $\frac{3}{5}$, latit. $\frac{3}{20}$ poll. (Gould l. c.)

Pupa obtorta Menke in litt. olim.
— *elegans Gould* in Bost. Journ. IV. p. 490.
— (Siphonostoma) *lituus Gould* in Bost. Journ. IV. 1. 1842.
Balea truncatula Villa disp. syst. p. 25.

β. Minor, ventrosior, anfractu ultimo interdum vix protracto: long. 12—13, diam. 4—4½ mill.

γ. Testa pallide cornea.

Habitat in insula Cuba! Frequentissima circa Matanzas, El Fundador etc.

Obs. Spira juniorum turrito-subulata. Rarissima sunt specimina adulta non truncata, anfractuum 20—21. — Columella in testa fracta acute biplicata.

18. C. alabastrina Pfr.

T. truncata, exacte cylindrica, oblique et confertim eleganter costulato-striata, alabastrina, apice vix attenuato nigricans; anfr. 15 planati, ultimus porrectus, basi acute carinatus; apertura subcircularis, basi canaliculata; perist. undique expansum, subreflexum. — Long. 15, diam. 3⅔ mill. Ap. 2½ mill. longa. (Mus. Brit.)

Cylindrella alabastrina Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 52.

Habitat in insula Jamaica.

19. C. subula (Helix) Férussac.

T. truncata, gracilis, subcylindrica, sursum attenuata, oblique confertissime costulato-striata, pallide cornea; anfr. 17 angusti, convexiusculi, ultimus breviter et oblique protractus, basi acute carinatus, latere dextro angulatus; apertura obliqua, subquadrangularis; perist. undique expansum, reflexiusculum. — Long. 14, diam. 2⅔ mill. Ap. diam. 2 mill. (Coll. Nr. 13.)

Helix subula (Cochlodina) *Fér.* pr. 508. Hist. t. 163. f. 8.
Clausilia subula Lam. ed. Desh. 11. p. 216. *)
Brachypodella subula Beck ind. p. 89. N. 3.
Cylindrella subula Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 41
— — *Phil.* Icon. II. 10. p. 50. t. 2. f. 13.

Habitat in insula Jamaica. (Gosse in Mus. Cuming.)

20. C. collaris (Helix) Férussac.

T. fusiformi-subulata, oblique striata, rufescens vel cornea. anfr. 12—15 convexi, ultimus basi compresso-carinatus, latere subangulatus, magis minusve protractus; apertura subquadrangu-

*) T. elongato-turrita, apice acuta, cylindracea, angusta, tenui, fragili, tenuissime striata (diaphana, pallide fusca); anfractibus convexiusculis, ultimo basi angulato detecto producto; apertura obliqua, alba, subcirculari; labiis reflexis. — Long. 18 mill. Apert subquadrangularis. (Desh. l. c.)

laris; perist. album, breviter expansum. — Long. 14, diam. 3½ mill. Ap. diam. 2⅔ mill. (Coll. Nr. 14.)

Helix collaris (Cochlodina) *Fér.* pr. 507. Hist. t. 163. f. 7.
Clausilia collaris Lam. 9. p. 114. ed. Dh. p. 200. *)
— — *Jay* catal. 1839. p. 53.
Brachypodella collaris Beck ind. p. 89. N. 2.
Cylindrella collaris Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 41.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 182. t. 1. f. 10.
Lister t. 20. f. 16.

β. Anfractu ultimo vix protracto:
Helix antiperversa Fér. pr. 509. Hist. t. 163. f. 5. 6.
Clausilia antiperversa Lam. ed. Desh. 40. p. 215. **)
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 177. t. 17. f. 19. 20.
— — *Jay* catal. 1839. p. 53.
Pupa truncatula Sow. gen. f. 7.
— — *Reeve* Conch. syst. t. 170. f. 7.
Brachypodella antiperversa Beck ind. p. 89. N. 4.
Cylindrella collaris β brevicollis Pfr. in Phil. Icon. I. 8. p. 183 t. 1. f. 9.

Habitat in insula Portorico; Martinique, Guadeloupe. (Fér.)

Obs. Omnes transitus inter formas α et β in speciminibus authenticis Musaei Ferussaciani observavi.

21. C. Auberiana (Pupa) Orbigny. †

T. elongata, turrita, cylindrica, tenuis, cornea, longitudinaliter oblique tenuiter striata; spira subfusoidea, cylindrica, antice angustata, postice acuminata, truncata (junior acuta); anfr. 10 convexiusculi, angustissimi, ultimus antice carinatus; apertura rotunda, obliqua; perist. continuum, dilatatum, acutum. — Long. 13, diam. 3½ mill. (Orb.)

Pupa Auberiana Orb. moll. cub. I. p. 184. t. 12. f. 21—23.

Habitat in insula Cuba.

§. 4.

22. C. gracilicollis (Helix) Férussac.

T. truncata, cylindrica, gracilis, albido-grisea, costulata: costulis confertis, rectis; sutura levis, papillis aequidistantibus

---

*) T. fusiformi-subulata, acutissima, longitudinaliter et oblique striata, rufescetne; anfract. numerosissimis; apertura minima, rotundata, edentula. — Long. 6½ lin. (Lam. l. c.)

**) T. elongato-turrita, subcylindracea, apice obtusa, basi perforata, fusco-lutea, tenuiter striata; anfract. angustis convexis, ultimo penultimo detecto. distorto; apertura alba, subquadrangulari, simplici edentula, labro lato, reflexo. — Long. 15—18, lat. 4 mill. (Desh. l. c.)

ornata; anfr. 15 subaequales, ultimus antice solutus, basi acute carinatus, subtetragonus; apertura intus subquadrangularis; perist. simplex, acutum, circulatim expansum. — Long. 20, diam. 4½ mill. Ap. diam. 3 mill. (Coll. Nr. 15.)

Helix gracilicollis (Cochlodina) *Fér.* pr. 505. Hist. t. 163. f. 10.
Clausilia truncatula Lam. 2. p. 113. ed. Dh. p. 197. *)
— — *Delessert* recueil t. 27. f. 11.
— *gracilicollis Desh.* in Lam. p. 197.
Urocoptis truncatula Beck ind. p. 83. N. 8.
Cylindrella gracilicollis Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 41.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 179. t. 1. f. 6.

Habitat in insula St. Thomas. (Maugé, Fér.)

23. C. crispula Pfr.

T. truncata, subcylindrica, supra medium ventrosior, tenuis, pallide cornea, plicis undatis crispato-costata; anfr. 12—13 convexi, ultimus attenuatus, solutus, teres, parum protractus; apertura circularis; perist. undique expansum, reflexiusculum. — Long. 15, diam. max. 4 mill. Ap. diam. 3 mill. (Coll. Nr. 16.)

Clausilia crispula Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 353.
Cylindrella crispula Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 42.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 181. t. 1. f. 13.
Pupa crispula Gould in Bost. journ. IV. 4. p. 492.

Habitat in insula Cuba rarior. Prope El Fundador provinciae Canimarensis ipse legi; Mount Vernon (Gould).

24. C. perplicata (Helix) Férussac.

T. truncata, cylindrica, tenuis, diaphana, pallide cornea, longitudinaliter confertim undulato-striata et plicis distantibus, lamellatim prominentibus munita; anfr. 12 convexi, ultimus basi plicato-angulatus, fere horizontaliter breviter protractus; apertura fere circularis, loco carinae subcanaliculata; perist. liberum, album, undique expansum. — Long. 14, diam. 3¼ mill. Apert. diam. 3 mill. (Mus. Cuming.)

Helix perplicata (Cochlodina) *Fér.* pr. 506. Hist. t. 163. f. 9.
Clausilia perplicata Lam. ed. Desh. 42. p. 216. **)
Brachypodella perplicata Beck ind. p. 89. N. 1.
Cylindrella perplicata Pfr. in Phil. Icon. II. 16. p. 218. Achat. t. 1. f. 9.

Habitat in insulis Antillis.

*) T. tereti, gracili, truncata, longitudinaliter striata, albido-grisea; apertura ovato rotundata, edentula. — Long. 9 lin. (Lam. l. c.)

**) T. elongato-turrita, cylindracea, angusta, apice decollata, tenui, cornea, longitudinaliter lamellosa; anfr. angustissimis, ultimo detecto, producto; apertura alba, circulari, labiis reflexis. — Long. 18, lat. 4 mill. (Desh. l. c.)

25. C. Sagraiana Pfr.

T. truncata, subcylindracea, tenuis, corneo-albida, plicis distantibus, subrectis, alternantibus, in ultimo anfractu confertioribus, subtilioribus munita; anfr. 9 convexi, ultimus basi obsolete angulatus, parum protractus; apertura subcircularis; perist. liberum, tenue, brevissime expansum. — Long. 13, diam. 4 mill. Ap. diam. $2^3/_4$ mill. (Coll. Nr. 17.)

Cylindrella Sagraiana Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 120.
— *perplicata Pfr.* in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 41.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 182. t. 1. f. 14.

Habitat in insula Cuba. (Unicum specimen legi prope El Fundador.)

26. C. Laterradii (Clausilia) Grateloup. †

T. cylindraceo-turrita, subventricosa, umbilicata, apice truncata, tenuis, oblique et symmetrice plicata; anfr. 9 convexiusculi; collum basi angulatum, subarcuatum; apertura simplex, subquadrata. — Long. 14—15, diam. 5 lin. (Grat.)

Clausilia Laterradii Grat. in Act. Bord. XI. p. 430. t. 2. f. 10.
Cylindrella Laterradii Pfr. Symb. II. p. 137.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 182. t. 1. f. 18. (ex Grat.)

Habitat in insula Cuba (Laterrade).

27. C. Philippiana Pfr.

T. fusiformi-elongata, gracilis, subtruncata, tenuis, subobliquc argute costata, diaphana, corneo-albida, obsolete fusculo-variegata; spira valde attenuata, apice subtruncata; anfr. 12—15 convexi, ultimus solutus, deorsum protractus, teres; apertura obliqua, circularis; perist. undique breviter expansum. — Long. $12^1/_2$, diam. $2^2/_3$ mill. (anfr. 4—5 ab apert.) Ap. diam. 2 mill. (Mus. Cuming.)

Cylindrella Philippiana Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 50. t. 2. f. 12.

Habitat in insula Cuba.

28. C. Hanleyana Pfr.

T. vix rimata, subcylindracea, versus apicem decollatum attenuata, tenuis, diaphana, pallide cornea, regulariter et confertim costulata: costulis obliquis, subarcuatis, filiformibus; anfr. 14 subaequales, vix convexiusculi, ultimus antrorsum breviter porrectus, dorso et basi compresso-carinatus, latere dextro angulatus; apertura obsolete angulato-subcircularis; perist. liberum, albidum, undique expansum. — Long. 13, diam. 3 mill. Ap. diam. 2 mill. (Coll. Nr. 18.)

Cylindrella Hanleyana Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 16.

Cylindrella Hanleyana Phil. Icon. III. 17. p. 7. Cyl. t. 3. f. 3.

Habitat in provincia Cumana Venezuelae.

Obs. Forma similis C. collari (Nr. 20); differt anfractibus vix convexiusculis, eleganter costulatis, etc.

29. C. leucopleura Menke.

T. vix rimata, subcylindracea, versus apicem truncatum attenuata, tenuis, pellucida, nitida, pallide cornea, oblique costata: costis strictiusculis, distantibus, pallidioribus; anfr. 15 convexiusculi, ultimus breviter protractus, basi acute serrato-carinatus, latere dextro subangulatus; apertura subcircularis, basi obsolete angulata; perist. liberum, undique breviter expansum. — Long. 13½, diam. 2⅔ mill. Ap. diam. 2 mill. (Coll. Menke.)

Cylindrella leucopleura Menke in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 2.
— — *Phil.* Icon. III. 17. p. 6. Cyl. t. 3. f. 2.

Habitat . . . ?

30. C. costata (Brachypus) Guilding.

T. subrimata, truncata, cylindraceo-fusiformis, solidula, corneo-fusca, oblique subdistanter costulata; anfr. 9 convexiusculi, ultimus basi subcarinatus, antice vix solutus, latere dextro subangulatus; apertura subverticalis, subangulato-circularis; perist. simplex, vix expansum. — Long. 8½, diam. 3 mill. Ap. diam. 2 mill. (Mus. Cuming.)

Brachypus costatus Guild. in Zool. Journ. IV. p. 167. *)
Siphonostoma costata Swains. Malac. p. 168. f. 22.
Cylindrella costata Pfr. in Phil. Icon. I. 8. p. 183. t. 1. f. 16. (ex Swains.) et Ibid. II. 10. p. 52. t. 2. f. 8.

Habitat in arboribus insulae Barbados.

31. C. pallida (Brachypus) Guilding.

T. truncata, fusiformi-cylindracea, tenuis, pellucida, pallide cornea; anfr. 9—13 planiusculi, confertissime striati et distanter costati (costis subverticalibus, elevatis, medio incisis), ultimus confertius costulatus, solutus, oblique porrectus, latere subangulatus, basi crenato-carinatus; apertura subverticalis, angulato-circularis; perist. undique expansum. — Long. 8—9½, diam. max. 2½ mill. Ap. diam. 2 mill. (Coll. Nr. 19.)

Brachypus pallidus Guild. in sched. originar.
Siphonostoma costata Swains. Mal. p. 333. f. 97 c. d. (auct.)
Cylindrella pallida Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 52. t. 2. f. 14.

Habitat in India occidentali.

*) T. fusca, apice saepe decollata, longitudinaliter oblique costata, anfractibus undecim? — Long. 4½, diam. 1½‴. (Guild. l. c.)

32. C. seminuda Adams.

T. subrimata, truncata, subcylindracea, apice paulo attenuata, tenuis, pellucida, pallide cornea; sutura profunda; anfr. 9 planati, singuli medio laevigati, superne valide coronato-costati, inferne confertim plicati, ultimus regulariter confertim costatus, latere et basi crenato-carinatus, breviter porrectus; apertura angulato-subcircularis; perist. album, undique expansum. — Long. 9, diam. 2½ mill. Apert. diam. 1¾ mill. (Coll. Nr. 20.)

Cylindrella seminuda Ad. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14. *)

— — *Phil.* Icon. II. 10. p. 51. t. 2. f. 16.

Habitat in insula Jamaica.

* * *

33. C. Oviedoiana (Pupa) Orbigny. †

T. elongata, cylindrica, tenuis, fusca, longitudinaliter oblique striato-plicata; spira elongatissima, cylindrica, apice truncata (junior acuminata); anfr. 12 angusti, plani, ultimus antice carinatus; suturae laevigatae; apertura ovalis, obliqua; perist. continuum, simplex. — Long. 28, diam. 5 mill. (Orb.)

Pupa Oviedoiana Orb. moll. cub. I. p. 182. t. 12. f. 15—17.

Habitat in insula Cuba.

Obs. Num haec forsan C. Humboldtiana? Icones omnium specierum Orbignyanarum nondum ad me pervenerunt.

34. C. Poeyana (Pupa) Orbigny. †

T. elongatissima, fusoidea, tenuis, cornea, longitudinaliter acuto-striata; spira elongatissima, inflata, postice acuminata, truncata; anfr. 11 convexiusculi, ultimus antice carinatus; apertura rotunda; perist. continuum, acutum. — Long. 14, diam. 3 mill. (Orb.)

Pupa Poeyana Orb. moll. cub. I. p. 185. t. 12. f. 24—26.

Habitat in insula Cuba.

Obs. «Differt a Pupa antiperversa umbilico deficiente, apertura non angulosa, anfractibus minus convexis». (Orb.)

§. 5.

35. C. elongata (Turbo) Chemnitz.

T. sinistrorsa, truncata, cylindraceo-subulata, solidiuscula, oblique costulato-striata, nitida, pallide virescenti-albida; sutura

*) T. parva, albida, subfusiformi, late decollata; anfr. 10 vel 11 perditis; anfr. reliquis 9 supra subangulatis, mediis planulatis, costatis, costis pluribus prominentibus; anfr. superis mediis obsolete costatis; anfr. ultimo bicarinato, apertura ab anfr. penultimo late disjuncta; labro expanso, tenui. — Long. post decoll. 0,33, lat. 0,09 poll. (Ad. l. c.)

obliqua; anfr. 6—10 lati, convexiusculi, ultimus breviter solutus, basi carinatus; apertura subcircularis; perist. undique late expansum. — Long. (spec. trunc. 8 anfr.) 26, diam. $4^3/_4$ mill. Apert. c. perist. 6 mill. longa, $5^1/_5$ lata. (Coll. Nr. 21.)

Turbo elongatus Chemn. IX. P. 1. p. 114. t. 112. f. 956.
Helix Chemnitziana (Cochlodina) *Fér.* pr. 512.
Pupa Chemnitziana Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 413.
— *gracilis Sow.* Gen. of shells f. 8.
— — *Reeve* Conch. syst. t. 170. f. 8.
Clausilia Chemnitziana Lam. ed. Desh. 43. p. 217.
Apoma elongata Beck ind. p. 89. N. 1.
Balea Chemnitziana Villa disp. syst. p. 25.
Cylindrella Chemnitziana Pfr. Symb. II. p. 136.
— — *Phil.* Icon. II. 10. p. 49. t. 2. f. 4.
— *Cumingii Adams* in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14. *)

Habitat in insula Jamaica.

36. C. gracilis (Turbo) Wood.

T. sinistrorsa, plerumque truncata, cylindraceo-subulata, tenuis, oblique undulato-striata, pellucide albida; sutura obliqua; anfr. 9—10 lati, vix convexiusculi, ultimus vix solutus, basi carinatus; apertura oblonga, basi effusa; perist. undique breviter expansum. — Long. (spec. non truncati, anfr. 16) 26, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 22.)

Turbo gracilis Wood suppl. t. 6. f. 38.
Clausilia gracilis Gray in Wood suppl. p. 34.
Cylindrella Chemnitziana? Pfr. in Phil. Icon. I. 8. p. 184. t. 1. f. 5.
— *gracilis Pfr.* in Phil. Icon. II. 10. p. 49. t. 2. f. 5.

Habitat in insula Jamaica.

Obs. In hac sectione conferatur C. Humboldtiana var. β. (Nr. 14.)

§. 6.

37. C. teres Menke.

T. breviter rimata, cylindracea, solidiuscula, sublaevigata, opaca, nitens, candida; spira elongata, integra, apice obtuse conica; anfr. 14 subaequales, vix convexiusculi, ultimus confertim costulato-striatus, antrorsum brevissime protractus, superne subcarinatus, basi obsolete angulatus; apertura fere verticalis, pyri-

*) T. magna, candida, subfusiformi, longissima, heterostropha, costulis minimis obliquis regularibus rotundatis creberrimis ornata, late decollata; anfr. 10 vel 11 perditis, superis perconvexis; anfr. reliquis 8 vel 9; apertura elliptica, in faucibus valde contracta, in labrum latissimum acutum expansa; anfr. ultimo carina semi-revolvente aperturam subeffusam faciente, instructo. — Div. supra 10^0. Long. tot. 1,4, post decoll. 1,15, lat. 0,19 poll. (Ad. l. c.)

formi-rotundata, intus plica profunda columellae coarctata; perist. continuum, liberum, breviter expansum, reflexiusculum. — Long. 22, diam. 5½ mill. Ap. 4 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 23.)

Cylindrella teres Menke in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 1.
— — *Phil.* Icon. III. 17. p. 5. Cyl. t. 3. f. 5. 6.

Habitat in Mexico interioris provincia Puebla (Liebmann).

38. C. Pfeifferi Menke.

T. rimata, ovato-oblonga, subfusiformis, tenuis, pellucida, flavescenti-albida, dense et tenuissime lamelloso-costata; spira oblongo-conica, apice obtusiuscula; anfr. 12 vix convexiusculi, ultimus non protractus, basi subcompressus; apertura rotundata, superne ad dextram subangulata, plica columellari profunda, obsoleta subcoarctata; perist. liberum, continuum, breviter expansum, margine supero subhorizontali. — Long. 17½, diam. medio 5⅔ mill. Ap. 4 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 24.)

Cylindrella Pfeifferi Menke in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 1.
— — *Phil.* Icon. III. 17. p. 6. Cyl. t. 3. f. 4.

Habitat ad Tehuacan, in Mexico (Liebmann).

39. C. Pilocerei Pfr.

T. rimato-subperforata, cylindracea, solidiuscula, subobliquetenuissime striata, nitens, carneo-albida; spira elongata, integra, apice conica, acutiuscula; anfr. 12—13 vix convexiusculi, medii latissimi, ultimus ruguloso-striatus, antrorsum breviter porrectus, dorso carinatus; apertura triangulari-subcordiformis; perist. liberum, continuum, margine supero subhorizontali, medio introrsum prominente, non reflexo, dextro et sinistro reflexiusculis. — Long. 13—14, diam. 4 mill. Ap. 3 mill. longa et lata. (Coll. Nr. 25.)

Cylindrella Pilocerei Pfr. Symb. I. p. 47.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 183. t. 1. f. 7. et Ibid. III. 17. p. 5. Cyl. t. 3. f. 7. 8.

Habitat in republica mexicana. Prope Cuantla de las Amilpas in Pilocereo senili degentem detexit Hegewisch; serius legit Cl. Liebmann.

Obs. Variat striis longitudinalibus magis minusve distinctis.

40. C. Roemeri Pfr.

T. vix rimata, subcylindracea, apice obtuse conica, non truncata, substriata, carneo-albida; anfr. 14 angusti, planiusculi, ultimus basi carinatus, antrorsum solutus et extrorsum tortus; apertura verticalis, oblongo-circularis, intus plica marginis dextri co-

arctata; perist. continuum, undique breviter expansum. — Long. 13—14, diam. 4½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Roemer.)

Cylindrella Roemeri Pfr. mss.

β. Minor, sursum ventrosior, anfr. 12, ultimo brevius soluto: long. 11, diam. supra medium 4 mill. (Coll. Nr. 26.)

Habitat in Texas, ubi prope Neu-Braunfels legit Dr. Ferd. Roemer.

Obs. Affinis quidem et praecedenti et sequenti, tamen carina basali anfractus ultimi et ejus torsione tam singulari, ut testam primo aspectu sinistrorsam putes, ab omnibus distinctissima.

41. C. Goldfussi Menke.

T. profunde rimata, elongata, medio ventrosa, apice conico non truncata, tenuis, diaphana, pallide cornea, confertim et subarcuatim costulato-striata; anfr. 12 vix convexiusculi, angusti, ultimus antrorsum breviter protractus, dorso carinatus, latere dextro subsulcatus, basi rotundatus; apertura subverticalis, oblique subtriangulari-pyriformis; perist. undique breviter expansum, albidum, margine supero flexuoso. — Long. 11, diam. medio 4⅓ mill. Ap. 3 mill. longa et lata. (Coll. Nr. 27.)

Cylindrella Goldfussi Menke in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 2.
— — *Phil.* Icon. III. 17. p. 6. Cyl. t. 3. f. 9.

Habitat in Texas.

Obs. Ad hanc sectionem conf. C. collaris Nr. 20.

§. 7.

42. C. acus Pfr.

T. subintegra, elongata, cylindracea, apice attenuata, tenuis, pellucida, pallide cornea, levissime striata, nitida; anfr. 18—19 planiusculi, ultimus oblique et confertim costulato-striatus, basi crenulato-carinatus, non protractus; apertura oblongo-rotundata; perist. tenue, expansum, margine supero subappresso. — Long. 24—26, diam. 3½ mill. Apert. diam. long. 4 mill. (Coll. Nr. 28.)

Cylindrella acus Pfr. Symb. I. p. 47.
— — *Phil.* Icon. I. 8. p. 182. t. 1. f. 8.

Habitat in insulae Cubae regione occidentali: Callajabas (E. Otto).

43. C. Dunkeriana Pfr.

T. subrimata, truncata, exacte cylindrica, oblique et confertim subarcuato-striata, corneo-rufa; anfr. 12 plani, ultimus non protractus, basi acute carinatus; apertura obliqua, obovalis, basi subcanaliculata, in fundo ad columellam subuniplicata; perist.

breviter reflexum, margine supero vix soluto. — Long. 19. diam. 3⅓ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Mus. Cuming.)

Cylindrella Dunkeri Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 51. t. 2. f. 9.
— *cylindrus Adams* in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14?*)

Habitat . . . ?

44. C. Gossei Pfr.

T. subcylindracea, sursum attenuata, subtruncata, tenuis, diaphana, oblique et arcuatim leviter costulata, pallide cornea vel hyalina; anfr. 12—16 vix convexiusculi, lente et regulariter accrescentes, ultimus basi acute carinatus, antice brunneo-bimaculatus; apertura oblonga, basi effusa, subangulata; perist. simplex, expansum, marginibus flexuosis, superne disjunctis. — Long. 21, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 29.)

Cylindrella Gossei Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 137.
— — *Pfr.* in Phil. Icon. II. 10. p. 53. et III. 17. p. 7. Cyl. t. 3. f. 10.

Habitat in insula Jamaica. (Gosse in Mus. Cuming.)

45. C. tricolor Pfr.

T. subperforata, fusiformi-turrita, apice valde attenuato subtruncata, laevigata, nitens, opaca, alba, strigis diaphanis, corneo-cinereis ornata; anfr. 12—15 convexiusculi, ultimus basi acute carinatus, antice ascendens, pone aperturam castaneo-marginatus; apertura oblonga, basi subeffusa; columella obsolete plicata; perist. simplex, expansum, marginibus disjunctis, dextro sinuoso, columellari superne angulatim reflexo. — Long. 18, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 30.)

Cylindrella tricolor Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 67.
— *Gossei Phil.* Icon. II. 16. p. 218. Achat. t. 1. f. 10.

Habitat . . . ?

Obs. Haec species, quam antea varietatem praecedentis esse putaveram, ab illa facile distinguenda est sculptura, anfractibus convexioribus etc.

* *
*

46. C. Maugeri (Helix) Wood.

T. rimata, subfusiformis, apice truncata, laevissima, nitida, colore varia; anfr. 8 planuli, ultimus penultimum non superans, basi obtuse carinatus; apertura oblonga; columella plicato-prominens; perist. reflexum, marginibus conniventibus, callo tenui,

*) T. rubra, cylindracea, praecedenti [C. Chemnitzianae] similiter sed exilius insculpta, late decollata; anfr. reliquis 12, haud multum convexis; apertura subovata, in labrum subtenue expansa; anfr. ultimo acute carinato. — Long. post decoll. 0,82, lat. 0,15 poll. (Ad. l. c.)

appresso junctis. — Long. 17, diam. 6 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. N. 31.)

Helix Maugeri Wood suppl. t. 7. f. 31.
— *ignifera* (Cochlodina) *Fér.* pr. 495.
Bulimus Maugeri Gray in Wood suppl. p. 32.
Pupa Maugeri Sow. gen. f. 6.
— — *Reeve* Conch. syst. t. 170. f. 6.
— *splendens Menke* coll. *Pfr.* Symb. I. p. 45.
Buliminus Maugeri Beck ind. p. 71. N. 39?
Torquilla Hornbeckii Villa disp. syst. p. 57.
Cylindrella Maugeri Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 53. III. 17. p. 7. Cyl. t. 3. f. 13.

α. Cinnamomea, sutura albo-cingulata, perist. roseo.
β. Pallide straminea, sutura albo-lineata, perist. albo:
Pupa fusiformis Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14. *)
γ Cinerea, apice viridis, anfr. ultimo albo, castaneo-bifasciato, apertura et peristomate flavis.
δ. Cinnamomea, anfr. ultimo albido, nigricante fasciato, perist. flavo.

Habitat in insula St. Thomas (Hornbeck!) et in Jamaica.

Obs. Conf. C. sanguinea Nr. 8.

§. 8.

47. C. Cumingiana Pfr.

T. umbilicata, non truncata, cylindrica, apice obtusa, oblique striatula, nitida, hyalina; anfr. 10 planiusculi, supremi 3 conum brevem, obtusum formantes, ultimus basi et dorso acute carinatus, a latere compressus, longe porrectus; umbilicus angustissimus, ad apicem pervius; apertura obliqua, pyriformis, superne angulata; perist. undique breviter expansum. — Long. 9½, diam. 3 mill. Apert. 2⅓ mill. longa, c. perist. 1½ lata. (Coll. Nr. 32.)

Cylindrella Cumingiana Pfr. in Phil. Icon. II. 10. p. 51. t. 2. f. 6.

Habitat in insulis Philippinis (Cuming).

§. 9.

48. C. Petitiana (Pupa) Orbigny. †

T. oblongo-conica, subventricosa, umbilicata, longitudinaliter oblique striata, alba, maculis rufis irregulariter ornata; spira elongata, acuminata, apice acuta; anfr. 9 convexi, subcarinati,

*) T. fusiformi, nitida, exilissime striata, opaca, cinerea, decollata; anfr. 5 vel 6 perditis, planulatis; anfr. 8 reliquis, haud multum convexis, albo-fasciatis, fascia infrasuturali; labro solido, albo, rotundato, sinuoso, supra haud continuo; umbilico angusto. — Long. post decoll. 0,8; lat. 0,27 poll. (Ad. l. c.)

angusti; suturae crenulatae; apertura rotunda; labrum tenue, reflexum. — Long. 7, diam. 2½ mill. (O.)

Pupa Petitiana Orb. moll. cub. I. p. 180. t. 12. f. 6—8.

Habitat in insula Cuba.

49. C.? pygmaea Adams. †

T. minima, conica, gracillima, regulariter striata, striis latis; anfr. 7 convexi; apertura obliqua; labrum haud late reflexum. Div. 10". Spirae long. 0,195; long. tot. 0,35; lat. 0,4 poll. (Ad.)

Cylindrella (?) pygmaea Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 14

Habitat in insula Jamaica.

50. C. Petiveriana (Helix) Férussac. †

(Species nusquam descripta, inter affines vix determinanda!)

Helix Petiveriana (Cochlodina) *Fér.* pr. 498.
— — *Wood* suppl. t. 8. f. 70.
Urocoptis Petiverana Beck ind. p. 83. N. 1.
Petiver. Pterigr. tab. 12. f. 9.
Lister t. 21. f. 18.
Favanne Conch. t. 65. f. B 6.

Habitat in Antillis. (Fér.)

Obs. Praeterea species indescriptae hujus generis, vel novae vel ad descriptas referendae, sequentes esse videntur: *Helix* (Cochlodina) *Sloanii Fér* pr. 496 (Antill.), *H. Draparnaldi Fér.* 497 (Cyclodontina Beck ind. p. 88. N. 1. — Antill.) *H. Blainvilliana Fér.* pr. 499 (Urocoptis Blainv. Beck ind. p. 83. N. 2. — Antill.), *H. rosata Fér.* pr. 501 (Urocoptis Beck ind. p. 83. N. 4 — Antill.), *H. flexistriata Fér.* Mus., *Urocoptis glandula Beck* Nr. 5, *Uroc. abbreviata Beck* N. 6. (ins. St. Domingo), *Uroc. coarctata Beck* N. 7 (List. t. 21. f. 17.) et *Urocoptis? soluta Beck* p. 83. N. 9. ex ins. Antillis. — Urocoptis? tortuosa Beck N. 10 (Turbo Chemn.) Cyclostomaceis adnumeranda videtur.

XII. Balea Prideaux emend.

Conspectus specierum.

1. Columella simplice (Balea Gray) . . . . . §. 1. Nr. 1—4.
2. Columella plicata
   a. oblique plicata . . . . . §. 2. — 5—6.
   b. transversim plicata (Megaspira Lea) . . . . . §. 3. — 7.

---

§. 1.

1. B. perversa (Turbo) Linn.

T. sinistrorsa, rimata, fusiformi-turrita, tenera, subtilissime costulato-striata, sericina, olivaceo-cornea; spira turrita, apice acutiuscula; anfr. 9 convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura rotundato-pyriformis; columella simplex; perist. simplex, brevissime expansum, marginibus callo tenui, juxta insertionem labri lamellam parvam emittente junctis, sinistro superne sinuoso. — Long. 9½, diam. 2⅔ mill. Ap. 2⅓ mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 1.)

Turbo perversus Linn. Faun. suec. N. 2172. etc.
— — *Chemn.* IX. P. 1. p. 116. t. 112. f. 9596. (fig. aucta, rudis.)
— — *Mont.* test. brit. p. 355. t. 11. f. 12.
— *nigricans Dillw.* excl. plur. synon. (teste Desh.)
Helix perversa (Cochlodina) *Fér.* pr. 511.
Bulimus perversus Poir. prodr. p. 57. N. 25.
Pupa fragilis Drap. tabl. d. moll. p. 64. N. 25.
— — *Drap.* hist. p. 68. t. 4. f. 4.
— — *Nilss.* p. 48. N. 1.
— — *Lam.* 24. p. 110. ed. Dh. p. 178.
— — *C. Pfr.* I. p. 56. t. 3. f. 16.
— — *Blainv.* in Dict. sc. nat. tome 28. p. 94
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 406. N. 14.
— — *Porro* Malac. p. 58.

Pupa fragilis Morelet moll. du Port. p. 74.
Clausilia fragilis Stud. Verz. p. 20.
— — *Hartm.* in Neue Alpina I. p. 215.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 7. T. 1.
— — *C. Pfr.* III. p. 62.
— — *Held* in Isis 1836. p. 275.
— *parvula Gärtn.* Conch. Wett. p. 22.
— *perversa Charp.* cat. moll. Suiss. p. 17.
— *tenerrima Ziegl.* (Anton Verz.)
— *uniplicata Calc.* Effem. sc. et lett. Sicil. p. 82.
Odostomia perversa Flem. Edinb. Encycl. } teste Gray.
Balaea fragilis Leach moll. p. 116. }
— *perversa Gray* Man. p. 207. t. 6. f. 70.
— — *Thomps.* land- and freshwater-moll. of Irel. p. 27
Balea lucifuga Leach mss. (teste Gray.)
— *fragilis Gray* in Zool. Journ. I. p. 61. *)
— — *Rossm.* X. p. 24. f. 636.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 296.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 8.
— *perversa Flem.* brit. anim. p. 271.
— — *Beck* ind. p. 89. N. 1.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 220.
Fusulus fragilis Fitz. syst. Verz. p. 105.
Balia fragilis } *Swains.* Malac. p. 334.
Eruca fragilis }
Stomodonta fragilis Merm. moll. pyr. p. 48. N. 5.

Habitat in Germania (plerumque in rupibus basalticis), Helvetia, Gallia, Britannia, Hispania, Lusitania, Italia, Sicilia, Hungaria, Suecia.

Obs. Plica parietalis in adultissimis modo testis adest.

2. **B. tristensis Leach.**

T. sinistrorsa, subulata, ovata, fusca. — Axis $^4/_{10}$, diam. $^1/_{10}$ poll. (Gr.) — Long. 10, diam. 3 mill. (Spec. Mus. Brit.)

Balea tristensis Leach mss. *Gray* in Zool. Journ. I. 1. p. 61. t. 6. f. A.
— — *Beck* ind. p. 89. N. 2.
Pupa tristensis Gray in Ann. of Phil. 1825. vol. IX. p. 413.

Habitat in Tristan D'Acunha.

3. **B. Sarsii Philippi.**

T. sinistrorsa, subperforata, oblongo-turrita, striatula, nitida, pellucida, olivaceo-cornea; spira acutiuscula; anfr. 7 convexi, ul-

*) T. sublineari-ovata, pellucida, flavescente. (Gray l. c.)

timus basi rotundatus; columella substricta, paulo recedens; apertura oblongo-semiovalis; perist. simplex, expansiusculum, margine sinistro sinuoso-dilatato. — Long. 6, diam. 2¼ mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Nr. 2.)

Balea Sarsii Phil. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 84.

Habitat in Norvegia. Misit Cl. Sars.

Obs. Forma B. tristensi similior, quam perversae. Inter specimina collectionis Philippianae unum tantum exstat peristomate perfecto, attamen plica parietali carens. Ex analogia autem evidente concludere licet, hanc plicam, sicut in B. perversa, in testis perfectis adesse.

4. B. ventricosa Leach.

T. sinistrorsa, lanceolato-ovata, pallide fusca. — Axis $^3/_{10}$, diam $^1/_{10}$ poll. (Gray.) — Long. 8, diam. 3 mill. (Spec. Mus. Brit.)

Balea ventricosa Leach mss. *Gray* in Zool. Journ. I. 1. p. 62. t. 6. f. B.

Pupa ventricosa Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 413.

Balia ventricosa Swains. Malac. p. 334.

Habitat in Tristan D'Acunha.

§. 2.

5. B. Funcki Pfr.

T. sinistrorsa, vix subrimata, turrita, truncata, sublaevigata, fusca; anfr. (spec. trunc.) 5 convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura oblongo-semiovalis, intus fulva; plica parietalis valida compressa, columellaris obliqua, obsoleta; perist. album, expansum, reflexiusculum, marginibus callo junctis, externo sinuato. — Long. (trunc.) 14, diam. 4 mill. Ap. c. perist. 5 mill. longa, 3⅓ lata. (Mus. Cuming.)

Balea Funcki Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1847.

Habitat in Nova Granada. Prope Cachopo provinciae Meridae legit Cl. Funck.

Obs. Clausilium et plicae palatales, Clausiliis essentiales, huic et sequenti speciei omnino desunt.

6. B. livida (Clausilia) Menke.

T. dextrorsa, rimata, fusiformis, laevigata (minutissime striatula), fusco-violacea; sutura albo-lineata; anfr. 9—10 vix convexiusculi, ultimus antice striatus, albus, basi tumidus; apertura late ovalis, intus fusco-carnea; lamella 1 brevis in pariete aperturali, altera plicaeformis, obliqua ad columellam; perist. labiatum, reflexiusculum, marginibus callo appresso junctis. -

Long. 15—16, diam. anfr. penult. 4½ mill. Ap 4½ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 3.)

Clausilia livida Menke syn. ed. 2. p. 130.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 40.
Balea livida Rossm. X. p. 23. f. 635.

Habitat in Hungaria (teste Dr. Murray).

Obs. 1. Balea truncatula et Chemnitziana Villa huic generi adnumerari non possunt. Conf. Cylindrella gracilicollis (II. p. 376.) et Chemnitziana (p. 381).

Obs. 2. Balea turrita Pfr. (Symb. II. p. 55.) generi Tornatellinae, Baleae proxime affini, restituenda videtur.

§. 3.

7. B. elatior (Pupa) Spix.

T. subperforata, cylindraceo-turrita, solidula, subarcuatim et confertim costulata, vix nitens, fulvida, strigis obliquis rufis variegata; spira elongata, apice obtusa; anfr. 16—17 planiusculi, regulariter lente accrescentes, ultimus basi rotundatus; columella bi- vel triplicata; apertura semiovalis, intus albida, lamella profunde intrante parietis aperturalis munita; perist. subincrassatum, breviter expansum, margine columellari brevi, superne dilatato, sinuoso-reflexo. — Long. 36—40, diam. 8—9 mill. Ap. oblique 8 mill. longa. (Coll. Nr. 4.)

Pupa elatior Spix test. bras. p. 20. t. 15. f. 1.
— — *Lam.* ed. Dh. 33. p. 183.
Helix elatior (Cochlodon) *Orb.* syn. p. 21.
Pyrgelix elata Beck ind. p. 88. N. 1.
Megaspira elatior Pfr. Symb. II. p. 130.

β. Major, anfr. 24: long. 65, diam. 11 mill. Ap. 12 mill. longa. (Spec.)
Megaspira Ruschenbergiana Lea obs. II. p. 21. t. 23. f. 101. *)
— — *Jay* cat. 1836. t. 1. f. 2.
— — *Grat.* Act. Bord. XI. p. 427. t. 2. f. 9.
— — *Sow.* Conch. Man. ed. II. p. 187. f. 294.

γ. Gracilior, subcylindracea, anfr. 21: long. 42, diam. 7½ mill. (Spec.)

Habitat in Brasilia.

Obs. Variat praeterea aperturae forma ovali vel oblique semicirculari.

---

*) T. cylindraceo-turrita, valde striata, subfusca, maculis longitudinalibus rufo-fuscis ornata, apice consolidata; anfr. 23 subplanulatis; spira ad apicem obtusissima; columella quadriplicata; labro reflexo. — Diam. 0,5; long. 2,5″. (Lea l. c.)

XIII. Tornatellina Beck.

1. T. turrita (Strobilus) Anton.

T. turrita, tenuis, subtilissime striatula, pellucida, nitida, pallide cornea; spira elongata, apice obtusiuscula; anfr. 9—10 convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus ¼ longitudinis subaequans; sutura impressa; apertura oblique obovalis, praeter laminam validam parietis aperturalis horizontaliter intrantem edentula; perist. simplex, acutum. — Long. 6, diam. 2 mill. Ap. oblique 1½ mill. longa. (Coll. Nr. 1.)

Strobilus turritus Anton Verz. p. 46. N. 1691.
Tornatellina Archimedis Beck ind. p. 80. N. 4. (teste Anton.)
Balea turrita Pfr. Symb. II. p. 55.
Elasmatina subulata Petit in Proc. Zool. Soc. 1843. p. 2. *)
β. Minor, anfr. 10: long. vix 5, diam. 1⅔ mill. (Spec.)

Habitat in insula Opara (Cuming).

2. T. Petitiana Pfr.

T. sinistrorsa, conico-turrita, laevigata, nitida, pellucida, cornea; spira elongata, apice acutiuscula; sutura anguste marginata; anfr. 8 vix convexiusculi, ultimus ⅓ longitudinis subaequans, basi rotundatus; paries aperturalis lamella acuta, elevata, alba, spiraliter intrante munitus; columella superne subtortodentata; apertura obliqua, semiovalis; intus tenuiter albo-callosa; perist. acutum. — Long. 6⅓. diam. anfr. ult. 3 mill. Ap. 2¼ mill. longa. (Coll. Nr. 2.)

Tornatellina Petitiana Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 149.

Habitat . . . ?

3. T. cubensis Pfr.

T. sinistrorsa, oblongo-turrita, tenuissima, laevigata, hyalina; spira turrita, apice obtusiuscula; sutura levissima; anfr. 6½ — 7 plani, ultimus spira paulo brevior; paries aperturalis lamella

*) T. conico-elongata, cylindracea, pellucida, dilute cornea; anfr. 10 convexis, sutura lineari, impressa; apice obtuso; apertura oblique obovata; columella dente lamelliformi intusque decurrente instructa; labro tenui, acuto. — Long. 6, diam. 2 mill. (Petit l. c.)

parvula, intrante juxta columellam munitus; apertura angusta, lanceolata; perist. acutum, margine columellari brevissimo. — Long. 5, diam. 1⅔ mill. Ap. 2 mill. longa. (Coll. Nr. 3.)

Achatina pellucida Pfr. in Wiegm. Arch. 1840. I. p. 252.
Tornatellina cubensis Pfr. Symb. II. p. 130.

Habitat in insula Cuba. Testas modo inanes in arena litorali legi prope Matanzas.

4. T. minuta (Achatina) Anton.

T. ovato-oblonga, subtilissime striatula, pellucida, cornea, nitida; spira turrito-conica, apice obtusiuscula; anfr. 5½ convexiusculi, ultimus ⅖ longitudinis subaequans; apertura oblonga, subauriformis, lamella parietis aperturalis valida alba et columella calloso-contorta coarctata; perist. acutum. — Long. 3, diam. 1½ mill. Ap. 1⅓ mill. longa. (Coll. Nr. 4.)

Achatina minuta Ant. Verz. p. 44. N. 1592? *)
Tornatellina minuta Pfr. Symb. II. p. 130.

Habitat in insula Juan Fernandez.

Obs. Specimen descriptum ab amico Anton nomine Ach. minutae accepi, sed in descriptione auctoris lamina parietis aperturalis haud memorata est. Num A. minuta Ant. alia species, A. lubricae affinis?

* * *

5. T. trochiformis Beck.

T. conica, subtrochiformis, tenuis, striatula, pellucida, nitida, fusco-cornea; spira conica, apice acuta; sutura linearis, submarginata, anfr. 10 — 11 angusti, plani, ultimus ⅓ longitudinis non aequans, carinatus, basi convexiusculus; apertura depressa, lunaris, lamina debili parietis aperturalis et plica horizontaliter intorta columellae brevissimae coarctata; perist. acutum. — Long. 5 — 6, diam. 3 — 3¼ mill. Ap. oblique 2 mill. longa. (Coll. Nr. 5.)

Tornatellina trochiformis Beck ind. p. 80. N. 2. (teste Ant.)
— — *Pfr.* Symb. II. p. 55.
Strobilus fissidens Mühlf. Ant. Verz. p. 46. N. 1695.
Elasmatina Cumingiana Petit in Proc. Zool. Soc. 1843. p. 2. **)
Junior:
Strobilus conicus Anton Verz. p. 46. N. 1696.

Habitat in insula Juan Fernandez.

---

*) T. oblongo-ovali, spira stricta, non ventrosa; anfractus ultimus reliquos aequans; nitidula; subtiliter striata, lucide brunnea: apertura oblongo-ovalis. — Lat. ⅓, alt. 1¼ lin. (Ant. l. c.)

**) T. ovato-conica, pyramidata, pellucida, dilute corneo-fuscescente; anfr. 10 — 11 subplanulatis, ultimo subangulato; apertura semilunari, angustata; columella biplicata; plica superiori obsolete lamelliformi, inferiori arcuata, lamellosa; labro tenui, acuto. — Long. 6, diam. 3¼ mill. (Petit l. c.)

6. T. bilamellata (Strobilus) Anton.

T. ovato-conica, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, cornea; spira conica, apice acuta; anfr. 6—7 plani, ultimus $^3/_7$ longitudinis subaequans, basi rotundatus; apertura elliptica, angusta, lamina mediocri, suboblique intrante parietis aperturalis, plica valida, transversa columellae et laminis 2 subtilibus, parallelis palati coarctata; perist. acutum. — Long. 5, diam. 3 mill. Ap. $2^1/_2$ mill. longa. (Coll. Nr. 6.)

Strobilus bilamellatus Ant. Verz. p. 46. N. 1694.
Tornatellina clausa Beck ind. p. 80. N. 1. (teste Ant. in litt.)
— — *Pfr.* Symb. II. p. 55. (ex spec. incomplet.)

Habitat in insula Opara.

7. T. Reclusiana (Elasmatina) Petit. †

T. oblongo-conica, pellucida, corneo-fuscescens; anfr. 9—11 planiusculi; apertura semilunaris; columella basi contorto-plicata, plica lamellosa; labrum tenue, acutum. — Long. 5, lat. 2 mill. (Petit.)

Elasmatina Reclusiana Petit in Proc. Zool. Soc. 1843. p. 2.
Tornatellina Reclusiana Pfr. Symb. III. p. 60.

Habitat in insula Masafuera, in littore Chilensi.

8. T. globosa (Elasmatina) Petit.

T. globoso-conica, solidiuscula, striatula, virenti-lutea; spira conica, acutiuscula; sutura levissima; anfr. 7 planiusculi, ultimus spiram fere aequans, subglobosus; apertura elliptico-semiovalis, plicis 4 coarctata: plica 1 in pariete aperturali, oblique intrante, subtus subduplicata, secunda valida, brevi, emarginata, subbiloba ad columellam, 2 obsoletis in palato. — Long. 4—$4^1/_2$, diam. 3 mill. Ap. $2^1/_4$ mill. longa. (Coll. Nr. 7.)

Elasmatina globosa Petit in Proc. Zool. Soc. 1843. p. 2. *)
Tornatellina globosa Pfr. Symb. III. p. 60.

Habitat in insula Opara (Cuming).

9. T. trochlearis Beck.

T. ventroso-fusiformis, nitida, pellucida, pallide cornea; anfr. 6 planuli, ultimus spira brevior, basi attenuatus; apertura oblonga;

*) T. ventricoso-conica, pellucida, luteo-virescente; anfr. 6—7 planiusculis, ultimo maximo, ventricoso, pallidiore; spira conico-acuta; apertura semilunari, ringente; columella supra medium dente lamelliformi instructa, dente subtus marginato, interdum duplicato, ad basim plicato, plica antice emarginata robuste biloba, lobo superiori ascendente, inferiori subhorizontali; labro acuto. — Long. 4, lat. 3 mill. (Petit l. c.)

perist. simplex; lamella parietis aperturalis transversa, magna, acuta. — Long. 4, diam. 2 mill. (Coll. Anton.)

Tornatellina trochlearis Beck ind. p. 80. N. 3. (teste Anton in litt.)
— — *Pfr.* Symb. II. p. 55.
Strobilus pellucidus Mühlf. Anton Verz. p. 46. N. 1693.
β. Gracilior, palato subtiliter unilamellato. (Coll. Nr. 8.)

Habitat in insula Opara (Anton), Masafuera (Beck).

10. T. ovata (Strobilus) Anton.

T. ovata, ventrosa, nitida, laevigata, pellucida, cornea; spira brevis, obtusa; anfr. 3½ convexi, ultimus inflatus, ⅔ longitudinis subaequans; apertura angusta, semiovalis, plica 1 compressa parietis aperturalis et altera dilatata, torta, subtriangulari columellae coarctata; perist. acutum. — Long. 3½, diam. 2⅓ mill. (Coll. Nr. 9.)

Strobilus ovatus Anton Verz. p. 46. N. 1697.
Achatina ovata Pfr. Symb. I. p. 29.

Habitat in insula Opara (Anton).

Obs. Conf. Bulimus Antoni Pfr. (vol. II. pag. 221.)

* * *

11. T.? Ferussaci Pfr. †

T. elongata, ventricosa, tenuis, diaphana, alba, substriata, spira elongata, apice obtusa; anfr. 7; apertura oblonga, unilamellata; columella contorta, truncata, acuta; labrum tenue, secans. — Long. 12, diam. 11 mill. (Orb.)

Helix unilamellata Fér. Mus.
— — (Cochlitoma) *Orb.* syn. p. 9.
Achatina unilamellata Menke syn. ed. II. p. 29.
Bulimus unilamellatus Orb. voy. p. 257.
Tornatellina Ferussaci Pfr. Symb. II. p. 130.

Habitat in provincia Santa Cruz de la Sierra reipublicae Bolivianae. (Orb.)

Obs. Num haec potius Achatinae lamellatae et Funcki Nr. 84 et 85 (vol II. pag. 271.) affinior?

XIV. Clausilia Draparnaud. *)

Conspectus specierum.

A. Plica lunata nulla.
1. Anfractu ultimo longe soluto . . . . . §. 1. Nr. 1—2.
2. Anfractu ultimo vix soluto vel appresso.
a. Apertura basi rotundata,
α. sublaevigatae
* europaeae . . . . . §. 2. — 3—16.
** asiaticae . . . . . §. 3. — 17—23.
β. costulatae . . . . . §. 4. — 24—34.
b. Apertura basi angulosa . . . . . §. 5. — 35—40.
B. Plica lunata inconspicua vel obsoleta. **)
1. Peristomate continuo, soluto
a. laevigatae vel striatae
α. dextrorsae . . . . . §. 6. — 41.
β. sinistrorsae . . . . . §. 7. — 42—50.
b. costulatae . . . . . §. 8. — 51—55.

---

*) Ad dignoscendas Clausilias terminis a Cl. Rossmässler 1836 (Icon. III. p. 8.) propositis utamur necesse est. Nempe in apertura observantur:

1) lamellae 2 plerumque convergentes, interdum imperfectae, nunquam omnino deficientes:

a) supera juxta insertionem labri = plica parietalis Cantr. Malac. p. 144.

b) infera in medio marginis columellaris aperturae = plica columellaris Cantr.

2) lunella s. plica lunata, in plerisque speciebus tanquam macula albida opaca, antrorsum arcuata vel strictiuscula in parte anfractus ultimi aperturae opposita extus conspicua.

3) plicae palatales, rarius omnino deficientes:

a) superae, suturae parallelae, 1 vel plures = plica suturalis Cantr.

b) inferae, oblique descendentes, saepe emersae = plica basilaris Cantr.

4) plica subcolumellaris (Cantr.) columellam circumvolvens, forsan nunquam deficiens, sed saepe pone lamellam inferam occultata, saepius autem infra hanc emersa = plica columellaris Rossm.

**) Cl. de Charpentier (Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 142.) plicam lunatam et reliquas in testis opacis exactissime conspicuas reddi asserit, si acidi nitrici gutta illa pars testae, qua situm habent, tangatur, statimque aqua abluatur. Hac methodo adhibita Clausiliae in §. 6—10 descriptae inter reliquas sectiones distribuendae erunt.

c. acute lamellatae . . . . . §. 9. Nr. 56—60.
2. Peristomate superne appresso vel interrupto §. 10. — 61—65.
C. Plica lunata imperfecta . . . . . §. 11. — 66—88.
D. Plica lunata distincta.
1. Albidae subopacae . . . . . §. 12. — 89—103.
2. Corneae,
a. sublaevigatae, nitidae
α. sutura simplice . . . . . §. 13. — 104—115.
β. sutura albofilosa . . . . . §. 14. — 116—120.
γ. sutura papillifera . . . . . §. 15. — 121—137.
b. striatulae
α. sutura papillifera . . . . . §. 16. — 138—146.
β. sutura simplice . . . . . §. 17. — 147—164.
c. costulatae vel costatae
α. peristomate simplice . . . . . §. 18. — 165—192.
β. peristomate denticulato . . . . . §. 19. — 193—203.
d. cancellatae . . . . . §. 20. — 204.
E. Species dubiae . . . . . §. 21. — 205—222.

---

§. 1.

1. Cl. tridens (Turbo) Chemnitz.

T. non rimata, fusiformis, subtruncata, solida, longitudinaliter costata, oblique minutim striata, fusca; anfr. 7—9 planiusculi, lati, ultimus deorsum solutus; apertura magna, oblique subpyriformis, intus sulcata; lamellae validae, approximatae, conniventes, acutae; lunella nulla; plica palatalis unica, supera, subcolumellaris crassa, subramosa; perist. continuum, incrassatum, album, undique liberum, reflexum. — Long. 25, diam. medio 5 mill. Ap. 5½ mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 1.)

Turbo tridens Chemn. IX. P. I. p. 115. t. 112. f. 957.
— *labiatus Dillw.* descr. cat. II. p. 875.
— *costulatus Wood* suppl. t. 6. f. 36.
Helix bicanaliculata (Cochlodina) *Fér.* pr. 523.
Clausilia costulata Lam. 4. p. 113. ed. Dh. p. 198.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 47.
— — *Rossm.* XI. p. 8. f. 718.
— *tridens Schweigg.* Naturg. p. 741.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 1.
— — *Küster* Mon. p. 12. t. 1. f. 1—4.
— *labiata Sow.* genera of shells fasc. 30. Claus. f. 3.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 171. f. 3.
— *bicanaliculata Jay* catal. 1839. p. 53.

Habitat in insula Portorico.

2. Cl. epistomium Küster.

T. non rimata, cylindraceo-fusiformis, tenuis, oblique confertim striatula, cornea, diaphana; spira apice obtusa; anfr. 10 plani, ultimus verticaliter descendens, basi subrotundatus; apertura oblique cordato-rotunda; lamella supera valida, marginalis, infera parvula profunda; lunella nulla (vel inconspicua?); plica palatalis 1 longa, profunda, subcolumellaris vix conspicua; perist. continuum, undique late expansum. — Long. 26, diam. medio 4⅓ mill. Ap. 4⅔ mill. longa et lata. (Spec. coll. dom. Thomae.)

Clausilia epistomium Küster Monogr. p. 13. t. 1. f. 5—8.

Habitat in America centrali teste Cl. Thomae.

§. 2.

3. Cl. Sandrii Küster.

T. rimata, turrita vel fusiformi-turrita, solida, subtilissime striatula, sericina, fusca; spira apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi tumidus, juxta rimam obtuse cristatus; apertura ovali-oblonga; lamella supera compressa, infera lata, valida, tortuose ascendens; lunella nulla; plicae palatales 5 (secunda et quinta longissimae, quarta subramosa), subcolumellaris breviter emersa; perist. albo-labiatum, expansum, reflexiusculum, superne breviter appressum. — Long. 23, diam. 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 2.)

Clausilia Sandrii Küster Monogr. p. 28. t. 2. f. 20—23.

Habitat in Dalmatia.

4. Cl. laminata (Turbo) Montagu.

T. minutissime rimata, fusiformis, glabriuscula, fusco-cornea vel corneo-rufa; spira turrita, apice obtusiuscula; anfr. 10—11 vix convexiusculi, ultimus antice striatus, juxta rimam subtuberculatus; apertura ovali-pyriformis; lamella supera minuta, infera valida; lunella nulla; plicae palatales sub 4 (prima et tertia longiores), subcolumellaris emersa; perist. connexum, album, limbatum, superne subangulosum; palatum oblique callosum. — Long. 17, diam. 4 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 3.)

Helix bidens Müll. verm. II. p. 116. N. 315.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 2. T. 9.
— *derugata* (Cochlodina) *Fér.* pr. 529.
Turbo bidens Chemn. IX. P. I. p. 119. t. 112. f. 960. n. 1. Nec Linn.
— — *Gmel.* p. 3609. N. 87.
— *laminatus Mont.* test. brit. p. 359. t. 11. f. 4.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 874. N. 142.
Bulimus bidens Brug. Enc. méth. I. p. 352. N. 93.
— — *Poir.* prodr. p. 57. N. 26.

Pupa bidens Drap. tabl. d. moll. p. 61. N. 18.
Clausilia bidens Drap. hist. p. 68. t. 4. f. 5—7.
— — *C. Pfr.* I. p. 60. t. 3. f. 25.
— — *Hartm.* in Neue Alpina I. p. 217.
— — *Flem.* brit. anim. p. 271.
— — *Rossm.* I. p. 76. f. 29. VII. p. 16. f. 461. 62.
— — *Charp.* catal. moll. Suisse p. 17.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 49.
— — *Lam.* ed. Dh. 13. p. 202.
— — *Roth* diss. p. 20.
— — (Marpessa) *Gray* Man. p. 212. t. 5. f. 53.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 118.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 15.
— *lamellata Leach* moll. p. 118.
— *laminata Turt.* Man. p. 70. f. 53.
— — *Dupuy* moll. du Gers p. 35.
— *derugata Jeffr.* } teste Beck.
Odostomia laminata Flem. olim. }

β. Major: long. 21, diam. 5½ mill.
Clausilia grossa Ziegl. Mus.
— *bidens var. Rossm.* VII. f. 463.
— *lucida Menke* syn. ed. II. p. 129.

γ. Saturate rufa vel rubicunda, gracilis:
Clausilia granatina Ziegl. Mus.
— *transylvanica Stentz* in sched.
— *bidens var. Rossm.* VII. f. 465.

δ. Gracilis, sutura albo-subfilosa, perist. saepe vix connexo: long. 15—17, diam. 3½—4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2¾ lata. (Spec.)
Clausilia ungulata Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 50.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 61.
— *bidens var. Rossm.* VII. p. 16. f. 464.

ε. Minor, pallide cornea: long. 12, diam. 3¼ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2⅓ lata.
Clausilia lucida Ziegl. Mus.
— *bidens var. Rossm.* VII. p. 17. f. 467.

ζ. Albina, virenti-hyalina (ad formam typicam) vel coerulescenti-hyalina (ad var. *δ.* pertinens). Rarissimae.

Habitat in plerisque Europae terris, nec non prope Smyrna (Roth); varietates citatae praesertim in Illyria. Specimina albina formae typicae prope Cassel, Cl. ungulatae in monte Loibl Carinthiae legi.

Obs. Varietates *β—γ* in omnibus formis intermediis occurrunt. — *Cl. semifimbriata Mouss.* (inter varietates a Villa laudata) et *Cl. ampla Hartm.* (Neue Alpina I. p. 217.) mihi incognitae sunt. Cl. ampla etiam a C. Pfeiffer et Beck cum synonymo Cl. fimbriatae Mlf. in varietatibus Cl. bidentis enumeratur.

5. Cl. fimbriata Mühlfeldt.

T. vix rimata, subfusiformi-turrita, subtiliter striata, nitida, straminea; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus antice tumidus; apertura ovali-oblonga, intus albo-callosa; lamellae mediocres; lunella nulla; plicae palatales 3 (supera longissima), subcolumellaris emersa; perist. albo-limbatum, reflexiusculum, marginibus disjunctis vel callo tenui junctis, sinistro sinuoso; palatum callo margini parallelo incrassatum. — Long. 14—16, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 4.)

Clausilia fimbriata Mühlf. Mus.
— — *(Ziegl.) Rossm.* Il. p. 11. f. 106?
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 16.
— *bidens var. C. Pfr.* Ill. p. 62. t. 7. f. 14. 15.?
Dyodonta fimbriata Hartm. Gast. I. p. 155. t. 31. f. 1—3.

β. Saturatius virenti-lutea, callo palatali extus aurantio:
Clausilia saturata Ziegl. Mus.
— *virens Mühlf.* olim.

γ. Rufo-cornea, callo palatali crasso, aurantiaco:
Clausilia phalerata Ziegl. Mus.

δ. Fusco-cornea, epidermide passim detrita:
Clausilia detrita Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 54.
— *cerata Rossm.* IV. p. 15. f. 258.
— *bidens var. Scholtz* in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 103?
— *fimbriata var. Schmidt* syst. Verz. p. 16.

Habitat in Carinthia (monte Ovir!), Carniolia, Croatia! Var. δ etiam in Buccovina.

Obs. 1. Callus palatalis in hac specie nonnullisque affinibus peristomatis margini semper parallelus, in Cl. laminata ejusque cognatis oblique recedens.
Obs. 2. Conf. Cl. elongata Cantr. Nr. 213.

6. Cl. Küsteri Rossmässler.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, solidula, gracilis, subtilissime striata, sericina, lutescenti-cornea; anfr. 11—13, supremi convexi, ultimi 4 planulati, ultimus distinctius striatus, juxta rimam subtuberculatus; apertura ovali-pyriformis; lamellae mediocres; lunella nulla; plicae palatales 3 (superae 2, tertia infera), subcolumellaris breviter emersa; palatum transverse subcallosum; perist. continuum, solutum, sublabiatum, reflexiusculum. — Long. 19, diam. 4⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 5. Spec. a Cl. Rossm. commun.)

Clausilia Küsteri Rossm. Ic. IV. p. 13. f. 254.
— *substriata Küst.* in litt. olim.
— *Küsterii Beck* ind. p. 92. N. 52.
— *Adjaciensis Shuttl.* in litt. (Mittheil. Bern. Ges. 1843. p. 18.)

β. Minor: long. 14, diam. 3⅓ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2½ lata. (Spec.)
Habitat in Sardinia et Corsica.

7. Cl. Parreyssi Ziegler.

T. breviter rimata, fusiformi-cylindracea, glabra, nitidissima, rufa; spira apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 10 planiusculi, ultimus antice costulato-striatus; apertura oblongo-pyriformis; lamella supera minutissima, infera vix validior; lunella nulla: plicae palatales 4 (secunda et tertia saepe obsoleta breves), subcolumellaris emersa; perist. vix continuum, albido-limbatum, reflexiusculum, intus late rubello-labiatum; palatum callo margini sinistro parallelo, fulvo tumidum. — Long. 18, diam. 4 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 6.)

Clausilia Parreyssii Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* X. p. 20. f. 628.
— *marmorata Parr.* in sched. olim.
— *cerea Menke* syn. ed. II. p. 30?

Habitat in montibus Carpathis.

8. Cl. marginata Ziegler.

T. rimata, fusiformis, sublaevigata, nitida, pellucida, flavescenti-cornea; spira apice acutiuscula; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus basi rotundatus, antice striatus; apertura pyriformis, angustata; lamellae approximatae, validae; lunella nulla; plicae palatales sub3 (supera longissima), subcolumellaris longe emersa; perist. continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, intus fusculo-labiatum. — Long. 17—18, diam. 4 mill. Ap. 4¼ mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 7.)

Clausilia marginata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 12. f. 107. X. p. 20.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 60.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 183. t. 19. f. 1. 2.
— — *Lam.* ed. Dh. 22. p. 207.
— *democletiana Stentz.* (teste Villa disp. syst. p. 25.)

β. Minor:
Clausilia bilabiata Friv. nec Wagn. (Rm. X. p. 20.)

γ. Major: long. 23, diam. 4½ mill.
Clausilia grossa Friv. in sched.
— *marginata var. Rossm.* X. p. 19. f. 626.

Habitat in Banatu, Transylvania, var. γ in Turcia.

Obs. Conf. Cl. stigmatica (Nr. 72.), praecedentibus affinis.

9. Cl. macedonica Rossmässler.

T. rimata, fusiformis, subtiliter striata, nitidula, violascenti-cinerea; spira apice obtusiuscula, fulva, opaca; anfr. 11—13 pla-

niusculi, ultimus basi subcompressus, costulato-striatus; apertura ampla, pyriformis, intus fuscula; lamella supera exigua, infera valida; lunella nulla; plicae palatales sub5 (secunda longissima, quarta brevissima), subcolumellaris valida, emersa; perist. continuum, undique solutum, late expansum. — Long. 20—22, diam. 4½—5 mill. Ap. 6 mill. longa, 4½ lata. (Coll. Nr. 8.)

Clausilia macedonica Rossm. Ic. X. p. 18. f. 624.
— *candidescens β Friv.* in sched.
— *Friwaldskyi Villa* olim. (disp. syst. p. 25.)

Habitat in Macedonia.

10. Cl. plumbea Rossmässler. †

T. rimata, fusiformis, ventricosa, laeviuscula, livida; sutura alba; anfr. 9; apertura pyriformi-rotundata; lamellae validae, infera flexuosa; lunella nulla; plicae palatales 4 (superiores 2 longae, utrinque conniventes, tertia brevissima, quarta mediocris), subcolumellaris emersa; perist. continuum, parum solutum, albolabiatum, reflexum. Alt. 8⅓, lat. 2⅓ lin. (Rm.) — Long. 19, diam. 5 mill. Ap. oblique 5 mill. longa, 4 lata. (ex ic.)

Clausilia plumbea Rossm. Ic. X. p. 16. f. 617.

Habitat . . . ? (In Mus. Berol.)

11. Cl. commutata Rossmässler.

T. vix rimata, fusiformis, glabriuscula, nitidula, corneo-lutescens vel castanea; spira apice obtusa; anfr. 9—11 vix convexiusculi, ultimus basi tumidus, striatus; apertura ovali-subpyriformis; lamella supera parvula, infera valida; lunella nulla; plicae palatales 3 (media flexuosa), subcolumellaris emersa; perist. subconnexum, subtiliter albo-limbatum; palatum saepe callo diagonali incrassatum. — Long. 13, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 9.) — Alt. 6—7, lat. 1—1½ lin. (Rm.)

Clausilia commutata Rossm. Ic. IV. p. 19. f. 269.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 53.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 16.
— *diodon Collect.*
— *tristis Cantr.* Malac. méd. p. 149. t. 5. f. 19? *)

β. Minor: long. 10, diam. 2¾ mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (Spec.)

*) T. fusiformi, elongata, striata, vix rimata, sordide fusca; anfr. 10 convexis, sutura simplice disjunctis; cervice plicatula; apertura subrotunda aut ovali, fuscescente, 5 plicata: pl. parietali columellarique compressis, subcolumellari minima, basilari conspicua sicut et suturali; perist. soluto. — Alt. 5—5½, diam. 1½‴. — Triest freq. (Cantr. l. c.)

Clausilia annexa Ziegl. (teste Küster.)

Habitat in Illyria, Carniolia, prope Tergestum et Monfalcone, etiam in Silesia (Scholtz) et Helvetia (teste Partsch, Rm.).

12. Cl. diodon Studer.

T. rimata, fusiformis, subventrosa, virenti-lutescens, subtiliter striata, opaca; spira sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 9 convexiusculi, ultimus substriatus, basi tumidus; apertura ovali-pyriformis; lamella supera minuta, infera stricta, antice angulata; lunella nulla; plicae palatales 3 (supera 1 mediocris, 2 inferiores punctiformes), subcolumellaris distincta, emersa; perist. sejunctum, albolabiatum, parum expansum. — Long. 12. diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia diodon Stud. Verz p. 19.

— — *Rossm.* Ill. p. 19. f. 189.

— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 17. t. 2. f. 8.

— — *Beck* ind. p. 93. N. 58.

— *bidens β dyodon Hartm.* in Neue Alpina I. p. 217.

Helix diodon (Cochlodina) *Fér.* pr. 530.

Habitat in Helvetia, Wallis et in montibus pedemontanis (Charp.).

Obs. Inter omnia specimina, quae e variis locis sub hoc nomine accepi, nullum unquam inveni descriptioni et specimini typico Rossmässleriano congruum. — Nonne interdum plica lunata distinctior adsit?

13. Cl. curta Rossmässler.

T. vix rimata, ventroso-fusiformis, confertissime costulato-striata, sericina, fusco-cornea; spira apice attenuata, acutiuscula; anfr. 9 planiusculi, ultimus basi subgibbus; sutura submarginata; apertura ovali-pyriformis; lamella supera mediocris, infera compressa, elata, flexuosa; lunella nulla; plicae palatales 3 (antice in callum transversum, tenuem confluentes, media flexuosa), subcolumellaris emersa; perist. subconnexum, reflexiusculum. — Long. 10—11, diam. 3—3¼ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 10.)

Clausilia curta Rossm. Ic. IV. p. 19. f. 268.

— — *Beck* ind. p. 93. N. 56.

— — *Schmidt* syst. Verz. p. 19.

Habitat in Carniolia: Grossgallenberg prope Laibach (Schmidt).

14. Cl. orthostoma Menke.

T. rimata, cylindrico-fusiformis, obtusa, striata, nitida, rufescens; spira obtusa; anfr. 9—10 convexiusculi; apertura ovali-pyriformis; lamella supera parva, infera valida, flexuosa; lunella nulla; plicae palatales 4 (suprema longior, infima saepe obsoleta).

subcolumellaris subemersa; perist. subconnexum, limbato-reflexum. — Long. 12, diam. 3¼ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 11.)

Clausilia orthostoma Menke syn. ed. II. p. 130. *)
— *taeniata Ziegl., Rossm.* III. p. 21. f. 192.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 57.

Habitat in Saxonia, Silesia, Bavaria (ad radicem montis Watzmann!), Hungaria.

15. Cl. succincata Ziegler.

T. rimata, turrito-fusiformis, subtilissime striata, pellucida, nitida, lutescenti-cornea; spira attenuata, acutiuscula; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus antice costulatus, albescens, subconstrictus; apertura pyriformis; lamella supera parvula, compressa, infera planiuscula, obliqua; lunella nulla; plicae palatales 2 (suturae parallelae, inferior brevis), subcolumellaris inconspicua; perist. connexum, album, incrassato-labiatum, breviter expansum. — Long. 11, diam. infra medium 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2¼ lata. (Coll. Nr. 12.)

Clausilia succineata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 21. f. 193.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 138.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 17.
— *exilis Ziegl.* olim.

Habitat in alpibus Carnioliae et Carinthiae.

16. Cl. pulchella Pfr.

T. rimata, turrito-fusiformis, subtilissime striatula, sublaevigata, albescenti-cornea; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 11 planiusculi (medii interdum distinctius striati), ultimus basi subgibbus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae approximatae, infera obliqua, strictiuscula; lunella nulla; plicae palatales 2 (suprema longior, altera brevissima), subcolumellaris immersa; perist. continuum, subappressum, albidum, expansiusculum. — Long. 10, diam. 2⅔ mill. Ap. 2¼ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia pulchella Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 9.

Habitat in montibus Welebit Croatiae (Frivaldsky).

---

*) T. fusiformi, striata, flavo fusca; anfr. 10; apertura ovata, recta; columella biplicata; perist. continuo, reflexo, superius anfractui penultimo arcte adpresso. — Long. 6, lat. 1½ lin. — Prope Lipsiam legit Klett. (Menke l. c.)

§. 3.

17. Cl. corticina v. d. Busch.

T. subrimata, turrita, basi vix attenuata, corneo-rufa, oblique minutissime striatula, rudis; spira turrita, acuta; sutura albo-submarginata; anfr. 10 lati, planiusculi; apertura ovalis, intus nitide castanea; lamella supera compressa, infera approximata, validior, perobliqua; lunella nulla; plicae palatales sub2 profundae, subcolumellaris profunda, obsoleta; perist. continuum, expansum, albo-marginatum, superne subsolutum — Long. 24—27, diam. 5—5½ mill. Ap. 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 13.)

Clausilia corticina v. d. Busch mss.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 60.
— — *Küster* p. 26. t. 2. f. 24. 25.

Habitat in insula Java (Winter).

18. Cl. pluviatilis Benson.

T. rimata, fusiformis, tandem truncata, solida, leviter oblique striata, olivaceo-fusca; anfr. 9 planiusculi, ultimus basi compressus, canaliculatus; apertura oblique ovalis; lamella supera acuta, infera valida, oblique intrans, antice levior; lunella nulla; plica palatalis sub1 elongata, subcolumellaris porrecta; perist. continuum, solutum, margine exteriore incrassato, reflexo. — Long. 25, diam. 7 mill. (Mus. Brit.)

Clausilia pluviatilis Bens. in Ann. and mag. nat. hist. IX. p. 486. *)
— — *Pfr.* Symb. III. p. 94.

Habitat in insula Chusan Chinae.

Obs. Descriptio Bensoniana incompleta ad Cl. Largillierti Phil. referenda videtur (conf. Nr. 43.), sed specimina authentica Musaei Britannici nullo modo cum ea conveniunt.

19. Cl. loxostoma Benson.

T. vix rimata, fusiformis, apice subtruncata, medio ventrosa, sublaevigata, corneo-grisescens; anfr. 8 convexiusculi; sutura confertim crenulata; apertura oblique pyriformis, intus fulvescens; lamella supera acuta, infera oblique torta; lunella nulla; plicae palatales 4—6 (suprema longissima), subcolumellaris non conspicua; perist. subincrassatum, expansum, continuum, margine

*) T. fusiformi, pallide olivacea; spira attenuata, crystallina, apice papillari; anfr. 14, medianis ventricosioribus, omnibus leviter transverse striatis; perist. valde reflexo, planato, ad labii basin plica obliqua solida, sulcoque concurrente munito. — Axis 1,1 poll. (Bens. l. c.)

supero appresso. — Long. 21, diam. medio 6 mill. (Mus. Brit.) Ap. 6 mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. v. d. Busch.)

Clausilia loxostoma Bens. in Journ. Asiat. Soc. V. p. 353. *)

— *bengalensis v. d. Busch* mss. *Pfr.* Symb. II. p. 60.

— — *Küster* p. 24. t. 2. f. 11—13.

Habitat in Bengalia.

20. Cl. Junghuhni Philippi.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, solidula, subtilissime striata, vix nitidula, diaphana, cerea; spira superne subito attenuata, apice obtusa; anfr. 11 convexi, ultimus basi rotundatus; apertura ovali-pyriformis, intus albida; lamella supera valida, infera stricte ascendens; lunella nulla; plicae palatales sub 4, distantes, deorsum decrescentes, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, albo-sublabiatum, superne sinuosum. — Long. 22, diam. fere 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 4 lata. (Coll. Philippi.)

Clausilia Junghuhni Phil. in Küst. Mon. p. 23. t. 2. f. 5—7.

Habitat in insula Java.

21. Cl. cornea Philippi.

T. vix rimata, cylindraceo-fusiformis, tenuis, confertissime striata, sericina, cornea; spira sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 12—13 planiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura ovalis; lamellae minutae, infera valde ascendens; lunella nulla; plicae palatales 3 (supera longissima), subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, expansiusculum, album. — Long. 22, diam. 4 mill. Ap. 5 mill. longa, 3½ lata. (Coll. Philippi.)

Clausilia cornea Phil. in Küster Mon. p. 22. t. 2. f. 1—4.

Habitat in insula Java.

22. Cl. javana Pfr.

T. subrimata, cylindraceo-fusiformis, solidula, oblique confertissime striatula, vix nitidula, saturate rufa; spira sensim attenuata, apice obtusiuscula; sutura levis, submarginata; anfr. 9—10 lati, vix convexiusculi, ultimus antice subrugosus, basi rotundatus; apertura oblique pyriformis, intus violaceo-livida; lamellae validae, divergentes, supera compressa, infera perobliqua, stricte ascendens, introrsum subbifida; lunella nulla; plicae palatales 3—4 (suprema longissima, 2 sequentes profundae, quarta saepe

*) T. sinistrorsa, fusiformi, medio ventricosa, corneo-grisescente; anfr. convexis, laevigatis, striis obsoletis; suturis confertissime crenulatis; apertura elongata, obliqua, biplicata, supra angustiore, infra dilatata; perist. reflexo; columella praearcuata. — Long. 0,85 poll. (Bens. l. c.)

obsoleta), subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, margine columellari strictiusculo, rarius curvato. — Long. 23, diam. 4⅔ mill. Ap. fere 6 mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 14.)

Clausilia javana Pfr. Symb. I. p. 49.
— — *Küster* p. 26. t. 2. f. 26—28 et
— *Heldii Küster* p. 27. t. 2. f. 29—31.

Habitat in insula Java (v. Ende, Winter).

Obs. Variat magnitudine, plicarum palatalium numero, plica subcolumellari emersa vel subimmersa (Küst. f. 27.), aperturae margine columellari stricto (Küst. f. 30.), vel apertura ovali (Küst. f. 27.).

23. Cl. Cumingiana Pfr.

T. vix rimata, fusiformi-cylindrica, gracilis, subtiliter oblique striata, sericina, brunnea; anfr. 11, primi 5—6 convexi, reliqui planulati, ultimus costulato-striatus, subporrectus, dorso carinatus, basi rotundatus; apertura oblongo-pyriformis; lamellae approximatae, subaequales; lunella nulla; plicae palatales 2 (superior brevis, inferior brevissima), subcolumellaris inconspicua; perist. liberum, latum, carneo-labiatum, expansum, subreflexum. — Long. 21, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 15.)

Clausilia Cumingiana Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 158.

Habitat in insulis Philippinis (Cuming).

§. 4.

24. Cl. Grayana Pfr.

T. vix rimata, fusiformis, medio ventrosa, confertim acute costata, sericina, coerulescenti-cinerea, apice nitida, cornea; anfr. 12 convexi, ultimus attenuatus, compressus, validius costatus, basi subcristatus; apertura oblongo-ovalis, intus fuscidula; lamella supera tenuis, infera perobliqua, fissa; lunella nulla; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris occulta; perist. continuum, solutum, undique expansum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 16.)

Clausilia Grayana Pfr. Symb. III. p. 94.
— —. *Küster* t. 8. f. 15—18.

Habitat in insula Cerigo (Forbes).

25. Cl. Frivaldskyana Rossmässler. †

T. rimata, fusiformis, ventricosa, corneo-fusca, costulato-striata; sutura subpapillifera; anfr. 11 convexi, ultimus rugosus, basi tumidulus; apertura pyriformis; lamella infera valida, elata; lunella nulla; plicae palatales 4 (tertia brevissima), subcolumellaris emersa; perist. continuum, subsolutum, reflexum, labiatum.

— Alt. 8, lat. 2 lin. (Rm.) — Long. 19, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3½ lata. (ex ic.)

Clausilia Frivaldskyana Rossm. Ic. X. p. 20. f. 627.

— *fimbriata Friv.* in sched.

Habitat in Turcia.

Obs. Cl. marginatae eodem modo affinis, quam costata commutatae. (Rm.)

26. Cl. intermedia Schmidt.

T. rimata, fusiformis, solidula, regulariter costata, nitidula, brunnea; spira apice attenuata, acutiuscula; anfr. 11—12 planiusculi, ultimus basi tumidus, juxta rimam gibbus; apertura ovali-pyriformis; lamellae mediocres, compressae; lunella nulla; plicae palatales 4, suprema et secunda flexuosa in callum crassiusculum transversum palatalem abeuntes, 2 infimae elongatae, juxta subcolumellarem emersae, antice callo junctae; perist. subconnexum, fusculum, subtiliter limbatum, margine columellari supra rimam angulatim dilatato. — Long. 17, diam. infra medium 4⅓ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 17.)

Clausilia intermedia Schmidt syst. Verz. p. 18.

— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 69.

— *costata var. grossa Rossm.* (teste Schmidt.)

Habitat in Carniolia.

Obs. Plica palatalis secunda flexuosa interdum plicam lunatam imperfectam simulat.

27. Cl. costata Ziegler.

T. subrimata, fusiformis, confertim costulata, vix nitidula, cornea; spira apice attenuata, acutiuscula; anfr. 10 planiusculi, ultimus basi tumidus; apertura oblongo-pyriformis; lamellae compressae, albae, graciles; lunella nulla; plicae palatales 3, media brevissima, infima sicut subcolumellaris emersa; perist. vix connexum, reflexiusculum, subtiliter labiatum. — Long. 14, diam. 3¼ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 18.)

Clausilia costata Ziegl. Mus.

— — *C. Pfr.* Ill. p. 42. t. 7. f. 17. 18.

— — *Rossm.* Ill. p. 16. f. 181.

— — *Beck* ind. p. 93. N. 55.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 180. t. 18. f. 7. 8.

Habitat in Illyria (prope Woltschach in valle Isontii!) et Sirmia (Rm.).

28. Cl. Porroi Pfr.

T. subrimata, fusiformis, solidula, confertim costulato-striata, sericina, lutescenti-cornea; spira attenuata, acutiuscula; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura ovalis; lamellae

mediocres, infera antice subramosa; lunella nulla; plicae palatales 3 (suprema mediocris, 2 breves), subcolumellaris emersa; perist. continuum, superne subappressum, tenue, reflexiusculum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Porroi Pfr. mss.

— *sarda Porro* in sched. coll. Rossm.

Habitat in Sardinia.

Obs. Affinis praecedenti; differt costis subtilioribus, plica palatali infima brevi, nec emersa, etc. — Etsi a Cl. Porro hoc nomine designata, cum descriptione Cl. sardae Villa minime convenit. Conf. Nr. 220.

29. Cl. Michaudiana Pfr.

T. rimata, fusiformis, confertim costulata, sericina, cornea; spira regulariter attenuata, acutiuscula; anfr. 12 convexiusculi, ultimus basi tumidus, juxta rimam breviter cristatus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae mediocres; lunella nulla; plicae palatales 2 superae, divergentes, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, undique expansum, intus carneo-labiatum. — Long. 14, diam. 3⅔ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Michaudiana Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 12.

Habitat in Turcia (Frivaldsky).

Obs. Similis Cl. elatae Nr. 151, nec non biplicatae Nr. 180.

30. Cl. Moussoni Charpentier.

T. rimata, fusiformis, costulato-striata, pellucida, cornea, nitida; spira sensim attenuata, apice obtusa; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus basi tumidus, callo aurantio, margini parallelo signatus; apertura oblongo-pyriformis, intus profunde albo-callosa; lamellae mediocres, conniventes; lunella nulla; plicae palatales 3 (supera 1 longa, media brevissima, tertia infera), subcolumellaris vix emersa; perist. vix connexum, brevissime reflexiusculum. — Long. 12, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 19.)

Clausilia Moussoni Charp. ined.?

— — *Villa* disp. syst. p. 28.

Habitat in Helvetia («Albiskette» in fagetis).

31. Cl. varians Ziegler.

T. rimata, fusiformi-cylindrica, confertim costulato-striata, sericina, cornea; spira turrita, acutiuscula; anfr. 9—10 vix convexiusculi, ultimus antice subconstrictus, basi tumidus, cristatus; apertura rotundato-pyriformis, basi subcanaliculata; lamella supera parvula, compressa, infera remota, profunda; lunella nulla;

plicae palatales 2 superae (altera longa, altera postica punctiformis), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, vix solutum, reflexiusculum. — Long. 10—12, diam. 2½—3 mill. Ap. 2⅓ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Nr. 20.)

Clausilia varians Ziegl. Mus.
— — *C. Pfr.* III. p. 40. t. 7. f. 24. 25.
— — *Rossm.* IV. p. 17. f. 263.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 125.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 20.

β. Virenti-albida, plerumque major:
Clausilia diaphana Ziegl. olim.
— — *C. Pfr.* III. p. 40. t. 7. f. 20. 21.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 180. t. 18. f. 17. 18.
— *varians var. Rossm.* IV. f. 263 maj.

Habitat in alpibus Styriae et Carinthiae inferioris (in «Eulöfen» vallis Lavantae! et prope St. Leonhard: Rm.), etiam in Saxonia (Rm.) et Silesia (Scholtz).

Obs. Paries interlamellaris saepe pliculis munitus est, similiter ac in Cl. plicatula.

32. Cl. capillacea Rossmässler.

T. minute rimata, attenuato-fusiformis, capillaceo-costulata, sericina, flavescens; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus basi vix gibbus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae parvulae, approximatae; lunella nulla; plicae palatales 3 (superae 2, quarum inferior brevissima, tertia infera vix conspicua), subcolumellaris immersa; perist. continuum, vix solutum, expansiusculum, subtiliter limbatum. — Long. 12, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 21.) — Alt. 4½, lat. ¾ lin. (Rm.)

Clausilia capillacea Rossm. Ic. III. p. 22. f. 194.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 137.
— *strigillata Ziegl.* Mus.

Habitat in Dalmatia.

Obs. Conf. Cl. pulchella Nr. 16.

33. Cl. filograna Ziegler.

T. non rimata, fusiformis, subtiliter costulata, diaphana, vix nitidula, fusca; spira turrita, apice obtusa; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus antice rotundatus; apertura pyriformis; lamellae parvulae, imperfectae; lunella nulla; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris breviter emersa; palatum transverse callosum; perist. continuum, productum, reflexiusculum. — Long. 9, diam. 2½ mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 22.)

Clausilia filograna Ziegl. Mus.

Clausilia filograna Rossm. IV. p. 17. f. 264.
— — *Pfr.* in Wiegm. Arch. 1841. I. p. 222.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 20.

Habitat in Silesia (Scholtz), Austria (frequentissima in «Helenenthal» prope Baden!), Styria, Illyria, Croatia, Bucovina.

Obs. *Claus. distinguenda Zgl.* Mus. nullo modo distingui potest.

34. Cl. deltostoma Lowe.

T. subrimata, fusiformis, solidula, longitudinaliter costulata, opaca, non nitens, fusca; spira subulata, apice acuta; anfr. 9 regulariter accrescentes, convexiusculi, ultimus margine columellari cristato-tuberosus; apertura rotundato-pyriformis; lamella supera mediocris, infera valida, obliqua; lunella nulla (?); plica palatalis 1 supera, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, albidum, reflexiusculum. — Long. 10, diam. 2¾ mill. Ap. 2½ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Nr. 23. Spec. Lowean.)

Helix (Cochlodina) *deltostoma Lowe* Faun. Mader. p. 65. t. 6. f. 37. *)
Clausilia deltostoma Lam. ed. Dh. 32. p. 211.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 2.
β. Anfractibus planatis, sutura subobsoleta:
Helix deltostoma var. Lowe l. c. f. 38.

Habitat in insulis Madera et Portosancto.

Obs. Variat apertura magis ovali vel deltoidea.

§. 5.

35. Cl. canalifera Rossmässler.

T. non rimata, fusiformis, apice attenuata, fusca, substriata, nitidula; anfr. 13 vix convexiusculi, ultimus antice plicatulus, basi in cristam curvatam compressus; apertura angulato-pyriformis, basi canalifera; lamellae mediocres; lunella nulla; plicae palatales 3, subtilissimae, retrorsum convergentes, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, expansum, reflexiusculum. — Alt. 8 — 8½, lat. 2 lin. (Rm.) — Long. 19, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia canalifera Rossm. Ic. III. p. 17. f. 183.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 122.

*) T. turrita, gracili, obtusa; anfr. 10 — 11 planiusculis, striis rectiusculis, crebris, elevatis sculptis; apertura oblique obovato-rotundata, deltoidea, effusa, postice angustata, subbiplicata; plica antica columellari, interna, obliqua, duplice, postica simplice, prominente, sc. extrorsum ad marginem peristomatis producta eique continua, sinum ad angulum posticum aperturae efficiente; perist. continuo, expanso, reflexo, disjuncto. — Long. 5 — 5½, diam. 1½ lin (Lowe l. c.)

Clausilia cerea Collect.

Habitat in Tauria (Parreyss).

Obs. Variat testa paulo breviore, magis ventrosa.

36. Cl. detersa Ziegler.

T. non rimata, fusiformis, ventrosa, fusca, subtilissime striata, opaca; anfr. 12 plani; ultimus latere impressus, basi compresso-carinatus; apertura angulato-pyriformis, intus fusca, basi canalifera; lamella infera remota, stricta; lunella nulla; plicae palatales 3 (superae 2 breves, tertia infera subemersa), subcolumellaris immersa; periomphalum latum; perist. continuum, productum, albidum. — Long. 17, diam. infra medium 4¾ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3¼ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia detersa Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 17. f. 182.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 123.

Habitat in Tauria.

37. Cl. gracilicosta Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, corneo-fusca, albo-costulata; spira sursum attenuata, acutiuscula; anfr. 12—13 vix convexiusculi, ultimus basi valide et prominenter cristatus; apertura subpyriformis, basi angulata, canaliculata; lamellae parvulae; lunella nulla; plicae palatales 3, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, liberum, albidum, expansum, reflexiusculum. — Long. 18—19, diam. 3½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 24.)

Clausilia gracilicosta Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 18. f. 184.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 121.
— *exsculpta Crist.* et *Jan.*
— *didyma Parr. Ant.* Verz. p. 45. N. 1631.

β. Minor:
Clausilia ravida Ziegl. Mus.

γ. Minor, gracilis, peristomate producto:
Clausilia porcata Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 117.
— *gracilicosta var. Rossm.* VII. p. 24. f. 490.

Habitat in Tauria.

38. Cl. acridula Ziegler.

T. subrimata, fusiformis, subtilissime costulato-striata, sericina, fusca; spira turrita, acutiuscula; anfr. 12 planiusculi, ultimus antice ruguloso-plicatus, latere subimpressus, basi arcuato-cristatus; apertura elliptico-pyriformis, basi canaliculata; lamella

infera remota, profunda; lunella nulla; plicae palatales 3, subcolumellaris immersa; perist. continuum, productum, expansum. — Long. 10—11, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 25.)

Clausilia acridula Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 18. f. 185.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 118.

Habitat in Tauria.

39. Cl. taurica Krynicki?

T. subrimata, fusiformi-subulata, regulariter et confertim costulata, vix nitidula, fusco-cornea; spira superne gracillima, acuta; anfr. 11 planiusculi, celeriter accrescentes, ultimus a latere excavato-impressus, basi bicristatus; apertura elliptica, superne et basi angulata; lamella supera parvula, infera profunda, vix conspicua; lunella nulla; plica palatalis 1 obsoleta, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, expansum. — Long. 13, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2¼ lata. (Coll. Nr. 26.)

Clausilia taurica Kryn.? Beck ind. p. 95. N. 98.

Habitat in Tauria.

40. Cl. Bergeri Mayer.

T. vix rimata, fusiformi-cylindrica, levissime striatula, nitidula, saturate coerulescenti-brunnea; spira elongata, obtusiuscula; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus antice breviter solutus, latere bicostatus, basi acute cristatus; apertura subtriangularis, basi canaliculata, intus fusca; lamella supera parvula, infera remota, profunda; lunella nulla; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, brevissime reflexum, marginibus superne et inferne angulatim junctis, dextro valde arcuato, a crista basali sulco profundo separato, externo subrecto, subrepando. — Long. 10—12, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, medio 1¾ lata. (Coll. Nr. 27.)

Clausilia Bergeri Mayer mss.
— — *Rossm.* Ill. p. 18. f. 187.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 116.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 18.
— *cristata Ziegl.* Mus.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 180. t. 18. f. 10. 11.
— *rostellum Held* in Isis 1836. p. 276. *)

Habitat in Salisburgia (frequentissima in «Öfen der Salzach»!), in alpibus Bavariae, in Carinthia et Carniolia.

Obs. Conf. Cl. strumosa Nr. 81.

*) T. cylindraceo-fusiformi, obtusa, brunneo-nigrescente, laeviuscula; toro dorsuali trigemino, acute prominente; apertura lunata; perist. soluto rostrique

§. 6.

41. Cl. Voithii Rossmässler.

T. dextrorsa, rimata, cylindraceo-fusiformis, striatula, nitida, coerulescenti-albida; spira sursum attenuata, apice obtusiusculo pallide cornea; anfr. 12, supremi 3 convexi, laevigati, reliqui planulati, 3—4 sequentes costulati, ultimus rugoso-costulatus, basi acute cristatus; apertura elliptica; lamella supera evanescens, infera plicaeformis, obliqua; lunella et plica subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1 supera; perist. continuum, expansiusculum, superne breviter solutum. — Long. 17, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 28.)

Clausilia Voithii Rossm. Ic. IV. p. 11. f. 246.

— — *Beck* ind. p. 91. N. 24.

β. Minor, anfr. 10: long. 14, diam. 3½ mill. (Spec.)

Habitat in insulis Graeciae.

§. 7.

42. Cl. Cecillii Philippi.

T. arcuato-rimata, fusiformis, solida, oblique costulato-striata, laete castanea; spira elongata, sursum attenuata; anfr. sub 12 planiusculi, ultimus basi rotundatus; apertura magna, obverse auriformis, intus fuscula; lamellae validae albidae, conniventes; lunella imperfecta (vix distinguenda); plica palatalis 1 mediocris, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, superne angulatum, crassum, coerulescenti-albidum, late expansum, reflexiusculum. — Long. 31, diam. 6⅔ mill. Ap. 7⅔ mill. longa, 6 lata. (Coll. Philippi.)

Clausilia Cecillii Phil. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 68.

Habitat in China (Cecille, Largilliert).

43. Cl. Largillierti Philippi.

T. arcuato-rimata, fusiformis, solida, oblique striata, laete fuscescens; spira elongata, sursum valde attenuata, apice acutiuscula; anfr. 13 vix convexiusculi, ultimus antice tumidus, basi in cristam brevem compressus; apertura ampla, oblique pyriformi-elliptica, basi ad dextram anguste canaliculata; lamellae validae, supera compressa, infera profunda, obliqua, sursum bipartita; lunella imperfecta vel obsoleta; plica palatalis 1 longa, suturae parallela, subcolumellaris juxta canalem usque in marginem peri-

---

modo protracto, subreflexo, bicanaliculato, fusco; margine columellari prope semicirculato, laterali subrecto; columellae lamellis 3 exilibus, 2 dexterioribus occultis, intermedia rursus bifida; faucium pariete laterali uniplicato. — Long. 4⅔ — 5¼, lat. 1⅛ lin. (Held l. c.)

stomatis producta; perist. continuum, breviter solutum, crasse albo-labiatum, undique expansum. — Long. 30, diam. (anfr. penult.) 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 29.)

Clausilia Largillierti Phil. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 68.

Habitat in China (Largilliert).

44. Cl. orientalis v. d. Busch.

T. rimata, fusiformi-subulata, glabra, nitida, pallide griseo-cornea; spira valde elongata, gracillima; anfr. 14—15 planiusculi, apertura pyriformis, intus coerulescenti-albida; lamella supera compressa, infera subrecte ascendens; lunella haud conspicua, neque plica palatalis; plica subcolumellaris valida, fere ad basin usque prominens; perist. continuum, solutum, reflexum. — Long. 25, diam. infra medium 4⅓ mill. Ap. 5 mill. longa, medio 3⅔ lata. (Coll. v. d. Busch.)

Clausilia orientalis v. d. Busch mss.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 60.
— — *Küst.* p. 25. t. 2. f. 17—19.

Habitat in insula Java.

45. Cl. teres (Bulimus) Olivier.

T. vix rimata, subfusiformi-cylindracea, longitudinaliter striata, cinerascenti-alba; spira elongata, gracilis, apice fusco-nigra, nitida; anfr. 14 planissimi, ultimus confertim rugoso-plicatus, basi subcompressus; apertura oblongo-ovalis, intus laete castanea; lamella supera punctiformis, infera levis, furcata; lunella indistincta; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, superne vix solutum, labiatum, breviter expansum. — Long. 21, diam. medio 4 mill. Ap. 4⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 30.)

Bulimus teres Oliv. voy. I. p. 417. t. 17. f. 6.
Helix teres (Cochlodina) *Fér.* pr. 517.
Clausilia teres Lam. 7. p. 114. ed. Dh. p. 199.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 21.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 177. t. 17. f. 17. 18.

Habitat in insula Creta.

46. Cl. Boissieri Charpentier.

T. non rimata, fusiformis, sublaevigata, coerulescenti-albida vel carneo-cinerea; spira elongata, apice cornea, acutiuscula:

*) B. sinister, parvulus, anguste fusiformis, obsolete striolatus, cum vertice atrato albidus; anfract. planissimis; apertura ovato-oblonga, obscure bidentata. (Oliv. l. c.)

anfr. 11 planulati, summi striati, ultimus costulato-striatus, solutus, basi bicristatus: cristis compressis, superne remotis, ad aperturam confluentibus, altera strictiuscula, altera juxta periomphalum latum arcuatim flexa; apertura ampla, ovalis, intus albida; lamella supera marginalis, infera valida, subhorizontalis; lunella inconspicua; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris profunda, immersa; perist. liberum, simplex, undique late expansum. — Long. 20½, diam. medio 4 mill. Ap. 5 mill. longa, c. perist. 4 lata. (Coll. Nr. 31.)

Clausilia Boissieri Charp. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 142.

Habitat in Syria (Petit); prope Beirut, inter Nahr et Kelb (Boissier).

47. Cl. caerulea (Helix) Férussac.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, laevigata, opaca, vix nitidula, coerulescenti-calcarea, punctis corneis irregulariter conspersa; spira turrita, apice attenuata, nigro-coerulescens; anfr. 11 — 12 planulati, ultimus antice ruditer rugosus, basi in cristas 2 convergentes, crenulatas productus; apertura elliptico-ovalis, carneo-fuscula; lamellae parvulae, profundae; lunella et plica subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1, suturae parallela; perist. continuum, solutum, expansum. — Long. 19, diam. 4⅔ mill. Ap. 4⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 32.)

Helix caerulea (Cochlodina) *Fér.* pr. 520 et Mus.!
Clausilia coerulea Rossm. II. p. 8. f. 99.
— — *Desh.* Expéd. de Morée III. p. 166. t. 19. f. 64 — 66.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 26.
— — *Lam.* ed. Dh. 30. p. 210.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 178. t. 17. f. 21. 22.

β. Minor, cristis basalibus sulco minus profundo separatis, anfr. 10: long. 15, diam. 3¾ mill. (Spec.)

Habitat in Morea et insulis Archipelagi: Santorino, Naxos, Chios.

48. Cl. cretensis Mühlfeldt.

T. non rimata, fusiformis, gracilis, vix nitidula, coerulescenti-albida, punctis corneis aspersa; spira sensim attenuata, apice acuta, nigricans; anfr. 12, supremi glabri, 3 — 4 sequentes subtiliter costulato-striati, medii laevigati, planiusculi, ultimus antice confertim rugosus, basi cristato-compressus; apertura oblonga, intus pallide fulva; lamellae parvulae, approximatae; lunella et plica subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1, suturae parallela; perist. continuum, solutum, albo sublabiatum, undique expansum. — Long. 18, diam. vix 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 33.)

Clausilia cretensis Mühlf. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 11. f. 245.

Clausilia cretensis Beck ind. p. 91. N. 23.
— — *Roth* diss. p. 21.
— *chrysalis Gray* in Wood suppl. p. 34?
Turbo chrysalis Wood suppl. t. 6. f. 39?

Habitat in insulis Creta et Syra.

49. Cl. virginea Pfr.

T. rimata, fusiformis, solida, opaca, alba, nitidula, medio obsolete striata, apice cornea; sutura linearis; anfr. 10 planulati, penultimus supra suturam rugatus, ultimus valide rugoso-costatus, basi tumidus, juxta rimam cristatus; apertura ovalis, intus fusca; lamellae conniventes, infera validior; lunella indistincta; plica palatalis 1, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, undique breviter expansum. — Long. 15, diam. medio 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 34.)

Clausilia virginea Pfr. Symb. III. p. 95.
— — *Küster* t. 4. f. 4—6.

Habitat in insula Creta (Forbes).

50. Cl. discolor Pfr.

T. vix rimata, fusiformis, solidula, laevigata, carneo-lactea, opaca, irregulariter corneo-variegata; sutura linearis; anfr. 11 planulati, ultimus confertissime costulato-striatus, basi gibboso-cristatus; apertura oblonga; lamellae subaequales, infera profunda; lunella indistincta; plica palatalis 1 prope suturam, subcolumellaris nulla; perist. continuum, albo-labiatum, superne breviter solutum, undique expansum. — Long. 14—15, diam. infra medium 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 35.)

Clausilia discolor Pfr. Symb. III. p. 93.
— — *Küster* t. 8. f. 34—37.

Habitat in insula Cerigo (Forbes).

§. 8.

51. Cl. Spratti Pfr.

T. rimata, fusiformis, saepe decollata, confertissime costata (costis rectiusculis), fulvo-cinerea; sutura submarginata; anfr. 14 planiusculi, ultimus rugis acutis, elevatis, confluentibus exasperatus, basi obsolete compressus; apertura ovalis; lamellae conniventes, infera perobliqua; lunella obsoleta; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, tenue, late expansum. — Long. (spec. non truncati) 24, diam. $5^1/_3$ mill. Ap. 5 mill. longa, $3^1/_2$ lata. (Coll. Nr. 36.)

Clausilia Spratti Pfr. Symb. III. p. 94.
— — *Küster* t. 8. f. 1—4.

Habitat ad Melopotamo insulae Candiae (Spratt, Forbes).

52. Cl. Lopedusae Calcara.

T. subrimata, clavato-fusiformis, solida, pallide rubella vel coerulescens, non nitens, costis filiformibus, rectis, albis confertissimis obsita; spira sensim attenuata, acutiuscula; sutura linearis, crenulata; anfr. 10 plani, ultimus basi cristis 2 subaequalibus, distantibus, parallelis munitus; apertura coarctata, semiovalis; lamellae exiguae, infera subfurcata; plica lunata et subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1 supera, longa; perist. continuum, breviter solutum, angulatim expansum, callo crassissimo albo labiatum. — Long. 17, diam. 4 mill. Ap. c. perist. 4½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Lopedusae Calc. teste Friv.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 11.

Habitat in insula Lampedusa.

53. Cl. inflata (Bulimus) Olivier.

T. vix rimata, clavato-fusiformis, longitudinaliter costulata, lactea; spira attenuata, apice nigra, nitida; anfr. 12—14 vix convexiusculi, ultimus validius rugatus, basi brevissime gibbosocristatus; apertura oblongo-ovalis, intus fuscula; lamellae mediocres, approximatae; lunella indistincta; plicae palatales 2 elongatae, subcolumellaris immersa; perist. solutum, continuum, breviter expansum. — Long. 21, diam. infra medium 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3¼ lata. (Coll. Nr. 37.)

Bulimus inflatus Oliv. voy. I. p. 417. t. 17. f. 3. *)
Helix inflata (Cochlodina) *Fér.* pr. 521.
Clausilia inflata Lam. 6. p. 114. ed. Dh. p. 199.
— — *Guér.* Iconogr. Moll. t. 6. f. 13.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 32.
— — *Küster* t. 8. f. 26—29.

β. Minor: long. 17, diam. 3½ mill.
Clausilia inflata Ziegl. Rossm. IV. p. 12. f. 250.
— *tumens Beck* ind. p. 91. N. 29.

Habitat in insula Candia; var. β in Sicilia?

54. Cl. Olivieri Roth.

T. subarcuato-rimata, fusiformi-turrita, solidula, longitudinaliter costulato-plicata, nitidula, sordide albida, fusco irregulariter maculata; spira turrita, apice saturate cornea, nitida, acutiuscula; anfr. 11—12 planulati, ultimus antice confertius rugoso-plicatus, basi obsoletissime bicristatus; apertura ovalis, fuscula; lamella supera parvula, infera profunda, subramosa; plica lunata

*) B. sinister, parvulus, ventricoso-fusiformis, cum vertice atrato lacteus, leviter striolatus; apertura ovali, obscure bidentata, alba. (Oliv. l. c.)

et subcolumellaris inconspicuae, palatales 2; perist. continuum, vix solutum, breviter expansum. — Long. 18—19, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 38.)

Clausilia Olivieri Roth diss. p. 21. t. 2. f. 7.

Habitat in insula Rhodo.

55. Cl. senilis Ziegler.

T. subarcuato-rimata, ventroso-fusiformis, confertissime costulata, non nitens, opaca, sordide alba, punctis fuscis raris aspersa; spira sensim attenuata, apice cornea, acutiuscula; anfr. 10—11 subplanulati, sutura impressa distincti, ultimus rugosior, basi compresso-cristatus; apertura obliqua, elliptico-pyriformis, sursum oblique in angulum acutum producta; lamella supera minuta, infera remota, subobsoleta; plica lunata et subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1 supera; perist. continuum, solutum, sublabiatum, undique expansum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. oblique 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 39.)

Clausilia senilis Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 11. f. 248. 249.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 30.
— *modesta Ziegl.* (teste Rossm.)
— *antiquata Parr.* (Menke syn. p. 31.)

Habitat in insulis graecis, Corfu.

§. 9.

56. Cl. retusa (Bulimus) Olivier.

T. rimata, fusiformi-cylindracea, decollata, longitudinaliter costulato-plicata, in interstitiis longitudinaliter striata, albido-cinerea; anfr. 6—7 vix convexiusculi, ultimus validius rugoso-plicatus, basi striato-cristatus; apertura angusta, oblonga, carneo-fusca; lamellae exiguae, supera fere obsoleta; plica lunata et subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1 valida; perist. continuum, liberum, breviter expansum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, $2^3/_4$ lata. (Coll. Nr. 40.)

Bulimus retusus Oliv. voy. I. p. 416. t. 17. f. 2. *)
Helix retusa (Cochlodina) *Fér.* pr. 514.
Clausilia retusa Lam. 3. p. 113. ed. Dh. p. 198.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 13.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 190. t. 19. f. 15. 16?

Habitat in insula Creta.

---

*) B. sinister, parvulus, decollatus, fusiformi-cylindraceus, totus conspicue plicato-striatus, obsolete albus; apertura ovali, introrsum obscure biplicata, rufidula. (Oliv. l. c.)

57. Cl. lerosiensis (Helix) Férussac.

T. subrimata, fusiformis, apice valde attenuata, acute et confertim costata, pallide fuscescens; anfr. 10—11 convexi, ultimus remote rugosus, basi rugoso-subcristatus; apertura subovalis; lamellae mediocres, conniventes, acutae; plica lunata et subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1 elongata; perist. continuum, solutum, tenue, brevissime expansum. — Long. 16, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 41.)

Helix Lerosiensis (Cochlodina) *Fér.* pr. 515 et Mus.!
Clausilia Lerosiensis Beck ind p. 90. N. 14.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 47.

Habitat in insula Leros Archipelagi.

Obs. Similis praecedenti, sed non truncata et aperturae forma diversa.

58. Cl. saxatilis Parreyss.

T. subrimata, fusiformi-subulata, acute et confertim lamellato-costata, albido-fuscescens; spira elongata, valde attenuata, apice cornea; anfr. 12, supremi convexi, inferiores 3—4 subplanulati, ultimus brevis, superne constrictus, basi cristatus; apertura parvula, oblonga; lamellae subaequales; lunella obsoleta; plica palatalis 1 distincta, subcolumellaris nulla; perist. continuum, superne solutum, undique mediocriter expansum. — Long. 16, diam. (anfr. penult.) 4 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 42.)

Clausilia saxatilis Parr. in sched.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 94.

Habitat in insula Cypro.

59. Cl. exarata Ziegler.

T. cylindrico-fusiformis, gracilis, violascenti-cinerea, longitudinaliter argute albo-costulata; spira elongata, acutiuscula; anfr. 11—13, supremi convexi, 4—5 ultimi plani, ultimus medio sulcato-impressus, basi bicristatus, antice protractus, superne carinatus; apertura pyriformi-rotundata, intus pallide fuscescens; lamellae conniventes, compressae, infera validior; lunella inconspicua; plicae palatales 2 parallelae, antice evanescentes, subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, undique expansum. — Long. 20—21, diam. 3¼—3½ mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 43.)

Clausilia exarata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 13. f. 108.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 15.
— — *Lam.* ed. Dh. 37. p. 213.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 192. t. 19. f. 19. 20.
— *callosa Mühlf.*

Clausilia angistoma Collect.

β. Minor, anfr. 11, apice et apertura fuscis: long. 15, diam. 2¾ mill. (Spec.)

Clausilia denegabilis Ziegl. teste Parreyss.

Habitat prope Macarsca Dalmatiae, var. *β* in insula Corzzola.

60. Cl. lamellosa Wagner.

T. vix rimata, subcylindrica, tenera, fusculo-cinerea, argute albo-costulata; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus distantius costatus, basi obtuse cristatus; apertura rotundato-ovalis, fuscescens; lamellae compressae, parvulae, valde conniventes; lunella indistincta; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris non emersa; perist. continuum, solutum, tenue, fragile, breviter expansum. — Long. 11—13, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 44.)

Clausilia lamellosa Wagn. in Chemn. XII. p. 190. t. 236. f. 4143.*)
— — *Beck* ind. p. 90. N. 16.
— — *Lam.* ed. Dh. 34. p. 212.
— *sulcosa Mühlf.* Mus.
— — *Rossm.* II. p. 13. f. 109.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 193. t. 19. f. 25. 26.
— — *Roth* diss. p. 20.
— *elegans Cantr.* Bull. Brux. II. p. 382.**)
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 152. t. 5. f. 13. (nec 15.)

Habitat in Dalmatia, Ragusa; in muris Smyrnae (Roth).

§. 10.

61. Cl. strigillata Mühlfeldt.

T. rimata, oblongo-cylindracea, confertim costulata, cinerea; spira subulata, apice acutiuscula; anfr. 7 convexiusculi, ultimus basi obsolete cristatus, subgibbus; apertura rotundato-ovalis; lamellae conniventes, parvulae, compressae; lunella indistincta; plicae palatales 2 superae, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, expansum, superne brevissime solutum. — Long. 9½, diam. 2⅔ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 45.)

Clausilia strigillata Mühlf. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 13. f. 110.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 18.

---

*) T. fusiformi, cornea, lamellis longitudinalibus albis creberrimis instructa; apertura biplicata; perist. dilatato, patulo, reflexo — Long. 6 lin. — Dalmat. (Wagn. l. c.)

**) T. elongata, gracili, fusca, longitudinaliter costata; costis pliciformibus creberrimis albidis; anfr. 9; apertura ovali, patula; columella biplicata; labro uniplicato. — Alt. 5½, diam. 1 lin. — Ragusa. (Cantr. l. c.)

Clausilia strigillata Lam. ed. Dh. 33. p. 212.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 193. t. 19. f. 23. 24.
— *comta Mühlf.* olim.
— *sulcosula Ziegl.* Mus.
— *sulculosa Menke* syn. ed. II. p. 31.

β. Paulo major, anfr. 8, costulis distinctioribus:
Clausilia striolaris Ziegl.

Habitat in Dalmatia, prope Ragusam.

62. Cl. formosa Ziegler.

T. rimata, oblongo-fusiformis, confertissime capillaceo-costulata, corneo-cinerea; sutura levissima, filaris, alba; anfr. 7 subplanulati, supremi pallide cornei, ultimus acutius costatus, basi gibbo-cristatus; apertura oblonga; lamellae mediocres, conniventes; lunella indistincta; plicae palatales 2 superae, subcolumellaris vix emersa; perist. vix continuum, breviter expansum, superne tenuissimum, appressum. — Long. 9, diam. 2⅔ mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 46.)

Clausilia formosa Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 14. f. 111.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 17.
— — *Lam.* ed. Dh. 36. p. 213.
— *brevis Cantr.* Bull. Brux. II. p. 382. *)
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 151. t. 5. f. 20.

Habitat in Dalmatia, prope Ragusam; in insula Meleda (Küster).

Obs. Beck Cl. brevem Cantr. ad Cl. strigillatae Mlf. var. minorem refert; sed ex descriptione et icone huc pertinere mihi videtur. — Cantraine Cl. Schuchii Voith ejus synonymam habet.

63. Cl. armata Kutschig. †

T. cylindrica, obtusiuscula, opaca, alba; anfr. 10 angusti, primi nitidi, tertius et quartus ferrugineo-rufi, subtiliter costulati, reliqui costati: costis gibboso-elevatis; cervix acute costata; apertura ovata; perist. acutum, subrectum; lamellae minutae, suprema inconspicua; lunella et plicae palatales inconspicuae. — Alt. 5, lat. 1½‴. (Küst.)

Clausilia armata Kutschig in Küst. Mon. p. 22. t. 2. f. 8—10.

Habitat in Dalmatia. (Specimen hucusque unicum in collectione auctoris in urbe Zara.)

---

*) T. parva cylindracea cinereo-fusca, longitudinaliter levissime striata; anfract. 7 planiusculis; apertura magna, ovali; columella biplicata; labro uniplicato. — Alt 3½, diam. 1 lin. — Prope Umbla Dalmatiae. (Cantr. l. c.)

64. Cl. abrupta Küster.

T. vix rimata, subfusiformis, laevigata, cinerea, apice cornea; anfr. 8½—9 planiusculi, ultimus abrupte attenuatus, antice costulato-striatus, basi cristato-gibbus; apertura semiovalis; lamellae approximatae, convergentes; plica lunata et subcolumellaris inconspicuae, palatalis 1; perist. non continuum, breviter reflexum, albidum, marginibus subparallelis. — Long. 10, diam. medio 3 mill. Ap. 2¼ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Nr. 47.)

Clausilia abrupta Küst. Mon. p. 15. t. 1. f. 13—16.
— *rejectilis Parr.* in sched.

Habitat in Dalmatia meridionali.

* * *

65. Cl. interrupta Ziegler.

T. rimata, subturrita, confertim et eleganter costata, sericina, diaphana, cornea; spira turrita, obtusiuscula; anfr. 11 convexiusculi, ultimus vix angustior, antice subconstrictus, basi gibbus; apertura semiovalis; lamella supera compressa, infera profunda, saepe obsoleta; lunella nulla vel imperfecta; plicae palatales 3 (suprema longa, 2 breves, callosae), subcolumellaris emersa; perist. sejunctum, marginibus subparallelis, breviter expansis, reflexiusculis, externo sinuoso. — Long. 10, diam. 3 mill. Ap. 2¾ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 48.)

Clausilia interrupta Ziegl. Mus.
— — *C. Pfr.* III. p. 39. t. 7. f. 22. 23.
— — *Rossm.* IV. p. 20. f. 270.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 20.
— *Pfeifferi Schmidt* in sched. olim.
Fusulus interruptus Fitz. syst. Verz. p. 105.
β. Albina, virenti-hyalina. (Rariss.)

Habitat in alpibus Styriae, nec non Carnioliae (Schmidt).

§. 11.

66. Cl. cochinchinensis Pfr.

T. subrimata, fusiformis, minutissime oblique striata, solida, nitida, livido-fusca; sutura profunda; anfr. 9 lati, convexiusculi, ultimus confertim rugoso-costulatus, basi rotundatus; apertura pyriformis; lamellae albidae, conniventes, infera superne bipartita; lunella imperfecta, e lamellis pluribus brevibus composita; plica palatalis 1 longissima, supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, superne subangulosum, undique expansum

et breviter reflexum. — Long. 25, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 49.)

Clausilia cochinchinensis Pfr. Symb. I. p. 48.
— — *Küst.* p. 18. t. 1. f. 23. 24.

Habitat in Cochinchina.

67. Cl. insignis Gould. †

T. fusiformis, sinistrorsa, solida, castanea; anfr. 9 convexi, leviter striati; apertura purpurea, rotundata, lamellis 2 fortibus postice et 5 tenuibus per testam apparentibus intus instructa; labrum valde reflexum. — Long. 1, diam. ⅕ poll. (G.) — Long. 28, diam. 6½ mill. Ap. 7 mill. longa, 6 lata. (ex ic.)

Clausilia insignis Gould in Bost. Journ. IV. 4. p. 458. t. 24. f. 8.

Habitat in provincia Tavoy imperii birmani.

68. Cl. Philippiana Pfr.

T. vix rimata, abbreviato-fusiformis, crassa, solida, subtilissime striatula, castanea; spira ventrosa, apice obtusissima; anfr. 6, primi 3 planiusculi, penultimus convexus, ultimus angustior, basi rotundatus; apertura verticalis, oblique semiovalis; lamellae validae, approximatae; lunella imperfecta vel obsoleta; plica palatalis 1 longa, supera, subcolumellaris immersa; perist. crassum, continuum, superne subadnatum, marginibus late expansis, columellari perobliquo, externo strictiusculo. — Long. 21, diam. 7¾ mill. Ap. oblique 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 50.)

Clausilia Philippiana Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 69.

Habitat in imperio birmano; prope Mergui legit Dr. Th. Philippi.

Obs. Affinis praecedenti. Differt forma abbreviata spirae (in pluribus speciminibus prorsus aequali) et formatione aperturae.

* * *

69. Cl. tenuilabris Rossmässler.

T. vix rimata, clavato-fusiformis, ventricosa, subtiliter costulato-striata, fusco-cornea; anfr. 11 lati, convexiusculi, ultimus basi tumidus, leviter subcristatus; apertura ovali-pyriformis; lamella supera parva, infera parum elata, strictiuscula; lunella subnulla; plica palatalis 1 supera, brevis, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, pallidum, tenuissimum, expansiusculum. — Long. 17½, diam. medio 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia tenuilabris Rossm. Ic. XI. p. 7. f. 710.

Habitat in Banatu (Frivaldsky).

70. Cl. Stentzii Rossmässler.

T. perforato-rimata, turrito-fusiformis, solidula, subtiliter striata, nitida, brunnea; spira sensim attenuata, apice obtusa; sutura albo-filosa et papillis striaeformibus irregulariter ornata; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus basi tumidus, juxta rimam subgibbus; apertura rotundato-ovalis, intus fusca; lamellae imperfectae, supera punctiformis, infera profunda; lunella imperfecta vel nulla; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris inconspicua; perist. connexum, albidum, breviter expansiusculum. Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 51.)

Clausilia Stentzii Rossm. Ic. III. p. 19. f. 188.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 139.
— *Stentziana Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 192. t. 19. f. 21. 22?

Habitat in alpibus Tyroliae (Stentz).

Obs. Persimilis Balcae lividae (II. p. 389). Conf. praeterea Claus. Rossmässleri Nr. 118.

71. Cl. lamellata Ziegler.

T. minutim rimata, fusiformis, ventricosa, glabriuscula, nitida, pellucida, lutescenti-cornea; sutura papillifera: papillis sparsis, minimis; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus subtiliter plicato-striatus, basi obtuse gibbosus; apertura pyriformis; lamellae validae, inferior perquam compressa; plicae palatales 2 superae, altera longa, altera brevis, tertia infera longa, distinctissima e lunella imperfecta exiens; plica subcolumellaris compressa, ad marginem fere emersa; perist. connexum, reflexum, sublabiatum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia lamellata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 14. f. 257.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 67.
— *cornea Mühlf.* (test. Menke et Beck.)

Habitat in insula Corfu.

Obs. Proxime affinis videtur Cl. conspurcatae Nr. 135.

72. Cl. stigmatica Ziegler.

T. vix rimata, cylindraceo-fusiformis, tenuis, glabriuscula, nitida, rufa; spira sensim attenuata, sursum pallidior, apice obtusiuscula; sutura papillis albis, remotis, punctiformibus ornata; anfr. 10—12 vix convexiusculi, ultimus antice striatus, basi gibbus; apertura semiovali-pyriformis; lamellae mediocres; lunella imperfecta, tenuissima, interrupta; plicae palatales 2 (supera longa, altera infra fere verticaliter descendens, emersa), subcolumellaris vix emersa; perist. connexum, superne subangulatum,

sublabiatum, expansum. — Long. 17, diam. 4⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, 3¼ lata. (Coll. Nr. 52.)

Clausilia stigmatica Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 9. f. 163.
— — *Cantr.* Mal. méd. p. 150?

Habitat in Dalmatia.

Obs. Conf. Cl. olivacea Cantr. Nr. 219.

73. Cl. Sturmii Küster.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, striata, nitidula, subpellucida, pallide cornea; spira sursum attenuata, acutiuscula; anfr. 10 convexiusculi, ultimus antice purpurascens, basi bigibbosus: gibbere basali sulco profundo ab altero, obsoletiore separata; apertura pyriformi-oblonga; lamella supera tenuis, infera valida; lunella imperfecta; plicae palatales sub 3 (superae 1—2, infera 1 emersa), subcolumellaris vix conspicua; perist. sejunctum, expanso-reflexum. — Long. 14½, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Küst. spec. max.)

Clausilia Sturmii Küster mss.

Habitat prope Budua Dalmatiae.

Obs. Variat magnitudine. Specimina vidi dimidio minora. Conf. Cl. piceata Nr. 125.

74. Cl. translucida Ziegler.

T. punctato-rimata, ventroso-fusiformis, confertissime striatula, translucida, nitida, pallide cornea; spira longe attenuata, apice acutiuscula; anfr. 13 convexiusculi, 2 ultimi lati, ultimus antice tumidus, basi subgibbus; apertura irregularis, subsemiovalis, intus profunde callosa; lamella sup. mediocris, infera valida, antice bifida; plicae palatales 3, supera longa, media brevis, infima e lunella imperfecta, interrupta oblique descendens, emersa; pl. subcolumellaris horizontaliter protrusa; perist. connexum, breviter expansum, margine externo arcuatim dilatato. — Long. 14, diam. fere 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 53.)

Clausilia translucida Ziegl. Mus.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 69.

Habitat in Dalmatia.

75. Cl. Meisneriana Shuttleworth.

T. rimata, elongato-fusiformis, tenuiuscula, confertim striata, sericina, fusca; sutura marginata; anfr. 12 planiusculi, ultimus costulato-striatus, basi subgibbus; apertura ovali-oblonga; lamellae mediocres; lunella imperfecta; plicae palatales 3 (suprema mediocris, secunda brevis, tertia infera), subcolumellaris im-

mersa; perist. continuum, solutum, hepaticum, expanso-reflexiusculum. — Long. 16, diam. vix 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 54.)

Clausilia Meisneriana Shuttl. in Mittheil. d. nat. Ges. in Bern. 1843. p. 18.*) teste Rossm.

Habitat prope Fiumorbe Corsicae (Shuttl.), in Sardinia (Rm.).

Obs. Num forsan plica lunata distinctius efformata, in §. 18 enumeranda?

76. Cl. badia Ziegler.

T. vix rimata, cylindrico-fusiformis, solidula, striata, sericina, fusca; spira regulariter attenuata, acutiuscula; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus basi tumidus, subgibbus; apertura rotundato-pyriformis; lamella supera mediocris, infera ramosa, antrorsum subtruncata; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, affixum, albolimbatum. — Long. 13, diam. 3½ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 55.)

Clausilia badia Ziegl. Mus.
— — *C. Pfr.* III. p. 41. t. 7. f. 9.
— — *Rossm.* IV. p. 20. f. 271.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 110.
— *simplex Ziegl.* (teste Anton.)

Habitat in alpibus Styriae.

Obs. Affinis Cl. ventricosae et plicatulae.

77. Cl. viridana Ziegler.

T. breviter rimata, turrito-fusiformis, solidula, longitudinaliter confertim costulata, diaphana, luteo-virescens; spira apice attenuata, acutiuscula; anfr. 11—12 convexiusculi, ultimus basi tumidus, antice subconstrictus; apertura ovali-pyriformis, intus alba, callosa; lamella supera elongata, infera profunda, subduplicata; lunella imperfecta, saepe dissoluta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, breviter solutum, albo-limbatum, breviter expanso-reflexiusculum. — Long. 16—17, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 56.)

Clausilia viridana Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 16. f. 261.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 128.
Dyodonta viridana Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 157. t. 31. f. 4—6.

Habitat prope Mehadia in Banatu.

---

*) Species staturae mediocris, subtiliter striata, sutura profunda. Accedit ad Cl. rugosam, sed affinior est speciebus 2 nondum descriptis: Cl. Thomasianae et Webbianae Charp. (Shuttl. l. c.)

78. Cl. fallax Rossmässler.

T. vix rimata, fusiformis, ventricosa, costulata, fusco-cornea; anfr. 11½ convexiusculi, ultimus basi tumidus, cristatus; apertura rotundato-pyriformis, lata; lamella infera remota; lunella imperfecta; plicae palatales 2 superae (inferior postica, brevissima), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, reflexum, rubello-labiatum; periomphalum hemisphaericum. — Alt. 8, lat. 2 lin. (Rm.) — Long. 19, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 57.)

Clausilia fallax Rossm. Ic. IV. p. 16. f. 262.
— *decipiens Ziegl.* Mus. (teste Rm.)
— — *Beck* ind. p. 95. N. 65.

Habitat in Gallizia.

Obs. Conf. Cl. elata Nr. 151.

79. Cl. turgida Ziegler.

T. non rimata, fusiformis, turgida, costulata, nitidula, lutescens; anfr. 9 convexi; apertura pyriformi-rotundata; lamella infera subhorizontalis; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, reflexum, fulvolabiatum. — Long. 12, diam. infra medium 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Spec. typ. coll. Rossm.)

Clausilia turgida Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 20. f. 191.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 133.

β. Elongata, minus turgida, costulis subtilioribus: long. 14, diam. 4 mill. (Coll. Rossm.)

Habitat in Buccovina.

80. Cl. nectarina Frivaldsky.

T. rimata, fusiformi-attenuata, confertim costulata, fusca; spira apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi crista compressa, arcuata, periomphalum latiusculum cingente munitus; apertura angusta, oblongo-pyriformis; lamella supera marginalis, infera profunda, debilis; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, vix solutum, expansiusculum. — Long. 11—12, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia nectarina Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 10.

Habitat prope Brussa Natoliae.

* * *

81. Cl. strumosa Frivaldsky.

T. vix rimata, fusiformis, striatula, vix nitidula, brunnea; spira apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 13 planiusculi, supremi costulati, ultimus pone aperturam constrictus et carina transversa, intus callosa munitus, basi compresso-carinatus; apertura semiovalis, basi angulata; lamella supera compressa, infera profunda, strictiuscula, subfurcata; plica lunata imperfecta, e palatalibus 4 (supera longa, mediis 2 brevibus, subconfluentibus, quarta infera, subelongata) composita, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, expansum, labiatum, margine externo strictiusculo; periomphalum lunare. — Long. 14, diam. 3⅔ mill. Ap. 4 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 58.)

Clausilia strumosa Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 8.

Habitat prope Brussa Natoliae (Frivaldsky).

* * *

82. Cl. cylindrica Gray.

T. rimata, adulta cylindrica, truncata, nitide cornea, oblique costulato-striata; anfr. 7 subaequales, ultimus antice validius corrugatus; apertura subverticalis, pyriformis; lamellae leves; lunella imperfecta; plicae palatales 3, suprema longissima; perist. continuum, albidum, brevissime reflexum. — Long. 13, diam. 3 mill. (Mus. Brit.)

Clausilia cylindrica Gray in Mus. Brit.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 93.

Habitat in India.

Obs. Spira juvenum valde elongata, gracilis.

83. Cl. Forbesiana Pfr.

T. rimata, fusiformis, arcuato-costata, cinerea, opaca, apice nitida, cornea; sutura filo-marginata, albida; anfr. 11—12, primi convexi, reliqui planulati, ultimus compressus, attenuatus, rugoso-costatus, basi gibboso-bicristatus; apertura ovali-oblonga, intus fuscula; lamellae conniventes, infera major, subduplicata; lunella imperfecta; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris inconspicua; perist. solutum, late expansum. — Long. 23, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 59.)

Clausilia Forbesiana Pfr. Symb. III. p. 93.
— — *Küster* t. 8. f. 5—7.

Habitat in Lycia.

84. Cl. syracusana Philippi.

T. vix rimata, fusiformis, plerumque decollata, costata, palida, corneo-albida; anfr. spec. integri 9—10, decollati 5—7, subplanulati, ultimus remotius costatus, a latere impressus, basi acute cristatus; apertura rotundata; lamellae profundae, approximatae, supera minuta; plicae palatales 2, supera longa, altera juxta subcolumellarem vix emersam e lunella imperfecta exiens; perist. continuum, solutum, late expansum. — Long. (spec. decoll. 6 anfr.) 13—14, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3¾ lata. (Coll. Nr. 60.)

Clausilia syracusana Phil. Sicil. I. p. 139. t. 8. f. 23.
— — *Rossm.* IV. p. 13. f. 255.
— — *Küster* t. 8. f. 22—25.
— *macrosoma Cantr.* Bull. Brux. II. p. 381.*)
— *macrostoma Cantr.* Malac. méd. p. 153. t. 5. f. 18.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 9.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 115.
— *inflata Delle Chiaje, Scacchi* cat. p. 16.

Habitat in Sicilia, prope Syracusam, et in insula Malta (Cantr.).

85. Cl. sulcosa Wagner.

T. vix rimata, fusiformis, gracilis, confertim costulata, nitidula, violascenti-cinerea; spira sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus basi obtuse et arcuatim cristatus; apertura semiovali-pyriformis, intus carneo-fuscula; lamellae mediocres, conniventes; lunella imperfecta, profunde immersa; plicae palatales sub 2 (ex illa exeuntes, superior longa), subcolumellaris breviter emersa; perist. expansum, reflexiusculum, marginibus sejunctis, columellari brevissimo. — Long. 14, diam. vix 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 61.)

Clausilia sulcosa Wagn. in Chemn. XII. p. 190. t. 236. f. 4144.**)
— — *Beck* ind. p. 91. N. 19.
— *irregularis Ziegl.* Mus.
— — *Rossm.* II. p. 14. f. 112.
— — *Lam.* ed. Dh. 35. p. 212.
— — *Küst.* p. 14. t. 1. f. 9—12?
— *ragusensis Mühlf.* Mus.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 189. t. 19. f. 11. 12.
— *labiosa Mühlf.* olim.
— *inflata Pot.* et *Mich.* l. c. t. 19. f. 13. 14?

---

*) T. ventricosa, cinereo-albida, exquisite longitudinaliter costata; costis crebris, pliciformibus; anfr. 9 planulatis; apertura ovata, patula; columella labroque biplicatis. — Alt. 7, diam. 1⅔ lin. (Cantr. l. c.)

**) T. fusiformi, cornea, striis elevatis, subtilissimis, albo-coerulescentibus praedita; apertura biplicata; perist. reflexo. — Long. 6 lin. (Wagn. l. c.)

β. Major, distinctius albo-costata: long. 16, diam. 3¼ mill. (Spec.)
Clausilia cataphracta Parr. in sched.

γ. Sublaevigata, costulis obsoletis:
Clausilia acicula Cantr. Bull. Brux. II. p. 382. *)
— — *Beck* ind. p. 91. N. 20.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 152. t. 5. f. 16.
— *irregularis Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 181. t. 18. f. 19. 20?

Habitat in Dalmatia, prope Ragusam, var. β in insula Meleda.

Obs. Conf. Cl. strigillata, abrupta, formosa, huic affines.

* * *

86. Cl. naevosa (Helix) Férussac.

T. rimata, ventroso-fusiformis, costulato-striata, sordide lactea, fusco-maculata, apice cornea; anfr. 10 planuli, ultimus confertim rugosus, basi breviter tuberculatus; apertura pyriformis; lamella supera parva, infera bipartita; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, albo-labiatum, undique expansum, margine externo sinuato. — Long. 14, diam. 4⅓ mill. Ap. oblique 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 62.)

Helix naevosa (Cochlodina) *Fér.* pr. 527. et Mus.!
Clausilia naevosa Beck ind. p. 94. N. 77.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 48.

Habitat in insula Zante (Fér.), Cerigo (Forbes).

Obs. A Cl. lactea Zgl., cui similis, forma aperturae et plica lunata imperfecta distinctissima.

87. Cl. munda Ziegler.

T. subrimata, fusiformis, costulato-plicata, coerulescenti-albida; anfr. 10—11 vix convexiusculi; apertura rotundo-ovalis, lutescens; lamellae parvae, approximatae; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, reflexum, subsimplex. — Alt. 6½, lat. 1½ lin. (Rm.) — Long. 15, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (ex ic.)

Clausilia munda Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 11 f. 247.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 28.
— — *Roth* diss. p. 21.

β. Minor: long. 12; diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 63.)

Habitat in muris urbis Smyrnae et Rhodi.

---

*) T. elongata gracili cinerea, longitudinaliter costata, costis obsoletis; anfr. 12; apertura auriculari; columella labroque biplicatis. — Alt. 6½, diam. 1⅕ lin. — Umbla prope Ragusam. (Cantr. l. c.)

88. Cl. Schuchii Voith.

T. non rimata, fusiformis, subventricosa, subtiliter costulata, albida, corneo-signata; anfr. 9 vix convexiusculi, medii sublaevigati, ultimus acutius costatus; apertura rotundata; lamellae mediocres; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, longa, subcolumellaris conspicua; perist. continuum, solutum, reflexum, sublabiatum. — Alt. 5½, lat. 1½ lin. (Rm.) — Long. 12½, diam. 3⅓ mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 64.)

Clausilia Schuchii Voith mss.
— — *Rossm.* IV. p. 13. f. 253.
— *maculosa min. Beck* ind. p. 91.

Habitat in Graecia (Schuch).

§. 12.

89. Cl. Kutschigii Küster.

T. profunde rimata, fusiformis, ventrosissima, glabriuscula, nitida, coerulescenti-albida; spira turrita, acutiuscula; anfr. 9½ vix convexiusculi, ultimus plicis validis, flexuosis, acute elevatis, remotis costatus, basi tumidus; apertura rotundato-pyriformis, ampla, fusca; lamellae debiles, profundae, infera introrsum saepe ramosa; lunella distincta, valida; plicae palatales 2 superae, longae, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, superne solutum, tenue, undique expansum, marginibus subparallelis. — Long. 24, diam. medio 7 mill. Ap. 7 mill. longa, 5⅔ lata. (Coll. Nr. 65.)

Clausilia Kutschigii Küster Mon. t. 3. f. 12—14.
— *costicollis Parr.* in sched.
— *dalmatina var. costicollis Schmidt* in sched.

β. Minor, anfr. 8, ventrosa vel paulo gracilior: long. 18, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 5 lata. (Spec.)

Clausilia Kutschigii var. Küst. t. 3. f. 15. 16.
— *contracta Parr.* in sched.
— *dalmatina var. contracta Rossm.* XI. p. 4. f. 694.
— — *var. epidaurica Kutsch.* (teste Schmidt.)

Habitat in Dalmatia.

Obs. Ab omnibus affinibus facile distinguitur forma ventrosa, sculptura rudi anfractus ultimi et defectu plicae palatalis inferae.

90. Cl. macarana Ziegler.

T. rimata, fusiformis, sublaevis, violascenti-cinerea, nitidula; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula, cornea; sutura subalbomarginata; anfr. 11—12 vix convexiusculi, ultimus antice subconferte et stricte costulatus, juxta rimam gibbus; apertura pyriformi-ovalis, carneo-fusca; lamellae validae, infera oblique

ascendens; lunella leviter arcuata; plicae palatales 4 (superae 2 elongatae, tertia brevis et quarta subemersa e lunata prodeuntes), subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, sublabiatum, undique late expansum. — Long. 29, diam. 6½ mill. Ap. 8 mill. longa, 6 lata. (Coll. Nr. 66.)

Clausilia macarana Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 6. f. 97. X. p. 22. f. 631 b.
— — *Lam.* ed. Dh. 20. p. 206.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 182. t. 18. f. 23. 24.
— — *Küster* p. 32. t. 3. f. 17—21.
— *macascarensis Sow.* gen. of shells. Claus. f. 1.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 171. f. 1.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 295?
— *Macarscarensis Beck* ind. p. 92. N. 38.
— *corrugata Menke* syn. ed. II. p. 29. (ex parte.)

β. Minor, anfr. 9, apertura angustiore, ovali: long. 20, diam. 5 mill. Ap. 5⅓ mill. longa, 4½ lata. (Spec.)

Clausilia macarana var. stenostoma Rossm. X. p. 21. f. 631.
— *dalmatina Cantr.* Malac. méd. p. 145. t. 5. f. 14.

Habitat prope Macarsca Dalmatiae.

91. Cl. almissana Küster.

T. rimata, fusiformis, solidula, laevigata, nitidula, cinereo-albida, corneo substrigata et punctata; spira regulariter attenuata, acutiuscula; sutura albo-submarginata; anfr. 10 subplani, ultimus antice confertim costulatus, basi sulcatus, inter sulcum et rimam cristato-gibbus; apertura ampla, ovalis, fusco-carnea; lamellae validae, compressae, infera transversa, sursum flexa; lunella leviter arcuata; plicae palatales 3 (superae 2 elongatae, tertia infera juxta subcolumellarem emersam decurrens, valida, basi tuberculum prominulum formans); perist. continuum, solutum, undique late expansum. — Long. 25, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, 5½ lata. (Coll. Nr. 67.)

Clausilia Almissana Küster Mon. t. 3. f. 24—31.

β. Minor, anfr. 8 — 10: long. 19, diam. 5 mill. Ap. 5⅔ mill. longa, 4⅓ lata. (Spec.)

Habitat prope Almissa Dalmatiae.

Obs. Unicum specimen dextrorsum legit Cl. Küster. (vid. l. c. f. 28.)

92. Cl. dalmatina Partsch.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, solida, sublaevigata, cinereo-lactea, punctis et maculis corneis conspersa; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula, cornea; sutura simplex; anfr. 10 — 11 plani, ultimus contractus, antice irregulariter rugosus, basi vix gibbus; apertura ovalis, pallide hepatica; lamellae mediocres,

infera oblique ascendens; lunella distincta; plicae palatales 3, superae 2, longae, tertia infera, filaris, juxta subcolumellarem vix conspicuam subemersa; perist. continuum, breviter solutum, marginibus subparallelis, breviter expansis. — Long. 24, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 68.)

Clausilia dalmatina Partsch in Mus. Caes. Vindob.
— — *Rossm.* II. p. 7. f. 98.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 39.
— — *Lam.* ed. Dh. 17. p. 204.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 117.
— — *Küster* p. 29. t. 3. f. 1—11.
— *corrugata Menke* (ex parte.)
— *marmorata Ziegl.* Mus.

Habitat in Dalmatia, prope Vergoraz, in insula Corzzola etc.; in regno neapolitano, prope Piedimonte d'Alife (Scacchi).

Obs. Variat magnitudine et spira magis minusve gracili.

93. Cl. Draparnaldi Beck.

T. rimata, subcylindrico-fusiformis, laeviuscula, sub epidermide lactea fusca; anfr. 13, infraapicales costulali, ultimus supra aperturam semiplicatus, antice grosse rugosus; apertura ovali-oblonga, intus fusca; lamella superior parva, infera remota, oblique ascendens; lunella imperfecta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, tenue, expansum. — Alt. 9—10, lat. 2 lin. (Rm.) — Long. 23, diam. vix 5 mill. Ap. 5⅔ mill. longa, 4 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Draparnaldi Beck ind. p. 91. N. 34.
— *corrugata Drap.* p. 70. t. 4. f. 11. Nec Chemn. teste Beck.
— — *Lam.* 5. p. 114. ed. Dh. p. 198.
— — *Rossm.* X. p. 15. f. 615.
Pupa corrugata Drap. tabl. d. moll. p. 62. N. 19.

Habitat in insulis graecis?

Obs. Conf. Cl. corrugata Chemn. Nr. 207.

94. Cl. aquila Parreyss.

T. rimata, fusiformis, oblique subtiliter costulato-striata, nitidula, livido-albida, apice cornea; anfr. 10 planiusculi, ultimus antice confertim et acute plicatus, basi subcristatus; apertura ovali-pyriformis, intus carneo-fusca; lamella supera mediocris, infera obliqua, recta; lunella tenuis, leviter arcuata; plicae palatales 2 validae, inferior valde in aperturam prolongata, subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, undique expansum.

— Long. 18, diam. 4⅔ mill. Ap. 5 mill. longa, 4¼ lata. (Coll. Nr. 69.)

Clausilia aquila Parr. in sched.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 92.

Habitat in insula Corzzola Dalmatiae.

95. Cl. nobilis Pfr.

T. rimata, fusiformis, solida, striata, nitidula, coerulescenti-albida, punctis et strigis corneis conspersa; spira regulariter attenuata, apice obtuso pellucida; sutura linearis, distanter albo-papillata; anfr. 10, supremi 4 convexi, reliqui plani, ultimus confertim rugoso-striatus, basi obtuse cristatus; apertura magna, alba, ovalis, intus canaliculata; lamellae approximatae, infera strictiuscula; lunella distincta; plicae palatales 3, superae 2, parallelae, longae, tertia infera, emersa; perist. continuum, solutum, undique expansum, reflexiusculum, albo-callosum. — Long. 24, diam. medio 5⅔ mill. Ap. 6⅓ mill. longa, 4½ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia nobilis Pfr. mss.

Habitat ad Ridicofano.

96. Cl. lesinensis Kutschig.

T. rimata, fusiformis, gracilis, oblique striatula, nitida, carneo-albida, punctis corneis raris conspersa; spira elongata, regulariter attenuata, apice cornea, acutiuscula; sutura levis, albo-submarginata; anfr. 13 subplani, ultimus basi leviter gibboso-cristatus; apertura oblonga, intus livida; lamella infera obliqua, parum flexa; lunella distincta; plicae palatales 2 superae, subparallelae, subcolumellaris vix emersa; perist. breviter expansum, marginibus subparallelis, superne disjunctis. — Long. 23, diam. 5 mill. Ap. 5½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Rossm. et Küst.)

Clausilia lesinensis Kutsch. in Küst. Monogr. t. 4. f. 1—3.

Habitat in insula Lesina Dalmatiae.

Obs. Varietatibus nonnullis Cl. almissanae et macaranae persimilis, sed numero et positione plicarum palatalium facillime dignoscenda. Quare Cl. macarana var. stenost. Rossm. X. f. 634, etsi reliquis characteribus a nostra vix distinguenda, huc referenda non videtur.

97. Cl. candidescens Ziegler.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, sublaevis, opaca, nitida, violascenti-lactea; spira sursum attenuata, apice obtusiuscula, cornea; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus antice costulato-striatus, basi tumidus, subgibbus; apertura rotundato-pyriformis, intus fuscula; lamella supera minuta, infera profunda, mediocris; lunella distinctissima, suturam levem, albo-filosam attingens; plicae palatales 2 (supera 1 longa, altera brevis, pone lunatam) subcolu-

mellaris vix emersa; perist. continuum, vix solutum, albido-incrassato-labiatum, expansum. — Long. 20, diam. 5½ mill. Ap. 5½ mill. longa, 4¼ lata. (Coll. Nr. 70.)

Clausilia candidescens Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 10. f. 104.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 88.
— — *Lam.* ed. Dh. 14. p. 203.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 117.
— *viduata Costa.* (teste Villa.)
— *taburnensis* et *pallens Scac.* (teste Phil.)

β. Minor:
Clausilia lubrica Scacchi. (Phil.)

γ. Cinereo-lactea, anfractu ultimo distinctius costulato, perist. continuo, soluto.

Habitat in montibus Aprutiis et Sicilia; var. γ in Monte Tirioli Calabriae.

98. Cl. cinerea Philippi.

T. vix rimata, fusiformis, striatula, vix nitidula, cinereo-albida; spira apice cornea, obtusa; sutura subpapillifera; anfr. 10—11 subplanulati, ultimus antice confertim costulato-striatus, basi tumidus; apertura rotundata; lamellae mediocres; lunella leviter arcuata, suturam attingens; plica palatalis nulla, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, vix solutum, expansum, sublabiatum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 71. Spec. plur.)

Clausilia cinerea Phil. Sicil. I. p. 145. t. 8. f. 24. II. p. 117.
— *ominosa Ziegl.* Mus.
— — *Rossm.* III. p. 11. f. 168.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 85.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 186. t. 19. f. 5. 6.
— *teres Delle Chiaje, Scac.* cat. p. 16. (teste Phil.)

Habitat in regno neapolitano, inter Castellamare et Salernum, Valle Tremonti etc. (Phil.), in Sicilia? (Rm., Beck.)

Obs. Specimina occurrunt intermedia inter Cl. cineream et candidescentem, huic habitu, magnitudine et colore simillima, sed plicis palatalibus omnino destituta. — Num ambae species jungendae?

99. Cl. agnata Partsch.

T. subtiliter rimata, fusiformi-cylindracea, glabriuscula, corneo-albida vel opalina, nitida; spira elongata, apice obtusiuscula, cornea; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus antice striatus, juxta rimam obsolete cristatus; apertura oblongo-pyriformis, intus fuscula; lamellae mediocres, conniventes; plicae palatales 2 superae, approximatae, longae, tertia infera e lunella subimperfecta

exiens, subcolumellaris emersa; perist. sublabiatum, albidum, expansum, marginibus subparallelis, sejunctis. — Long. 15—19, diam. medio 4—4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 72.)

Clausilia agnata Partsch in Mus. Caes. Vindob.
— — *Anton* Verz. p. 45. N. 1606.
— — *Küster* t. 4. f. 7—9.
— *albescens Ziegl.* Mus. Nec Menke.
— — *Rossm.* IV p. 14. f. 256.

Habitat in Croatia.

100. Cl. albescens Menke.

T. rimata, fusiformis, ventrosa, solidiuscula, carneo-albida, nitida; sutura simplex; anfr. 9 convexiusculi, 3 supremi cornei, ultimus striatus, basi tumidus; apertura ovalis, intus fulvescens; lamellae distinctae, acutae; lunella vix conspicua; plicae palatales 4 (3 longae, tertia brevis), subcolumellaris valida; perist. connexum, expansum, margine columellari appresso, tenui. — Long. 19, diam. 5 mill. (Coll. Menke.)

Clausilia albescens Menke syn. ed. II. p. 30. 130.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 60.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 46.
— *laevigata Martens?* (Beck.)

Habitat in gubernio Tergestino et Carniolia.

Obs. Similis Cl. opalinae, sutura simplice etc. distincta.

101. Cl. bigibbosa Charpentier.

T. vix subrimata, fusiformis, confertim subarcuata-striata, opaca, nitidula, cinereo-albida; spira sensim attenuata, apice fuscula, obtusiuscula; anfr. 9—11 vix convexiusculi, ultimus subtiliter et dense rugatus, latere compressus, basi bicristatus: cristis subparallelis, obtusiusculis; apertura late ovata; lamellae mediocres, infera validior, subtransversa; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, undique breviter expansum. — Long. 17, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Küster.)

Clausilia bigibbosa Charp. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 143.
— — *Küster* Mon. t. 8. f. 19—21.

Habitat ad Karaman Asiae minoris.

Obs. Variat longitudine 15 usque 19 mill. (Charp. l. c.)

* * *

102. Cl. contaminata Ziegler.

T. profunde rimata, clavata, ventrosa, solida, livido-calcarea; spira superne subito attenuata, acutiuscula; anfr. 10—11, summi

convexi, glabri, cornei, sequentes plicato-striati, sequentes planulati, laevigati, ultimus antice plicatus, basi rotundatus; apertura coarctata, subrhombea; lamella supera minuta, infera profunda, subverticalis; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. disjunctum, calloso-incrassatum, expansum, marginibus subparallelis, externo intus unidentato. — Long. 18, diam. medio 5¾ mill. Ap. oblique 5 mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia contaminata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ic. II. p. 11. f. 105.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 6.
— — *Lam.* ed. Dh. 16. p. 204.

Habitat in insula Corfu.

103. Cl. lactea Ziegler.

T. rimata, fusiformis, inflata, solida, supra costulato-striata, nitidula, alba; spira superne conica, acutiuscula; anfr. 9 planiusculi, inferi sublaevigati, ultimus antice subrugosus, basi gibbus; apertura subsemicircularis; lamellae parvulae, remotae; lunella distincta, irregularis; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. albo-labiatum, marginibus subparallelis, remotis, externo breviter expanso, columellari dilatato, patente. — Long. 15, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 73.)

Clausilia lactea Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 90. N 4.
— — *Rossm.* X. p. 15. f. 616.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 117.
— *episcopalis Jan.*
β. Minor: long. 11, diam. 3⅔ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2½ lata. (Spec.)

Habitat in insula Corfu et prope Cataniam (Jan); Ital. bor.? (Beck.)

Obs. An huc referenda Clausilia obliqua Mühlf.?

§. 13.

104. Cl. cattaroensis Ziegler.

T. rimata, cylindrico-attenuata, laevigata, corneo-albida, pellucida, nitidiuscula; anfr. 12—13 vix convexiusculi, ultimus antice confertim rugoso-striatus, basi subgibbus; apertura subsemiovalis; lamellae mediocres, infera stricta, oblique ascendens; lunella distincta; plicae palatales 4 (superae 3 elongatae, approximatae, quarta infera), subcolumellaris emersa; perist. late expansum, sublabiatum, marginibus subparallelis, disjunctis, externo sinuoso. — Long. 24, diam. 5½ mill. Ap. 6 mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 74.)

Clausilia cattaroensis Ziegl. Mus.

Clausilia cattaroensis Rossm. II. p. 8. f. 100.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 45.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 179. t. 18. f. 3. 4.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 146.
— — *Küster* t. 4. f. 14—17.
— *catarvensis Lam.* ed. Dh. 15. p. 203.
— *laevigata Mühlf.* Mus.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 47?
— *lesinacensis Parr.* in sched.

β. Gracilior, violascenti-fusca:
Clausilia cattaroensis β fusca Kutsch. (teste Schmidt.)

Habitat prope Cattaro Dalmatiae.

Obs. Cantraine dubitanter laudat: Gualt. t. 4. f. C. — et Cl. griseam Desh. (conf. Nr. 148.) eandem speciem esse putat.

105. Cl. subcristata Küster.

T. profunde rimata, cylindraceo-attenuata, laevigata, nitida, pellucida, fusco-cornea; spira superne attenuata, apice obtusa; anfr. 12, supremi 8 convexi, sequentes planulati, ultimus infra suturam constrictus, antice rugoso-striatus, basi crista arcuata, distincta munitus; apertura subsemiovalis; lamella supera parvula, infera flexuose ascendens; lunella lata, oblique recedens; plicae palatales 2—3 superae, distantes et 1 infera juxta cristam decurrens, subcolumellaris breviter emersa; perist. sejunctum, expansum, margine externo supra medium introrsum incrassato, columellari dilatato, patente. — Long. 22, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 3¾ lata. (Coll. Küster.)

Clausilia subcristata Küst. in litt. et Monogr. t. 4. f. 10—13.

Habitat in montibus Montenegrinis, 3000′ supra mare.

Obs. Differt a praecedente colore, strictura anfractus ultimi, apertura multo minore, crista cervicis, et lamellae inferae, nec non plicarum palatalium formatione.

106. Cl. pachygastris Partsch.

T. rimata, ventroso-fusiformis, apice attenuata, tenuis, pellucida, glabriuscula, cinereo-lutescens; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus antice striatulus, juxta rimam obsolete cristatus; sutura linearis, submarginata; apertura magna, rotundato-pyriformis; lamella supera compressa, tenuis, infera obliqua, obtusiuscula; lunella distincta, leviter arcuata; plicae palatales 2 (inferior longior), subcolumellaris breviter porrecta; perist. continuum, album. breviter expansum, reflexiusculum, margine externo repando, intus incrassato. — Long. 18, diam. medio 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 75.)

Clausilia pachygastris Partsch in Mus. Caes. Vindob.

Clausilia pachygastris Rossm. II. p. 10. f. 103.
— — *Lam.* ed. Dh. 23. p. 207.
— — *Küster* t. 4. f. 18—20.
— *pachygastra Beck* ind. p. 92. N. 42.

β. Contracta, spira medio inflata, superne subito conico-attenuata, crista basali gibbosa: long. 21, diam. 7 mill. Ap. 6 mill. longa, 4¾ lata. (Spec.)

γ. Spira paulo elongata, anfr. 10—11: long. 22, diam. medio 5½ mill. Ap. 5½ mill. longa, 4½ lata. (Spec.)

Clausilia pachygastris var. Küst. t. 4. f. 21. 22.
— *bulla Parr.* in sched.

Habitat in insula Meleda Dalmatiae.

107. Cl. pachystoma Küster.

T. arcuato-rimata, fusiformis, solidula, sublaevigata, rubellocornea, diaphana, parum nitida; spira regulariter attenuata, apice obtusiuscula; sutura supra medium obsolete et distanter albopapillosa; infra medium subfilaris; anfr. 12 subplanulati, ultimus antice striatus, basi breviter cristatus; apertura pyriformis, coarctata, basi subangulata; lamellae mediocres, infera antice dilatata; lunella remota, distincta; plicae palatales 2 superae, parallelae, subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, expansum, intus callo albo incrassatum, margine externo superne subdentato. — Long. 18—19, diam. 4½ mill. Ap. 5 mill. longa, fere 4 lata. (Coll. Nr. 76.)

Clausilia pachystoma Küster mss.

Habitat in Dalmatia, prope Verlika (Küster).

108. Cl. laevissima Ziegler.

T. punctato-rimata, subcylindrico-fusiformis, laevigata, pellucida, nitida, corneo-lutescens; spira sensim attenuata, apice obtusa; sutura simplex; anfr. 10—12 planiusculi, ultimus antice confertim striatus, basi subgibboso-compressus; apertura semiovali-pyriformis; lamellae mediocres, conniventes; lunella leviter arcuata; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris emersa; perist. connexum, subadnatum, expansum, margine externo dilatato. — Long. 20, diam. 4½ mill. Ap. 5 mill. longa, medio 4 lata. (Coll. Nr. 77.)

Clausilia laevissima Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* II. p. 9. f. 101. XI. p. 8. f. 711—16
— — *Beck* ind. p. 92. N. 44.
— — *Lam.* ed. Dh. 19. p. 205.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 146.
— — *Küster* t. 4. f. 23—25.
— *glabrata Mühlf. Menke* syn. ed. II. p. 30

Clausilia laevigata Mühlf. Jan cat. p. 5. N. 31.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 47.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 184. t. 18. f. 21. 22.

β. Abbreviata, anfr. sub 10, sutura subpunctato-filosa: long. 16, diam. 4 mill. Ap. $4^2/_3$ mill. longa, 4 lata. (Spec.)

Clausilia laevissima var. Küster t. 4. f. 26. 27.
— *decorata Ziegl.* Mus.

Habitat in Dalmatia et Croatia meridionali.

Obs. Conf. Cl. latilabris Wagn. Nr. 127.

109. Cl. Ziegleri Küster.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, subtiliter striata, nitida, fusco-cornea; sutura callo albo submarginata; anfr. 9 planiusculi, ultimus antice superne subcompressus, basi subinflatus, ad rimam vix gibbus; apertura ovalis; lamella supera mediocris, infera valida, subhorizontalis; lunella tenuis; plicae palatales 3 (supera 1 elongata, 2 breves e lunata prodeuntes), subcolumellaris vix conspicua; perist. subcontinuum, undique expansum, reflexiusculum. — Long. 21, diam. 6 mill. Ap. 6 mill. longa, 5 lata. (Coll. Küst.)

Clausilia Ziegleri Küster Mon. p. 16. t. 1. f. 17. 18.

β. Major, anfr. 11: long. 26, diam. $6^1/_2$ mill.

Habitat in Dalmatia; ad fluvium Narenta legit Küster.

110. Cl. brunnea Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, gracilis, sublaevis, nitidula, brunnea; spira turrita, apice obtusa; sutura impressa; anfr. 12—13 planulati, ultimus antice costulato-striatus, a latere compressus, basi in cristam acutiusculam, arcuatam, crenulatam productus, apertura elliptico-pyriformis; lamellae parvulae, infera profunda, retrorsum furcata; lunella lata, strictiuscula; plicae palatales 4 brevissimae (superae 3, quarta infera), subcolumellaris immersa; perist. simplex, continuum, solutum, undique expansum. — Long. 18, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 78.)

Clausilia brunnea Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* X. p. 16. f. 618.

Habitat in montibus Tauri. (Zgl., Rm.)

111. Cl. proboscidea Küster.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, tenuis, regulariter et confertim striata, corneo-lutescens; anfr. 12 vix convexiusculi, ultimus basi attenuatus, subcompressus; sutura levis, submarginata; apertura oblongo-pyriformis; lamella supera tenuissima, infera valida, subtuberculosa; lunella subobsoleta, strictiuscula; plicae

palatales 3 (superae 2, tertia e lunata prodiens, in cervicem porrigens), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, tenue, margine supero breviter soluto, columellari dilatato, patente, sinistro sinuoso, breviter expanso-reflexiusculo. — Long. 17½, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Küster.)

Clausilia proboscidea Küster Mon. p. 17. t. 1. f. 19—22.

Habitat . . . ?

112. Cl. satura Ziegler.

T. distincte rimata, fusiformis, subventricosa, apice attenuata, corneo-lutescens, subopaca; sutura sub-albofilosa, interdum obsolete papillifera; anfr. 10—11 vix convexiusculi, ultimus striatus, basi arcuato-subcristatus; apertura pyriformi-rotundata; lamellae mediocres; lunella distincta; plicae palatales 2 (supera longa, altera infera, brevis), subcolumellaris emersa; periomphalum angustum, gibbum; perist. continuum, affixum, fusculo-sublabiatum, expansum. — Long. 15—16, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia satura Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 14. f. 175.
— *saturata Beck* ind. p. 93. N. 64.

Habitat in Croatia.

113. Cl. subcylindrica Ziegler.

T. minutissime rimata, subcylindrica, laevigata, pellucida, nitida, corneo-lutescens; spira sensim attenuata, apice obtusa; sutura simplex; anfr. 9—10 subplanulati, ultimus antice subtiliter striatus; apertura pyriformis; lamellae mediocres, infera subflexuosa; lunella saepe in pliculas 2 subcontiguas partita; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris emersa; perist. subconnexum, subtiliter reflexo-limbatum. — Long. 12—13, diam. vix 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 79.)

Clausilia subcylindrica Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 14. f. 174.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 69.

β. Paulo ventrosior:
Clausilia geophila Küster in sched.

Habitat prope Scolia Dalmatiae.

114. Cl. oleata Rossmässler.

T. punctiformi-rimata, fusiformis, sublaevigata, diaphana, vix nitens, virescenti-cornea, pellucida; spira turrita, apice acuta; anfr. 11—12 subplanulati, ultimus antice striatulus, a latere compresso-canaliculatus, basi obtuse bicristatus; apertura rotundo-pyriformis; lamellae compressae, infera profunda, horizon-

talis; lunella parvula, arcuata; plicae palatales 2 (supera 1 mediocris, altera brevissima), subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, subalbo-labiatum, expanso-reflexiusculum. — Long. 12—14, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅕ lata. (Coll. Nr. 80.)

Clausilia oleata Rossm. Ic. XI. p. 6. f. 703.
— *transparens Friv.* in sched.

β. Solidiuscula, lutescenti-cornea, eroso-punctata:
Clausilia Rossmässleri Stentz in sched.

Habitat in Transylvania, Banatu.

115. Cl. subulata Pfr.

T. subrimata, fusiformi-subulata, tenuis, striatula, nitidula, cornea; spira subulata, acutiuscula; anfr. 11—12 planiusculi, ultimus bicristatus: crista altera transversa, obtusula pone aperturam, altera basali, magis compressa, subarcuata; apertura pyriformi-oblonga; lamella supera mediocris, infera profunda, subverticalis; lunella parvula; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, vix solutum, tenue, expansiusculum. — Long. 12½, diam. vix 3 mill. Ap. 3 mill. longa, vix 2 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia subulata Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 11.

Habitat prope Brussa Natoliae (Frivaldsky).

Obs. Formatione cristarum similis Cl. strumosae Nr. 81, caeterum valde diversa.

§. 14.

116. Cl. dacica Frivaldsky.

T. rimata, subcylindraceo-fusiformis, oblique striatula, nitida, pellucida, corneo-fusca; spira superne sensim attenuata, apice obtusiuscula; sutura impressa, albo-filosa, distanter papillifera; anfr. 11—12 subplanulati, ultimus basi leviter sulcatus; apertura magna, ovalis, intus fusca; lamella supera compressa, infera subhorizontalis, medio tuberculifera; lunella linearis, angulata; plicae palatales sub3 (suprema longa, secunda, interdum obsoleta, oblique descendens, tertia ab angulo infero lunatae verticaliter emersa, valida), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, breviter solutum, hepaticum, reflexo-expansum. — Long. 27, diam. 6 mill. Ap. 7 mill. longa, 5⅓ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia dacica Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 12.

Habitat in montibus Banatus (Frivaldsky).

117. Cl. albocincta Pfr.

T. rimata, fusiformis, nitide violascenti-brunnea; sutura papillis confluentibus candido-filosa; anfr. 11 planuli, ultimus antice striatulus, basi bituberculato-cristatus; apertura pyriformi-rotundata; lamella supera compressa, acuta, infera valida, interdum ramosa; lunella magna, strictiuscula; plicae palatales 3—4 (superae 2, quarum superior interdum obsoleta, tertia mediana, antrorsum dilatata, quarta ad basin lunellae), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, breviter solutum, undique expansum, albo- vel fusculo-labiatum. — Long. 20, diam. medio 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 81.)

Clausilia albocincta Pfr. Symb. I. p. 48.
— *albicincta Rossm.* XI. p. 5. f. 697.

Habitat prope Cattaro Dalmatiae (?Stentz), prope Zara vecchia et Sign. (Küster).

118. Cl. Rossmässleri Pfr.

T. rimata, fusiformis, solidiuscula, subtilissime striata, nitidula, picea; spira regulariter attenuata, apice obtusiuscula; sutura candido-filosa vel papillis striaeformibus fimbriata; anfr. 11 convexiusculi, ultimus antice rugoso-striatus, basi breviter et obtuse cristatus; apertura ovalis; lamellae mediocres, profundae; lunella distincta; plicae palatales sub 2 superae, subcolumellaris vix emersa; perist. connexum, hepaticum, breviter expansum. — Long. 18, diam. infra medium 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 82.)

Clausilia Rossmässleri Pfr. Symb. I. p. 48.
— *rhaetica Mühlf. Ant.* Verz. p. 46. N. 1688.
— *Stentzii var. Rossm.* XI. p. 5. f. 698.

Habitat in alpibus Carinthiae; frequentem legi prope Tarvis et in monte Predihl.

Obs. Etsi Clausiliae Stentzii affinem, tamen speciem elegantem pro illius varietate agnoscere non possum. Conf. Nr. 70.

119. Cl. saxicola Parreyss.

T. rimata, subcylindrica, sublaevigata, cornea; spira superne sensim attenuata, obtusa; sutura albo-filosa; anfr. 9—10, summi convexi, 4 ultimi subplani, lente accrescentes, ultimus basi tumidulus, obsolete gibbosus; apertura subrotunda; lamella supera minuta, marginem non attingens, infera flexuosa; lunella valida; plica palatalis nulla, subcolumellaris emersa; perist. continuum, vix solutum, reflexiusculo-expansum. — Long. 16⅔, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 83.)

Clausilia saxicola Parr. in sched. teste Rossm.

β. Minor: long. 15, diam. 3¾ mill. (Spec.)

Habitat prope Athenas.

120. Cl. bicristata Frivaldsky.

T. subrimata, clavato-fusiformis, gracilis, sublaevigata, vix nitida, brunnea; spira elongata, apice obtusiuscula, pallida; sutura albo-filosa; anfr. 12—13 vix convexiusculi, ultimus antice confertim striatus, a latere compressus, basi carinis 2 subaequalibus, crenulatis munitus; periomphalum lunare; apertura subquadrato-rotundata; lamella supera minuta, infera elata, flexuosa; lunella distincta, perobliqua; plicae palatales 2 (supera brevis, altera longior), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, expansum, fusculum. — Long. 20, diam. 4 mill. Ap. 4½ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 84.)

Clausilia bicristata Friv. mss.

— — *Rossm.* X. p. 16. f. 619.

Habitat in Turcia.

Obs. Conf. Cl. Ziegleri Nr. 109, et satura Nr. 112.

§. 15.

121. Cl. Braunii Charpentier.

T. rimata, subventroso-fusiformis, striolata, vix nitidula, diaphana, saturate fusca; spira superne attenuata, obtusiuscula; sutura papillis albis, striaeformibus, magis minusve confertis ornata; anfr. 10—11 convexi, ultimus antice paulo distinctius striatus, basi vix compressus; apertura ovalis; lamellae mediocres; lunella perfecta, valida; plica palatalis 1 supera, elongata, subcolumellaris laminatim emersa; perist. connexum, superne appressum, undique expansum, albidum. — Long. 21, diam. 5 mill. Ap. 5½ mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 85.)

Clausilia Braunii Charp. mss.

— — *Rossm.* III. p. 9. f. 162.

— — *Beck* ind. p. 93. N. 70.

— *columellaris Mühlf.* Mus.

Habitat in muris prope Weinheim Badiae! et in Sicilia?

122. Cl. itala Martens.

T. rimata, fusiformis, solida, striatula, parum nitens, violascenti-fusca; spira sensim attenuata, acutiuscula; sutura albo-filosa, papillis distinctis candidis, striaeformibus ornata; anfr. 11 plani, ultimus antice costulato-striatus, basi compresso-gibbus; apertura ovalis; lamellae mediocres; lunella perarcuata; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris emersa; perist. continuum,

album, late expansum, reflexiusculum, superne appressum. — Long. 21, diam. 5 mill. Ap. 6 mill. longa, 4⅓ lata. (Coll. Nr. 86.)

Clausilia itala Martens in Coll.
— — *Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 93.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 74.
— *subrugata Ziegl.* Mus. *Beck* ind. p. 93. N. 71.
— *Braunii var. Rossm.* III. p. 9.
Helix papillata (Cochlodina) *Fér.* pr. 525?

Habitat in Italia et Sicilia.

123. Cl. alboguttulata Wagner.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, striata, rufo-fusca, nitidiuscula; sutura levis, papillis subaequalibus, striaeformibus (in anfractu ultimo interdum evanidis) obsita; anfr. 11 vix convexiusculi, ultimus antice costulato-striatus, basi tumidus; apertura pyriformi-ovalis, labio profundo, calloso, extus convexo, flavido coarctata; lamellae parvulae, subaequales; lunella exquisita; plica palatalis 1 (rarius 2 superae), subcolumellaris usque ad apertura emersa; perist. breviter reflexum, marginibus sejunctis vel callo filiformi junctis. — Long. 15—16, diam. 3½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 87.)

Clausilia alboguttulata Wagn. in Chemn. XII. p. 191. t. 236. f. 4146. *)
— — *Lam.* ed. Dh. 29. p. 210.
— *punctata Mich.* compl. p. 55. t. 15. f. 23. **)
— — *Lam.* ed. Dh. 25. p. 208.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 95.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 221.
— — *Graells* catal. moll. Esp. p. 8.
— *albopustulata Jan* Mantissa p. 3. ***)
— *ornata Ziegl.* Mus.
— — *Rossm.* III. p. 9. f. 164.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 94.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 148?

β. Major: long. 20, diam. 4½ mill. (Spec. Mus. Paris.)
Helix crenata (Cochlodina) *Fér.* pr. 526 et Mus.!

---

*) T. fusiformi, fusca, striata, nitida, pellucida; anfractuum margine superiore remote albo-plicato; columella biplicata. — Long. 8¼, lat. 2 lin. — Dalmat. (Wagn. l. c.)

**) T. sinistrorsa, fusiformi, pellucida, longitudinaliter oblique striata, cornea vel fulva; anfr. 11 convexis, ultimo corrugato, spiraliter ad suturam unisulcato dorsoque macula albida semilunari ornato; suturis denticulis albis superne notatis; apertura ovata; perist. albo, reflexo, superne sinum simulante; labio uniplicato; columella bilamellata; apice obtuso. — Alt. 9—10, lat. 2 lin (Mich. l. c.)

***) T. fusiformi, ventricosa, striata, anfractuum suturis punctis albidis notatis (alt. 6, lat. 2 lin.), columella trilamellata. (Jan l. c.)

Clausilia crenata Menke syn. ed. II. p. 29?
— — *Beck* ind. p. 94. N. 76?

γ? Ventrosior, papillis suturae raris: long. 16, diam. medio 5 mill. Ap. 4½ mill longa, 3 lata. (ex ic.)
Clausilia punctata Rossm. III. p. 10. f. 165.

Habitat in Silesia (Scholtz in Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 105.), Styria, Tyrolia, Carinthia, Carniolia, Croatia, Gallia (prope Avignon et Apt: Dupuy!) Lombardia, Hispania (Graells).

Obs. Specimina italica plerumque majora sunt. Variat praeterea colore pallidiore (Cl. annexa et diluta Zgl.) et saturatius rufo (Cl. rubiginea Zgl.) nec non callo cervicis magis minusve distincto, et perist. magis expanso, latiore, albo.

124. Cl. leucostigma Ziegler.

T. breviter rimata, cylindraceo-fusiformis, substriata, coerulescenti-cornea, parum nitida; spira sensim attenuata, apice obtusiuscula; sutura papillis albis, oblongis, confertis ornata; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus antice confertim rugatus, basi tumidus; apertura oblongo-subpyriformis; lamella supera mediocris, infera subflexuosa; lunella parum arcuata; plica palatalis nulla vel 1 brevissima, obsoleta, subcolumellaris immersa; perist. subconnexum, albo crasse labiatum, expansum. — Long. 17—19, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 88.)

Clausilia leucostigma Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 11. f. 166.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 89.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 148?
— — *Phil.* Sicil. II. p. 116.

β. Minor, peristom. plerumque connexo, labio crassiore, porcellaneo. anfr. 9—10: long. 16, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 4 lata. (Spec.)
Clausilia candidilabris Porro in Villa disp. syst. p. 58.*)

γ. Minor, cornea, papillis tenuioribus, perist. parum labiato:
Clausilia leucostigma var. samnitica Rossm. XI. p. 4. f. 695.

δ. Plerumque minor, magis ventrosa, cinereo-coerulescens: long. 15, diam. 4⅓ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3 lata. (Spec.)
Clausilia opalina Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 11. f. 567.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 87.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 117.
— *latilabris Mühlf.* (Menke syn. ed. II. p. 30.)

Habitat in montibus Aprutiis.

---

*) T. rimata, fusiformi, corneo-pellucida, laeviuscula; cervice laevi striatula; sutura minutissime et crebre papillifera; perist. connexo, labio crasso, convexe patulo, albo, porcellaneo; plica lunata distincta, columellari minima; anfr. 10. — Long. 14—17, diam. 4—4½ mill. (Villa l. c.)

125. Cl. piceata Ziegler.

T. rimata, fusiformis, solidula, substriata, nitidissima, fulvo-cornea; anfr. 11—12, ultimus striatus, basi subtuberosus; sutura minute papillifera; apertura pyriformis; lamellae perfectae, infera arcuata, protrusa; lunella perfecta, strictiuscula; plica palatalis 1 supera, longa, subcolumellaris emersa; perist. sejunctum, labiatum, breviter expansum. — Long. 14—16, diam. 4 mill. Ap. 3½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 89.)

Clausilia piceata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 18. f. 266.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 90.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 118.
— *adaucta Porro* in Villa disp. syst. p. 57. *) teste Rossm.
— *sinuata Küst.* coll.

Habitat in montibus Aprutiis (Rm.)

126. Cl. robusta Küster.

T. rimata, ventroso-fusiformis, laevigata, nitida, cornea; spira sursum attenuata, obtusa; sutura anfr. super. confertim albo-papillata; anfr. 10 planiusculi, ultimus antice costulato-striatus, basi breviter cristato-gibbus; apertura truncato-ovalis; lamella supera marginalis, infera valde ascendens, introrsum furcata; lunella distincta, leviter arcuata; plica palatalis 1 supera, longa, subcolumellaris longe emersa; perist. vix continuum, superne interruptum vel appressum, undique breviter expansum, margine externo distincte unidentato. — Long. 16, diam. medio 4¾ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 90.)

Clausilia robusta Küst. in litt. et Monogr. t. 4. f. 34—37.

Habitat prope Spalato Dalmatiae.

Obs. Differt a sequente praesertim forma aperturae, lamella infera furcata, margine externo superne distincte dentato.

127. Cl. latilabris Wagner.

T. rimata, fusiformi-cylindrica, sublaevis, nitida, pellucida, corneo-lutescens; spira sensim attenuata, apice obtusiuscula; sutura anfractuum superiorum minute papillifera; anfr. 12 planuli, ultimus striatus, basi cristato-gibbus; apertura ovali-pyriformis; lamellae mediocres; lunella distincta; plicae palatales sub 2 superae (superior saepe obsoleta), subcolumellaris vix emersa;

*) T. rimata, fusiformis, corneo-lutea, glabra, nitida; cervice laevi; apertura pyriformi; perist. continuo, subtili, albo; plicis palatalibus absconditis, columellari inconspicua, lunata distincta; anfr. 11. — Alt. 14—15, lat 3½—4 mill. — Hab. in Aprutiis. — Differt a Cl. commutata Rm praecipue cervice non striata et plicis palatalibus absconditis. (Villa l. c.)

perist. connexum, albido-sublabiatum, reflexiusculo-expansum. — Long. 18, diam. 4⅓ mill. Ap. 4⅓ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 91.)

Clausilia latilabris Wagn. in Chemn. XII. p. 191. t. 236. f. 4145. *)
— *decipiens Rossm.* III. p. 14. f. 176. XI. p. 8. f. 717.
— — *Küster* t. 14. f. 28—30.
— *saturàlis Ziegl.* Mus.
— *suturalis Mühlf.* Mus. (Menke syn. ed. II. p. 30.)
— — *Beck* ind. p. 92. N. 48?
— *simulans Beck* ind. p. 93. N. 66.

β. Minor:
Clausilia nitidescens Ziegl. Mus.

γ. Tenuissima, substriata, papillis subobsoletis:
Clausilia amoena Küster mss.
— *elegantula Ziegl.* (teste Parreyss.)

Habitat in Dalmatia.

Obs. Species pervariabilis quoad magnitudinem, formam et suturam distinctius vel obsolete papilliferam; formae nonnullae intermediae eam cum Cl. laevissima Zgl. (Nr. 108.) jungere videntur.

128. Cl. gastrolepta Ziegler.

T. minutim rimata, fusiformi-cylindracea, gracilis, substriata, nitidula, cornea; spira superne attenuata, obtusa; sutura anfractuum superiorum papillifera; anfr. 11—12 planuli, ultimus antice costulato-striatus; apertura ovalis; lamellae mediocres, infera flexuosa; lunella exquisita; plica palatalis 1 supera, longissima, subcolumellaris vix emersa; perist. vix continuum, expansum, superne affixum. — Long. 17, diam. vix 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 92.)

Clausilia gastrolepta Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 15. f. 179.
— — *Beck* ind. p. 92. N. 51.
— *elongata Cantr.* Bull. Brux. II. p. 381? (Conf. Nr. 213.)

Habitat in Dalmatia.

129. Cl. blanda Ziegler.

T. minutim rimata, cylindraceo-fusiformis, glabra, nitida, fulvo-cornea; spira sensim attenuata, obtusiuscula; sutura anfractuum superiorum minute papillifera; anfr. 11 planiusculi, ultimus antice striatulus; apertura late pyriformis; lamella infera flexuosa; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, longissima,

*) T. fusiformi, cornea, laevi, nitida, pellucida; anfractuum margine superiore dense plicato-crenulato; apertura expansa; columella plicis 2 majoribus. — Long. 9½, lat. 2¼ lin. (Wagn. l. c.)

subcolumellaris emersa; perist. magis minusve connexum, breviter expansum, albo-limbatum. — Long. 15, diam. 3½ mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 93.)

Clausilia blanda Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 13. f. 173.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 68.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 178. t. 17. f. 23. 24.
— *strigata Mühlf.* (Menke syn. ed. II. p. 30.)

Habitat in Dalmatia.

Obs. Num a praecedente satis diversa? Nonne formis intermediis cum illa juncta?

130. Cl. paestana Philippi.

T. minute rimata, fusiformis, tenuis, sublaevigata, nitidula, fusco-cornea; spira superne attenuata, obtusa; sutura papillis albis, minutis, oblongis ornata; anfr. 10 planiusculi, ultimus antice costulato-striatus, basi breviter cristato-gibbus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae mediocres, infera in labium prodiens; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, longa, subcolumellaris emersa; perist. connexum, expansiusculum, albo-limbatum. — Long. 13½, diam. 3½ mill. Ap. 3⅓ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 94.)

Clausilia paestana Phil. Sicil. I. p. 138. II. p. 116.
— — *Rossm.* Ill. p. 13. f. 172.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 78.
— *monilifera Mühlf.* et *Beck* ind. p. 94. N. 93?
— *concolor Ziegl.* (Ant. Verz. p. 45.)
— *punctata Scac.* catal. p. 16. (Phil.)

Habitat ad Paestum.

131. Cl. Freyeri Küster.

T. minute rimata, fusiformi-cylindracea, gracilis, substriata, nitida, cornea; spira superne attenuata, obtusa; sutura distincte et confertim papillifera; anfr. 12 planiusculi, ultimus antice costulato-striatus, basi subgibbus; apertura oblongo-ovalis; lamellae mediocres; lunella exquisita; plicae palatales 2 subaequales, superae, subcolumellaris emersa; perist. continuum, breviter expansum, superne subaffixum. — Long. 17, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 95.)

Clausilia Freyeri Küster mss.

Habitat prope Castel Nuovo Dalmatiae.

Obs. Simillima Cl. gastroleptae (Nr. 128.), papillis in omnibus anfractibus distinctis et plicis palatalibus 2 diversa.

132. Cl. Vidovichii Parreyss.

T. rimata, fusiformis, striatula, nitida, fusco-cornea; sutura eleganter albo-papillata; anfr. 10 planiusculi, ultimus subtus turgidus, juxta rimam vix compressus; apertura rotundato-ovalis; lamellae distantes, subaequales, infera subfurcata; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. disjunctum, breviter expansum, margine sinistro superne calloso. — Long. 15, diam. medio 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 96.)

Clausilia Vidovichii Parr. in sched.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 95.

Habitat in Dalmatia.

133. Cl. bilabiata Wagner.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, subtilissime striata, nitida, lutescenti-cornea; spira lente attenuata, obtusiuscula; sutura anfractuum superiorum papillifera; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus antice striatus, basi subgibbus; apertura pyriformi-rotunda, basi subangulata; lamella supera valida, compressa, infera profunda, parvula; lunella distincta; plica palatalis 1 longa, supera, subcolumellaris emersa; perist. connexum, album, crassum, subduplicatum, undique expansum, extus album. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 97.)

Clausilia bilabiata Wagn. in Chemn. XII. p. 189. t. 236. f. 1142. *)
— — *Rossm.* III. p. 15. f. 177.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 62.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 147. t. 5. f. 17.
— *reflexa Ziegl.* Mus. et *Beck* ind. p. 94. N. 82?
— *labiocrassa Mühlf.* Mus.
— *reflexilabris Cantr.* Bull. Brux. II. p. 381.

β. Minor, anfr. 8, peristomatis crassissimi margine interiore antrorsum prominente: long. 9, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅔ lata. (Spec.)

γ. Striatula, perist. simplice, expanso, albo-calloso:
Clausilia crassilabris Mühlf. (Beck) et *Küster* in sched.
— *albolabris Parr.* in sched.

δ. Striatula, apertura semiovali, perist. tenui, rectangule patente, plica subcolumellari valde emersa:
Clausilia planilabris Rossm. X. p. 21. f. 630.

Habitat in Dalmatia.

Obs. Species Cl. semirugatae (Nr. 142) proxime affinis. Varietates *γ* et *δ* potius formae imperfectae esse videntur.

---

*) T. fusiformi, laevi, pellucida, cornea; anfractibus margine superiore crenulatis; perist. reflexo, crasso, per sulcum profundum bimarginato; apertura biplicata — Long. 5½ lin. (Wagn. l. c.)

134. Cl. montenegrina Küster.

T. profunde rimata, fusiformis, laevigata, nitidula, cornea; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; sutura confertim albo-papillata; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus striatulus, basi tumidus, leviter bigibbosus; apertura ovalis; lamellae parvae, infera subramosa; lunella distincta, brevis; plica palatalis 1 valida, supera, subcolumellaris tenuis, vix emersa; perist. sejunctum, tenue, breviter expansum. — Long. 10½, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 98.)

Clausilia montenegrina Küster in sched.

Habitat prope Cettigne reipublicae Montenegrinae.

Obs. Similis speciminibus imperfectis praecedentis, sed forma aperturae basi rotundatae, lamellarum etc. facile distinguenda.

135. Cl. conspurcata Jan.

T rimata, fusiformis, sublaevigata, nitida, cornea; spira regulariter attenuata, obtusiuscula; sutura minute papillifera; anfr. 9—10 vix convexiusculi, ultimus antice plicatulo-striatus, basi cristato-gibbus; apertura rotundato-ovalis; lamellae mediocres, infera flexuosa; lunella perfecta; plicae palatales 2 (supera 1 longissima, altera infera, emersa), subcolumellaris vix conspicua; perist. vix connexum, breviter expansum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 99.)

Clausilia conspurcata Jan in sched.
— — *Rossm.* IV. p. 18. f. 265.
— *Deenia Cantr.* (teste Beck)? Conf. Nr. 211.

Habitat in Dalmatia.

Obs. Conf. Cl. lamellata Ziegl. Nr. 71.

136. Cl. binotata Ziegler.

T. subrimata, fusiformis, laeviuscula, nitida, pellucida, corneo-lutescens; spira sensim attenuata, obtusiuscula; sutura filiformis, superne minute papillifera; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus antice subtiliter striatus; apertura rotundato-pyriformis; lamella supera mediocris, infera valida, flexuosa; lunella distincta; plicae palatales sub 3 (suprema longissima, secunda brevis, saepe obsoleta, tertia rapide descendens), subcolumellaris emersa; perist. continuum, vix solutum, reflexum. — Long. 17, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 100.)

Clausilia binotata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 15. f. 178.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 63.
— — *Küster* t. 4. f. 31—33.

β. Minor, ventrosior, papillis distinctioribus, plica palatali infera minus valida: long. 15, diam. 4 mill. (Spec.)

Clausilia Kokeilii Küster in sched.

Habitat in Istria.

137. Cl. gibbula Ziegler.

T. rimata, fusiformis, solidula, sublaevigata, lutescenti-cornea; spira sensim attenuata, acutiuscula; sutura papillis striaeformibus, crebris, albis ornata; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus antice striatus, basi breviter gibbus; apertura ovalis; lamellae mediocres, infera flexuosa; lunella strictiuscula; plicae palatales 3 (superae 2, antice callo junctae, infera stricte descendens, valida, emersa), subcolumellaris vix conspicua; perist. vix vel subconnexum, breviter expansum, albo-limbatum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 101.)

Clausilia gibbula Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 12. f. 171.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 79.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 116.
— *Brinierii Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 178. t. 18. f. 1. 2. *)
— *Deenia Cantr.*? (Conf. Nr. 211.)

Habitat in montibus Aprutiis.

§. 16.

138. Cl. septemplicata Philippi.

T. rimata, fusiformis, solidiuscula, minute et confertim striata, diaphana, sericina, rufo-cornea; spira sursum attenuata, apice obtusiuscula; sutura papillis albis punctiformibus munita; anfr. 11 planiusculi, ultimus antice rugosior, basi subcristatus; apertura oblongo-ovalis; lamella supera minuta, infera valida, subhorizontalis; lunella leviter arcuata; plicae palatales 4 (supera longa, mediae antice callo junctae, quarta perobliqua, emersa), subcolumellaris breviter emersa; perist. continuum, solutum, albidum, undique expansum. — Long. 20, diam. 5 mill. Ap. 5½ mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 102.)

Clausilia septemplicata Phil. Sicil. I. p. 139. t. 8. f. 22. II. p. 116.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 75.
— *sublaevis Ziegl.* (Ant. Verz. p. 45.)
— *sublevis Jay* cat. 1839. p. 54?

*) T. sinistrorsa, cylindrica, pallide cornea, subtilissime et regulariter striata, pellucida, nitida; anfr. 9—10 subplanis, ad suturam irregulariter crenatis; apertura subrotunda, superne angulata; columella biplicata; perist. intus marginato, patulo et ad angulum subcalloso; apice corneo. — Long. 19, diam. 3½ mill. (Pot. et M. l. c.)

Clausilia sericina Rossm. Ill. p. 7. f. 161.
— *laevigata Ziegl.* olim.

Habitat in Sicilia.

139. Cl. Calcarae Philippi.

T. rimata, fusiformis, solidiuscula, oblique confertim striata, sericina, pallide cornea; spira obtusiuscula; sutura anfractuum superiorum papillifera, inferiorum simplex; anfr. 11 planiusculi, ultimus antice vix rugosior, basi subcristatus; apertura oblongo-ovalis; lamella supera minuta, infera substricte ascendens; lunella leviter flexuosa; plicae palatales 3 (superae 2, tertia infera, emersa), subcolumellaris immersa; perist. continuum, vix solutum, tenue, albidum, undique expansum. — Long. 18, diam. 4⅔ mill. Ap. 4⅔ mill. longa, 3⅔ lata. (Coll. Nr. 103.)

Clausilia Calcarae Phil. in Zeitschr. f. Malak. 1844. p. 107.

Habitat prope Palermo Siciliae.

Obs. Persimilis praecedenti; differt colore, sutura vix papillifera, plica palatali 1 deficiente et praecipue lamella inferiore non flexuosa, sed stricte introrsum ascendente.

140. Cl. bidens (Turbo) Linn.

T. rimata, fusiformis, solidula, subtiliter striata, nitida, carneo-cinerascens; spira turrita, apice acutiuscula (rarissime decollata); sutura rufa, punctato-papillifera; anfr. 10—11 vix convexiusculi, ultimus antice acutius striatus, basi tuberculato-compressus; apertura rotundato-ovalis; lamellae parvae; lunella distincta, ad suturam elongata; plica palatalis 1 breviuscula, saepe obsoleta, subcolumellaris immersa; perist. vix connexum, album, expansum, margine externo sinuoso. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 104.)

Turbo bidens Linn. syst. ed. X. p. 767. N. 566.*) ed. XII. p. 1240. N. 649.
— — *β Gmel.* p. 3069. N. 87.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 873. N. 141.
— *papillaris Chemn.* IX. P. 1. p. 121. t. 112. f. 963. 64.
— *mediterraneus Wood* suppl. t. 6. f. 40.
Helix papillaris Müll. verm. II. p. 120. N. 317.
— — (Cochlodina) *Fér.* p. 528.
— *bidens Brook.* f. 103. (Cantr.)
Bulimus papillaris Brug. Enc. méth. I. p. 353. N. 94
Pupa papillaris Drap. tabl. d. moll. p. 62. N. 20.

*) T. turrita, pellucida; anfractibus contrariis, sutura subcrenata, apertura postice bidentata. — Gualt. t. 4. f. C. — Habitat in Europa australi (Linn. l. c.)

Clausilia papillaris Drap. hist. p. 71. t. 4. f. 13.
— — *Lam.* 10. p. 115. ed. Dh. p. 200.
— — *Wagn.* in Chemn. XII. p. 188. t. 236. f. 4141.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 138.
— — *Rossm.* III. p. 12. f. 169.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 84.
— — *Gray* Man. p. 14. t. 5. f. 56.
— — *Cantr.* Malac.-méd. p. 151.
— *bidens Turt.* Man. p. 73. f. 56.
— *mediterranea Gray* in Wood suppl. p. 34.
— *vitrea Stentz* (Ant. Verz. p. 45.) detrita.
Gualtieri t. 4. f. D. E.

β. Costulato-striata, palato calloso, perist. continuo, breviter soluto:
Clausilia virgata Crist. et *Jan* catal. p. 5.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 83.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 194. t. 19. f. 27. 28.
— *affinis Phil.* Sicil. I. p. 139.
— — *Beck* ind. p. 94.
— *papillaris var. Rossm.* III. p. 12. f. 170.
— — *var. Phil.* Sicil. II. p. 116.

Habitat in Illyria (frequentissima in muris prope Monfalcone et Fiume!), Gallia, Hispania, Italia, Sicilia; in Suecia (? Nilss.) Nec in Britannia (teste Gray).

141. Cl. microstoma Küster.

T. rimata, fusiformis, regulariter et confertim striata, corneo-fusca, nitidula; sutura subtiliter crenulato-marginata; anfr. 10 convexiusculi, ultimus basi tumidus, ad aperturam subconstrictus; apertura angustata, oblongo-pyriformis; lamellae subconniventes, tenues; lunella linearis, arcuata; plicae palatales 3 (superae 2, tertia brevis ad basin), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, intus callo albo incrassatum, extus breviter expansum. — Long. 12, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Küster.)

Clausilia microstoma Küst. Mon. p. 21. t. 1. f. 31—34.

Habitat . . . ?

142. Cl. semirugata Ziegler.

T. vix rimata, fusiformi-cylindrica, pellucida, nitida, cornea vel corneo-albida; anfr. 10—11 planiusculi, superne semirugati, ultimus antice confertim plicatus, basi subcristato-tuberculatus; sutura levis, papillifera; apertura oblongo-pyriformis, intus callosa; lamellae subaequales, conniventes; lunella distincta, longa; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, album, breviter reflexum, superne appressum, lamella

supera emarginatum. — Long. 17, diam. 4½ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3½ lata. (Coll. Nr. 105.)

Clausilia semirugata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 21. f. 274.
— — *Cantr.* Mal. médit. p. 148?
— *nitidula Mühlf.* (Menke syn. ed. II. p. 30.)
— *pygmaea b. Beck* ind. p. 94.
— *chersonensis Friv.*
— *nitida Parr.* olim.

β. Minor, plerumque ventrosior, anfr. 8—9, rugis distinctioribus: long. 14, diam. 3¼ mill. (Spec.)

Clausilia pygmaea Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 80.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 189. t. 19. f. 9. 10.
— *nitida Mühlf.* Mus.
— *semirugata var. Rossm.* IV. p. 21. f. 273.

Habitat prope Ragusa et Macarsca Dalmatiae.

143. Cl. vibex Rossmässler.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, diaphana, lutescenti-cornea; spira apice attenuata', obtusiuscula; sutura confertim papillato-crenata; anfr. 9 vix convexiusculi, supremi 5 confertim costulati, sequentes sublaevigati, ultimus antice confertim rugosus, constrictus, basi breviter et acute tuberculatus: tuberculo pone stricturam usque ad suturam ascendente; apertura rotundato-subpyriformis; lamellae parvulae; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, breviter solutum, albo-labiatum, expansum. — Long. 12½, diam. 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 106.)

Clausilia vibex Rossm. Ic. X. p. 21. f. 629.
— *deplana Stentz* in sched.

Habitat in Croatia meridionali.

Obs. Conf. Cl. labiata (Nr. 154.) var.

144. Cl. albida Parreyss.

T. rimata, ventroso-fusiformis, subtiliter (interdum obsolete) costulato-striata, hyalina, albida, apice cornea; sutura subsimplex, papillis remotis, minutis ornata; anfr. 9, supremi convexi, reliqui planiusculi, ultimus antice turgidus, juxta rimam distinctam subcompressus; apertura ovalis; lamellae subaequales, convergentes; lunella valida; plicae palatales 2 approximatae, subcolumellaris vix emersa; perist. breviter expansum, superne interruptum. — Long. 12, diam. medio 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 107.)

Clausilia albida Parr. in sched.

Clausilia albida Pfr. Symb. III. p. 92.
— *pupula Küster* in sched.

Habitat prope Budua Dalmatiae.

145. Cl. pellucida Pfr.

T. rimata, fusiformis, tenuis, oblique plicatula, pellucida, cornea; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; sutura papillis subconcoloribus ornata; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus antice ruguloso-plicatus, basi obtuse bicristatus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae mediocres, infera flexuosa; lunella distincta; plicae palatales 2 (supera 1, altera infera, valida, emersa), subcolumellaris fere immersa; perist. continuum, breviter solutum, undique subtiliter limbatum. — Long. 11, diam. 3 mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 108.)

Clausilia pellucida Pfr. mss.
— *Kutschigii Parr.* in sched. Nec Küst.

Habitat in Dalmatia: Budua, Castelli (Küster).

* * *

146. Cl. conspersa Parreyss.

T. rimata, subfusiformis, solida, oblique et confertim undulato-striata, vix nitidula, castanea; spira sursum attenuata, acutiuscula; sutura impressa, papillis albidis irregulariter conspersa; anfr. 10 convexiusculi, ultimus basi obsolete gibbosus; apertura magna, oblonga; lamella supera verticalis, infera valida, subtransversa, flexuosa; lunella perarcuata; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. connexum, appressum, late expansum, album, intus valide labiatum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia conspersa Parr. in sched.

Habitat prope Travnik.

§. 17.

147. Cl. Buschii Küster.

T. rimata, fusiformis, solidula, striatula, subdiaphana, cerea; spira sursum attenuata, acutiuscula; sutura simplex, impressa; anfr. 11 vix convexiusculi, ultimus antice costulatus; apertura obliqua, pyriformis; lamellae parvae, infera profunda; lunella distincta, parum arcuata; plicae palatales nullae, subcolumellaris ad marginem peristomatis descendens; perist. breviter solutum, continuum, expansum, incrassatum. — Long. 19, diam. anfr. penult. 4⅔ mill. Ap. oblique 4⅔ mill. longa, 3 lata. (Mus. Cuming. et v. d. Busch.)

Clausilia Buschii Küster Monogr. p. 24. t. 2. f. 14—16.

Habitat in Japonia (Sieboldt).

148. Cl. grisea Deshayes.

T. rimata, subventroso-fusiformis, nitidula, cinerea, corneo-nebulosa; spira superne attenuata, apice obtusiuscula; anfr. 9, primi 5 convexiusculi, striati, sequentes 2 subplanulati, laevigati, ultimus antice rugosus, basi tumidus, juxta rimam gibbus; apertura subrotundata; lamella supera compressa, infera flexuosa, subramosa, lunella distincta; plicae palatales sub 2 superae, subcolumellaris emersa; perist. continuum, vix solutum, album, undique expansum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{2}{3}$ lata. (Coll. Nr. 109.)

Clausilia grisea Desh. Expéd. de Morée III. p. 168. t. 19. f. 52—54.
— — *Lam.* ed. Dh. 18. p. 205. *)
— — *Beck* ind. p. 91. N. 27.
— — *Rôth* diss. p. 21. t. 2. f. 6.

Habitat in Morea.

Obs. Species ex Deshayesii descriptione et figura vix agnoscenda. De varietatibus ejus conf. Roth l. c.

149. Cl. Massenae Potiez et Michaud. †

T. fusiformis, solida, albida, corneo irregulariter maculata, maculis oblongis, longitudinaliter sulcata; anfr. 10—12, primi minores valde sulcati, ultimus dorso corrugatus; apertura ovata, superne angulata; perist. simplex, acutum, subreflexum; columella biplicata, inter plicas aliquando plicatula; apex corneus, laevigatus. — Long. 10—12, diam. 5 mill. (P. et M.)

Clausiliae Massenae Pot. et *Mich.* gal. l. p. 185. t. 19. f. 3. 4.

Habitat in Morea, prope Navarin.

Obs. An praecedentis varietas? an sequentis?

150. Cl. maculosa Deshayes. †

T. elongato-fusiformis, ventricosa, apice acuminata, albo-grisea, maculis longitudinalibus punctisve fuscis notata; anfr. convexiusculi, primi striati, alteri laevigati, ultimus ad aperturam rugosus; apertura ovata, alba; columella triplicata. — Long. 18, diam. 5 mill. (Dh.)

Clausilia maculosa Desh. Expéd. de Morée III. p. 167. t. 19. f. 67—69.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 35.
— — *Lam.* ed. Dh. 21. p. 206.

Habitat in Morea et insulis Archipelagi.

---

*) T. elongata, fusiformi, ventricosa, laevigata, albo-grisea, fusco-nubeculata; ultimo anfractu ad aperturam striato; apertura dilatata; columella bipli cata; plica anteriore bifida. — Long. 19, lat. 5 mill. (Desh. l. c.)

151. Cl. clata Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, ventrosa, striata, nitidula, fusculo-lutescens; spira sursum attenuata, obtusa; anfr. 10 convexiusculi, ultimus basi obtuse cristatus; apertura pyriformi-rotundata; lamella infera alta, subhorizontalis; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, carneo-labiatum. — Long. 16, diam. 4½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia elata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* Ill. p. 20. f. 190.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 132.

Habitat in Buccovina.

Obs. Plica lunata interdum imperfecta et interrupta est, tunc inprimis species Cl. turgidae (Nr. 79) maxime affinis apparet.

152. Cl. somchetica Pfr.

T. rimata, ventroso-subfusiformis, confertim striata, corneo-fusca; spira celeriter attenuata, apice obtusa; anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus basi ventrosus, compresso-cristatus; apertura subangulato-pyriformis; lamella supera compressa, infera remota, subramosa; lunella distincta; plicae palatales 4 elongatae, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, breviter expansum. — Long. 14, diam. 5 mill. Ap. 4 mill. longa, medio 3 lata (Coll. Nr. 110.)

Clausilia somchetica Pfr. Symb. III. p. 94.
— *Kolenati Siemaschko.* (teste de Middendorff.)

Habitat in Caucaso, Somchetia.

153. Cl. hetaera Frivaldsky.

T. rimata, ventroso-subfusiformis, confertim striata, vix nitidula, corneo-rufa; spira sensim attenuata, apice obtusiuscula; anfr. 11—12 vix convexiusculi, ultimus antice tumidus, basi crista compressa, arcuata munitus; apertura ovali-pyriformis, intus callosa, basi canaliculata; lamella supera marginalis, infera profunda, subramosa; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, expansum. — Long. 12—14, diam. 4 mill. Ap. oblique 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia hetaera Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 10.

Habitat in insula Prinkipos (Frivaldsky).

154. Cl. labiata (Turbo) Montagu.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, solidula, subtilissime costulato-striata, sericina, cinerascenti-cornea; spira regulariter

attenuata, apice obtusiuscula; sutura subundulata; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus antice validius costulatus, basi in cristam brevem, opacam compressus; apertura rotundata; lamellae mediocres; lunella distincta; plica palatalis nulla (vel vestigium unius superae), subcolumellaris fere immersa; perist. subconnexum, breviter expansum, albo-labiatum; palatum transverse albo-callosum. — Long. 13, diam. 3⅓ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 111.)

Turbo labiatus Mont. test. brit. p. 362. t. 11. f. 6.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 875. N. 146.
Clausilia solida Drap. p. 69. t. 4. f. 8. 9.
— — *Lam.* ed. Dh. 24. p. 208.
— — *Rossm.* IV. p. 18. f. 267.
— *labiata Turt.* Man. f. 57.
— — *Gray* Man. p. 14. t. 5. f. 57.
Helix solida (Cochlodina) *Fér.* pr. 535.

β. Minor, sutura papillifera, callo palatali extus magis minusve prominente:

Clausilia solida var. cajetana Rossm. XI. p. 4. f. 696.

Habitat in Gallia et Italia boreali, var. *β* circa Gaëta.

155. Cl. crenulata Ziegler. †

T. minutim rimata, fusiformis, corneo-lutescens, diaphana, subtilissime costulato-striata; anfr. 10, ultimus antice plicato-striatus; apertura pyriformi-rotunda; lamella infera elata, flexuosa; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, affixum, albo-limbatum. — Alt. 5 — 6, lat. 1 lin. (Rm.) — Long. 12½, diam. 3 mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (ex ic.)

Clausilia crenulata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 21. f. 272.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 92.

Habitat in Dalmatia.

Obs. Differt a Cl. conspurcata (Nr. 135.) cui peraffinis, statura minore, graciliore, striis regularibus, deficientibus papillis et plica palatali secunda.

156. Cl. rugicollis Ziegler.

T. punctato-rimata, gracilis, fusiformis, subtiliter capillaceo-striata, opaca, cornea; anfr. 12 — 13 vix convexiusculi, ultimus praecedente longior, antice rugoso-costulatus, latere impressus, basi tuberculato-bicristatus, fossula interposita; apertura pyriformis, basi canaliculata; lamellae approximatae, subaequales, compressae; lunella parva, incrassata; plica palatalis 1 supera longa (raro altera sub eadem brevior), subcolumellaris immersa; perist.

continuum, vix solutum, reflexum. — Long. 14, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2¼ lata. (Coll. Nr. 112.)

Clausilia rugicollis Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 18. f. 186.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 124.

β. Major: long. 18, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Spec.)
Clausilia rugicollis var. Rossm. XI. p. 5. f. 699. 700.

Habitat in Banatu.

157. Cl. carissima Ziegler.

T. rimata, clavato-fusiformis, subtilissime striata, corneo-lutescens; anfr. 10 planiusculi, ultimus brevis, antice costato-striatus, medio et basi sulcatus, basi bicristatus: crista infima compressa; apertura pyriformis; lamellae subaequales, infera profunda; lunella brevis, distincta; plica palatalis 1 supera, elongata, subcolumellaris immersa; perist. continuum, productum, reflexiusculum, lutescenti-limbatum. — Long. 10, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 113.)

Clausilia carissima Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* X. p. 22. f. 632.
— *varians min. Friv.* in litt. (Rm.)

β. Major, subtiliter costulato-striata: long. 12, diam. 3⅓ mill. (Spec.)
Clausilia bella Stentz in sched.
— *carissima var. bella Rossm.* XI. p. 6. f. 702.

γ. Major, anfractu ultimo magis protracto: long. 16, diam. 4 mill.
Clausilia banatica Friv. in sched.

Habitat in Banatu.

158. Cl. aculus Benson.

T. vix rimata, fusiformi-subulata, oblique costulato-striata, nitida, cornea; spira subulata, sursum valde attenuata, acuta; anfr. 10—11 convexi, ultimus basi rotundatus, vix fortius costulatus; apertura oblique pyriformis, intus nitida; lamellae subaequales, infera furcata; lunella distincta; plica palatalis 1 infra suturam, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, albidum, superne vix solutum, undique brevissime reflexum. — Long. 14, diam. 3¾ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 114.)

Clausilia aculus Bens. in Ann. and mag. nat. hist. IX. p. 487. *)
— — *Pfr.* Symb. III. p. 92.
— — *Küst.* p. 19. t. 1. f. 25—27.

Habitat in insula Chusan Chinae.

*) T. subulata, nitida, epidermide fuscescente, anfr. 10—11 oblique leviter striatis; apertura dentibus 2—3 minuta; perist. reflexo. — Axis longior 0,65, min. 0,5 poll. (Bens. l. c.)

159. Cl. diminuta Parreyss.

T. subrimata, cylindraceo-fusiformis, oblique costulata, corneo-fusca, parum nitida; spira subulata, apice acutiuscula; anfr. 9 planiusculi, ultimus basi compresso-subcristatus; apertura semiovalis; lamellae inaequales, supera parvula, recta; lunella brevis, valida; plicae palatales 2 parallelae, tertia brevis infra lunatam, subcolumellaris immersa; perist. non continuum, margine brevissime expansum. — Long. 11, diam. infra medium 2⅔ mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅓ lata. (Coll. Nr. 115.)

Clausilia diminuta Parr. in sched.
— — *Pfr.* Symb. III. p. 93.

Habitat in Dalmatiae insula Meleda.

160. Cl. gracilis C. Pfr.

T. rimata, fusiformis, gracilis, striolata, nitidula, purpurascenti-brunnea; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 11—12 convexiusculi, ultimus antice tumidus, costulato-striatus, pone aperturam subconstrictus, basi bituberculatus; apertura rotundato-pyriformis, fuscula; lamellae parvulae, infera profunda; lunella distincta, suturam attingens; plica palatalis 1 brevissima pone lunatum, subcolumellaris vix emersa; palatum transverse callosum; perist. continuum, solutum, undique reflexiusculum. — Long. 10, diam. 2½ mill. Ap. 2 mill. longa, 1⅔ lata. (Coll. Nr. 116.)

Clausilia gracilis C. Pfr. I. p. 65. t. 3. f. 32. *)
— — *Rossm.* VII. p. 24. f. 489.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 101.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 20.
— *parvula Turt.* Man. t. 5. f. 59?
— *nigricans var. Gray* Man. p. 218. t. 5. f. 59?
— *saxatilis Hartm.* (teste Villa disp. syst. p. 28.)
Rupicola gracilis Hartm. in sched.

β. Major, long. 12, diam. fere 3 mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (Spec.)
Rupicola saxatilis Hartm. in sched.

γ. Subclavata, basi vix attenuata: long. 8, diam. 2½ mill. (Spec.)

Habitat passim in Germania: in Hassia (C. Pfr.), in Austria (frequens circa Ischl, Traunfall, Salzburg, Öfen der Salzach etc.!), Carniolia; var. *β* in Helvetia, *γ* in Carniolia (Schmidt).

161. Cl. Tettelbachiana Rossmässler.

T. rimata, fusiformis, ventrosa, subtiliter striatula, brunnea; spira apice obtusiuscula; anfr. 9—10 convexiusculi, ultimus

*) T. fusiformi, gracili, striatula; columellae lamellis obsoletis. — Long. 5, lat. 1 lin. — List. hist. lib. I. pars I. N. 39. T. 6. (C. Pfr. l. c.)

tumidus, gibbus, basi leviter carinato-compressus; apertura pyriformi-rotundata; lamellae parvae, inferior retrorsum dichotoma; lunella parva; plicae palatales 2 (altera supera, altera minima infera e callo palatali exiguo exiens), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, affixum, reflexum, albido-limbatum. — Long. 9—10, diam. 3 mill. Ap. 2½ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 117.)

Clausilia Tettelbachiana Rossm. Ic. VII. p. 19. f. 476.

β. Minor, confertim et subtiliter costulato-striata. (Rm. l. c.)

Habitat in monte Schneeberg Austriae (Tettelbach), var. *β* in alpibus Carnioliae (Schmidt).

162. Cl. Schmidti Pfr.

T. vix rimata, fusiformis, purpurascenti-brunnea, nitidula; spira sursum valde attenuata, acutiuscula; anfr. 12—13, supremi convexi, sequentes subplanulati, laevigati, ultimus basi crista brevi et tuberculo juxtaposito obsoletiore munitus; apertura ovali-pyriformis; lamellae parvulae, infera remota, subramosa; lunella suturam non attingens; plicae palatales 2 (altera supera mediocris, altera infera oblique descendens), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, in limbum fusculum, subtilem reflexum. — Long. 12, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 118.)

Clausilia Schmidti Pfr. Symb. I. p. 49.

Habitat in alpibus Carinthiae et Friauliae!

Obs. Habitu Cl. gracili similis, sed Cl. parvulae affinior, ab hac magnitudine, spira gracili, acutiuscula, striis distinctioribus, apertura magis rotundata etc. diversa. — Variat testa paulo ventrosiore et tuberculo basali magis minusve distincto. Plica palatalis infera interdum vix conspicitur.

163. Cl. parvula Studer.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, subtilissime striatula, nitidula, brunnea; spira regulariter attenuata, apice obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 10 vix convexiusculi, ultimus antice costulato-striatus, a latere subcompressus, basi sulcatus, breviter bicristatus; apertura pyriformis; lamellae parvae, infera profunda; lunella distincta, brevis, suturam non attingens; plicae palatales 2, quarum 1 supera, altera juxta subcolumellarem emersam e callo palatali saepe obsoleto oblique ascendens; perist. continuum, solutum, undique reflexiusculum. — Long. 8½, diam. 2½ mill. Ap. 2 mill. longa, 1¼ lata. (Coll. Nr. 119.)

Clausilia parvula Stud. Verz. p. 20.
— — *Hartm.* in Neue Alpina I. p. 215.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 18. t. 2. f. 10.
— — *Rossm.* VII. p. 23. f. 488.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 99.

Clausilia parvula Schmidt syst. Verz. p. 20.
— *minima C. Pfr.* I. p. 66. t. 3. f. 35. III. p. 63.
— — *Forst.* in Nov. Act. Acad. Leop. XIX. P. II. p. 280.
— *paula Parr. Ant.* Verz. p. 46. N. 1665.
Helix parvula Stud. in Coxe travels. (Htm.)
— — (Cochlodina) *Fér.* pr. 544.
Turbo crustatus Hartm. in Alpina I.
Stomodonta parvula Merm. moll. pyren. p. 47.
Rupicola parvula Hartm. in sched.
β. Minor: long. 7½, diam. 2 mill. Ap. 1⅔ mill. longa, 1¼ lata. (Spec.)
Rupicola minima Hartm. in sched.

Habitat in Germania passim (prope Cassel, Eisenach! in Silesia), Austria (Schneeberg, Baden prope Wien, Salzburg, «Öfen der Salzach» etc.!), Illyria, Helvetia, var. *β* passim cum altera intermixta.

Obs. Testa saepe vivente animale detrita vel calcareo-incrustata, nec solum in montibus altis, sed etiam in rupibus calcareis vallis «Ahnethal» prope Cassellam.

* * *

164. Cl. torticollis (Bulimus) Olivier.

T. profunde rimata, subcylindracea, longe truncata, longitudinaliter confertissime costulato-striata, ferrugineo-albida; anfr. 4—5 plani, ultimus attenuatus, antice deviatus, solutus, dorso carinatus, medio excavatus, basi bicristatus; apertura angulato-pyriformis; lamellae profundae, supera obsoleta; lunella brevis, distincta; plicae palatales 2 elongatae, subcolumellaris inconspicua; perist. liberum, continuum, undique expansum. — Long. 12½, diam. 4¾ mill. Ap. 4 mill. longa, 3¾ lata. (Coll. Nr. 120. Spec. 4½ anfr.)

Bulimus torticollis Oliv. voy. I. p. 416. t. 17. f. 4. *)
Helix torticollis (Cochlodina) *Fér.* pr. 513.
Clausilia torticollis Lam. 1. p. 113. ed. Dh. p. 197.
— — *Beck* ind. p. 90. N. 12.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 179. t. 18. f. 5. 6.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 171. f. 2.
Turbo torticollis Wood suppl. t. 6. f. 35.

Habitat in insula Creta (Oliv.), Standié Syriae (Fér.).

Obs. Ad hanc sectionem conf. Cl. conspersa Nr. 146, et socialis Nr. 182.

---

*) Bul. sinister, parvulus, dilute rubiginosus, valde truncatus, subcylindricus; collo libero, angustato, subquadrato; apertura subrotunda. (Oliv. l. c.)

§. 18.

165. Cl. Grohmanniana Partsch.

T. rimata, cylindraceo-fusiformis, decollata, subtiliter costulata, albido-lutescens, non nitens; anfr. 7 — 10 planiusculi, ultimus basi breviter cristatus, juxta cristam subimpressus; apertura rotundato-pyriformis; lamella supera parvula, ad marginem porrigens, infera valida, flexuosa; lunella distincta; plicae palatales 4 (omnes in apertura conspicuae, mediae antice callo junctae), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, undique expansum, reflexiusculum. — Long. 21, diam. 5 mill. Ap. 6½ mill. longa, 5 lata. (Coll. Nr. 121. Spec. trunc. 7½ anfr.)

Clausilia Grohmanniana Partsch in Mus. Caes. Vindob.
— — *Rossm.* III. p. 7. f. 160.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 116.
— — *Küster* Mon. t. 8. f. 8—11.
— *Grohemanni Beck* ind. p. 90. N. 10.
— *Grohmanni Cantr.* Malac. médit. p. 153.
— *decollata Stentz* in sched.
— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 181. t. 18. f. 13. 14.

Habitat in Sicilia (Grohmann).

166. Cl. anatolica Roth.

T. arcuato-subrimata, ventroso-fusiformis, confertissime costulata, opaca, fuscescenti-albida; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 9—10, supremi convexi, sequentes subplanulati, ultimus antice subramoso-rugatus, basi cristatus, juxta cristam impressus; apertura angulato-subrotunda; lamella supera parva, infera profunda, transversa; lunella extus vix conspicua; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, undique expansum. — Long. 17 — 19, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, 4 lata. (Coll. Nr. 122.)

Clausilia anatolica Roth diss. p. 21. t. 2. f. 5.
— — *Rossm.* XI. p. 4. f. 693.

Habitat in sepulcris necropoleos Cacamo Cariae (Roth), in insula Skinosa (Forbes).

167. Cl. maculata Ziegler.

T. vix rimata, clavato-fusiformis, dense capillaceo-costulata, coerulescenti-albida, livido-maculata; spira regulariter attenuata, apice nigricans; anfr. 12 convexi, ultimus confertim rugoso-costatus, basi bigibbosus; apertura ovalis, fuscula; lamellae parvae, approximatae; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, subsolutum, breviter

expansum, simplex. — Long. 19, diam. 4½ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia maculata Ziegler Mus.
— . — *Rossm.* IV. p. 12. f. 251.
— — *Beck* ind. p. 91. N. 31.

Habitat prope Smyrna (Ziegler).

168. Cl. Sieboldtii Pfr.

T. arcuato-rimata, fusiformis, solida, confertim costulata, vix nitidula, corneo-fusca; spira sensim attenuata, acuta; anfr. 10 convexi, ultimus penultimum non superans, basi rotundatus, obsolete gibbus; apertura magna, pyriformis; lamellae mediocres, convergentes; lunella profunda, arcuata, extus conspicua; plica palatalis 1 mediocris, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, liberum, album, expansum, reflexiusculum. — Long. 18, diam. medio 4 mill. Ap. 4⅔ mill. longa, 3⅔ lata. (Mus. Cuming.)

Clausilia Sieboldtii Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Japonia (v. Sieboldt).

169. Cl. montana Stentz.

T. arcuato-rimata, fusiformi-cylindrica, solida, confertim plicata, nitidula, corneo-lutea; spira cylindrica, apice sensim attenuata, obtusa; sutura impressa, submarginata; anfr. 13, primi 9—10 convexi; sequentes subplanulati, ultimus antice rugosus, basi brevissime cristatus; apertura oblongo-pyriformis; lamella supera mediocris, infera profunda, subramosa; lunella strictiuscula; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, vix expansum, intus crasse albo-labiatum. — Long. 20, diam. 4⅓ mill. Ap. 4½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 123.)

Clausilia montana Stentz in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 70.

Habitat in Transylvania, Banatu.

170. Cl. ventricosa Draparnaud.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, solida, confertim costulato-striata, nigricanti-rufa vel brunnea, vix nitida; spira longe attenuata, apice acutiuscula; anfr. 11—12 vix convexiusculi, ultimus basi tumidus, subgibbus; apertura pyriformi-rotundata; lamellae mediocres, infera profunda, antice ramosa; lunella parvula; plica palatalis 1 supera, elongata, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, breviter solutum, albidum, expansum. — Long. 20, diam. 4⅔ mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔—3 lata. (Coll. Nr. 124.)

Pupa ventricosa Drap. tabl. des moll. p. 62. N. 21.

Clausilia ventricosa Drap. hist. p. 71. t. 4. f. 14.
— — *Rossm.* II. p. 9. f. 102. IV. f 276.
— — *Charp.* catal. moll. Suisse p. 17.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 104.
— — *Lam.* ed. Dh. 27. p. 209.
— — *Gray* Manual p. 15. f. 4.
— *plicata γ Hartm.* in Neue Alpina I. p. 217.
— *perversa Fitzing.* syst. Verz. p. 104.
— *cinerascens Parr.* (Beck.)
— *asphaltina Ziegl.* Mus.
— *ventriculosa Villa* disp. syst. p. 27.
Heliæ muscosa Stud. in Coxe travels. (teste Hartm.)
— *perversa Sturm* Fauna VI. H. 2. T. 10.
— *ventriculosa* (Cochlodina) *Fér.* pr. 531.
Stomodonta ventricosa Mermet moll. pyr. p. 48.

β. Major; cerasino-brunnea: long. 22, diam. 5½ mill.
Clausilia ventricosa var. Rossm. IV. p. 21. f. 275.

γ. Minor: long. 14, diam. 4 mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata.
Clausilia tumida Ziegl. Mus.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 103.
— *ventricosa var. Rossm.* IV. p. 21. f. 277.

δ. Cristata (Held in Isis 1837. p. 306.)
Clausilia rusiostoma Held in Isis 1836. p. 275.*)

Habitat passim in Germania, Gallia, Helvetia, Illyria, Hungaria.

Obs. Conf. affines: Cl. viridana Nr. 77, badia Nr. 76 et lineolata Nr. 201

171. Cl. fulcrata Ziegler.

T. rimata, cylindrico-fusiformis, corneo-lutescens, eleganter costulata, sericina, subpellucida; anfr. 11 vix convexiusculi, ultimus basi subgibbus, breviter cristatus; apertura pyriformi-ovalis; lamellae mediocres; lunella distincta; plicae palatales 2 (altera supera, longa, altera infera, candida, emersa), subcolumellaris emersa; perist. continuum, breviter expansum, superne appressum. — Long. 19, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll Rossm.)

Clausilia fulcrata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* III. p. 16. f. 180.
— — *Beck* ind. p. 93. N. 73.

---

*) T. fusiformi, ventricosa, brunneo-nigricante, striata; toro dorsuali simplici, obtuso; apertura semiovato-pyriformi; perist. applicato, incrassato, paulum reflexo, albo; columella trilamellata; lamella dextra tenuissima, occulta, intermedia maxima, prorsum rursumque fissa; faucibus pullo-rubescentibus quarum pariete laterali uniplicato. — Long. 7—8, lat. 1¾—2 lin. (Held l. c.)

β. Minor: long. 14⅔, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 125.)

Habitat in insula Lissa Dalmatiae; var. *β* ad arcem Clissa prope Spalato (Küster).

172. Cl. stabilis Ziegler.

T. arcuato-rimata, clavato-fusiformis, solida, confertim plicata, diaphana, nitida, corneo-lutea; spira superne subito attenuata, obtusiuscula; anfr. 11 convexi, ultimus pone aperturam tumidus, rugosus, basi breviter cristatus; apertura ovali-pyriformis, basi distincte canaliculata, callo palatali crasso, lineari angustata; lamella sup. majuscula, infera profunda, subverticalis; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, expansum, margine supero et externo sinuosis. — Long. 14, diam. 3½ mill. Ap. oblique 3½ mill. longa; 2⅔ lata. (Coll. Nr. 126.)

Clausilia stabilis Ziegl. Mus. teste Stentz.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 70.

Habitat in Banatu.

Obs. Conf. Cl. elata Nr. 151 et turgida Nr. 79.

173. Cl. isabellina Pfr.

T. rimata, fusiformis, confertissime costulato-striata, sericina, pallide isabellina; spira regulariter attenuata, obtusiuscula; anfr. 9 planiusculi, ultimus basi subcompressus; sutura impressa; apertura ovali-pyriformis; lamella supera acuta, infera minor, perobliqua; lunella distincta; plicae palatales 3 (superae 2 minutae, tertia valida), subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, album, reflexum. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 127.)

Clausilia isabellina Pfr. Symb. II. p. 60.
— — *Küster* p. 20. t. 1. f. 28—30.
— *intrusa Parr.* in sched.

Habitat prope Cairo. (teste Mus. Caes. Vindob.)

Obs. Plica lunata in hac specie distinctius quam in ulla alia in apertura conspicitur. Plica palatalis tertia antice interdum in 2 tuberculos abit.

* * *

174. Cl. strangulata (Helix) Férussac.

T. vix rimata, gracillime fusiformis, confertim et regulariter costata, pallide cinnamomea; sutura impressa; anfr. 13 vix convexi, ultimus prope aperturam quasi strangulatus et carina acuta circumdatus; apertura angusta, pyriformis; lamellae parvulae; lunella distincta; plica palatalis 1 longa, subcolumellaris valida,

strangulationem non superans; perist. continuum, liberum, tenue, late expansum, album. — Long. 18, diam. 3½ mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 128.)

Helix strangulata (Cochlodina) *Fér.* pr. 516.
Clausilia strangulata Beck ind. p. 91. N. 22.
— — *Pfr.* Symb. I. p. 47.

Habitat prope Seyde et circa Beirut Syriae (Boissier).

175. Cl. bicarinata Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, gracilis, irregulariter costulato-striata, pallide cornea, albo-strigillata; spira superne attenuata, apice obtusa; anfr. 14 plani, ultimus latere impressus, basi bicristatus: crista basali arcuata, anteriore angulato-curvata; apertura ovato-pyriformis, intus alba, basi bicanaliculata; lamella infera immersa, subflexuosa; lunella lata; plicae palatales 2—3 superae, brevissimae, subcolumellaris alte immersa; perist. continuum, solutum, reflexum, album. — Alt. 8½, lat. 2 lin. (Rm.) — Long. 19, diam. 4⅓ mill. Ap. 4 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia bicarinata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* X. p. 17. f. 620.
— *bicristata Ziegl.* (Parr.)

Habitat in Syria.

176. Cl. galeata Parreyss.

T. vix rimata, fusiformis, cornea, subtilissime costulata; anfr. convexiusculi; cervix compressissima, galeiformis, basi carinata: carina curvata, periomphalum latum cingente; apertura triangulari-pyriformis, basi canaliculata; lamellae parvae, approximatae; lunella parva; plicae palatales 2 superae, longae, subcolumellaris remotissima; perist. continuum, productum, reflexum, acutum. — Alt.? lat. 1½ lin. (Coll. Rossm. spec. trunc.) — Long. 18 (?), diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, medio 2 lata. (ex ic.)

Clausilia galeata Parr. in sched.
— — *Rossm.* X. p. 17. f. 621.

Habitat prope Balbek Syriae.

177. Cl. fraudigera Parreyss.

T. vix rimata, fusiformis, gracilis, cornea, costulata, albo-strigillata; sutura albo-subfilosa; anfr. 13 vix convexi, ultimus latere canaliculato-impressus, basi bicarinatus, canali interposito: carina basali marginem attingente, altera breviore; apertura rotundato-pyriformis, intus fuscula; lamellae approximatae, inferior flexuosa, valida; lunella parva; plicae palatales 2 superae, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, expansum.

reflexiusculum, fusculum. — Long. 18, diam. 3⅔ mill. Ap. 3½ mill. longa, medio vix 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia fraudigera Parr. in sched.

— — *Rossm.* X. p. 18. f. 622.

Habitat in Turcia.

178. Cl. varnensis Pfr.

T. vix rimata, fusiformis, confertim costulata, corneo-fusca, albo-strigillata; sutura impressa; spira sursum attenuata, obtusa; anfr. 13 vix convexiusculi, ultimus latere impressus, basi latus, obtuse bicristatus, sulco interposito; apertura elliptico-pyriformis; lamellae conniventes, infera flexuosa, tenuis; lunella arcuata; plicae palatales 2 (altera supera, longa, altera infera, emersa), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, expansum, valide albo-labiatum. — Long. 16—17, diam. 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 2¾ lata. (Coll. Nr. 129.)

Clausilia varnensis Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 8.

Habitat prope Varna Turciae (Frivaldsky).

Obs. Differt a praecedente anfractu ultimo tumido, obtuse cristato, plica palatali infera, descendente etc.

179. Cl. pagana Ziegler.

T. punctato-rimata, turrito-fusiformis, tenuis, diaphana, cornea, confertim albido-costulata; spira gracilis, apice acutiuscula; anfr. 12—14 convexiusculi, ultimus a latere profunde sulcato-impressus, basi cristato-bituberculatus, fossula interposita; apertura pyriformis, intus fulvida, basi subcanaliculata; lamellae approximatae, compressae; lunella parva, incrassata; plica palatalis 1 supera longa (rarius altera brevior), subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, expansum. — Long. 17, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 130. Spec. max.)

Clausilia pagana Ziegl. Mus.

— — *Rossm.* XI. p. 6. f. 701.

β. Elongata, anfr. 14—15, costis elevatis, lamelliformibus: long. 18, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2⅔ lata. (Spec.)

γ. Minor, anfr. 11 convexioribus: long. 12, diam. 3 mill. (Spec.)

Clausilia bulgariensis Friv. in sched.

Habitat in Banatu, var. *γ* prope Tirnava.

Obs. Persimilis Cl. rugicolli Nr. 156, costis acutiusculis bene distincta

180. Cl. biplicata (Turbo) Montagu.

T. vix rimata, fusiformis, solidiuscula, confertim costulata, diaphana, lutescenti-cornea, costulis infra suturam impressam

albidis; spira superne attenuata, apice obtusa; anfr. 11—14 convexiusculi, ultimus basi cristatus; apertura pyriformis, basi canaliculata; lamella supera ad marginem porrecta, infera profunda; lunella distincta, gracilis; plicae palatales 2 retrorsum convergentes, subcolumellaris immersa; perist. continuum, aliquantulum productum, expansum, sublabiatum. — Long. 16—17, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 131.)

Turbo biplicatus Mont. test. brit. p. 361. t. 11. f. 5.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 874. N. 143.
Clausilia biplicata Leach moll. p. 120.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 129.
— — *Gray* Man. p. 214. t. 5. f. 55.
— *Montagui Gray* in Ann. of Phil. XIII.
— *plicata Gärtn.* Wett. p. 22.
— — *β Hartm.* in Neue Alpina I. p. 217.
— *ventricosa C. Pfr.* I. p. 63. t. 3. f. 29.
— — *Forst.* in Nov. Act. Leop. XIX. P. II. p. 251.
— — *var. similis Menke* syn. ed. II. p. 32.
— *perversa C. Pfr.* I. p. 62. t. 3. f. 28.
— *similis Charp.* mss. *Rossm.* I. p. 77. f. 30. VII. p. 17. f. 468. XI. p. 7. f. 705. 706.
— — *Charp.* cat. moll. Suiss. p. 17.
— — *Roth* diss. p. 20.
— *vivipara Held* in Isis 1837. p. 309.
— — *Klett* mss. (teste Rossm. VII. p. 17.)
Helix perversa Müll. verm. II. p. 118. n. 316?
— *similis* (Cochlodina) *Fér.* pr. 533.
Odostomia biplicata Flem. (teste Beck.)
Laciniaria similis Htm. in sched.

β. Plicis interlamellaribus 2—3, magis minusve distinctis:
Clausilia biplicata C. Pfr. I. p. 61. t. 3. f. 27.
— — *Forst.* l. c. p. 277. t. 58. f. 8.

γ. Major, anfr. 14, plica palatali tertia saepe instructa: long. 20, diam. 4½ mill.
Clausilia similis var. grandis Rossm. VII. p. 17. f. 469.

δ. Minor, anfr. 10—11: long. 12—13, diam. 3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata.
Clausilia sordida Ziegl. Mus.

ε. Albina, pallidissime virenti-hyalina. Rarior.

ζ. Minor, apice valde attenuato, acuto, peristomate paulo distinctius labiato, anfr. 13: long. 15, diam. 3⅔ mill. (Coll. Rossm.)
Clausilia Schwerzenbachii Parr. in sched.

Habitat frequens in Germania, Helvetia, Britannia; var. ζ prope Brussa.

Obs. 1. Huc referendae: Cl. cinerascens Crist. et Jan, Cl. consors et rustica Zgl., Cl. triplicata Mühlf. — Conf. Cl. fallax Nr. 78

Obs. 2. Cl. Fort. Forster l. c. p. 249—282 hanc speciem (sub nomine generali Cl. ventricosae) accuratius examinavit, et formam clypei (i. e. spatii inter lamellas parietis inclusi) maximi momenti aestimans, sequentes disjunxit species:

A. Clypeo cordato:
1. *Claus. cordata* p. 269. t. 58. f. 1.
2. — *vulnerata* p. 270. ib. f. 2.

B. Clypeo subcordiformi:
3. *Claus. infulaeformis* p. 272. f. 3.
4. — *radicans* p. 273. f. 4.

C. Clypeo non cordiformi:
5. *Claus. rostrata* p. 274. f. 5.
6. — *quadrata* p. 275. f. 6.

Veram Cl. ventricosam Drap. et Rossm. inter formas delineatas haud invenio. Praeterea omnes has formas inter centena speciminum in diversissimis regionibus collectorum et a me examinatorum distinguere mihi non contigit.

181. Cl. fritillaria Frivaldsky.

T. vix rimata, clavato-fusiformis, subventricosa, corneo-lutescens, subtessellatim albo-strigillata, subtiliter costulato-striata; anfr. 11 convexiusculi, ultimus antice tumidus, basi leviter carinatus; apertura pyriformis; lamellae regulares; lunella parva; plicae palatales 2 (altera supera longior, altera infera, e lunata exiens, brevis), subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, reflexum, albido-sublabiatum. — Long. 14½, diam. infra medium 4 mill. Ap. oblique 3⅔ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia fritillaria Friv. in sched.
— — *Rossm.* X. p. 18. f. 623.
— *flammigera Parr.* (teste Rossm.)

Habitat in Turcia.

182. Cl. socialis Frivaldsky.

T. rimata, fusiformis, solida, confertim costulata (vel costulato-striata), vix nitidula, cinnamomeo-cornea; spira apice attenuata, obtusiuscula; anfr. 12—13 planiusculi, ultimus basi tumidus, bicristatus: crista basali validiore; apertura angusta, pyriformi-ovalis; lamellae mediocres; lunella subangulata; plicae palatales 3 (superae 2 subparallelae, tertia infera), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, breviter solutum, intus crasse albo-labiatum. — Long. 16—17, diam. vix 4 mill. Ap. 3⅔ mill. longa, 3 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia socialis Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 9

Habitat prope Varna Turciae (Frivaldsky).

183. Cl. vetusta Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, solida, confertim costulato-striata, fusco-cornea, albido-strigillata; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 12—13 vix convexiusculi, ultimus latere impressus, basi sulcatus, bicristatus: crista basali compressiore; apertura irregulariter pyriformis, basi canaliculata; lamellae parvae, approximatae, infera profunda; lunella brevis, valde arcuata; plicae palatales 2 (supera 1, altera e callo transversali rubello juxta canalem ascendens), subcolumellaris fere immersa; perist. continuum, solutum, labiatum, margine externo strictiusculo, breviter expanso, columellari reflexo. — Long. 16, diam. vix 4 mill. Ap. 3⅓ mill. longa, medio 2½ lata. (Coll. Nr. 132.)

Clausilia vetusta Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. (Sept. 1836.) p. 16. f. 260.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 19.
— *decisa Ziegl.* olim.
— *venusta Beck* ind. p. 96. N. 115.
— *cana Held* in Isis 1836. Apr. p. 275? *)

β. Minor: long. 14, diam. 3⅓ mill. (Spec.)
Clausilia vulcana Stentz in sched.
— *vetusta var. Rossm.* XI. p. 7. f. 707.

Habitat in Carinthia, Carniolia (prope Garczerewitz!), in Bavaria (?), var. *β* in Banatu et prope Tharand Saxoniae (Rm.).

Obs. Si revera, teste Held in Isis 1837. p. 902, Cl. cana est eadem species ac Cl. vetusta, nomen Heldianum prioritate gaudet. Sed descriptio Cl. canae ad biplicatae varietatem potius referenda mihi videtur.

184. Cl. costulata Jan.

T. rimata, clavato-fusiformis, deorsum ventrosa, tenuiuscula, capillaceo-costulata, diaphana, sericina, cinerascenti-cornea; spira superne valde attenuata, apice acutiuscula; anfr. 11—12 convexi, ultimus basi cristatus; apertura ovalis, basi obsolete angulata; lamella supera marginem non attingens, infera valida, profunda; lunella magna, distincta; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa, extus conspicua; perist. continuum, parum solutum, subsimplex, undique expansum. — Long. 15, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 133.)

Clausilia costulata Jan Mantissa p. 3. **)

*) T. fusiformi, gracili, costulata, brunnea, costulis crebris intermixtis albis canescente; toro dorsuali simplice, prosiliente; apertura rhombeo-ovata, oblonga; perist. paulum provecto, reflexo, bicanaliculato; columellae lamellis 3 fere aeque validis, dextra latente, sinistra interrupta; faucium pariete laterali 2—3plicato; plica superiore positu rugae dorsuali respondente; clausilio oblongo, gracili, apice repente incrassato, brunneo. — Long. 7—8, lat. 1½—1¾ lin. — Bavaria. (Held l. c.)

**) T. fusiformi, ventricosa, dense costulata (alt. 7, lat. 2 lin.), apertura ovali, columella biplicata. (Jan l. c.)

Clausilia costulata Beck ind. p. 96. N. 113.
— *clavata Rossm.* IV. p. 12. f. 252.
— *lamellosa Villa* disp. syst. p. 58.

Habitat in Italia boreali.

185. Cl. Hübneri Rossmässler.

T. vix rimata, fusiformis, oblique costata, diaphana, vix nitida, carneo-fuscula; spira sensim attenuata, apiculata, acutissima; sutura marginata, crenulata; anfr. 11, primi laevigati, planiusculi, sequentes convexi, penultimus subplanatus, ultimus basi compresse carinatus; apertura ovalis, basi canaliculata; lamella infera subverticalis, introrsum bifida; lunella strictiuscula; plicae palatales 2 superae, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, breviter solutum, tenue, undique expansum. — Long. 14, diam. 3⅔ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2½ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Hübneri Rossm. in litt.

Habitat prope Brussa Natoliae.

186. Cl. Grimmeri Parreyss.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, costis elevatis, subundulatis, subdistantibus munita, nitidula, rubello-cornea; spira regulariter attenuata, acutiuscula; sutura impressa, crenata; anfr. 10 convexiusculi, ultimus basi arcuato-cristatus, sulco juxta cristam, intus plicam prominentem formante, sculptus; apertura subangulato-elliptica; lamellae mediocres; lunella strictiuscula, plica palatalis 1 supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, breviter expansum. — Long. 9, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 1¾ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia Grimmeri Parr. in sched.

Habitat prope Gratz Styriae.

* * *

187. Cl. olympica Frivaldsky.

T. non rimata, turrita, sericina, fusca, confertim albo-costulata; spira regulariter attenuata, acuta; anfr. 10—11 convexi, ultimus descendens, longe porrectus, dorso subsulcatus, basi compresso-carinatus; apertura pyriformi-ovalis; lamella supera compressa, infera inconspicua; lunella arcuata; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, liberum, albidum, undique expansum. — Long. 11, diam. anfr. penult. 2½ mill. Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 134.)

Clausilia olympica Friv. in sched.

Clausilia olympica Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 8.
Habitat in monte Olympo.

* * *

188. Cl. bicolor Pfr.

T. breviter rimata, fusiformis, violascenti-brunnea, subtiliter et subarcuatim costulato-striata; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi leviter bicarinatus, confertim costulatus; apertura pyriformis, basi canaliculata; lamella supera minuta, antica, infera profunda, transversa, valida, compressa; lunella transverse elongata; plica palatalis 1 infra suturam, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, fusculum, solutum, undique expansum. — Long. 14, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 135.)

Clausilia bicolor Pfr. Symb. III. p. 93.
— — *Küster* t. 8. f. 12—14.

β. Anfractu ultimo a latere paulo magis compresso.

Habitat in insula Andros, β in ins. Thermia (Forbes).

189. Cl. pumila Ziegler.

T. vix rimata, fusiformis, confertim costulato-striata, diaphana, vix nitidula, fusco-cornea; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 10—11 planiusculi, ultimus basi sulcatus et gibboso-cristatus; apertura pyriformis, basi magis minusve canaliculata; lamella supera mediocris, infera extrorsum duplicata; spatium interlamellare uniplicatum; lunella leviter arcuata; plicae palatales 2 (supera 1, altera basalis e callo palatali ascendens), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, expansum, sublabiatum. — Long. 12—14, diam. 3—3½ mill. Ap. 3½ mill. longa, 2⅓ lata. (Coll. Nr. 136.)

Clausilia pumila Ziegl. Mus.
— — *C. Pfr.* III. p. 41. t. 7. f. 16.
— — *Rossm.* IV. p. 15. f. 259.
— — *Beck* ind. p. 97. N. 136.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 20.
— *cuspidata Held* in Isis 1836. p. 276.*) teste auct. in Isis 1837. p. 902.
— *Partschii Fitz.* (teste Ant. Verz. p. 45. N. 1653.)

β. Nitida, anfr. 10 convexioribus: long. 12, diam. 3 mill. Ap. 2⅔ mill longa, 2 lata. (Spec.)

*) T. claviformi-fusiformi, acuminata, striata, brunnea, striis intermixtis albidis variegata; toro dorsuali geminato, valido; apertura rhombeo-ovata, perist. paulum producto, reflexo; columellae lamellis 3, magnitudine fere paribus, dextra sublatente, media prorsus bifida; plica interlamellari una; faucium pariete laterali plicis 2 atque tuberculo validis exornato; plica superiore positu cum ruga dorsi conveniente. — Long. 4½—5½, lat. 1⅛—1¼ lin. (Held l. c.)

Clausilia triplicata Hartm. teste Mousson.

γ. Minor: long. 9½, diam. 2⅔ mill. (Spec.)
Clausilia pusilla Ziegl. (teste Schmidt.)

δ. Plicula interlamellari obsoleta vel deficiente.

Habitat in Hassia, Saxonia, Silesia, Austria, Styria, Carinthia; var. β in Helvetia, γ in Carniolia, nec non in Hassia (Ahnethal bei Cassel), δ frequentissima prope Baden Austriae.

190. Cl. circumdata Frivaldsky.

T. subrimata, fusiformis, confertim costulata, sericina, fusco-cornea; spira sensim attenuata, obtusiuscula; sutura subcrenulata, obsolete albo-filosa; anfr. 11 convexiusculi, ultimus basi in cristam brevem compressus, intus callo transverso incrassatus; apertura pyriformi-elliptica, basi angulata; lamella supera mediocris, infera profunda, substricta; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, brevis, subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, solutum, expansum, margine columellari callo verticali sublabiatum; periomphalum profundum, anguste lunatum. — Long. 13, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 137.)

Clausilia circumdata Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 9.

Habitat prope Brussa Natoliae (Frivaldsky).

191. Cl. rugosa Draparnaud.

T. subrimata, fusiformi-cylindrica, tenuiuscula, confertim costulato-striata, diaphana, corneo-fusca; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 12—14 planiusculi, ultimus basi sulcatus, leviter bicristatus; apertura ovali-pyriformis; lamella supera exigua, infera antice crassior; lunella distincta; plicae palatales 2 (supera 1, altera infera, callo transverso juxtaposita), subcolumellaris vix emersa; perist. continuum, solutum, breviter expansum, albido-limbatum. — Long. 12—14, diam. vix 3 mill Ap. 2⅔ mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 138.)

Pupa rugosa Drap. tabl. d. moll. p. 63. N. 23.
Clausilia rugosa Drap. hist. p. 73. t. 4. f. 19. 20.*)
— — *Lam.* 12. p. 115. ed. Dh. p. 201. (excl. synon.)
— — *Beck* ind. p. 97. N. 134. (ex parte.)
— — *Rossm.* VII. p. 20. f. 487.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 75.
— *perversa Dupuy* moll. du Gers p. 36.
Helix rugosa (Cochlodina) *Fér.* pr. 543.
Stomodonta rugosa Merm. moll. pyr. p. 47.

Habitat in Gallia et in Lusitania (prope Cintra et Oporto: Morelet)

*) T. fusiformi, gracili, brunnea, striata; columella bilamellata; perist soluto productoque; anfr. 12 — 13. (Drap. l. c.)

192. Cl. nigricans (Turbo) Pultency.

T. vix rimata, cylindraceo-fusiformis, solida, subtilissime striato-costulata, sericina, nigricanti-castanea, plerumque albido-strigillata; spira sensim attenuata, apice acutiuscula; anfr. 10—11 convexiusculi, ultimus basi subsulcatus, breviter cristatus; apertura pyriformis, magis minusve oblonga, saepe basi subcanaliculata; lamella supera marginalis, infera introrsum bifurcata vel ramosa; lunella distincta; plica palatalis 1 supera, altera e callo palatali transverso exiens (saepe obsoleta), subcolumellaris emersa; perist. continuum, breviter solutum, reflexiusculum. — Long. 13, diam. 3¼ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 139.)

Turbo nigricans Pult. cat. Dors. p. 46.
— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 875. N. 145?
— *bidens Mont.* test. brit. p. 357. t. 11. f. 7.
Clausilia dubia Drap. hist. p. 70. t. 4. f. 10?*)
— — *Lam.* ed. Dh. 28. p. 209?**)
— — *Gray* Man. p. 216. t. 12. f. 143.
— *rugosa C. Pfr.* I. p. 63. t. 3. f. 30.
— — *Forst.* in Nov. Act. Leop. XIX. P. II. p. 279. t. 58. f. 9?
— *obtusa Rossm.* VII. p. 19. f. 482.
— *nigricans Jeffr.* in Linn. tr. XVI. p. 351.
— — *Gray* Man. p. 217. t. 5. f. 58.
— *crassula Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 180. t. 18. f. 9. 10?
Odostomia nigricans Flem. in Edinb. Encycl. (Gray.)
Andraea dubia Hartm. in sched.

β. Lamella infera distincte cruciatim biramosa. (Htm.)
Clausilia cruciata Stud. Verz. p. 20.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 17. t. 2. f. 9.?***)
— *plicatula β Hartm.* in Neue Alpina I. p. 216?
Helix cruciata (Cochlodina) *Fér.* pr. 542?

γ. Major, lineis impressis, confertis distincte reticulata: long. 15, diam 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2 lata. (Spec.)
Clausilia undulata Parr. in sched.

δ. Major, remotius striata (Htm.)
Helix roscida Stud. in Coxe travels.
Clausilia roscida Stud. Verz. p. 20.
— *plicatula δ Hartm.* l. c. p. 216.

---

*) T. cornea fusca, striata; apertura ovata; columella bilamellata; fauce subcoarctata. — Paulo minor quam Cl. solida. (Drap. l. c.)

**) T. elongato-fusiformi, fusca, cornea, striata; anfr. convexiusculis, ultimo superne sulco bipartito; apertura ovato-pyriformi, alba, columella bilamellata, labiis continuis, reflexis. — Long. 13, diam. 3 mill. — Intermedia inter Cl rugosam et ventricosam. (Desh. l. c.)

***) T. cornea, fusiformi, abbreviata, striata; columella bilamellata, lamellis convergentibus. — Rochers calcaires des bains de Loësch. (Charp. l. c.)

ε. Gracilior:
Clausilia rugulosa Ziegl. Mus.
ζ. Minor, anfr. 10: long. vix 10, diam. 2½ mill. Ap. 2½ mill. longa, 1⅔ lata. (Spec.)
Turbo Everetti Mill. in Ann. of Phil. XIX. p. 376?
η. Peristomate superne subappresso:
Clausilia obtusa C. Pfr. I. p. 65. t. 3. f. 33. 34.
ϑ. Albina, virenti-hyalina. (Rariss.)

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Suecia etc.

Obs. 1. Pervariabilis quoad spiram magis minusve gracilem, aperturae formam, callum palatalem plicamque inferam magis minusve perfectam; praeterea interdum plicula interlamellaris adest. — Num Cl. cruciata et roscida Stud. (var. β et δ) huc pertineant, certe non scio; certius vero huc referendae sunt *Cl. advena, albicilla, ochreata* et *sativa Zgl.*, nec non *Cl. instabilis Ant.* Verz. p. 45. N. 1632.

Obs. 2. In hac sectione conferatur Cl. carissima (Nr. 157.) var.

§. 19.

193. Cl. denticulata (Bulimus) Olivier.

T. perforato-rimata, fusiformi-cylindracea, regulariter et confertim costata, brunnea, nitidula, epidermide decidua argenteo strigata et maculata; anfr. 14 vix convexiusculi, ultimus fortius rugoso-costatus, basi gibboso-cristatus; apertura pyriformi-subcircularis; lamella supera tenuis, recta, infera remota, profunda, duplicata, lunella vix conspicua; plica palatalis 1 elongata, subcolumellaris immersa, occulta; perist. subincrassatum, expansum, intus denticulis confertis marginem attingentibus munitum. — Long. 17, diam. 4⅓ mill. Ap. c. canali supero 4 mill. longa, 3⅓ lata. (Coll. Nr. 140.)

Bulimus denticulatus Oliv. voy. I. p. 297. t. 17. f. 19. *)
Helix denticulata (Cochlodina) *Fér.* pr. 538.
Clausilia denticulata Lam. 8. p. 114. ed. Dh. p. 199.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 97.

Habitat in insula Scio (Oliv.); in insula Andros legit Forbes!

Obs. Testa detrita rubro-violascens, minutissime striata (ut in diagnosi Lamarckiana).

194. Cl. maesta (Helix) Férussac.

T. vix rimata, ventroso-fusiformis, confertissime capillaceo-striata, diaphana, vix sericina, fusca; spira sensim attenuata, apice obtusa; anfr. 9—10 subplanulati, ultimus antice costulatus, basi cristatus; apertura pyriformi-rotunda; lamella supera mar-

*) Bul. sinister, parvulus, elongatus, subtiliter striatus, rufescens; apertura cum angusto sinu suborbiculata, undique multidentata. (Oliv. l. c.)

ginalis, infera introrsum furcata; lunella strictiuscula; plicae palatales 5 emersae (quarum nonnullae interdum obsoletae), subcolumellaris vix emersa; perist. connexum, reflexiusculum, superne appressum, margine externo subdenticulato, interlamellari subtiliter 3—4-plicatulo. — Long. 14, diam. 4 mill. Ap. 3½ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 141.)

Helix maesta (Cochlodina) *Fér.* pr. 539.
Clausilia moesta Rossm. X. p. 23. f. 634.

Habitat prope Seyde et circa Beirut Syriae (Boissier).

195. Cl. corpulenta Frivaldsky.

T. vix rimata, ventroso-fusiformis, confertim costulato-striata, sericina, brunnea; spira sursum subito attenuata, acutiuscula; anfr. 10—11 convexi, penultimus supra aperturam rugulosus, ultimus basi acute cristatus; apertura ovali-pyriformis, basi canaliculata; lamella supera magna, infera profunda, furcata; lunella distincta, obliqua; plicae palatales 5 emersae (superae 2 longae, inferae breviores), subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, reflexiusculum, undique plicatulum. — Long. 13, diam. 4⅓ mill. Ap. oblique 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 142.)

Clausilia corpulenta Friv. in sched.
— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 7.

Habitat prope Brussa Natoliae (Frivaldsky).

Obs. Differt a praecedente sculptura, spira attenuata, acuta, aperturae forma, peristomate soluto, periomphalo lato, etc.

196. Cl. thessalonica Frivaldsky.

T. rimata, cylindrico-fusiformis, subtilissime costata, fusca; spira superne attenuata, apice obtusa; anfr. 11 planiusculi, ultimus basi compresso-cristatus; apertura pyriformi-rotundata; lamella supera marginalis, infera provecta, stricta; lunella distincta, parva; plicae palatales 3 (tertia distinctissima, rarius quarta e lunata exiens), subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, breviter expansum, intus undique plicatulum. — Long. 14, diam. 3½ mill. Ap. 3 mill. longa, 2½ lata. (Coll. Nr. 143.)

Clausilia thessalonica Friv. in sched.
— — *Rossm.* X. p. 22. f. 623.

β. Minor, plicis palatalibus nonnullis obsoletis: long. 10½, diam. 3 mill. Ap. vix 3 mill. longa, 2⅓ lata.
Clausilia multidentata Parr. in sched.

Habitat prope Thessalonich (Frivaldsky).

197. Cl. serrulata Mus. Petropol.

T. vix rimata, fusiformis, solidula, confertim costulata, diaphana, nitida, cerea; spira sursum valde attenuata, apice acutius-

cula; anfr. 10 convexi, ultimus basi rotundatus, vix compressus; apertura ficiformis; lamella supera compressa, introrsum arcuata, infera profunda, debilis; lunella distincta; plica palatalis 1 elongata, supera, subcolumellaris immersa; perist. continuum, breviter solutum, album, reflexiusculum, plicis confertis, marginem superantibus serrulatum. — Long. 12, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, medio vix 2 lata. (Coll. Nr. 144)

Clausilia serrulata Mus. Caes. Petropol.

— — *Pfr.* in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 71.

Habitat in Tauria. (Benevole communicavit Cl. de Middendorff.)

* * *

198. Cl. oxystoma Rossmässler.

T. vix rimata, fusiformis, medio ventrosa, brunnea, nitidula; spira sursum attenuata, gracilis; anfr. 12, summi 3 convexi, glabri, cornei, sequentes costulato-striati, 2 penultimi sublaevigati, ultimus acute costatus, basi valide bicarinatus, latere compressus, superne solutus; apertura pyriformi-subcircularis, basi canaliculata; lamella supera minuta, marginalis, infera profunda valida; lunella exigua, linearis; plicae palatales 3 (supera punctiformis, secunda elongata, tertia infera, callosa), subcolumellaris inconspicua; perist. continuum, liberum, acutum, expansum, pliculis permultis, marginem non attingentibus, obsitum. — Long. 22, diam. 5 mill. Ap. 4½ mill. longa, 4 lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia oxystoma Rossm. Ic. X. p. 19. f. 625.

— *ambliostoma Parr.* in sched.

Habitat prope Baalbek Syriae.

199. Cl. plicata Draparnaud.

T. subrimata, fusiformis, tenuiuscula, costulata, cornea, albostrigillata; spira gracilis, apice acutiuscula; anfr. 12—14 vix convexiusculi, ultimus basi compresso-cristatus; apertura elliptico-pyriformis, basi canaliculata, fuscula; lamella supera mediocris, infera profunda, perobliqua; lunella strictiuscula; plicae palatales 2 subparallelae (rarius tertia brevior), subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, breviter expansum, utrinque pliculis confertis, marginem non attingentibus munitum. — Long. 18, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, vix 3 lata. (Coll. Nr. 145.)

Pupa plicata Drap. tabl. d. moll. p. 63. N. 22.

Clausilia plicata Drap. hist. p. 72. t. 4. f. 15. 16.

— — *C. Pfr.* I. p. 61. t. 3. f. 26.

— — *Rossm.* I. p. 78. f. 31. VII. p. 18. f. 470

— — *Beck* ind. p. 96. N. 114.

— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 17.

Clausilia plicata Lam. ed. Dh. 26. p. 209.
— — *Roth* diss. p. 20.
— — *Graells* catal. mol. Esp. p. 8.
Helix muralis Stud. in Coxe trav. (Htm.)
— *plicosa* (Cochlodina) *Fér.* pr. 536.

β. Testa quasi pruina coerulescente obducta:
Clausilia pulverosa Parr. in sched.
— — *Menke* syn. ed. II. p. 32.
— — *Beck* ind. p. 96. N. 126?

γ. Gracilior:
Clausilia plebea Ziegl. Mus.
— *plicata var. Rossm.* XI. f. 708.

δ. Minor:
Clausilia odontosa Ziegl. Mus.

ε. Pliculis marginis columellaris obsoletis:
Laciniaria semiplicata Hartm. in sched.

ζ. Major, pliculis omnibus subobsoletis:
Clausilia plicata var. Rossm. XI. p. 7. f. 709.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Illyria, Hungaria (Szigleget!), Gallizia, Turcia et prope Smyrna.

Obs. Huc referendae: Cl. anceps, consimilis, litigiosa, paradoxa Zgl., formae vix varietates constituentes. — Species nostra a Cl. biplicata semper differt costis subtilioribus, apertura angustiore, fere elliptica, plicis palatalibus subparallelis.

200. Cl. macilenta Rossmässler.

T. vix rimata, fusiformis, gracilis, elegantissime costulata, cornea; anfr. 14 convexi, ultimus antice subconstrictus, fortius costatus, basi carinato-compressus; apertura pyriformis, basi canaliculata; lamella infera remota; plicae palatales 2 superne cum lunella postice convergentes, subcolumellaris immersa; perist. continuum, solutum, reflexum, margine externo intus irregulariter pliculato. — Alt. 5, lat. 1 lin. (Rm.) — Long. 12, diam. 2⅔ mill. Ap. 2⅓ mill. longa, 1½ lata. (Coll. Rossm.)

Clausilia macilenta Rossm. Ic. XI. p. 6. f. 704.

Habitat in Turcia (Frivaldsky).

Obs. Differt a Cl. plicata anfractibus convexis, colore etc.

* * *

201. Cl. lincolata Held.

T. subrimata, ventroso-fusiformis, confertim costulato-striata, fusca, albido-strigillata; spira acutiuscula; anfr. 12 convexiusculi, ultimus basi tumidus, subgibbus; apertura rotundato-pyriformis; lamella infera profunda, ramosa; lunella parvula; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris vix emersa; spatium interla-

mellare plicatulum; perist. continuum, breviter solutum, expansiusculum. — Long. 14 — 15, diam. 4 mill. Ap. 3¾ mill. longa, 3 lata. (Coll. Nr. 146.)

Clausilia lineolata Held in Isis 1836. p. 275.*)
— *basileensis Fitz.* teste Rossm. IV. p. 22.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 108.
— *dedecora Ziegl.* teste Rossm. I. p. 80.
— *ventricosa var. Rossm.* IV. p. 22. f. 279.

β. Major, forma et statura ad Cl. ventricosam accedens:
Clausilia ventriculosa Ziegl. teste Schmidt syst. Verz. p. 19 et in sched.

Habitat in Bavaria et Helvetia, var. *β* in Carniolia.

202. Cl. densestriata Ziegler.

T. vix rimata, subventroso-fusiformis, solidula, confertissime arcuato-striata, sericina, cerasino-nigricans, albido-strigillata; spira regulariter attenuata, acutiuscula; anfr. 11 — 12 vix convexiusculi, ultimus antice tumidus, basi tuberculatus; apertura ampla, subcircularis, intus fuscula; lamella supera marginalis, infera transversa, antice subtiliter 2 — 3 ramosa; lunella distincta; plicae palatales 2 (supera 1 longa, altera oblique descendens, emersa), subcolumellaris emersa; perist. continuum, solutum, reflexiusculum; spatium interlamellare latum, pliculis 4 — 5 munitum; palatum transverse callosum. — Long. 12 — 14, diam. 3¾ mill. Ap. 3¼ mill. longa, 2⅔ lata. (Coll. Nr. 147.)

Clausilia densestriata Ziegl. Mus.
— — *Rossm.* IV. p. 21. f. 278.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 105.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 19.

Habitat in Styria, Carinthia et Carniolia.

203. Cl. plicatula Draparnaud.

T. subrimata, fusiformis, solidula, confertim costulato-striata, opaca, violaceo-fusca; spira regulariter attenuata, apice acutiuscula; anfr. 10 — 13 subplanulati, ultimus basi tumidus, gibbus; apertura pyriformi-rotundata; lamella supera valida, marginem attingens, infera truncata, 1 — 2 ramosa; lunella parum distincta; plica palatalis 1 supera (infera nulla), subcolumellaris vix emersa;

*) T. fusiformi, ventricosa, fusca, tenuiter et arcte striata, toro dorsuali aequo, vix significato; apertura semiovato-pyriformi; perist. applicato, incrassato, reflexo; margine laterali intus tuberculis 2 planatis, inter se cohaerentibus, albidis instructo; columella trilamellata, lamella dextra minima, subabscondita, intermedia latissima, prorsum rursumque fissa; plicis 2 — 3 interlamellaribus; faucium pariete laterali uniplicato. — Long. 6 — 7, lat. 1¾ lin. (Held l. c.)

perist. continuum, breviter solutum, undique expansum, reflexiusculum; spatium interlamellare pliculis magis minusve distinctis munitum; palatum transverse callosum. — Long. 13, diam. 3 mill. Ap. vix 3 mill. longa, 2 lata. (Coll. Nr. 148. Spec. plur.)

Pupa plicatula Drap. tabl. d. moll. p. 64. N. 24.
Clausilia plicatula Drap. hist. p. 72. t. 4. f. 17. 18.
— — *Lam.* 11. p. 115. ed. Dh. p. 201.
— — *C. Pfr.* I. p. 64. t. 3. f. 31.
— — *Flem.* brit. anim. p. 272.
— — *Rossm.* I. p. 79. f. 32. VII. p. 18. f. 471—475.
— — *Beck* ind. p. 95. N. 106.
— — *Forst.* in Nov. Act. Leop. XIX. P. II. p. 276. t. 58. f. 7.
— — *Turton* in Zool. Journ. II. p. 565.
— — *Schmidt* syst. Verz. p. 19.
— *corrugata? Gärtn.* Wett. p. 21.
— *Rolphii Leach* moll. p. 119.
— — *Turt.* Man. p. 71. f. 54.
— — *Gray* Man. p. 215. t. 5. f. 54.
— *Iphigenia Rolphii Gray* in Med. repos. 1821. p. 182
Turbo conversus Alten p. 18. t. 2. f. 3.
Helix perversa Stud. in Coxe trav. (teste Htm.)
— *plicatula* (Cochlodina) *Fér.* pr. 540.
— *quadridens Schranck.* (teste Held.)
Stomodonta plicatula Merm. moll. pyr. p. 47.
Plicaphora plicatula Hartm. in sched.

β. Pallide cornea:
Clausilia Villae Mühlf. Mus.

γ. Spira sursum longe attenuata:
Clausilia attenuata Ziegl. Mus.
— *plicatula var. Rossm.* VII. f. 474.

δ. Crassa, obtusior, anfractibus convexioribus:
Clausilia mucida Ziegl. Mus.
— *nana Parr.* in sched. (Ant. Verz. p. 45. N. 1633.)
— *muscida Beck* ind. p. 95. N. 109.
— *plicatula var. Rossm.* VII. f. 475.
— — *var. fontana Schmidt* in sched.

ε. Plicis interlamellaribus obsoletis:
Clausilia dubia Hartm. in Neue Alpina I. p. 216?

ζ. Magna, ad Cl. densestriatam proxime accedens: long. 16½, diam 4 mill.
Clausilia striolata Schmidt teste Rossm.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Illyria, Italia, Suecia.

Obs. Species pervariabilis quoad magnitudinem et formam. — Huc referendae sunt varietates in collectionibus obviae sub nominibus Cl. affinis, crudae et crassulae Zgl.

§. 20.

204. Cl. peruana Troschel.

T. non rimata, fusiformis, truncata, tenuis, striis longitudinalibus (in anfractibus superioribus costulas confertas formantibus) et transversis subtiliter reticulata, subdiaphana, corneo-cinerea; anfr. (remanentes) 7 vix convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus antice breviter solutus, basi rotundatus; apertura verticalis, ampla, pyriformi-subcircularis; lamellae approximatae, validae, profunde intrantes; lunella distincta, angusta, arcuata; plica palatalis 1 supera, subcolumellaris nulla; perist. simplex, tenue, late expansum, superne ad lamellam superam subexcisum. — Long. 31, diam. 8 mill. Ap. 9 mill. longa, 8 lata. (Coll. Tschud.)

Clausilia peruana Troschel in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 51.

Habitat in Peru, ubi unicum specimen legit Cl. de Tschudi.

§. 21.

205. Cl. chondriformis Jan. †

T. conoidea, ventricosa, apice obtusa, cinereo-rufa, striata (5½‴ alta, 1‴ lata), columella bilamellari, apertura ovata. (Jan.)

Clausilia chondriformis Jan Mantissa p. 3.

Habitat in Italia meridionali.

206. Cl. cincta Brumati. †

T. corneo-fulva, transparens; sutura inferne albo-lineata; columella bilamellata. — Long. 7 lin. (Br.)

Clausilia cincta Brum. catal. Monfalc. p. 37. f. 6.

Habitat in Friaulia: La Cargna et in rupibus arcis Osopo.

Obs. «Chiocciola fusiforme, un poco panciuta, diafana, striata; spira di 9—11 giri; sutura fornita di una continuazione di papille bianche, ineguali, formanti una linea, che sembra, irregolarmente merlata; apertura ovale; orlo più chiaro della conchiglia, leggermente riflesso; ombilico discernibile».

207. Cl. corrugata (Turbo) Chemnitz. †

T. longa, alba, 14 spirarum, ore parum compresso seu contracto, corrugato, bidentato, anfractibus sinistrorsis. (Ch.)

Turbo corrugatus Chemn. IX. P. 1. p. 120. t. 112. f. 961. 962.

— — *Dillw.* descr. cat. II. p. 875. N. 144.

— *bidens γ Gmel.* p. 3609.

Bulimus corrugatus Brug. Enc. méth. I. p. 354. N. 95.

Helix corrugata (Cochlodina) *Fér.* pr. 519.

Clausilia corrugata Beck ind. p. 91. N. 33.

Habitat . . .? (In Archipelago graeco teste Beck.)

Obs. Ex icone et descriptione Chemnitziana haec species a cognomini Draparnaudiana duce Beck distinguenda videtur. Conf. Cl. Draparnaldi Beck Nr. 93.

208. Cl. corynodes Held. †

T. fusiformi-claviformis, acuminata, brunneo-nigrescens, sublaevis, toro dorsuali simplici et tubere adjacente obtusis; apertura circulato-pyriformis; perist. paulum productum reflexumque, bicanaliculatum, subfuscum, margine laterali intus 2 instructo tuberculis inter se cohaerentibus, albis; columellae lamellae 3 exiguae, dextra recondita, media maxima, rursum fissa, sinistra gracillima; faucium paries lateralis plicis carens. — Long. $3^3/_4 - 4^1/_3$, lat. 1 lin. (H.)

Clausilia corynodes Held in Isis 1836. p. 276.

Habitat in alpibus Bavariae.

209. Cl. crenulata Risso. †

T. angusta, glabra, nitida, lucida; anfr. 12 convexiusculi, transversim sulcati, sulcis super suturam crenulatis; epidermis fusco-ferrugineus; peritrema albidum, postice unidentatum, dente lamelliformi armatum. — Long. 0,012. (R.)

Clausilia crenulata Risso hist. IV. p. 86. N. 195.

Habitat prope Braus, Brovis.

210. Cl. crispa (Helix) Lowe. †

T. turrita, subventricosa; anfr. 9 convexiusculi, striis transversis creberrimis, minutissime flexuosis sculpti, interstitiis elegantissime decussatim punctulato-striatis, quasi cancellatis; sutura distincta, impressa; apertura oblonga, biplicata: plicis columellaribus, approximatis, divaricatis, subposticis, postica prominente sc. extrorsum ad marginem peristomatis producta eique continua, sinum ad angulum posticum aperturae formante; perist. simplex, acutum, subexpansum; costae dorsales rimaque umbilicalis obsoletae. — Long. 7, diam. 2 lin. (L.)

Helix Cochlodina crispa Lowe Faun. Mader. p. 65. t. 6. f. 36.

Clausilia crispa Beck ind. p. 97. N. 131.

— — *Lam.* ed. Dh. 31. p. 211.

Habitat in rupibus sylvarum Maderae.

211. Cl. Deenia Cantraine. †

T. parva, cylindraceo-fusiformis, fulva, leviter striata; anfr. 10 convexiusculi; sutura papillis albidis distantibus ornata; aper-

tura ovata, lutea; columella biplicata; labrum triplicatum. — Alt. 6½, diam. 1⅔ lin. (C.)

Clausilia Deenia Cantr. in Bull. Brux. II. p. 381.
— — *Beck* ind. p. 94. N. 91.
— — *Cantr.* Malac. méd. p. 149.

Habitat in Dalmatia.

Obs. Cl. Beck speciem synonymam habet Cl. conspurcatae; auctor ipse Cl. gibbulam et sericinam Rossm. eandem speciem esse asserit et Cl. lamellatam Zgl. ejusdem varietatem elongatam putat.

212. Cl. Deshayesii Potiez et Michaud. †

T. sinistrorsa, fusiformis, solida, sordide cornea, longitudinaliter subtilissime striata; anfr. 12—13 convexi, ultimus rugosus; sutura marginata, leviter crenulata et punctata; apertura ovoidea, superne angulosa; columella biplicata; perist. reflexum, album; apex corneus, laevigatus. — Long. 25, diam. 7 mill. (P. et M.)

Clausilia Deshayesii Pot. et *Mich.* gal. I. p. 182. t. 18. f. 15. 16.

Habitat in Sicilia.

Obs. An forte Cl. septemplicata Phil.?

213. Cl. elongata Cantraine. †

T. elongata, corneo-fulva nitida; apertura ovata, patula; anfr. 12; columella biplicata; labrum uniplicatum. — Alt. 10, diam. 2 lin. (C.)

Clausilia elongata Cantr. Bull. Brux. II. p. 381.
— — *Cantr.* Malac. médit. p. 147. *)

Habitat prope Zara Dalmatiae.

Obs. Cantraine in synonymis habet: Cl. fimbriata Rossm. f. 106 et Cl. bidens var. pallida Crist., Clausiliamque cineream Phil. eandem speciem esse putat! — Beck (p. 94.) Cl. elongatam cum dubio inter varietates Cl. ornatae Zgl. enumerat.

214. Cl. exigua (Helix) Lowe. †

T. parvula, turrita, gracilis, obtusa; anfr. 8 planiusculi, transverse creberrime striati; apertura oblique obovata, biplicata: plica antica valde interna, postica prominente, margini peristomatis producta, continua, sinumque cum labro efficiente, ambabus columellaribus, simplicibus; perist. continuum, reflexum, postice subsinuatum. — Long. 3—3½, diam. 1 lin. (L.)

Helix Cochlodina exigua Lowe Faun. Mader. p. 66. t. 6. f. 39.

*) T. fusiformi-elongata, leviter striata, nitida, pellucida, grisco-cornea, fuscescente, ad basin rugosiuscula; apertura oblonga, subauriformi, fulva, triplicata; plica parietali columellarique maximis, suturali minima; perist. continuo, reflexo, albo — Alt. 9½, diam. 2⅓ lin. Anfr. 10—11. (Cantr. l. c.)

Clausilia exigua Beck ind. p. 90. N. 3.

Habitat in insula Madera.

215. Cl. heterostropha Risso. †

T. glabra, nitida, lucida; anfr. 11 striolis angustis aequalibus sculpti; sutura mamillata; epidermis cornea; peritrema albidum, postice et ad dextram dentibus 2 lamelliformibus armatum. — Long. 0,015. (R.)

Clausilia heterostropha Risso hist. IV. p. 87. N. 197.

Habitat circa Nizza.

216. Cl. inserta Porro. †

T. parva, solida, fusiformis, brunnea, crebre strigata, fere sericina; apertura circularis; perist. continuum, fere solutum, subtile, album; plicae immersae, fere inconspicuae; anfr. 8. — Long. 13, diam. 3½ mill. (Villa.)

Clausilia inserta Porro in *Villa* disp. syst. p. 58.

Habitat in Hungaria et Italia meridionali.

217. Cl. Macluriana Risso. †

T. oblongo-ovata, nitida, glabra, lucida; anfr. 11. striis angustis, aequidistantibus, impressis sculpti; epidermis fusca; peritrema albidum, dentibus 2 lamelliformibus, uno postico, uno ad dextram armato. — Long. 0,012. (R.)

Clausilia Macluriana Risso hist. IV. p. 87. N. 198.

Habitat circa Nizza.

218. Cl. Marcella Risso. †

T. angusta, supra abrupte acuminata; anfr. 11 striolis transversis obliquis sculpti; epidermis fusco-ferruginea; peritrema albidum, postice unidentatum, dente lamelliformi armatum. — Long. 0,009. (R.)

Clausilia Marcelia Risso hist. IV. p. 86. N. 196.

Habitat circa Nizza.

219. Cl. olivacea Cantraine. †

T. ventricosa, nitida, pellucida, levis, fulva; anfr. 11 planulati; sutura papillis albis, exiguis munita; apertura elongata; columella biplicata sicut et labrum. — Alt. 8, diam. 2 lin. (C.)

Clausilia olivacea Cantr. Bull. Brux. II. p. 381.

— — *Cantr.* Malac. méd. p. 150. t. 5. f. 15. *)

*) T. fusiformi, elongata, vix striata, nitida, pellucida, corneo-fusca; cervice striata; sutura papillis albis ornata; apertura subovata, compressa, 4 plicata: pl. parietali compressissima, columellari magna tuberculo basali inferne instructa, subcolumellari conspicua, suturali minima; perist. reflexo, albo, continuo; rima umbilicali minima; anfr. 12. — Alt. 6½—8. diam. 1¾—2 lin. (Cantr. l. c.)

Clausilia olivacea Beck ind. p. 93. N. 59.

Habitat in Dalmatia (Cantr. Bull.), prope Tergestum. (Malac.)

Obs. Beck Cl. stigmaticam Rossm. synonymam habet, et figura Cantrainei huic speciei bene congruit, sed Cantraine eam defectu plicae basilaris et plica subcolumellari conspicua ab illa differre asserit.

220. Cl. sarda Villa. †

T. minutissime rimata, cylindraceo-fusiformis, fulvo-cerea, glabra, cervice subtiliter striata; sutura parum profunda; apertura ovato-pyriformis; perist. albidum, columella plicis 2 flexuosis. — Long. 14—17, diam. 4½ mill. (V.)

Clausilia sarda Villa disp. syst. p. 57.

Habitat in Sardinia centrali.

221. Cl. torquata Held. †

T. fusiformis, obtusa, fusca, pellucida, nitida, exiliter striata, toro dorsuali denudato; apertura ovata; perist. applicatum, incrassatum, album, postice margine tumido, flavo ornatum; labium columellare anfractus penultimi convexitati agglutinatum; columella trilamellata: lamella dextra gracillima, recondita, intermedia validissima, laeva interrupta; faucium paries lateralis 3—4 plicatus, plicis 2 superioribus perbrevibus; clausilium incisura circularis instructum. — Long. 5—6, lat. 1⅓ lin. (H.)

Clausilia marginata Held in Isis 1836. p. 276. Nec Rossm.

— *torquata Held* in Isis 1837. p. 309.

Habitat in Bavaria, circa Monachum.

222. Cl. tuba paradisi Ehrenberg. †

T. fusiformis, fusca, provectiore aetate albida, subtiliter transverse striata, subventricosa, primo anfractu valde rugoso; apertura biplicata; spirae apex fragilitate truncatus; anfr. superstites 6½. — Long. 8½, diam. 2¼‴. (E.)

Clausilina tuba paradisi Ehrenb. Symb. phys.

Habitat in monte Libanon.

Obs. «Affinis Cl. corrugatae.»

SPECIES,

QUARUM NONNISI NOMINA MIHI INNOTUERUNT.

Clausilia

abbreviata Rossm. Villa p. 27. German.
albiguttata Mlf. = Megerlei Beck?
approximans Zgl. (Schmidt syst. Verz. p. 20.)
Arbae Stentz. (Porro cat.)
assimilis Zgl. Anton N. 1615. Sicil.
auricularis Beck p. 90. N. 8. Sicil.
carinata Parr. Villa p. 25. Syria.
consocia Zgl. Villa p. 28. Styria.
costulata Z. Villa p. 27. Dalmat.
crenilabra Kryn.
excisilabris Stentz, Villa p. 25. (albocincta Sandri) Dalmat.
fallax Z. = notha B.
foliacea (Helix) *Fér.* 534. Gallia.
funiculata Beck p. 93. N. 72. Ital. bor.
gigas Beck p. 92. N. 37. Ind. or.?
glabrata Kryn.
gracilicosta Kryn.
gravida Kryn.
gravidula Kryn.
interlapsa (Helix) *Fér.* 532. Antill. min.
intermedia Wallt. Villa p. 27. Bavar.
javanica v. Hass. Beck p. 92. N. 36. Java.
laeviuscula Jan. Beck p. 94. N. 96. Ital. bor.?
Maugei (Hel.) *Fér.* 522. St. Thomas.
maxima Stentz. Villa p. 25. Croat.
Megerlei Beck p. 96. N. 120. (albiguttata Mlf. *Helix Meg. Fér.* Mus.) Dalmat.
Menkiana Jay catal. 1839. p. 54.
? nebulosa (Cochlodina) *Fér.* 494. Antill.
notha Beck p. 96. N. 127. (fallax Z.) Dalmat.
obliqua Mlf. Beck p. 90. N. 5. Ins. jon.
oscitans (Hel.) *Fér.* 524. Beck p. 90. N. 11. Malta.
pagodula Stentz. Villa p. 28. Tirol.
papillosa Z. Jan. cat. p. 5. Ital. merid.
planicollis Parr. Villa p. 26. Croat.
semilamellata Kryn.
sionestana Faure-Big. (Helix Fér. 518.) Beck p. 91. N. 25. Candia.
strigosa Htm. Neue Alpina I. p. 217. Helvet.
striolata Parr. Villa p. 27. Transylv.
superflua Mlf. Villa p. 28. Lombard.
Thomasiana Charp. Shuttl. p. 18.
trivia Parr. Anton N. 1664. Bucovina.
undulata Mlf. Jan cat. p. 6. Beck p. 97. N. 135. Banat.
varicolor Z. Jan. cat. p. 5. Beck p. 94. N. 81. Sicil.
variegata Z. Villa p. 28. Styria.
vicina (Hel.) *Fér.* 537. Syria.
Webbiana Charp. Shuttl. p. 18.
Ziegleriana Jay catal. 1839. p. 55.

CLAUSILIAE

DESCRIPTAE, IN EUROPA CENTRALI NON OBVIAE, SECUNDUM LOCA NATALIA ORDINATAE.

Observatae sunt:

1. in Tauria; Cl. canalifera 35, detersa 36, gracilicosta 37, acridula 38, taurica 39, brunnea 110, serrulata 197.
2. in Graecia et insulis jonicis: Cl. Grayana 24, Voithii 41, teres 45, caerulea 47, cretensis 48, virginea 49, discolor 50, Spratti 51, inflata 53, Olivieri 54, senilis 55, retusa 56, lerosiensis 57, saxatilis 58, lamellata 71, naevosa 86, Schuchii 88, contaminata 102, lactea 103, saxicola 119, grisea 148, Massenae 149, maculosa 150, hetaera 153, torticollis 164, sionestana.
3. in Turcia et Asia minore: Cl. macedonica 9, Frivaldskyana 25, Michaudiana 29, nectarina 80, strumosa 81, subulata 115, fraudigera 177, varnensis 178, fritillaria 181, socialis 182, olympica 187, thessalonica 196, macilenta 200; — Forbesiana 83, munda 87, bigibbosa 101, anatolica 166, maculata 167, circumdata 190; corpulenta 195.
4. in Caucaso: Cl. somchetica 152.
5. in Syria: Cl. Boissieri 46, torticollis 164, strangulata 174, bicarinata 175, galeata 176, maesta 194, oxystoma 198, denticulata 193, tuba paradisi 222, carinata, vicina.
6. in India orientali: Cl. loxostoma 19, insignis 67, Philippiana 68, cylindrica 82, gigas.
7. in China: Cl. pluviatilis 18, Cecillii 42, Largillierti 43, aculus 158.
8. in Cochinchina: Cl. cochinchinensis 66.
9. in Japonia: Cl. Buschii 147, Sieboldtii 168.
10. in insulis Philippinis: Cl. Cumingiana 23.
11. in insula Java: Cl. corticina 17, Junghuhni 20, cornea 21, javana 22, orientalis 44.
12. in Egypto: Cl. isabellina 173.
13. in insula Madera: Cl. deltostoma 34, crispa 210, exigua 214.
14. in America: Cl. tridens 1, epistomium 2, peruana 204; — nebulosa, interlapsa et Maugei Fér. (Cylindrellae?)

XV. Daudebardia Hartmann.

1. D. rufa (Helix) Draparnaud.

T. perforata, depressa, convexiuscula, transverse dilatata, striatula, nitidissima, cornea vel rufa; spira mediocris, sublateralis; anfr. 3 sensim accrescentes, ultimus (in adultis) elongatus, depressus, non angulatus; apertura ampla, rotundato-ovalis. — Diam. maj. 5½, min. 4, alt. 1½ mill. (Coll. Nr. 1.)

Helix rufa Drap. hist. p. 118. t. 8. f. 26—29.
— — *Fér.* essai p. 45.
— — (Helicophanta) *Fér.* pr. 2. Hist. t. 10. f. 2.
— *brevipes Sow.* Conch. Man. f. 264.
Daudebardia rufa Hartm. in Sturm Fauna VI. H. 5. p. 54. H. 8. T. 5
Helicophanta rufa C. Pfr. III. p. 13. t. 4. f. 4. 5.
— — *Rossm.* I. p. 85. f. 39.
— — *Hartm.* Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 7. t. 3.
Daudebartia rufa Beck ind. p. 5. N. 1.

Habitat passim in Germania et Helvetia. Nec in Gallia teste Michaud.

2. D. brevipes (Helix) Draparnaud.

T. perforata, depressa, subauriformis, tenuis, laevigata, transverse dilatata, nitida, diaphana, fusca vel fulva; spira minutissima, fere punctiformis, lateralis; anfr. fere 3, ultimus non angulatus; apertura amplissima, ovalis. — Diam. max. 5, alt. vix 1 mill. (Coll. Nr. 2.)

Helix brevipes Drap. hist. p. 119. t. 8. f. 30—33.
— — *Fér.* essai p. 45.
— — (Helicophanta) *Fér.* pr. 1. Hist. t. 10. f. 1
Helicophanta brevipes C. Pfr. III. p. 12. t. 4. f. 1—3?
— — *Rossm.* I. p. 85. f. 40. (nec 39.)
— — *Gray* Manual p. 9.
— — *Hartm.* Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 10. t. 4
Daudebartia brevipes Beck ind. p. 5. N. 2.

Habitat rara in Germania meridionali, Helvetia, Italia boreali.

3. **D. Langi (Helicophanta) Pfr.**

T. obtecte perforata, depressissima, nitida, fulva, intus diffuso-callosa; spira minutissima, lateralis; anfr. 2, ultimus angulato-depressus; apertura amplissima, ovali-oblonga; perist. simplicissimum, rectum, margine columellari arcuato, superne in laminam tenuem, perforationem obtegentem reflexo. — Diam. maj. 6½, min. 4, alt. 4⅓ mill. (Coll. Nr. 3.)

Helicophanta Langi Pfr. Symb. III. p. 84.

Habitat in Hungaria (Lang, Stentz).

Obs. Num huic generi forsan adnumerandae: Vitrina gigas Bens. Nr. 10, V. aperta Bëck Nr. 31, nonnullaeque aliae?

XVI. Vitrina Draparnaud.

Conspectus specierum.

A. Genuinae:
1. europaeae . . . . . §. 1. Nr. 1—9.
2. asiaticae,
α. continentales . . . . . §. 2. — 10—16.
β. insulares . . . . . §. 3. — 17—31.
3. africanae,
α. continentales . . . . . §. 4. — 32—41.
β. insulares . . . . . §. 5. — 42—46.
4. australicae . . . . . §. 6. — 47—53.
5. americanae . . . . . §. 7. — 54.
6. patriae incertae . . . . . §. 8. — 55—56.
B. Succinoideae (Simpulopsis Beck *) . . . . . §. 9. — 57—61.

---

§. 1.

1. V. pellucida (Helix) Müller.

T. convexiusculo-depressa, sublaevis, nitidissima, pellucida, beryllina; spira mediocris, prominula; sutura subcrenulata, concolor vel rufescens; anfr. 3 celeriter accrescentes, convexiusculi, ultimus subtus latus, planiusculus, medio impressus, vix membranaceo-marginatus; apertura obliqua (45°), lunato-rotundata, aeque alta ac lata; perist. subinflexum, undique regulariter arcuatum. — Diam. maj. 6, min. 4⅔, alt. 3½ mill. (Coll. Nr. 1. Spec. hass.)

Helix pellucida Müll. verm. II. p. 15. N. 215. **)

---

*) Species hujus sectionis (forsan omnes americanae?) testae characteribus intermediae sunt inter Vitrinam et Succineam; animalia nondum observata esse videntur.

**) T. imperforata, depressiuscula, nitida, subvirescente; anfract. 3. — Diam. ⅛ — 1½ lin — Testa tenerrima vitrea, pellucidissima, politissima et

Helix pellucida Dillw. descr. cat. II. p. 947. N. 134.
— — *Cuvier* règne animal II. p. 405.
— *limacoides Alten* p. 85. t. 11. f. 20.
Vitrina beryllina C. Pfr. I. p. 47. t. 3. f. 1. III. p. 55.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 4.
— *pellucida Rossm.* I. p. 74. f. 28.
— — *Charp.* catal. moll. Suisse p. 2.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 5. et M. R. C. (ined.) VIII. t. 1. f. 1.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 162. f. 1.
— *Mülleri* et *Dillwynii Jeffr.* Linn. trans. XVI. P. 2. p. 326?
Cobresia helicoides vitrea Hübner. (teste Féruss.)
Vitrinus pellucidus Montf. Conch. II. p. 239.
Hyalina pellucida Stud. Verz. p. 11.
Limacina pellucida α Hartm. in Neue Alpina I. p. 246.
Helicolimax pellucida Fér. pr. 7. Hist. t. 9. f. 6.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Suecia etc.

Obs. Conf. V. Angelicae Beck Nr. 54.

2. V. annularis (Hyalina) Studer.

T. depresso-globosa, tenuis, sublaevigata, pellucida, nitida, virenti-hyalina; spira prominula, obtusa; anfr. 3 sensim accrescentes, ultimus rotundatus, basi latus; apertura vix obliqua, ovali-rotundata; perist. simplex, margine columellari brevi, subverticali. — Diam. maj. 4, min. 3, alt. 2¾ mill. (Coll. Nr. 2.)

Hyalina annularis Stud. Verz. p. 11.
Limacina annularis Hartm. in Neue Alpina I. p. 246.
Helicolimax annularis Fér. pr. 8. Hist. t. 9. f. 7.
Vitrina annularis Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 409.
— — *Charp.* cat. moll. Suisse p. 2.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 7.
— *subglobosa Mich.* compl. p. 10. t. 15. f. 18—20.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 50.

Habitat in alpibus Helvetiae et Galliae; in Lusitania (Morelet).

Obs. Species praecedenti multo affinior quam sequens, quae melioribus notis a V. pellucida distinguitur.

3. V. Draparnaldi (Helix) Cuvier.

T. depressa, tenuis, laevigata, nitidissima, pellucida, hyalino- vel lutescenti-virens; spira brevissima, apice vix prominula; sutura vix impressa, filo-marginata; anfr. 3½ celeriter accrescentes,

perquam fragilis; animalculo foeta flaveola, vacua albido-virens apparet; utrinque convexa absque striis vel foramine umbilicali. Anfractus supra vix tres, subtus unicus. Apertura lunata, repanda. — In Jungermannia platophylla sub finem Augusti, in fimo equino plures Octobri, et in virgultis medio Decembri reperi. (Müll. l. c.)

ultimus depressus, antrorsum elongatus, basi latiusculus, subplanus, vix membranaceo-marginatus; apertura perobliqua, transverse lunaris, latior quam alta; perist. tenue, margine columellari brevi, basali strictiusculo. — Diam. maj. 8, min. 6⅓, alt. 3¾ mill. (Coll. Nr. 3.)

Helix Draparnaldi Cuvier règne anim. II. p. 405.
— *diaphana Poir.* coq. fluv. et terr. p. 77.
— *elliptica Brown* in Wern. trans. II. p. 523. t. 24. f. 8?
Vitrina pellucida Drap. tabl. d. moll. p. 98. N. 1. Nec Müll.
— — *Drap.* hist. p. 119. t. 8. f. 34—37.
— — *Brard* p. 78. t. 3. f. 3—6.
— — *Lam.* VI. 2. N. 1. p. 53. ed. Dh. VII. p. 728
— — *Guérin* Iconogr. Moll. t. 5. f. 3.
— — *Desh.* in Encycl. méth. III. p. 1133. N. 1.
— — *Gray* Manual p. 120. t. 3. f. 21.
— *diaphana* et *depressa Jeffr.* Linn. Trans. XVI. P. 2. p. 326?
— *Draparnaldi Leach* moll. p. 80.
— *major C. Pfr.* I. p. 47. not.
— *Audebardi C. Pfr.* III. p. 55.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 3.
Limacina pellucida β Hartm. in Neue Alpina I. p. 246.
Helicolimax major Fér. essai p. 43.
— *Audebardi Fér.* pr. 6. Hist. t. 9. f. 5.
— *pellucida Blainv.* in Dict. sc. nat. tom. 32. p. 255.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 263.

Habitat in Gallia et Britannia. (Specimina germanica nunquam vidi.)

4. V. diaphana Draparnaud.

T. depressa, tenuis, laevigata, nitida, diaphana, virenti-hyalina; spira minuta, planiuscula; anfr. 2½ rapide accrescentes, subplani, ultimus dilatatus, depressus, subtus angustissimus, in marginem membranaceum, deciduum dilatatus; apertura fere horizontalis, amplissima, auriformis, margine columellari perarcuato. — Diam. maj. 6½, min. 4½, alt. 3 mill. (Coll. Nr. 4.)

Vitrina diaphana Drap. hist. p. 120. t. 8. f. 38. 39.
— — *C. Pfr.* I. p. 48. t. 3. f. 2. III. p. 55.
— — *Rossm.* I. p. 73. f. 27.
— — *Charp.* catal. moll. Suisse p. 2.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 2.
— — *Lam.* ed. Dh. VII. p. 728. N. 2.
— *pellucida Voith* in Sturm Fauna VI. H. 3. T. 16.
— — *Blainv.* Malac. p. 462. t. 41. f. 1.
Cobresia limacoides patera Hübner. (Féruss.)
Hyalina vitrea Studer Verz. p. 11.
Limacina vitrea α Hartm. in Neue Alpina I. p. 246.

Helix limacina Alten p. 81. t. 10. f. 19.
— *virescens Studer* in Coxe travels.
— *palliata Hartm.* in Alpina II.
Helicolimax vitrea Fér. pr. 5. Hist. t. 9. f. 4.
β. Pallidior:
Vitrina albina Ziegler olim.
Habitat passim in Germania, Helvetia, Gallia.

5. V. pyrenaica (Helicolimax) Férussac.

T. depressa, ovalis, nitida, hyalino-virens; anfr. 2½ rapide accrescentes, ultimus depressus, basi angustus, membrana angustissima cinctus; apertura horizontalis, fere regulariter ovalis, intus tenuissime callosa, marginibus approximatis, supero medio dilatato, subinflexo, columellari leviter arcuato. — Diam. maj. 6, min. 4, alt. 2⅓ mill. (Coll. Nr. 5.)

Helicolimax pyrenaica Fér. pr. 4. Hist. t. 9. f. 3.
Vitrina pyrenaica Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 409.
Habitat in Pyrenaeis, in valle Ossau, prope «Pic du Midi».

Obs. Intermedia inter V. diaphanam et elongatam.

6. V. elongata Draparnaud.

T. depressissima, auriformis, tenuissima, laevigata, nitida, lutescenti-hyalina; spira punctiformis, haud prominula; anfr. vix 2, ultimus antrorsum elongatus, basi linearis, in marginem membranaceum latiusculum dilatatus; apertura fere horizontalis, oblongo-ovalis, marginibus approximatis, supero repando. — Diam. maj. 4⅓, min. 3, alt. 1⅓ mill. (Coll. Nr. 6.)

Vitrina elongata Drap. hist. p. 120. t. 8. f. 40—42.
— — *C. Pfr.* I. p. 48. t. 3. f. 3. III. p. 55.
— — *Rossm.* I. p. 73. f. 26.
— — *Beck* ind. p. 1. N. 1.
— — *Lam.* ed. Dh. VII. p. 729. N. 3.
Helix Semilimax Féruss. pat. in Naturforscher 1802. St. XIX. T. 1. f. A. D.
Testacella Germaniae Oken Lehrb. d. Naturg. III. p. 312.
Hyalina elongata Stud. Verz. p. 11.
Limacina vitrea β Hartm. in Neue Alpina I. p. 246.
— *elongata Hartm.* in Sturm Fauna VI. H. 5. p. 54.
Helicolimax elongata Fér. pr. 1. Hist. t. 9. f. 1.
β. Minor, minus adulta:
Helicolimax brevis Fér. pr. 2. Hist. t. 9. f. 2.
Vitrina brevis Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 408.
Habitat rarior in Germania et Gallia. (Frequentem in Carinthia legi prope Klagenfurt.) In Helvetia repertam esse negat Charpentier.

7. V. glacialis Forbes. †

T. hyalina, supra planata, anfractibus 2; apertura patentissima, ovato-oblonga. — Long. 1/5, lat. 1/8". (F.)

Vitrina glacialis Forb. in Jard. Ann. 1837.
— — *Wiegm.* Arch. 1838. II. p. 273.

Habitat in Helvetia.

Obs. «Affinis V. elongatae».

8. V. Musignani Mandralisca. †

T. subglobosa, pellucida, hyalina, longitudinaliter tenue et eleganter striata; anfr. 3, ultimus major, subcarinatus; apertura rotundata; spira exsertiuscula. (M.) — Dimens.?

Vitrina Musignani Mandral. in Giorn. lett. N. 230.
— — *Arad.* e *Magg.* cat. rag. p. 113.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 216.

Habitat in Sicilia. In sylvis Caronie detexit Cl. baro Pirajno de Mandralisca.

9. V. Maravignae Mandralisca. †

T. depressa, convexiuscula, ovalis, corneo-virens, tenuis, nitida, subpellucida, umbilicata, longitudinaliter striata; anfr. 2½, ultimus maxime protractus; apertura amplissima, valde obliqua, subovata. — Long. 2¼, lat. 1¾ lin. (M.)

Vitrina Maravignae Mandral. moll. madon. p. 11.
— — *Piria* e *Scacchi* Antol. I. 1841. p. 124.
— — *Arad.* e *Magg.* catal. rag. p. 114.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 216.

Habitat in montibus Nebrodibus Siciliae.

§. 2.

10. V. gigas Benson.

T. solidiuscula, depressa, arcuatim striata, lineis spiralibus obsoletissime et irregulariter decussata, olivaceo-cornea; spira minuta, plana; sutura impressa; anfr. 2½ velociter accrescentes, ultimus superne subdepressus, peripheria rotundatus, basi angustus; apertura perobliqua, magna, transverse regulariter oblonga, intus subcallosa, marginibus fere contiguis, supero et infero strictiusculis, columellari leviter arcuato. — Diam. maj. 30, min. 18, alt. 13 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina gigas Benson in Journ. As. Soc. V. p. 350. *)

Habitat in Bengalia (Benson, Westermann).

*) T. tenui, corneo-virente, ovato-depressa, auriformi, velociter crescente, supra planata, rugis concentricis et striis radiatis decussata, subtus tumida;

11. V. monticola Benson.

T. depressa, tenuis, striatula, nitida, pellucida, lutescenti-cornea; spira plana, medio vix prominula; sutura leviter impressa; anfr. 4 celeriter accrescentes, planiusculi, ultimus depressus, non descendens; apertura obliqua, rotundato-lunaris; perist. simplex, marginibus conniventibus, callo tenuissimo junctis, supero antrorsum arcuato-dilatato, columellari cum basali angulum obtusum formante. — Diam. maj. 18, min. 14, alt. 7½ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina monticola Benson mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Bengalia, Landour, Himalaya, Almorah.

12. V. cassida Hutton. †

T. ovato-depressa, pallide cornea, radiatim striolata, junioris epidermide sericea, aetate nitore orbata; anfr. 5 velociter crescentes (penultimus etiam intra aperturam) ventricosiores; apertura patula, rotundato-ovata; spira convexa, apice exsertiuscula, minime obtusata. — Diam. maj. 1‴, 2‴. (H.)

Helicarion cassida Hutt. in Journ. Asiat. Soc. VII. p. 214.

Vitrina cassida Pfr. Symb. III. p. 45.

Habitat ad Simla Himalayae.

13. V. praestans Gould.

T. depresso-semiglobosa, tenuis, striatula, lineis subdistantibus spiralibus subdecussata, vix nitida, pallide cornea; spira non prominens; sutura levissime impressa; anfr. 3, rapide accrescentes, ultimus superne convexus, peripheria subdepressus, basi latiusculus; apertura perobliqua, subtriangulari-semiovalis; perist. simplex, subinflexum, marginibus approximatis, columellari recedente, perarcuato. — Diam. maj. 20, min. 16, alt. vix 10 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina praestans Gould in Bost. journ. IV. 4. p. 456. t. 24. f. 2. *)

Habitat in provincia Tavoy imperii Birmanorum.

14. V. Bensoni Pfr.

T. depressiuscula, tenuis, striatula, nitida, pellucida, pallide cornea; spira vix elevata, obtusa; sutura impressa, submarginata;

---

anfr. 2 excluso apice; ultimo anfractu valde ventricoso, pene totam testam efformante; apertura transversa, rotundato-ovata, praegrandi; labio valde arcuato. — Diam 1. 15 poll. (Bens. l. c.)

*) T. depressa, fragili, nitida, straminea; anfr. 3, striis incrementi et striis volventibus reticulatis; apertura subcoarctata. — Long. ⅘‴, alt. ⅖‴. (Gould l. c.)

anfr. 3½ convexiusculi, ultimus subdepressus, peripheria rotundatus, basi latus; apertura obliqua, lunato-subcircularis; perist. simplex, subinflexum, marginibus conniventibus, supero antrorsum subdilatato, columellari recedente, perarcuato. — Diam. maj. 12, min. 9½, alt. vix 6 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Bensoni Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in India orientali; in horto botanico Calcuttensi legit Benson.

15. V. birmanica Philippi.

T. depressa, transverse ovata, tenuissima, glaberrima, nitida, luteo-virens; spira vix elevata; anfr. 4 celeriter accrescentes, vix convexiusculi, sutura impressa disjuncti, ultimus basi subplanulatus; apertura perobliqua, late lunato-ovalis; perist. acutum, margine dextro antrorsum arcuato. — Diam. maj. 9⅓, min. 7¾, alt. 4⅔ mill. (Coll. Philippi.)

Vitrina birmanica Phil. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 65.

Habitat prope Mergui imperii Birmanorum. Legit Dr. Th. Philippi.

16. V. Gruneri Pfr.

T. globoso-depressa, glaberrima, parum nitens, olivaceo-cornea; spira vix elevata; sutura albo-marginata; anfr. 3½ convexiusculi, ultimus subdepressus; apertura perobliqua, lunato-ovalis; perist. simplex, marginibus conniventibus, columellari arcuato, subinflexo. — Diam. maj. 8, min. 6, alt. vix 5 mill. (Coll. Nr. 7.)

Vitrina Gruneri Pfr. Symb. III. p. 84.

Habitat in Arabia (Gruner).

§. 3.

17. V. Cumingi Beck.

T. depresso-globosa, tenuissima, subtiliter striata, nitida, albido-cornea; spira brevissima, obtusa; sutura levis, linea impressa marginata; anfr. 4 vix convexiusculi, ultimus inflatus, subdepressus, medio linea rufa cingulatus; apertura parum obliqua, lunato-rotundata; perist. simplex, marginibus remotis, columellari subverticali, leviter arcuato, superne reflexiusculo, perforationem punctiformem simulante, supero antrorsum vix arcuato. — Diam. maj. 20, min. 17, alt. 12 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Cumingi Beck mss.

— — — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Bohol Philippinarum (Cuming).

Obs. Similis V. corneae Nr. 38, spira multo depressiore, sutura marginata etc. diversa.

18. V. bicolor Beck.

T. subglobosa, tenuis, sublaevigata, nitidissima, carneo-albida; spira brevis, convexa, obtusa; sutura impressa; anfr. 3½ rapide accrescentes, ultimus inflatus, antice hyalinus, basi angustiusculus, membranaceo-marginatus; apertura vix obliqua, lunato-rotundata; perist. tenuissimum, margine dextro regulariter rotundato, columellari recedente, perarcuato. — Diam. maj. 18, min. 14, alt. 10 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina bicolor Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Guimaras Philippinarum (Cuming).

Obs. Corpus animalis album, apice nigrum (Cuming).

19. V. guimarasensis Pfr.

T. depresso-semiglobosa, tenuis, striatula, subdiaphana, virenti-carnea; spira parvula, parum elevata; sutura marginata; anfr. vix 4 subplani, rapidissime accrescentes, ultimus inflatus, subdepressus; apertura obliqua, lunato-subcircularis, aeque alta ac lata, intus submargaritacea; perist. tenuissimum, margine dextro regulariter arcuato, columellari recedente, perarcuato. — Diam. maj. 15, min. 11½, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina guimarasensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Guimaras Philippinarum (Cuming).

20. V. Beckiana Pfr.

T. depresso-globosa, circuitu ovalis, tenuissima, striatula, pellucida, nitida, pallidissime rubello-cornea; spira mediocris, brevis, obtusa; anfr. fere 4 vix convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus subdepressus, basi latus; apertura parum obliqua, lunato-rotundata, latior quam alta; perist. simplex, marginibus remotis, supero regulariter arcuato, columellari superne reflexiusculo, basi recedente, perarcuato. — Diam. maj. 16, min. 13, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Beckiana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

— *peraffinis Beck* in sched.

Habitat in insulis Philippinis: Negros, Siquijor, Guimaras (Cuming).

Obs. Variat magnitudine. A praecedente praecipue differt anfractibus minus rapide accrescentibus et aperturae forma.

21. V. politissima Beck.

T. globoso-depressa, solidula, laevigata, politissima, diaphana, cornea, saturatius radiata; spira mediocris, convexa; sutura impressa, submarginata; anfr. 4 convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus depresso-rotundatus, basi latus; apertura

obliqua, lunato-rotundata, aeque alta ac lata; perist. simplex, margine supero antrorsum arcuato, columellari leviter arcuato. — Diam. maj. 14, min. 11, alt. 7½ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina politissima Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Zebu Philippinarum (Cuming).

Obs. Animal omnino nigrum teste Cuming. — Differt a praecedente structura testae, sutura planiore, forma aperturae et columellae etc.

22. V. leytensis Beck.

T. depressa, circuitu ovalis, tenuissima, laevigata, nitidissima, lutescenti-carnea; spira planiuscula, vix elevata; sutura leviter impressa; anfr. 3 rapide accrescentes, ultimus superne subplanus, basi convexior, latiusculus; apertura parum obliqua, rotundato-lunaris, latior quam alta; perist. tenuissimum, margine supero parum arcuato, columellari superne reflexiusculo, basi cum inferiore angulum obtusum formante. — Diam. maj. 13, min. 10½, alt. 7 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina leytensis Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

β. Paulo major, subopaca, lutescenti-albida.

Habitat in insulis Philippinis: Leyte, var. *β* Siquijor (Cuming).

23. V. margarita Beck.

T. depresso-globosa, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, carneo-hyalina; spira parvula, planiuscula; sutura linearis; anfr. 3½ subplani, rapide accrescentes, ultimus magnus, inflatus; apertura obliqua, lunato-subcircularis; perist. tenuissimum, margine supero antrorsum dilatato, columellari leviter arcuato. — Diam. maj. 14, min. 11, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina margarita Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

β. Minor, an junior? Diam. maj. 9, min. 7½ mill.

Habitat in insulis Philippinis: Guimaras, *β* Leyte (Cuming).

24. V. gutta Pfr.

T. depresso-globosa, tenuissima, glaberrima, nitidissima, hyalina; spira vix elevatiuscula; sutura linearis, anguste marginata; anfr. 3½ planiusculi, rapide accrescentes, ultimus magnus, depresso-rotundatus, basi latiusculus; apertura parum obliqua, lunato-circularis; perist. simplex, undique regulariter arcuatum, margine columellari intrante, superne reflexiusculo. — Diam. maj. 11, min. 8½, alt. 6 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina gutta Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Vitrina subclathrata Beck in sched.

Habitat prope Sorsogon insulae Luzon (Cuming).

Obs. Similis speciminibus minoribus praecedentis, anfractuum numero et aperturae forma statim distinguenda.

25. V. rufescens Pfr.

T. depresso-globosa, tenuissima, plicatula, nitida, pellucida, rufescens; spira breviter conoidea, obtusiuscula; sutura impressa; anfr. fere 4 convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus ventrosus; apertura vix obliqua, lunato-subcircularis; perist. tenue, subinflexum, marginibus remotis, supero regulariter, columellari leviter arcuato. — Diam. maj. 13, min. 10, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina rufescens Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Mindoro (Cuming).

26. V. smaragdulus Beck.

T. depressiuscula, tenuis, vix striatula, non nitens, diaphana, aureo-virens; spira parvula, planiuscula; sutura leviter impressa, angustissime marginata; anfr. 3½ planiusculi, rapide accrescentes, ultimus utrinque subplanulatus, basi latus; apertura parum obliqua, rotundato-lunaris, latior quam alta; perist. tenue, subinflexum, margine supero antrorsum dilatato, columellari vix recedente, leviter arcuato. — Diam. maj. 12, min. 9½, alt. 7 mill (Mus. Cuming.)

Vitrina smaragdulus Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insula Negros Philippinarum (Cuming).

27. V. crenularis Beck.

T. depressa, tenuissima, glabra, nitida, pellucida, aurea; spira plana; sutura leviter impressa; anfr. 3½ planiusculi, juxta suturam plicato-crenulati, rapide accrescentes, ultimus depressus, basi latus; apertura obliqua, rotundato-lunaris, latior quam alta; perist. tenue, subinflexum, margine supero antrorsum dilatato, columellari leviter arcuato, basali strictiusculo. — Diam. maj. 13, min. 10, alt. 7 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina crenularis Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

β. Paulo major, crenulis minus distinctis.

Habitat in insulis Philippinis: Negros, *β* Zebu (Cuming).

Obs. Animal var. *β* omnino luteum esse notavit H. Cuming

28. V. resiliens Beck.

T. depressa, tenuissima, subtilissime et confertim pliculata, nitida, pellucida, virenti-straminea; spira planiuscula; sutura

leviter impressa; anfr. 3½ subplani, ultimus latus, depressus, basi fere omnino membranaceus; apertura obliqua, lunato-ovalis; perist. simplicissimum, margine columellari statim procedente, leviter arcuato. — Diam. maj. 11, min. 8½, alt. 6½ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina resiliens Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat prope Sibonga insulae Zebu (Cuming).

Obs. Animal album, apice nigrum teste H. Cuming. — Haec species formis intermediis cum V. crenulari juncta videtur.

29. V. papillata Pfr.

T. depressa, tenuis, laeviuscula, nitida, pellucida, pallide carnea; spira planiuscula, medio papillata; sutura profunde impressa, marginata; anfr. 3½ convexiusculi, prope suturam striatuli, ultimus depressus, lineis obsoletis spiralibus interdum sculptus, peripheria rotundatus, basi latiusculus; apertura perobliqua, ampla, rotundato-lunaris, latior quam alta; perist. tenue, margine supero antrorsum dilatato, columellari recedente, perarcuato. — Diam. maj. 10, min. 8, alt. 5 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina papillata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat ad Calauang insulae Luzon (Cuming).

Obs. Habitus fere V. diaphanae Drap.

30. V. planulata Pfr.

T. depressissima, subdiscoidea, laeviuscula, nitida, carnea; spira planiuscula; sutura impressa; anfr. 3 vix convexiusculi, rapidissime accrescentes, ultimus depressus, basi angustus; apertura amplissima, perobliqua, lunaris, transverse dilatata; perist. tenue, margine supero antrorsum dilatato, columellari valde recedente, arcuato. — Diam. maj. 11, min. 8, alt. 4½ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina planulata Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

— *depressa Beck* mss. nec Jeffr.

Habitat ad Calauang insulae Luzon (Cuming).

Obs. Differt a praecedente forma depressiore, spira non papillata, anfractu ultimo basi angustiore etc.

31. V. aperta Beck.

T. depressissima, superne convexiuscula, basi aperta, laevigata, subopaca, virenti-albida; spira minuta, lateralis; sutura levis; anfr. 2½ convexiusculi, basi angustissimi, aperti, ultimus permagnus, plane fornicatus; apertura horizontalis, auriformis.

usque in verticem aperta; perist. simplicissimum. — Diam. maj. 11, min. 8, alt. 3 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina aperta Beck mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat ad S. Juan insulae Luzon (Cuming).

Obs. *Vitrina ceylanica Beck* ind. p. 2. N. 12 et M. R. C. VIII. t. 1. f. 3 ined. (ex insula Ceylon) nondum descripta est.

§. 4.

32. V. hians Rüppell.

T. depresso-globosa, tenuis, striatula, pellucida, nitidula, pallide cornea, strigis saturatioribus radiata; spira parvula, conoideo-convexa; sutura impressa, marginata; anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus rotundatus, basi latiusculus; apertura obliqua, lunato-subcircularis; perist. simplex, marginibus convergentibus, columellari subrecedente, leviter arcuato. — Diam. maj. 24, min. 16, alt. 12 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina hians Rüpp. mss.

— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Abyssinia.

33. V. Sowerbyana Pfr.

T. depressa, subauriformis, arcuatim plicatula, tenuissima, nitida, pellucida, brunneo-fulva; spira vix emersa; sutura profunde impressa; anfr. 3, primi convexiusculi, ultimus depressus, peripheria angulatus, basi convexior; apertura ampla, perobliqua, lunato-ovalis, marginibus conniventibus, supero vix dilatato, columellari perarcuato, anguste membranaceo-marginato; margo internus anfractuum inconspicuus. — Diam. maj. 22, min. 15, alt. 11 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Sowerbyana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Africa occidentali.

34. V. Rüppelliana Pfr.

T. subsemiglobosa, tenuis, arcuato-striata, pellucida, parum nitida, fulva; spira brevis, obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 3 convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus ventrosus, basi latiusculus; apertura obliqua, lunato-rotundata; perist. simplex, margine supero fere angulatim antrorsum dilatato, columellari substricte recedente, basi leviter arcuato; margo internus anfractuum inconspicuus. — Diam. maj. 18, min. 13½, alt. 10 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Rüppelliana Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in Abyssinia.

Obs. Haud absimilis V. praestanti Gould Nr. 13.

35. V. grandis Beck.

T. depressa, tenuiuscula, radiatim subtiliter plicatula, diaphana, non nitens, albido-straminea; spira brevissima, vix emersa, subpapillata; sutura impressa; anfr. 3½ rapide accrescentes, subplanati, ultimus depressus, peripheria obsolete angulatus, basi latus, striatulus, nitidus; apertura parum obliqua, lata, lunaris; perist. simplex, margine supero antrorsum subdilatato, columellari subverticaliter descendente, arcuatim in basalem abiente. — Diam. maj. 18, min. 13, alt. 8 mill. (Coll. Nr. 8.)

Vitrina grandis Beck ind. p. 2. N. 14.
— — *Beck* M. R. C. VIII. t. 1. f. 15. ined.
— — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.
Helicophanta formosa Jonas olim in litt.

Habitat in provincia Senegalensi.

36. V. sigaretina Recluz.

T. auriformi, depressa, tenuis, striis arcuatis subradiata, nitida, pellucida, luteo-virescens; spira planiuscula, subpapillata; sutura leviter impressa; anfr. vix 3, rapide accrescentes, ultimus depressus, basi membranaceo-marginatus; apertura ampla, perobliqua, lunato-rotundata, transverse dilatata; perist. simplex, margine supero antrorsum arcuato, columellari recedente, arcuato. — Diam. maj. 16, min. 11½, alt. 7 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina sigaretina Recluz in Revue zool. 1841. p. 70.
— — *Recluz* in Guér. mag. 1842. t. 59. *)

Habitat in interiore Africae: Sediou in ripis fluvii Casamans (Recl.).

Obs. Margo anfractuum internus liber perforationem simulat usque in verticem spirae. Hoc signo statim distingui potest a V. monticola Nr. 11, caeterum persimili.

37. V. Poeppigii Menke.

T. globulosa, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, lutescenti-cornea, linea 1 rufa supra peripheriam cincta; spira brevissima, obtusa; sutura submarginata; anfr. 4 convexiusculi, ultimus inflatus; apertura rotundato-lunaris, margine dextro subrepando, columellari leviter arcuato, subverticaliter descendente. — Diam. maj. 10½, min. 9, alt. 7 mill. (Coll. Nr. 9.)

Vitrina Poeppigii Menke in Pfr. Symb. III. p. 81.

Habitat ad portum Natal.

---

*) T. auriformi, convexo-depressa, supra planulata, longitudinaliter striis tenuissimis remotis impressa, pellucida, luteo-viridescente; anfr. 3, linea plana discretis; spira retusissima, radiatim tenuiplicata; apertura maxima; labio interiore excavato, acuto, spiram internam ostendente. — Long. 18, diam. 13½, alt. 8 mill. — Differt a V. Lamarckii Fér. t. 9. f. 9 spira plana, radiatim plicata margine externo magis excavato, acuto. (Recl. l. c.)

38. V. cornea Pfr.

T. globoso-depressa, tenuissima, striatula, pellucida, pallide cornea; spira brevis, obtusa; anfr. 4 vix convexi, ultimus multo latior, subdepressus; apertura obliqua, ampla, lunaris; perist. simplex, rectum, margine dextro antrorsum arcuato, columellari declivi, leviter arcuato, superne brevissime reflexo-appresso. — Diam. maj. 16, min. 13, alt. 9 mill. (Coll. Nr. 10.)

Vitrina cornea Pfr. Symb. III. p. 81.

β. Linea 1 peripherica pallide fusca.

Habitat ad portum Natal (Menke).

39. V. natalensis Krauss.

T. depresso-globosa, tenuis, laevigata, pellucida, olivaceo-cornea, linea 1 rufa supra peripheriam interdum ornata; spira parum elevata, obtusiuscula; anfr. $4\frac{1}{2}$—5 celeriter accrescentes, vix convexiusculi, ultimus subdepressus, subtus medio excavatus; columella subarcuata, superne albo-callosa; apertura obliqua, magna, lunato-ovalis; perist. simplex, margine dextro antrorsum subdilatato, subinflexo. — Diam. maj. 19, min. 16, alt. 12 mill. (Coll. Krauss.)

Vitrina natalensis Krauss südafr. Moll. p. 74. t. 4. f. 17.

Habitat ad portum Natal.

40. Vitrina pellicula (Helicolimax) Férussac.

T. depresso-globosa, tenuis, diaphana, lutescenti-albida; spira breviter prominula; sutura rufo-marginata; anfr. $3\frac{1}{2}$—4 sensim accrescentes, ultimus inflatus; apertura lunato-rotundata. — Diam. maj. 13, min. 10, alt. 9 mill. ex ic. (Coll. Nr. 11?)

Helicolimax pellicula Fér. pr. 9. p. 21. Hist. t. 9 A. f. 5—7.

Vitrina pellicula Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 409.

— — *Pfr.* Symb. II. p. 17? *)

Helix fuscescens Wood ind. t. 34. f. 133?

Microcystis pellicula Beck ind. p. 2. N. 1?

Habitat in promontorio Bonae Spei (Delalande, Férussac).

41. V. abyssinica Rüppell.

T. depresso-ovata, sublaevigata, diaphana, vix nitidula, sordide virenti-cornea; spira brevis, convexiuscula; sutura leviter impressa; anfr. $2\frac{1}{2}$ convexiusculi, celeriter accrescentes, ultimus peripheria rotundatus, basi latiusculus; apertura obliqua, rotun-

*) T. imperforata, depresso-globosa, tenuissima, pellucida, epidermide virenti-cornea induta; spira vix elata; anfr. $3\frac{1}{2}$ rapide crescentibus; apertura magna, lunato-elliptica; perist. simplice. — Diam. long. 16, transv. 12, alt. 10 mill. (Pfr. l. c.)

dato-lunaris, transverse dilatata; perist. simplex, margine supero subrepando, columellari recedente, arcuato. — Diam. maj. 10, min. 7, alt. 5½ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina abyssinica Rüppell mss.
— — — *Pfr.* in Proc. Zool. Soc. 1848.
— *habyssinica Beck* ind. p. 1. N. 9.

Habitat in Abyssinia (Rüppell).

Obs. Nonne forsan ad hanc sectionem referenda: *Helix caffra Fér.* (Pfr. Monogr. I. p. 40.)?

§. 5.

42. V. Lamarckii (Helicolimax) Férussac.

T. depressa, ovalis, laevigata, tenuis, nitida, virenti-cornea; spira planiuscula; anfr. 2½ rapide accrescentes, margine interno libero; apertura ampla, subhorizontalis, auriformis; perist. simplex, margine supero antrorsum arcuato-dilatato, columellari late membranaceo-marginato. — Diam. maj. 15, min. 10, alt. 5½ mill. (Mus. Cuming.)

Helicolimax Lamarckii Fér. pr. 5. p. 21. Hist. t. 9. f. 9.
— — *Lowe* in Zool. Journ. IV. p. 338. t. suppl. 38.
Vitrina Lamarckii Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 409.
— — *Lowe* Faun. Mader. p. 40. t. 5. f. 1.
— — *Webb* et *Berth.* syn. p. 311. *)
— — *Orb.* canar. p. 53.
— — *Beck* ind. p. 2. N. 13.
— *Teneriffae Quoy* et *Gaim.* Astrol. II. p. 142. t. 13. f. 4—9. **)
— — *Lam.* ed. Dh. VII. p. 729. N. 4.
— *Cuvieri Sow.* gen. f. 2. (teste Lowe.)

Habitat in insulis Canariis, Teneriffa (W. et B.), Madera (Lowe).

43. V. fasciolata (Helicolimax) Férussac. †

T. depressa, transverse oblonga, tenuis, virescens, rufo-bicingulata; anfr. 3 rapide accrescentes; apertura lunato-ovalis; perist. acutum, margine columellari regulariter arcuato. — Diam. maj. 16, min. 10 mill. (ex ic.)

Helicolimax fasciolata Fér. pr. 10. p. 21. Hist. t. 9 B. f. 1.

Habitat in insula Teneriffa.

---

*) T. depressa, tenuissima, hyalina, nitida; apertura suborbiculari-ovata; anfr. 2. (W. et B. l. c.)

**) T. fragilissima, ovali, planiuscula, pellucida, virescente; anfr. 3; apertura maxime aperta, elliptica, margine sinistro valde inflexo; spira brevi. — Diam. maj. 7, min. 5 lin. (Quoy l. c.)

44. V. marcida Gould. †

T. sigaretiformis, tenuis, subopaca, flavo-viridis, depresso-orbicularis, tenuiter striata, subperforata; spirae anfr. ad 3, convexiusculi, ultimus amplus, declivis; apex subcentralis; sutura bene impressa; apertura transversa, elliptica; labrum plerumque membranaceum. — Diam. $^{22}/_{40}$, alt. $^{7}/_{40}$ poll. (G.)

Vitrina marcida Gould 1846. Exped. shells p. 26.

Habitat in insula Madera: Roche de Empeña, 4200′ supra mare.

Obs. «Differt a V. Lamarckii anfractuum numero majore et animale.»

45. V. Ruivensis Couthouy. †

T. haliotiformis, transverse subquadrata, depressa, papyracea, pellucida, nitida, chlorata, gradibus aetatis striata; spira vix conspicua, anfractu 1 rapide crescente; apex lateralis; apertura faciem inferiorem adaequans; labrum prope spiram membranaceum; columella laxe intro spiram volvens et eam penitus exhibens. — Lat. $^{25}/_{40}$, alt. $^{1}/_{40}$ poll. (G.)

Vitrina Ruivensis Couth. mss. *Gould* 1846. Exped. shells p. 26.

Habitat in insula Madera, prope cacumen montis Pico de Ruivo, 6210 ped. supra mare.

46. V. nitida Gould. †

T. depresso-globosa, heliciformis, tenuissima, pellucida, nitidissima, laevigata, succineo-viridis, imperforata; spirae anfr. 4 convexi, ultimus amplus; apex subcentralis, prominens; sutura excavata; apertura transversa, subcircularis; perist. inflexum; columella arcuata, usque ad apicem perspicua. — Diam. $^{19}/_{40}$, alt. $^{5}/_{40}$ poll. (G.)

Vitrina nitida Gould 1846. Exped. shells p. 26.

Habitat in insula Madera: Roche de Empeña, 4240′ supra mare.

§. 6.

47. V. Cuvieri (Helixarion) Férussac.

T. heliciformis, subglobosa, depressa, argute striata, virescente fuscescens; anfr....?, ultimus amplissimus, rotundatus; apertura subrotundo-lunata, latere interiore simplici?; columella vix spiralis. — Long. 5½, lat. 4¼, axis 3¼ lin. (Fér.)

Helixarion Cuvieri Fér. pr. p. 20. Hist. t. 9. f. 8. t. 9 A. f. 1. 2.
— — *Blainv.* in Dict. sc. nat. tom. 20. p. 482.
Vitrina Cuvieri Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 408.
— — *Sow.* gen. N. 11?
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 162. f. 2?
— *Australasiae Blainv.?*

Helicarion Cuvieri Beck ind. p. 2. N. 1.

Habitat in Australia?

Obs. Num eadem species V. Cuvieri Mus. Cuming.? sic describenda: t. depressa, solidula, subtiliter striata, diaphana, nitidula, virenti-fulva; spira planiuscula; sutura vix impressa, marginata; anfr. fere 4 vix convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus depresso-rotundatus, basi latiusculus, anguste membranacco-marginatus; apertura parum obliqua, rotundato-lunaris, latior quam alta, intus margaritacea; perist. simplex, margine supero subrepando, columellari breviter recedente, arcuato. — Diam. maj. 16, min. 12, alt. 7½ mill.

48. V. Freycineti (Helicarion) Férussac.

T. depressa, tenuiuscula, laevigata, nitida, opaca, pallide fulva; spira vix convexiuscula; sutura linearis; anfr. 3 rapide accrescentes, summi planiusculi, ultimus depresso-rotundatus, basi latiusculus; apertura parum obliqua, transverse lunari-oblonga; perist. simplex, undique anguste membranaceo-marginatum, margine supero antrorsum vix dilatato, columellari non recedente, leviter arcuato. — Diam. maj. 19, min. 14, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Helixarion Freycineti Fér. pr. 2. p. 20. Hist. t. 9 A. f. 3. 4 t. 9 B. f. 2.

— — *Blainv.* in Dict. sc. nat. tom. 20. p. 482.

Helicarion Freycineti Fér. in Voy. de Freyc. Zool. p. 465. t. 67. f. 1.

— — *Beck* ind. p. 2. N. 2.

Vitrina Freycineti Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 408.

— *Cuvieri Sow.* gen. 11. f. 2. (teste Beck.)

Helicolimax australasia Blainv. in Dict. sc. nat. tom. 32. p. 255

Helix (Vitrina) *Helicarion Voigt* in Cuv. Thierr. III. p. 76.

Habitat ad Port-Jackson Novae Hollandiae (Fér.).

Obs. Specimen descriptum Musaei Cumingiani (absque nomine et patria) iconibus Ferussacianis (diam. maj. 18, min. 13 mill.) fere omnino congruum. An nihilominus diversa species?

49. V. robusta Gould. †

T. helicoidea, transversa, depresso-globosa, subvalida, polita, perlucida, dilute flavo-viridis, lineis incrementalibus regularibus, obtusis striata; spira obtusa; anfr. 3, ultimus magnus; apex subcentralis; subtus rotundata; apertura rotundata, margine sinistro superne reflexo, rimam umbilicalem parvam formante. — Diam. max. ½, alt. ¼ poll. (G.)

Vitrina robusta Gould 1846. Exped. shells p. 27

Habitat in Novae Hollandiae ora orientali.

Obs. «Persimilis V. nigrae Quoy et Freycineti Fér.»

50. V. nigra Quoy. †

T. ovalis, planiuscula, rufa; apertura elliptica, ampla, margine sinistro leviter inflexo; anfr. 4, ultimus permagnus. — Diam. 6, alt. 2½ lin. (Q.)

Vitrina nigra Quoy et *Gaim.* Astrol. II. p. 135. t. 11. f. 8. 9.
— — *Lam.* ed. Dh. VII. p. 730. N. 5.

Habitat ad Port-Western Novae Hollandiae.

51. V. zebra Le Guillou. †

T. rotundata, umbilicata, supra depresso-convexa, subtus convexior, hyalina, flammulis albis et spadiceis oblique undulatis ornata; anfr. 4 supra tenuiter striati; apertura subdilatata; umbilicus minimus. — Diam. 7, alt. 5 mill. (G.)

Vitrina zebra Le Guill. in Revue zool. 1842. p. 136.

Habitat in insulis Aukland.

Obs. Nonne ad Naninas potius pertinens species?

52. V. tenella Gould. †

T. parva, succinea, subperforata, gradibus aetatis conspicuis striata; spira rotundata, apice subcentrali, anfr. 3 convexis, declinantibus; sutura excavata; apertura subcircularis; labrum antrorsum arcuatum. — Diam. ⅓, alt. 1/11 poll. (G.)

Vitrina tenella Gould 1846. Exped. shells p. 26.

Habitat in insula Kauai Sandwich.

Obs. «Simillima V. pellucidae, sed major, magis opaca, apertura ampliore.»

53. V. caperata Gould. †

T. helicoidea, depresso-globosa, ad peripheriam obtuse angulata, tenuis, subopaca, striis incrementalibus conspicuis et rugis obliquis ramulosis, praecipue supernis, exarata, dilute fulvocornea, arcte perforata; spira anfr. 3½ convexis, cito crescentibus; sutura profunda; apex subcentralis; apertura subcircularis; labrum simplex, ad umbilicum eversum; columella callum simulans, secundum spiram introiens. — Diam. max. 9/20, alt. ⅕ poll. (G.)

Vitrina caperata Gould 1846. Exped. shells p. 26.

Habitat in insula Kauai Sandwich.

§. 7.

54. V. Angelicae Beck.

T. convexiusculo-depressa, laevigata, nitida, pellucida, virenti-lutea; spira parvula, subprominula; sutura subtiliter

crenulata; anfr. $3\frac{1}{2}$ rapide accrescentes, ultimus subtus latus; apertura obliqua, lunato-ovalis; perist. simplex, subinflexum, margine columellari non recedente, leviter arcuato. — Diam. maj. 6, min. $4\frac{2}{3}$, alt. $3\frac{1}{3}$ mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina Angelicae Beck ind. p. 1. N. 6. et M. R. C. VIII. t. 1. f. 2. ined.
— — *Möller* ind. moll. Groenl. p. 4. *)
Helix pellucida Fabric. Faun. Groenl.
— *domestica Ström*? (Beck.)

Habitat in Groenlandia.

Obs. 1. Persimilis V. pellucidae, anfractibus celerius accrescentibus et forma aperturae vix distinguenda.

Obs. 2. Praeterea nulla Vitrinarum genuinarum species ex America mihi innotuit, excepta *V. mexicana Beck* M. R. C. VIII. t. 1. f. 4. (ined.)

§. 8.

55. V. fumosa Pfr.

T. depresso-globosa, tenuis, subtilissime striatula, nitida, albido-cornea; spira vix elevata, late conoidea, vertice castaneo: anfr. $4\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, ultimus ventrosior, superne fumoso-fuscescens, fascia angusta castanea ad suturam et altera lata ad peripheriam ornatus; columella arcuata; apertura parum obliqua, ampla, lunato-subcircularis; perist. tenuissimum, margine columellari superne reflexiusculo, appresso. — Diam. maj. 18, min. 15, alt. 11 — 12 mill. (Mus. Gruner.)

Vitrina fumosa Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 146.

Habitat . . . ?

56. V. virens Pfr.

T. depressiuscula, subsemiovalis, subtilissime striatula, nitidula, corneo-virens; spira planiuscula; sutura vix impressa; anfr. 3 vix convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus subdepresso-rotundatus, basi anguste membranaceo-marginatus; apertura obliqua, lunato-subcircularis; perist. tenue, subinflexum, undique regulariter arcuatum. — Diam. maj. 16, min. 12, alt. 8 mill. (Mus. Cuming.)

Vitrina virens Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat . . . ?

Obs. Superne V. guimarasensi similis, sed multo magis elongata. — Figura Vitrinae Cuvierii (in Sow. gen. et Reeve), ab auctoribus ad diversas species relata, forma cum hac melius quam cum ulla alia convenit.

---

*) Exigua magnitudine appendicis lateralis et numero anfractuum teste minore a V. pellucida distincta. (Möll. l. c.)

§. 9.

57. V. atrovirens (Helix) Moricand.

T. semiovalis, ventrosa, membranacea, sublaevigata, pellucida, vix nitidula (pruinosa) atro-virens; spira brevissima, depressa; anfr. 3—3½, penultimus vix convexus, ultimus magnus, inflatus; apertura ampla, obliqua, rotundato-ovalis; columella perarcuata, basi strictiuscula. — Diam. maj. 18, min. 14, alt. 10 mill. (Coll. Nr. 12.) — Alt. 12—15, diam. 20—25 mill. (Mor.)

Helix atrovirens Moric. Mém. Gen. VII. p. 416. t. 2. f. 1.
Simpulopsis atrovirens Beck ind. p. 100. N. 4.
Vitrina atrovirens Jay catal. 1839. p. 43.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

58. V. obtusa (Succinea) Sowerby.

T. semiovalis, ventrosa, tenuissima, oblique confertim plicata, pallide virescenti-lutea; spira parvula, vix prominula; anfr. 3 rapide accrescentes, ultimus inflatus; apertura perobliqua, amplissima, irregulariter ovalis, deorsum dilatata; columella subangulato-arcuata. — Diam. maj. 17, min. 14, alt. 9½ mill. (Coll. Nr. 13.) — Alt. 12, diam. 16 mill. (Mor.)

Succinea obtusa Sow. gen. shells N. 9.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 180. f. 2.
Helix obtusa (Cochlohydra) *Fér.* hist. t. 9 B. f. 5.
— *brasiliensis Moric.* Mém. 3e suppl. p. 54. t. 5. f. 5.
Simpulopsis obtusa Beck ind. p. 100. N. 3.
Vitrina obtusa
— *brasiliensis* } *Pfr.* Symb. II. p. 62.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

59. V. rufovirens (Succinea) Moricand.

T. subsemiglobosa, tenuissima, membranacea, oblique confertim plicata, pellucida, sericina, fusco-virens; spira prominula, conoidea, obtusiuscula; anfr. 3½ convexiusculi, ultimus inflatus; columella valde arcuata; apertura perobliqua, rotundato-ovalis, superne angulosa. — Diam. maj. 15, min. 13, alt. 7 mill. (Coll. Nr. 14.)

Succinea rufovirens Moric. Mém. 3e suppl. p. 53. t. 5. f. 4. *)
Vitrina rufovirens Pfr. Symb. III. p. 45.

Habitat prope Bahia Brasiliae.

Obs. «Intermedia inter sulculosam et brasiliensem. Differt ab affinibus anfractuum numero, apertura latiore quam in sulculosa, angustiore quam in

*) T. membranacea subrufo-virens, tetragyra, longitudinaliter sulcata; spira brevi, obtusa; apertura transverse ovato-subrotunda. (Mor. l. c.)

brasiliensi. In sulculosa et rufo-virente margo superior labri in medio anfractus praecedentis inseritur, in brasiliensi altius ad spiram ascendit. Sulci longitudinales paulo profundiores et magis regulares, quam in sulculosa, frequentiores et profundiores quam in brasiliensi.» (Mor.)

60. V. sulculosa (Helix) Férussac.

T. conico-subglobosa, tenuis, membranacea, oblique plicatula, pellucida, vix nitidula, flavescenti-cornea; spira elevata, conoidea, apice acuta; anfr. 4½ convexiusculi, ultimus ventrosior; apertura parum obliqua, rotundato-ovalis, superne angulosa; columella regulariter arcuata. — Diam. maj. 14, min. 11, alt. 9 mill. (Coll. Nr. 15.) — Alt. 17, diam. 15 mill. (Mor.)

Helix sulculosa (Cochlohydra) *Fér.* pr. 14. Hist. t. 11 A. f. 6.
Succinea sulculosa Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 415.
— — *Moric.* Mém. 3e suppl. p. 54.
— *membranacea Mich.* (teste Villa disp. syst. p. 9.)
Simpulopsis sulculosa Beck ind. p. 100. N. 2.
Vitrina sulculosa Pfr. Symb. III. p. 45.

Habitat in Brasilia.

Obs. Num forsan huic affinis Helix (Succ.) progastor Orb.? Conf. Succinea Nr. 47.

61. V. angularis (Helix) Férussac. †

T. globosa-conica, tenuis, striata, olivacea; spira conoidea; anfr. 4 celeriter accrescentes, ultimus medio angulatus; columella fortiter arcuata, albo-callosa; apertura lunato-rotundata. — Diam. 12, alt. 10 mill. (ex ic.)

Helix angularis (Cochlohydra) *Fér.* pr. 13. Hist. t. 11 A. f. 5.
Vitrina angularis Gray in Ann. of. Phil. 1825. IX. p. 415.
Simpulopsis angularis Beck ind. p. 100. N. 1.
Succinea angularis Pfr. Symb. II. p. 131.

Habitat in insula Isle de France?

Obs. Num ad hanc sectionem pertinent: Succinea rotundata, cepulla et putamen Gould, quas Cl. auctor ad Helicolimacem Fér. referendas asserit?

XVII. Succinea Draparnaud. *)

Conspectus specierum.

1. Europaeae . . . . . §. 1. Nr. 1—8.
2. Asiaticae . . . . . §. 2. — 9—10.
3. Africanae . . . . . §. 3. — 11—13.
4. Australicae . . . . . §. 4. — 14—32.
5. Americanae
   a. continentales . . . . . §. 5. — 33—57.
   b. ex India occidentali . . . . . §. 6. — 58—68.

---

§. 1.

1. S. putris (Helix) Linn.

T. ovata, tenuis, rugoso-striatula, pellucida, nitidula, succinea vel straminea; spira conica, acutiuscula; anfr. 3 — $3^1/_2$ convexiusculi, ultimus ventrosior, $^2/_3$ longitudinis subaequans; sutura levis; columella simplex, leviter arcuata; apertura vix obliqua, ovalis, superne angulata. — Long. 15—16, diam. 7—8 mill. Ap. 11 mill. longa, medio 7 lata. (Coll. Nr. 1. Spec. plur.)

Helix putris Linn. syst. ed. X. p. 774. ed. XII. p. 1249. N. 705.
— — *Gmel.* p. 3659. N. 135.
— — *Sturm* Fauna VI. H. 1. T. 16.
— — (Cochlohydra) *Fér.* pr. 9. Hist. t. 11. f. 4. 8. 9.
— *succinea Müll.* verm. II. p. 97. N. 296.
— — *Chemn.* IX. P. 2. p. 178. t. 135. f. 1248.
— *limosa Dillw.* descr. cat. II. p. 966. N. 175.
Neritostoma vetula Klein ostr. p. 55. t. 3. f. 70.
Turbo trianfractus Da Costa brit. Conch. p. 92. t. 5. f. 13.
Bulimus succineus Brug. Enc. méth. I. p. 308. N. 18.

*) Omnes specierum Succineae (sicut Vitrinae) descriptiones, quas publici juris factas inveni, hic proposui; sed decidere non suscipiam, quaenam ex nominum copia sint species revera distinctae?

Succinea amphibia Drap. tabl. d. moll. p. 55. N. 1.
— — *Drap.* hist. p. 58. t. 3. f. 22. 23
— — *Lam.* 2. p. 135. ed. Dh. p. 316.
— — *C. Pfr.* I. p. 67. t. 3. f. 36—38. III. p. 55
— — *Rossm.* I. p. 91. f. 45.
— — *Blainv.* Malac. p. 455. t. 38. f. 4.
— — *Desh.* in Ann. sc. nat. XXII. p. 345. — Anatome (Conf. Isis 1835. p. 184. t. 7.)
— — *Charp.* catal. moll. Suisse p. 4.
— — *Swains.* Malac. p. 328. f. 96.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 180. f. 3.
— — *Sow.* Conch. Man. f. 265.
— — *Phil.* Sicil. II. p. 102.
— — *Morelet* moll. du Port. p. 52. t. 5. f. 2
— *putris Fleming* brit. anim. p. 267.
— — *Beck* ind. p. 99. N. 8.
— — *Gray* Manual p. 178. t. 6. f. 73.
— *Mülleri Leach* moll. p. 78.
Tapada putris Studer Verz. p. 11.
Limnea succinea Flem. (Gray.)
Amphibina putris Hartm. in Neue Alpina I. p. 247.

β. Major, pallida: long. 20—21, diam. 10—11 mill.
Helix putris Fér. hist. t. 11. f. 6.
Succinea major Risso hist. IV. p. 59. N. 127? *)

γ. Maxima, rubella: long. 24, diam. 11 mill. (Spec.)
Helix putris Fér. hist. t. 11. f. 7.

δ. Saturate succinea, striolis inaequalibus, transversis sculpta:
Succinea elegans Risso hist. IV. p. 59. N. 128? **)

Habitat in fere omnibus Europae terris frequens. Var. *γ* prope Szigleget Hungariae legi.

2. S. Pfeifferi Rossmässler.

T. oblongo-ovata, solidula, striatula, pellucida, nitidula, succinea vel corneo-lutescens; spira brevis, conica, subpapillata: anfr. 3 vix convexi, ultimus $^3/_4$ longitudinis subaequans, utrinque attenuatus; apertura elongato-ovata, superne acutiuscula, basi oblique pone axin recedens, intus margaritacea, striata; columella levissime arcuata. — Long. 12, diam. 6—7 mill. Ap. 9 mill. longa, medio 5 lata. (Coll. Nr. 2.)

Succinea Pfeifferi Rossm. Icon. I. p. 92. f. 46.

---

*) T. pellucida, altissime elevata; anfr. 4, striis transversis inaequalibus sculptis; apertura patula; epidermide cornea. — Long. 0,018. (Risso l. c.)

**) T. pellucida, cornea, gradatim elevata; anfr. 4 striolis inaequalibus, inaequidistantibus, transversis sculptis; epidermide cornea; apertura simplici. — Long. 0,010. (Risso l. c.)

Succinea Pfeifferi Beck ind. p. 99. N. 7.
— — *Gray* Manual p. 179. t. 6. f. 74.
— — *Phil.* moll. Sicil. II. p. 102.
— *amphibia β Nilsson* p. 41.
— — *Phil.* Sicil. I. p. 142.
— *oblonga Turt.* Man. f. 74.
— *intermedia Bean* mss. (Gray.)
— *gracilis Alder* Mag. Zool. and Bot. II. p. 106.
— *calycina Menke* syn. ed II. p. 14.
— *levantina Desh.* Expéd. de Morée. Zool. p. 170. t. 19 f. 25—27.
— — *Lam.* ed. Dh. 4. p. 347. *)
— — *Cantraine* Malac. médit. p. 154.
Helix putris (Cochlohydra) *z Fér.* t. 11. f. 13.
— *angusta Studer* in Coxe trav.?
Tapada succinea Studer Verz. p. 11?
Amphibulina putris var. Hartm. in Sturm Fauna VI. II. 8. T. 6. 7.

Habitat passim in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, frequens in Hungaria, Carniolia, Sicilia etc.; in Morea (Desh.).

Obs. 1. Saepius speciem accepi sub nomine *Succ. bullinae* (Fér.?) *Ziegl.*, nec non nomine *S. brunneae Stentz.*

Obs. 2. Cl. Charpentier hanc speciem in Helvetia vivere negat, et Tapadam succineam Studeri ad Succ. amphibiam referendam esse asserit.

Obs. 3. Nomen Deshayesianum omnino rejiciendum. Conf. Phil. Sicil. II. p. 102, adnot., et quae Cl. Deshayes ipse profert de nomine Hel. carabinatae in Fér. hist. p. 7.

3. S. longiscata Morelet. †

T. elongata, fragilis, valde striata, fulvo-rubescens; apertura symmetrica, subangusta, oblonga, superne ovata, inferne angulata; spira acuminata; anfr. 3½ juxta suturam planulati. — Long. 17, amplit. 7 mill. (M.) — Ap. 12 mill. longa, paulo infra medium 5½ lata. (ex ic.)

Succinea longiscata Morelet moll. du Port. p. 51. t. 5. f. 1.

Habitat prope Faro Algarbiae.

Obs. Differt a S. amphibia forma elongata et aperturae coarctatae marginibus symmetrice curvatis et axi parallelis etc. (Mor.)

4. S. virescens Morelet. †

T. ovato-oblonga, tenuissima, pellucida, flavo-virescens, concinne striata; columella albicans; apertura ovata; spira bre-

*) T. ovato-oblonga, tenuissima, fragili, pellucida, flavo-rubescente; spira brevissima, acuminata; ultimo anfractu amplissimo; apertura obliqua; marginibus tenuissimis. — Long. 14, lat. 6 mill. (Desh. l. c.)

vissima; anfr. 3, ultimus amplissimus. — Long. 10, amplit. 5 mill. (M.) — Ap. 8 mill. longa, medio 4½ lata. (ex ic.)

Succinea virescens Morelet moll. du Port. p. 53. t. 5. f. 3.

Habitat in provincia Alemtejo Lusitaniae.

Obs. Affinis S. Pfeifferi; differt columella arcuata, apertura subeffusa, etc.

5. S. bullina (Helix) Férussac. †

T. oblongo-ovata, tenerrima, laevigata, flavido-albida; spira vix prominula, obtusa; anfr. 3, supremi planiusculi, ultimus ovatus; columella substricte recedens, basi arcuata; apertura irregularis, late ovalis. — Long. 11½, diam. 7 mill. Ap. 9½ mill. longa, supra basin 6 lata. (ex ic.)

Helix bullina (Cochlohydra) *Fér.* hist. t. 9 B. f. 4.

Succinea bullina Beck ind. p. 99. N. 9.

Habitat in Carniolia (Beck).

Obs. Figura Ferussaciana ad Succ. Pfeifferi, quacum saepius confunditur, referri nequit Veram S. bullinam Fér. nunquam vidi. — Succ. calycina Menke, a Cl. Beck huc relata, teste ipso auctore (Zeitschr. f. Mal. 1845. p. 111.) ad Succ. Pfeifferi pertinet.

6. S. oblonga Draparnaud.

T. ovato-oblonga, tenuis, subarcuatim striata, diaphana, fusco- vel virenti-lutescens; spira subelongata, conica, acutiuscula; sutura profunda; anfr. 3—4 ventrosi, celeriter accrescentes, ultimus spiram paulo superans; columella leviter arcuata; apertura parum obliqua, regulariter ovalis, superne vix angulosa. — Long. 8, diam. 4 mill. Ap. 4½ mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 3.)

Succinea oblonga Drap. tabl. d. moll. p. 56. N. 2.
— — *Drap.* hist. p. 59. t. 3. f. 24. 25.
— — *Lam.* 3. p. 135. ed. Dh. p. 317.
— — *C. Pfr.* I. p. 68. t. 3. f. 39. III. p. 56.
— — *Desh.* Encycl. méth. II. p. 20. N. 3.
— — *Rossm.* I. p. 92. f. 47.
— — *Charp.* catal. moll. p. 3.
— — *Beck* ind. p. 99. N. 17.
— — *Gray* Manual p. 180. t. 6. f. 139.

Tapada oblonga Studer Verz. p. 12.

Helix buccinum Schranck. (teste Beck.)
— *elongata* (Cochlohydra) *Fér.* pr. 10. Hist. t. 11. f. 1. 2.

Amphibulina oblonga Hartm. in Sturm Fauna VI. H. 8. T. 8. 9.

Amphibina oblonga Hartm. in Neue Alpina I. p. 248.

Habitat passim in Germania, Helvetia, Gallia, Britannia, Dania.

7. S. arenaria Bouchard.

T. ovato-acuta, sordide succinea, striata, pellucida, nitidula; spira conica, acutiuscula; sutura profunda; anfr. 3½ convexi, ultimus ⅘ longitudinis aequans; columella regulariter arcuata; apertura parum obliqua, regularis, ovalis, basi rotundata; perist. simplicissimum. — Long. 6⅔, diam. 4½ mill. Ap. 4 mill. longa, medio 3 lata. (Coll. Nr. 4. Spec. max.)

Succinea arenaria Bouch. catal.

— — *Pot.* et *Mich.* gal. I. p. 67. t. 11. f. 3. 4. *)

β. Minor, flavescens, crassior, vix nitida: long 5, diam. 3½ mill. (Spec.)

Habitat in Gallia (in littore prope Boulogne sur mer: Pot. et Mich., prope Auch: Dupuy), Dania (Beck) et in Germania (prope Bünde: Philippi); var. *β*, quae huc referenda mihi videtur, prope Westerhof in viciniis Göttingae legi.

8. S. abbreviata Morelet. †

T. parvula, globuloidea, pellucida, virescens; apertura ampla, rotundata; spira brevissima; anfractus ultimus dilatatus. — Long. 4, ampl. 3 mill. (M.)

Succinea abbreviata Mor. moll. du Port. p. 54. t. 5. f. 4.

Habitat circa Braganza Lusitaniae.

Obs. 1. «Affinis S. oblongae Drap.; differt peristomate rotundato-curvato, anfractu ultimo inflato et repando, etc.»

Obs. 2. Ad hanc sectionem pertinent species sequentes indescriptae: *Succ. taurica Zgl.* Beck ind. p. 99 ex Cherson. Taur. — *S. corsica Shuttl.* in Mittheil. d. Bern. nat. Ges. 1843. p. 13, — *Succ. italica Jan* et *S. sardea Megerle* ex Sardinia. (Villa disp. syst. p. 9.)

§. 2.

9. S. rugosa Pfr.

T. depresso-ovata, ventrosa, tenuis, oblique rugosa, nitide fulvescens; spira brevissima, obtusiuscula; anfr. 2½, ultimus inflatus; columella valde arcuata; apertura ampla, ovalis, superne subangulosa; perist. simplex, membranaceum. — Long. 14, diam. 10 mill. Ap. 12 mill. longa, medio 7½ lata. (Coll. Nr. 5.)

Succinea rugosa Pfr. Symb. II. p. 56.

Habitat prope Pondichery, teste Cl. Guérin.

---

*) T. ovata, corneo-rubra, pellucida, nitida, striata; anfr. 4, ultimo maximo. — Similis Succ. oblongae Dr., differt colore saturatiore, testa breviore et magis inflata. (P. et M. l. c.) — Long. 7, diam. 4 mill. Ap. 4 mill. longa, 2⅔ lata. (ex ic.)

10. S. gracilis Lea. †

T. longo-ovata, obliqua, exserta, subdiaphana, striata, pallide lutea; spira elevata; suturae impressae; anfr. subconvexi; apertura longo-ovata. (Lea.) — Dimens.?

Succinea gracilis Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 31.

Habitat in insula Java?

Obs. Hic enumerandae *Amphibulima macrostoma Beck* ind. p. 98. N. 6, et *Succ. tranquebarica Beck* p. 99. N. 12, utraque ex Tranquebar. — Nec non *Succ. crassiuscula Benson.* (Wiegm. Arch. 1839. II. p. 205.)

§. 3.

11. S. aegyptiaca Ehrenberg. †

T. oblonga bilinearis, spirae anfr. 3, testa glabra, pellucida, lineis curvis laxe striata. (Ehr.)

Succinea aegyptiaca Ehrenb. Symb. phys.
— *amphibia Aud. Sav.* Descr. de l'Eg. t. 2. f. 24.

Habitat prope Damiette.

12. S. exarata Krauss.

T. oblongo-subfusiformis, tenuissima, ruguloso-striata, pellucida, stramineo-hyalina; spira conica, acuta; anfr. 4 rapide accrescentes, convexiusculi, ultimus paulo ventrosior, basi attenuatus, medio sulcis 1—2 parallelis exaratus; apertura oblongo-ovalis, superne angulata; perist. simplex, margine dextro leviter, columellari vix arcuato. — Long. 10, diam. 5 mill. Ap. 6½ mill longa, medio 3½ lata. (Coll. Krauss.)

Succinea exarata Krauss südafr. Moll. p. 74. t. 4. f. 15.

Habitat ad Natal Africae meridionalis.

* * *

13. S. St. Helenae (Helisiga) Lesson.

T. glaberrima, ampla, ovata, unispirata, fusco-rubella, fragillima. — Diam. 7, alt. 3 lin. (Less.) — Coll. Nr. 6?

Helisiga St. Helenae Less. voy. Coq. p. 316. t. 15. f. 1.
— — *Isis* 1833. t. 2. f. 1.

Succinea St. Helenae Pfr. Symb. II. p. 132.

Habitat in insula St. Helena.

Obs. Speciebus accedit *S. zephyrina Beck* ind. p. 99. N. 23, ex ins. Madagascar.

§. 4.

14. S. australis (Helix) Férussac. †

T. ovata, striata, albida; spira inflata, conica, apice acuta, anfr. 4 perconvexi, celeriter accrescentes, ultimus ⅔ longitudinis

subaequans; columella valde arcuata, callósa; apertura ovalis, superne subangulosa. — Long. 13, diam. 6½ mill. Ap. 8½ mill longa, medio 5½ lata. (ex ic.)

Helix australis (Cochlohydra) *Fér.* pr. 11. Hist. t. 11. f. 11.
Succinea australis Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 415.
— — *Quoy et Gaim.* Astrol. Zool. II. p. 150. t. 13 f. 19—23?*)
— — *Lam.* ed. Dh. 7. p. 319?
— — *Beck* ind. p. 99. N. 21.

Habitat in insulis Australiae (Péron, Fér.), in locis elevatis, aridis prope Hobart-Town insulae Van-Diemen (Quoy et Gaimard).

15. S. caduca Mighels. †

T. subovata, pertenuis et fragilis, cornea; anfr. circa 2½, ultimus permagnus; spira subprominula; apertura elongato-ovalis; labrum tenue. — Long. 7/20, latit. 1/5 poll. (M.)

Succinea caduca Migh. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 21.

Habitat in insula Oahu.

16. S. canella Gould. †

T. parva, subsolida, opaca, ovata, impolita, cinnamomea, leviter striata; spira conspicua; anfr. 3 ventricosi, sutura valde constricta discreti; apertura parva, ovato-rotunda; perist. incrassatum, postice subcontinuum; columella arcuata, haud plicata. — Long. 1/3, lat. 2/9 poll. (G.)

Succinea canella Gould 1846. Exped. shells p. 29.

Habitat in insula Sandwich. Maui.

Obs. «Persimilis S. avarae et caducae Migh., sed minus elongata, solidior et absque plica columellari.»

17. S. cepulla Gould. †

T. parva, tenuissima, pellucida, nitida, succineo-virens, rotundato-elliptica, depressa, sinistrorsum rotundata, dextrorsum declivis, longitudinaliter striata et liris inaequalibus volventibus arata; spira fere nulla; anfr. 2½, apertura amplissima, ovalis, ad basim late rotundata, ad columellam arcuata, leviter plicata; intus metallica. — Long. ½, lat. 7/20, alt. 1/5 poll. (G.)

Succinea cepulla Gould 1846. Exped. shells p. 27.

Habitat in insula Hawaii.

---

*) T. ovato-oblonga, ventricosa, pellucida, fragili, flava aut nigricante, oblique striata; apertura ovali, superne vix angulosa; anfr. 3. — Long. 5½, diam. 3 lin. (Q.) — Long. 13, diam. 7 mill. Ap. 8 mill. longa, medio 5 lata. (ex ic.) — Differre ex icone videtur a specie Ferussaciana columella subtruncata.

18. S. crocata Gould. †

T. pinguis, subsolida, subopaca, ovato-globosa, saturate crocea, lineis incrementi exilibus et interdum lineis inordinatis volventibus striata; spira brevis, acuta; anfr. vix 3, convexi, sutura profundissima discreti, ultimus ventricosus; apertura magna, rotundato-ovata; columella carinata subincrassata, haud sinuosa; intus calcarea. — Long. $^5/_8$, lat. $^1/_2$ poll. (G.)

Succinea crocata Gould 1846. Exped. shells p. 29.

Habitat Upolu.

19. S. humerosa Gould. †

T. ovata, depressa, subrhombea, sublucida, striis incrementalibus rugosa, sulcis raris volventibus interdum arata, dilute virens et interdum rubricans; spirae anfr. 3, ultimus permagnus, postice subangulatus; apertura subovalis, postice amplificata: labrum dextrorsum decurrens; plica columellaris conspicua. — Long. $^3/_5$, lat. $^3/_8$, alt. $^1/_5$ poll. (G.)

Succinea humerosa Gould 1846. Exped. shells p. 28.

Habitat in montibus insulae Taheiti.

Obs. «Facile cognoscenda humero angulari anfractus ultimi.»

20. S. infundibuliformis Gould. †

T. acuto-conica, infundibuliformis, ad basim peroblique truncata, concinne striata, opaca, viridis; spira obtusa, anfr. $2^1/_2$ planulatis, ultimo magno; sutura linearis; apertura rotundato-ovata: margo sinister inflexus, ad peripheriam carinatus. — Long. $^7/_{10}$, lat. $^7/_{20}$ poll. (G.)

Succinea infundibuliformis Gould 1846. Exped. shells p. 30.

Habitat in montibus insularum Taheiti et Eimeo.

21. S. lumbalis Gould. †

T. mediocris, ovato-conica, tenuissima, sublucida, pallide virens, leviter striata, subtus gibbosa; spira acute conica; anfr. 3 convexiusculi, ultimus ventricosus, versus suturam declivis; apertura rotundato-ovata; columella valde arcuata, callo induta, plica mediocri. — Long. $^9/_{20}$, lat. $^5/_{20}$, alt. $^4/_{20}$ poll. (G.)

Succinea lumbalis Gould 1846. Exped. shells p. 28.

Habitat in insula Kauai Sandwich.

Obs. «Similis speciebus minoribus Limnaeae catascopii Say.»

22. S. manuana Gould. †

T. parva ovata, ventricosa, tenuis, subopaca, straminea, longitudinaliter striata et transverse sparsim rugosa; spira obtusa.

exserta, anfr. 2½ ventricosis, sutura profunda discretis; apertura ovato-rotundata; perist. ad columellam minime reflexum; regio umbilicalis depressa, sinuosa. — Long. ⅓, lat. ⅕ poll. (G.)

Succinea manuana Gould 1846. Exped. shells p. 29.

Habitat Manua.

23. S. modesta Gould. †

T. mediocris, ovata, tenuis, nitens, diaphana, stramineo-cornea, tenuiter striata et lineis interruptis volventibus arata, subtus ventricosa; spira reflexa, anfr. 3 ventricosis; apertura rotundato-ovata; columella arcuata, incrassata, subperforata; plica conspicua. — Long. ⅛, lat. ⅔ poll. (G.)

Succinea modesta Gould 1846. Exped. shells. p. 29.

Habitat Upolu.

Obs. «Similis specimini parvo S. campestris Say.»

24. S. pallida Pfr.

T. ovato-conica, solidiuscula, longitudinaliter ruguloso-striata, diaphana, pallide straminea; spira acuta; anfr. 4 convexi; columella leviter arcuata, filaris, supra basin aperturae ovalis subtruncata; perist. margine subincrassatum. — Long. 13, lat. 7, alt. 6½ mill. Ap. 8½ mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming.)

Succinea pallida Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 109.

Habitat in insula Taheiti.

25. S. patula Migh els. †

T. ovata, pellucida, fragilis, lutescens; spira nodiformis; anfr. 1½, ultimus permagnus; apertura ovalis, amplissima, aperta; labrum tenuissimum. — Long. ½, lat. ⅖ poll. (M.)

Succinea patula Migh. in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 21.

Habitat in insula Oahu.

Obs. Nomen mutandum ob S. patulam Brug.

26. S. procera Gould. †

T. magna, elongata, fulvo-cornea, striis incrementalibus crassis rugosa; spira acuta, anfr. 3 perobliquis convexiusculis composita, partem longitudinis fere dimidiam aequans; apertura ovato-oblongata; labrum postice decurrens; columella arcuata, subincrassata. — Long. 7/10, lat. 3/10 poll. (G.)

Succinea procera Gould 1846. Exped. shells p. 30.

Habitat in insula Eimeo.

Obs. Affinis Succ. infundibuliformi, forma similis Limnaeae umbrosae.

27. S. pudorina Gould. †

T. elongata, ovato-turrita, tenuis, lucida, striis conspicuis longitudinalibus notata, succineo-rubescens; spira elevata, anfr. 3 cylindraceis valde obliquis et sutura profunda discretis composita; apertura testae trientes duos adaequans, elongato-ovata, angusta; columella obliqua, subrecta, vix plicata. — Long. $^{11}/_{20}$, lat. $^{3}/_{10}$, alt. $^{1}/_{5}$ poll. (G.)

Succinea pudorina Gould 1846. Exped. shells p. 30.

Habitat in montibus ins. Taheiti et Eimeo.

Obs. «Persimilis S. oblongae Drap., sed gracilior, apertura angustiore.

28. S. putamen Gould.

T. magna, depressa, globoso-elliptica, tenuis, laevis, striis incrementalibus et striis volventibus tenuiter decussata, fulvo-cornea, ad peripheriam subangulata; spira fere nulla, anfr. vix 2, sutura linearis; apertura paginam inferiorem fere adaequans, rotundato-ovalis; margo columellaris subplicatus. — Long. $^{5}/_{8}$, lat $^{1}/_{2}$ poll. (G.)

Succinea putamen Gould 1846. Exped. shells p. 28.

Habitat Upolu.

29. S. rotundata Gould. †

T. parva, tenera, subopaca, hemisphaerica, flavo-virens, concinne striata; spira fere nulla, intus aperta, anfr. $2^{1}/_{2}$, ultimo amplissimo; apertura circularis, postice angulata, testam fere adaequans; margo columellaris obliquus, subrectus, conspicue plicatus, et callo lato indutus. — Long. $^{4}/_{10}$, lat. $^{7}/_{20}$, alt. $^{3}/_{20}$ poll. (G.)

Succinea rotundata Gould 1846. Exped. shells p. 27.

Habitat in montibus insulae Oahu Sandwich.

Obs. «Ad Helicolimaces Fér. referenda. Similis S. apertae Lea.»

30. S. tahitensis Pfr.

T. ovata, striatula, tenuis, vix nitida, pellucida, pallide succinea; spira brevis, obtusiuscula; anfr. $2^{1}/_{2}$ convexi, ultimus ovatus; columella leviter arcuata, medio obsolete (interdum distincte) angulata; apertura regulariter ovalis; perist. expansiusculum. — Long. 12, lat. 7, alt. $4^{1}/_{2}$ mill. Ap. $8^{2}/_{3}$ mill. longa, medio 5 lata (Coll. Nr. 7.)

Succinea tahitensis Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 109

— *pacifica Beck* ind. p. 99. N. 13? (ex ic. Féruss.)

Helix putris ε *Fér.* hist. t. 11 A. f. 10?

Habitat in insula Taheiti (Cuming).

31. S. venusta Gould. †

T. mediocris, ovata, tenuis, pellucida, nitida, ordinatim striata, epidermide succinea, interdum virescente induta, subtus gibbosa; spira conspicua, obtusiuscula, anfr. 2½ rotundatis; apertura ovata, longitudinis testae trientes 2 adaequans, postice angulata; columella obliqua, absque plica. — Long. $^{7}/_{10}$, lat. $^{1}/_{3}$, alt. $^{1}/_{5}$ poll. (G.)

Succinea venusta Gould 1846. Exped. shells p. 30.

Habitat Hawaii.

Obs. «Persimilis S. ovatae Say, magis inflata. Testa minus elongata, magis nitida et colore differt a S. pudorina Gould.»

32. S. vesicalis Gould. †

T. tenuissima, fragilis, lucida, late ovata, depressa, gradibus aetatis undulata, epidermide straminea induta; spirae anfr. 3, ultimus magnus, patulus, reliqui spiram parvam formantes; apertura subovalis, ad basim late rotundata, longitudinis $^{1}/_{5}$ aequans; plica columellaris conspicua. — Long. $^{4}/_{10}$, lat. $^{3}/_{8}$, alt. $^{2}/_{5}$ poll. (G.)

Succinea vesicalis Gould 1846. Exped. shells p. 28.

Habitat Mauna Kea, Hawaii.

Obs. 1. «Forma et statura similis S. rubescenti.»

Obs. 2. Huic sectioni accedunt: *S. Georgiana Beck* ind. p. 99 (ex Nova Hollandia) et *S. laevis Beck* ibid. (ex insula Van Diemen).

§. 5.

33. S. Nuttalliana Lea. †

T. longo-ovata, obliqua, subnitida, diaphana, striata, pallide lutea; spira subelevata; suturae impressae; anfr. 3 subconvexi; apertura longo-ovata. (L.) — Dimens.?

Succinea Nuttalliana Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32.

Habitat in provincia Oregonensi.

34. S. Oregonensis Lea. †

T. obliqua, tenuis, rugoso-striata, rufa, subdiaphana; spira exserta; suturae valde impressae; anfr. 3 inflati; apertura magna, lato-ovata. (L.) — Dimens.?

Succinea Oregonensis Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32.

Habitat in provincia Oregonensi.

35. S. rusticana Gould. †

T. elongata, ovato-conica, tenuis, pallide virens, impolita, lineis incrementalibus inaequalibus et crassis striata, subtus convexa; spira acuta, anfr. 2 convexiusculis; apertura ovata, qua-

drantes 3 longitudinis adaequans; columella arcuata, perspicue plicata. — Long. ½, diam. ⅓ poll. (G.)

Succinea rusticana Gould 1846. Exped. shells p. 31.

Habitat Oregon.

36. S. aperta Lea. †

T. subrotunda, tenuis, flavescens, laevis; spira brevissima; anfr. 2, ultimus grandissimus; apertura latissima. — Diam. 0,4, long. 0,5 poll. (L.) — Long. 13, diam. 9½ mill. Ap. 11½ mill. longa, medio 8½ lata. (ex ic.)

Succinea aperta Lea obs. II. p. 101. t. 23. f. 107.

Habitat ad fluvium Columbia-River.

Obs. Persimilis S. depressae Rang Nr. 66.

37. S. campestris Say.

T. ovata, perfragilis, pallide flava, lineis opacis albis et vitreis irregulariter alternantibus; anfr. 3 vix obliqui. — Long. vix ⅗, lat. 7/20 poll. (Say.) — Coll. Nr. 8?

Succinea campestris Say in Journ. acad. Philad. I. P. 1. p. 281.
— — *Beck* ind. p. 98. N. 3.
— — *Gould* report p. 195. f. 126. *)
— — *Pfr.* Symb. II. p. 56.

Helix campestris (Cochlohydra) *Fér.* pr. 12. Hist. t. 11. f. 12.

Habitat in America boreali: Massachusetts.

Obs. «Affinis S. ovali Say; differt testa magis robusta; minus elongata, crassiore, minus fragili, sutura multo minus obliqua.» (Say.) — «Anfractus regulariter inflati; apertura magis ovalis, quam in S. ovali, superne et inferne fere regulariter rotundata.» (Gould.)

38. S. ovalis Say.

T. subovata, pallide flava, diaphana, pertenuis et fragilis; anfr. fere 3 obliqui, ultimus amplissimus; spira parvula, prominula, obtusiuscula; apertura longitudinaliter subovalis, lata; columella valde angustata, ita ut a basi testae fere in apicem perspicere possis; callus columellae fere nullus. (Say.) — Long. 3/20, lat. 2/20, long. apert. 7/20 poll. Diverg. 56°. (Gould.) — Coll. Nr. 9?

Succinea ovalis Say in Nichols. Encycl.
— — *Say* in Philad. journ. I. p. 15.
— — *Desh.* Enc. méth. II. p. 20. N. 2.
— — *Beck* ind. p. 98. N. 1.

---

*) T. ovata, tenuis, diaphana, pallide flava; anfr. 3 haud valde obliqui perconvexi, ultimus amplissimus, turgidus; sutura profunda; apertura subovalis. — Long. ⅗, lat. ⅖ poll. Diverg. 80—90°. (Gould l. c.)

Succinea ovalis Lam. ed. Dh. 8. p. 319. *)
— — *Gould* report p. 194. f. 125.
Helix ovalis (Cochlohydra) *Fér.* pr. 8. Hist. t. 11 A. f. 1.
β. Major, usque 1 poll. longa:
Succinea ovalis var. Say in Philad. journ. II. p. 163.

Habitat in America boreali: Massachusetts; var. *β* Missouri.

39. S. retusa Lea. †

T. ovato-oblonga, tenuissima, pellucida, flavidula; spira brevis; anfr. 3; apertura infra dilatata et retracta. — Diam. 0,3, long. 0,7 poll. (Lea.) — Long. 17, diam. 7 mill. Ap. 11½ mill. longa, versus basin 6 lata. (ex ic.)

Succinea retusa Lea obs. I. p. 229. t. 19. f. 86.

Habitat prope Cincinnati, Ohio.

40. S. avara Say.

T. tenuissima, angulosa, flavida; anfr. 3 convexi; sutura profunda; apertura rotundato-ovalis, ⅘ longitudinis subaequans, superne et inferne fere aequaliter rotundata. — Long. $^{7}/_{20}$, lat. $^{5}/_{20}$ poll. Div. 56°. (Gould.) — Coll. Nr. 10.

Succinea avara Say in Long's sec. exped. App. p. 260. t. 15. f. 5.
— — *Gould* report p. 196. f. 127.
— — *Pfr.* Symb. II. p. 56?
β. Anfractibus laxius volutis, sutura profundissima (Gould):
Succinea vermeta Say in New-Harmony Disseminator.
— — *Say* descr. of new terr. shells p. 23. **)

Habitat in America boreali: Massachusetts; var. *β* prope New-Harmony.

41. S. Wardiana Lea. †

T. obliquo-ovata, subnitida, diaphana, obsolete striata, lutea; spira breviuscula; suturae subimpressae; anfr. 3 convexi; apertura subrotunda. (Lea.) — Dimens.?

Succinea Wardiana Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 31.

Habitat in America boreali: Ohio.

42. S. aurea Lea. †

T. obliquo-ovata, nitida, diaphana, laevis, aurea; spira subelevata; anfr. 3 convexi; apertura ovata. (Lea.) — Dimens.?

Succinea aurea Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32.

Habitat prope Springfield, Ohio.

*) T. ovata, lymnaeformi, pellucida, tenui, subsulcata; apertura ovali, obliqua; anfr. 4 convexis; spira brevi. — Long. 12—14 mill. (Desh. l. c.)

**) T. subovata, lutescente, tenuissima, fragili, subdiaphana; anfr. sub 3 perobliquis, convexis, rugosis; sutura profunde impressa; spira elatiuscula, acuta; apertura ovali, margine peristomatis supero rotundato. (Say l. c.)

43. S. Totteniana Lea. †

T. obliquo-ovata, subnitida, subdiaphana, obsolete striata, cornea; spira brevis; suturae impressae; anfr. 3 convexi; apertura elliptica. (Lea.) — Dimens.?

Succinea Totteniana Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32

Habitat in America boreali, Newport.

44. S. inflata Lea. †

T. ovata, ventrosa, tenuis, alba, epidermide tenuissima, pallida, sordide cornea, saturatius strigata induta, striatula, vix nitida; spira brevis, acuta; sutura mediocris; anfr. 3, secundus convexiusculus, ultimus tumidus, $^3/_4$ longitudinis subaequans; columella strictiuscula, tenuiter callosa; apertura vix obliqua, oblongo-ovalis, intus submargaritacea; perist. simplex, fragile. — Long. $10^1/_2$; diam. 7 mill. Ap. 8 mill. longa, medio 5 lata. (Coll. Nr. 11.)

Succinea inflata Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32. *)

Habitat in Carolina meridionali.

Obs. Specimina descripta a Cl. Griffith sub nomine S. inflatae missa sunt Forma ad figuram S. campestris (Say?) Fér. t. 11. f. 12 proxime accedunt.

45. S. undulata Say. †

T. subovata, pallide flavescens, translucens, fragilis; spira mediocris, obsolete rugosa; anfr. $3^1/_2$, ultimus corrugatus, vel subundulatus; columella angustata, umbilicum interiorem simulans. — Long. $^1/_2$ poll. (Say.)

Succinea undulata Say in Descr. of new terr. shells p. 24.

Habitat in Mexico.

Obs. «Similis S. ovali; differt sutura minus profunda et superficie anfractus ultimi magis undulata. Praeterea $^1/_2$—$^3/_4$ anfractus illam superat.»

46. S. texasiana Pfr.

T. oblonga, gracilis, striatula, alba, strigis sparsis pallide corneis notata; spira subturrita, acutiuscula; anfr. 4 convexi, ultimus spiram vix superans; columella subincrassata, parum recedens; apertura subobliqua, ovali-oblonga; perist. simplex, regulare. — Long. 11, diam. 5 mill. Ap. 6 mill. longa, medio $3^1/_2$ lata. (Coll. Roemer.)

Succinea texasiana Pfr. mss.

Habitat in Texas; legit Dr. Ferd. Roemer in insula Galveston.

Obs. Inter omnes species mihi notas Succ. chiloensis Phil. (Nr. 50) ad hanc proxime accedit.

---

*) T. subrotunda, inflata, tenui, lactea; spira brevi; suturis subimpressis; anfr. 3 rotundatis; apertura lato-ovata. (Lea l. c.)

47. S. progastor (Helix) Orbigny. †

T. globulosa, tenuis, diaphana, laevigata, succinea; spira conica, apice obtusa; apertura subrotunda; labrum acutum. — Long. 7 mill. (O.)

Helix progastor (Cochlohydra) *Orb.* syn. p. 2.
— — *Orb.* voy. p. 255. t. 22. f. 12—15.
Succinea progastor Beck ind. p. 99. N. 20.

Habitat in oris Brasilianis.

48. S. unguis (Helix) Férussac.

T. ovalis, depressissima, unguiculiformis, tenuis, subundulata, diaphana, succinea; spira nulla; apertura patula; columella laevigata. (O.) — Long. 24, lat. 15 mill. (ex icone aucta?) — Coll. Nr. 12?

Helix unguis Fér. Mus. teste Orb.
— — (Cochlohydra) *Orb.* syn. p. 2.
Omalonyx unguis Orb. voy. p. 229. t. 22. f. 1—7. *)
Amphibulima unguis Beck ind. p. 98. N. 1.

Habitat in Bolivia et Paraguay.

49. S. acquinoctialis Orbigny. †

T. oblonga, ventricosa, tenuis, diaphana, succinea; anfr. 3 apertura patula. (O.) — Dimens.?

Helix putris (Cochlohydra) *Orb.* syn. p. 2.
Succinea aequinoctialis Orb. voy. p. 231.
— *yncarum Beck* ind. p. 99. N. 15.

Habitat in provincia Guayaquilensi reipublicae Columbianae.

Obs. «Differt a S. putri forma magis inflata, abbreviata, apertura minus obliqua, basi latiore, etc.»

* * *

50. S. chiloensis Philippi.

T. oblonga, gracilis, ruditer striata, corneo-albida, solidula; spira subturrita, acuta; sutura mediocris; anfr. 3½—4 convexiusculi, ultimus ⅗ longitudinis vix aequans; columella substricte recedens, callo filari subincrassata; apertura subobliqua, ovali-oblonga, intus rugulosa, nitida; perist. simplex, margine dextro subrepando. — Long. 13, diam. 6 mill. Ap. 8 mill. longa, medio 4½ lata. (Coll. Nr. 13.)

Succinea chiloensis Phil. mss.

---

*) Omalonyx Orb. novum genus pro speciebus Succineae testa depressa, aperta, vix spirata, animale duplo minore distinctis institutum

Helix (Cochlohydra) *elongata γ Fér.* hist. t. 11 A. f. 11?

Habitat in insula Chiloë, ubi legit Philippi jun.

Obs. Specimina normalia figurae Ferussacianae citatae tam similia sunt, ut eandem speciem esse putes; sed teste Férussac specimina ibi figurata a Cl. Delalande in Promontorio bonae spei lecta sunt.

51. S. magellanica Gould. †

T. parva, tenuis, subflexilis, lucida, nitida, intense virens, rotundato-ovata; spira brevis, acuta, anfr. 3, sutura profunda discretis, ultimo amplo, ventricoso; apertura ovata; margo columellaris reflexiusculus, callo tenui superne munitus. — Long. $^1/_3$, lat. $^2/_9$ poll. (G.)

Succinea magellanica Gould 1846. Exped. shells p. 29.

Habitat in Terra Ignis (Gould).

52. S. semiglobosa Pfr.

T. ovato-semiglobosa, tenuis, laevigata, nitidissima, lutescenti-cornea; spira vix prominula, obtusa; anfr. 2, ultimus ventrosus: columella strictiuscula, oblique recedens; apertura rotundato-ovalis. — Long. 8, lat. $6^1/_2$, alt. 4 mill. Ap. $7^1/_2$ mill. longa, medio 5 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 14.)

Succinea semiglobosa Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1846. p. 109.

Habitat in insula Masafuera in littore chilensi (Cuming).

53. S. Gayana (Omalonyx) Orbigny. †

T. ovalis, depressa, unguiformis, radiata, fusca; spira nulla: apertura magna. — Alt. 10, lat. 7 mill. (O.)

Helix Gayana (Cochlohydra) *Orb.* syn. p. 2.

Omalonyx Gayana Orb. voy. p. 230. t. 22. f. 8—11.

Amphibulima Gayana Beck ind. p. 98. N. 2.

Habitat in insula Juan Fernandez.

54. S. mamillata Beck. †

T. diaphana, ovato-rotundata, ventricosissima, transversim creberrime striata; spira brevissima; apertura patula. — Long. $^1/_8$, lat. $^3/_8$ poll. (King.)

Succinea patula King in Zool. Journ. V. p. 343. Nec. Brug.

— *mamillata Beck* ind. p. 98. N. 2.

Habitat in insula Juan Fernandez.

55. S. fragilis King. †

T. ovato-acuta, diaphana, ventricosa, transversim striata, oblique subrugosa; spira brevis. — Long. $^9/_{16}$, lat. $^5/_{16}$ poll. (K.)

Succinea fragilis King in Zool. Journ. V. p. 343.

— — *Beck* ind. p. 98. N. 4.

Habitat in insula Juan Fernandez.

56. S. pinguis Pfr.

T. semiovata, tenuis, longitudinaliter striata, lineis impressis, transversis, magis minusve confertis sculpta, diaphana, corneo-lutea; spira brevissima, obtusa, mamillata; anfr. 2½ convexi; apertura patula, ovalis; columella leviter arcuata. — Long. 18, diam. 11 mill. Ap. 14½ mill. longa, medio 9 lata. (Mus. Cuming. et Coll. Nr. 15.)

Succinea pinguis Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 65.

Habitat in insula Masafuera orae chilensis (Cuming).

Obs. Num forte eadem ac praecedens?

* * *

57. S. groenlandica Beck. †

«Succineae amphibiae proxima, colore rubicundo anfractuum superiorum et apice obtusiore distinguitur. L. 4, 5. lin.» (Möll.)

Succinea groenlandica Beck ind. p. 99. N. 18.

— — *Möller* ind. moll. Groenl. p. 4.

Habitat in Groenlandia.

Obs. Huic sectioni adnumeranda est *Succ. Petitii Beck* ind. p. 98. N. 5, e Mexico. — Num etiam *Pelta Cumingi Beck* ind. p. 100?

§. 6.

58. S. Sagra Orbigny.

T. ovato-acuta, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, succinea; spira brevis, apice acuta; anfr. 3, penultimus convexiusculus, ultimus ventrosus, ¾ longitudinis subaequans; columella leviter arcuata, superne tenuissime callosa; apertura obliqua, subregularis, ovalis, superne subangulata. — Long. 12, diam. 7 mill. Ap. 9 mill. longa, medio 6 lata. (Coll. Nr. 16.)

Succinea Sagra Orb. moll. cub. I. p. 141. t. 8. f. 1—3.

— *fulgens Lea* in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32? *)

Habitat in insula Cuba.

59. S. contorta Adams. †

T. cornea; spira minima; anfr. 2⅓ perconvexi, perobliqui; apertura maxima, obliqua, elliptica. — Div. 80°. Spirae long. 0,08″. Long. tot. 0,23″. Lat. max. 0,21, min. 0,1 poll. (Ad.)

Succinea contorta Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 12

Habitat in insula Jamaica.

---

*) T. obliquo-ovata, fulgente, diaphana, striata, aurea; spira subelevata; suturis impressis; anfr. 3 convexis; apertura lato-ovata. — Cuba. (Lea l. c.)

60. S. tigrina Lesueur. †

T. ovalis, pellucida, tenuissima, subvirescens, maculis minimis subrufis aspersa; apertura ingentissima, patens, ovata; spira brevissima. — Long. 18—20 mill. (Dh.) — Long. 20; diam. 11 mill. Ap. 17 mill. longa. (ex ic. Fer.)

Helix tigrina (Cochlohydra) *Les. Fér.* pr. 6. Hist. t. 11 A. f. 4.
Succinea tigrina Gray in Ann. of Phil. 1825. IX. p. 415.
— — *Desh.* in Encycl. méth. II. p. 19. N. 1.
— — *Lam.* ed. Dh. 10. p. 320.
Amphibulima tigrina Beck ind. p. 98. N. 3.

Habitat in insula St. Vincent.

61. S. Cuvierii Guilding. †

T. nitens, diaphana, pallide succinea, immaculata, oblique plicata; anfr. 2 superiores obsoletiores. (G.) — Long. 11, diam. 8 mill. (Desh.)

Succinea Cuvierii Guild. in Zool. Journ. II. p. 443. t. suppl. 17 bis. f. 1—5.
— — *Lam.* ed. Dh. 5. p. 318.
— *Cuvieri Beck* ind. p. 99. N. 16.

Habitat in insula St. Vincent.

62. S. barbadensis Guilding. †

T. flavescens, saepe subopaca, longitudinaliter subplicata; spira producta; anfr. 4. — Long. 4—5 lin. (G.) — Long. 12—14, diam. 8—9 mill. (Desh.)

Succinea barbadensis Guild. in Zool. Journ. III. p. 532. t. suppl. 27 f. 4—6.
— — *Beck* ind. p. 99. N. 19.
— — *Lam.* ed. Dh. 6. p. 318.
Helix elongata β Fér. hist. t. 11 A. f. 2. 3. (teste Beck.)

Habitat in insula Barbados.

Obs. Affinis Succ. Cuvierii. (Guild.)

63. S. haliotidea Mittre. †

T. ovato-oblonga, pellucida, laevigata, tenuissima, lutescens, transversim leviter striata; apertura ingentissima, patens; spira nulla vel minutissima. — Long. 10, latit. 6 mill. (M.)

Succinea haliotidea Mittre in Revue zool. 1841. p. 65.

Habitat in insula Martinique.

Obs. «Persimilis Testacellae haliotideae.»

64. S. Candeana Lea. †

T. obliquo-ovata, subnitida, obsolete varicosa, diaphana, aurea; spira brevis; suturae subimpressae; anfr. 3 inflati; apertura longo-ovata. (L.) — Dimens.?

Succinea Candeana Lea in Proc. Amer. phil. Soc. 1841. II. p. 32.

Habitat in insula Martinique.

65. S. rubescens Deshayes.

T. ovata, tenuis, striatula (sub lente obsolete minutissime reticulata), rosea absque nitore; spira brevissima, obtusa; anfr. 3 convexiusculi, ultimus inflatus, $^{1}/_{5}$ longitudinis aequans; columella perarcuata; apertura amplissima, late ovalis, basi dilatata, superne subangulata. — Long. 18, diam. 12 mill. Ap. 15 mill. longa, medio 10 lata. (Coll. Nr. 17.)

Succinea rubescens Desh. in Guér. mag. 1830. t. 4.
— — *Desh.* in Encycl. méth. II. p. 20. N. 4.
— — *Guérin* Iconogr. Moll. t. 6. f. 8.
— — *Lam.* ed. Dh. 9. p. 319. *)

Helix rubescens (Cochlohydra) *Fér.* hist. t. 9 B. f. 3.

Amphibulima rubescens Beck ind. p. 98. N. 5.

Habitat in insula Guadeloupe.

66. S. depressa Rang. †

T. ovalis, latissima, fragilis, opaca, epidermide crassa virenti-flava induta; spira minima, depressa, vix distincta; apertura ovalis, maxima. — Long. 13, diam. $8^{3}/_{4}$ mill. (R.)

Succinea depressa Rang in Guér. mag. 1834. t. 55.

Habitat in insula Guadeloupe.

Obs. «An = Amphibulima tigrina Les.?» (Beck.)

67. S. appendiculata Pfr.

T. ovalis, depressa, tenuis, subtilissime striatula, vix nitida, roseo-lutescens; spira minima, vix prominula; anfr. 2, ultimus vix convexus; columella callosa, aperta, appendicula dilatata, torta superne munita; apertura regulariter ovalis; perist. simplex, margine dextro superne subsinuoso. — Long. 14, diam. 9, alt. $4^{1}/_{3}$ mill. Ap. fere 14 mill. longa. (Coll. Nr. 18.)

Succinea appendiculata Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 146.

Habitat in insula Guadeloupe. (Benevole communicavit Cl. Petit.)

Obs. Forma persimilis praecedenti, at bene distincta columella appendice torta quasi duplicata, spira subpapillatim prominula et peripheria magis regulari.

* * *

*) T. ovata, tenui, pellucida, rubescente, substriata; apertura ovali, amplissima, obliqua; spira brevi, obtusa. — Long. 22, diam. 13 mill. (Desh. l. c.)

68. S. patula (Bulimus) Bruguière. †

T. ovata rugosa depressa, spira brevi obtusa, apertura magna subquadragona. — Long. 15, lat. 11, alt. 6 lin. (Brug.

Bulimus patulus Brug. in Encycl. méth. I. p. 305. N. 15.
Amphibulima cucullata Lam. Ann. du Mus. VI. t. 55. f. 1.
— *patula Beck* ind. p. 98. N. 4.
Amphibulimus cucullatus Montf. p. 91. t. 23.
Helix patula (Cochlohydra) *Fér.* pr. 7. Hist. t. 11. f. 14—16 t. 11 A. f. 12. 13.
— — *Wood* suppl. t. 7. f. 9.
— *cucullata Schweigg.* Naturgesch.
Succinea cucullata Lam. 1. p. 134.*) ed. Dh. p. 315.
— — *Blainv.* Malac. p. 455. t. 37. f. 2.
— — *Sow.* Gen. of shells f. 1.
— — *Reeve* Conch. syst. II. t. 180. f. 1.
— *patula Sow.* Conch. Manual f. 266.

Habitat in insula Guadeloupe.

Obs. 1. Species magnitudine et forma irregulari ab omnibus distinctissima. Anfr. 4, ultimus superne ad dextram angulatim protractus. — Long. 32, diam 21 mill. Ap. 24 mill. longa, supra basin 17 lata. (ex ic. Féruss.)

Obs. 2. Succineae in universum quoad testam peraffines sunt Bulimi in §. §. 23 et 24 enumerati, qui conferantur.

---

*) T. ovato-inflata, tenui, flavescente; striis oblique transversis; spira brevissima, rubra; apertura valde patula. — Long. 14, diam. 9½ lin. (Lam. l. c.)

ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 4 post lin. 12 adde:

4ª. B. imperator Pfr.

T. imperforata, ovato-conica, solida, striatula, strigis nigris, fulvis et albidis alternantibus, interdum interruptis elegantissime picta; spira elongato-conica, acutiuscula; anfr. 6 superiores planiusculi, 2 ultimi convexi, ultimus spira multo brevior; columella subverticalis, basi extrorsum subdentata, carneo-livida; apertura truncato-ovalis, intus coerulescens; perist. late expansum, nigro-marginatum, margine dextro vix arcuato. — Long. 68, diam. 38 mill. Ap. 36 mill. longa, intus medio 23 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus imperator Pfr. in Proc Zool. Soc. 1848.

Habitat in insulis Philippinis.

Obs. Differt a B. Pithogastro et affinibus spira elongata, acuta, aperturae forma, etc.

Pag. 6 post lin. ult. adde:

11ª. B. monozonus Pfr.

T. imperforata, conoideo-ovata, solidula, longitudinaliter oblique plicata, saturate castanea; spira conoidea, obtusa; anfr. 5½ convexi, ultimus spira paulo brevior, ad peripheriam cingulo lato albo ornatus; columella subverticalis, basi extrorsum subtuberculata; apertura lunato-ovalis, intus margaritacea; perist. obtusum, vix expansiusculum, margine basali cum columella angulum obtusum formante. — Long 52, diam. 32 mill. Ap. 30 mill. longa, medio 21 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus monozonus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat in insulis Philippinis.

Obs. Forma B. Ticaonico similis; differt sculptura, anfractibus convexioribus etc.

Pag. 9 post lin. 12 adde: *Helix pastorella Val.* Mus. Par.
- 11 - - 33 - *Achatina? modesta Pfr.* Symb. II. p. 134.
- 14 - - 26 - *Achatina? pyramidalis Pfr.* Symb. II. p. 134.

Pag. 15 post lin. 10 adde: *Achatina? incompta Pfr.* Symb. II. p. 133.
- 21 - - 21 - *Helix ovipara Portl.* catal.
- 24 - - 22 -

60ª. B. leptochilus Pfr.

T. imperforata, oblongo-ovata, solidula, striata et malleata, sub epidermide olivacescente castaneo-marmorata; spira elongato-conica, obtusa; anfr. 6 vix convexiusculi, ultimus spiram vix superans; columella recedens, obsoletissime plicata; apertura oblonga, angusta; perist. breviter expansum, simplex, tenue, pallide carneum, marginibus callo tenuissimo junctis. — Long. 98, diam. 40 mill. Ap. 54 mill. longa, medio 24 lata. (Mus. Cuming.)

Bulimus leptochilus Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848.

Habitat prope La Baja in prov. Pamplona Novae Granadae (Funck).

Obs. Variat magnitudine. Constanter differre videtur a B. Moritziano forma magis oblonga, apertura angustiore, plica columellae obsoleta et peristomate tenui, pallido. — An nihilominus ejus var.?

Pag. 33 post lin. 32 adde: *Helix ovoidea* (Cochlostyla) *Fér.* pr. 328. Hist t. 112. f. 5. 6.
Orthostylus ovoideus Beck ind. p. 50. N. 8.
- 33 - - 40 - *Helix monogramma Val.* Mus. Paris.
- 55 - - 2 - *Helix planidens Rang* in Ann. sc. nat. XXIV. p. 54.
- 60 - - 16 - *Bulimus pulchellus (Sow.) Pfr.* Symb. II. p. 120.
- 61 - 12 - *Helix Protea Orb.* synops. p. 14. N. 81.
- 73 - - 15 - *Helix substriata Gmel.* 218. (Beck.)
- 83 - - 29 - *Clausilia Pantagruellina Villa* disp. syst. p. 25.
- 86 - - 38 - *Bulimulus vitreus Beck* ind. p. 64. N. 12?
- 87 - - 13 - *Pupa dentata Gray* in Wood ind. p. 50.
- 91 - - 3 - *Helix columba* (Cochlogena) *Fér.* pr. 412. *Seba* Thesaur. t. 71. f. 6. p. 169.
- 92 lin. 4 lege: *Bulimus Listeri Gray* in Wood suppl. p. 32.
- 92 post lin. 8 adde: *Helix Listeri Wood* suppl. t. 7. f. 23.
- 93 - - 29 - Obs. Ab hac specie vix diversa videtur testa nuperrime a Cl. *Fischer de Waldheim* in Bull. de la Soc. de Mosc. XXI. (1848.) P. 1 (ab auctore benevolenter mecum communicat.) nomine *Chilonopsis sulcatae* descripta et icone (t. 3. f. 1. 2) illustrata. — Genus novum: *Chilonopsis* sic definitur: testa turrita spiris 7 convexis; umbilicata: apertura elongata, angustata, inaequali, columella valde dilatata, intus et infra sinuata, extus marginata, basi canalem coecum cum labio dextro intumido, extus triplicato formante. Species sic describitur: Ch. turrita septemstriata, spiris

convexis, longitudinaliter sulcatis. — Altit. 6. millim.; diameter spirae primae 30 millim. — Hab. in St. Jago Americae meridionalis.

Pag. 99 post lin. 13 adde: *Helix uniangulata Fér.* Mus.
- 116 - - 6 - *Helix helvola Fér.* Mus. Paris.
- 116 - - 18 - *Helix scobinata Fér.* (teste Beck.)
- 120 - - 39 - *Helix montana* (Cochlogena) *Fér.* pr. 425.
- 144 - - 5 - *Bulimus carinatus Perry* t. 30. f. 1?
144 - - 9 - *Achatina undata Pfr.* Symb. I. p. 29.
- 144 - - 26 - *Achatina melanocheila Pfr.* Symb. II. p. 134.
- 151 - 32 - *Helix decollata β Gmel.* p. 3651.
- 155 - - 12 *Helix septenaria* (Cochlicella) *Fér.* pr. 384.
- 164 - - 32 - *Helix oryza Fér.* pr. 380.
- 188 - - 16 - *Buliminus sordidus Beck* ind. p. 70. N. 20.
- 188 - - 31 - *Bulimus ovum Desh.* in Cuvier règne an.
- 200 - - 36 - *Helix intertexta Fér.* Mus.
- 215 - - 24 - *Bulimus fasciatus Turt.* Man. f. 67.
- 216 - - 18 - *Bulimus agnatus Zgl.* in sched.
- 226 - - 28 - *Pupa apicata Mühlf.* Mus.?
- 229 - - 14 -

628ª. **B. lineatus Bruguière.** †

T. conica, turrita, nitida, anfractibus lineis 5 transversis aliisque longitudinalibus notata, apertura subrotunda. (Br.)

Bulimus lineatus Brug. Encycl. méth. I. p. 323. N. 43. (Chemn. IX. f. 1263. n. 1—4.)

Cochlicellus lineatus Beck ind. p. 63. N. 7?

Habitat in insula Guadeloupe (Badier, Brug.).

Pag. 231 post lin. 22 adde: *Bulimus bacillus* (Helix) *Fér.* Mus. Par.
- 241 - - 2 - *Bulimus textilis Pfr.* Symb. II. p. 123.
- 257 - - 16 - *Bulimus ustulatus Menke* syn. ed. II. p. 27?
- 261 - - 6 - *Glandina nitens Pfr.* Symb. II. p. 135.
- 266 - - 11 - *Helix octona* (Cochlicopa) *Fér.* pr. 369.
— *peregrina Gmel.* 223?
- 266 - - 26 - Obs. Varietatibus adnumerandi sunt *Bul. columnaris* et *novenarius Zgl.* Mus.
- 272 - - 28 - *Helix stagnorum Pult.?* (Mont.)
- 288 - - 1 - *Bulimus Mülleri Orb.* voy. p. 256.
- 289 - - 16 - *Achatina tumida Parr.* in sched.
- 297 - - 26 - *Achatina funiculata* (Helix) *Val.* Mus. Paris.
- 297 - - 11 - *Achatina Phoenix* (Hel.) *Val.* Mus. Paris.
- 297 - - 27 - *Achatina tetrao* (Hel.) *Val.* Mus. Paris.

298 lin. 2 lege: 1. **G. Lyonetianus (Hel.) Pallas.**

Pag. 305 post lin. 22 adde: *Helix minuta Müll.* verm. II. p. 101. n. 299?
- 343 - - 31 - *Helix granum* (Cochlodonta) *Fér.* pr. 483.
- 369 - - 34 - *Helix decollata γ Gmel.*
- 394 - - 27 - *Leptinaria unilamellata Beck* ind. p. 79. N. 1?
- 463 - - 5 - *Clausilia rugosa γ Drap.?* (Mich.)
- 474 - - 31 - *Clausilia rugosa γ Nilss.?*
- 475 - - 31 - *Bulimus perversus Brug.* Enc. méth. I. p. 351. n. 92?
- 476 - - 24 - *Helix dubia* (Cochlodina) *Fér.* pr. 541.

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM ET SUBGENERUM HELICEORUM

IN MONOGRAPHIA RECENSITORUM.

Abida Leach Synops. moll. brit. (1820) p. 165. — Genus teste Turton ab auctore in libro nunquam edito a Pupis separatum, serius a Gray in subgeneribus Pupae et in Synops. of the brit. Mus. (1842.) in generibus Helicidarum adoptatum.

Acanthinula Beck in Amtl. Ber. üb. d. Vers. in Kiel (1846.) p. 122. — Subgenus Helicis e typis Hel. aculeatae et lamellatae.

Acave Krynicki in Bull. Mosc. IX. (1836.) p. 157. — Subgenus Helicis ex typo Helicis nemoralis L. Vid. Acavus Blnv.

Acavus Montf. Conch. syst. (1810) II. p. 234. — Genus ab Helice separatum ex typo Hel. haemastomae L., in eodem sensu inter subgenera Helicis adoptatum a Beck (ind. p. 37.) et Hartm. (Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 165.)

Acavus Blainville in Dict. sc. nat. 1824. v. 32. p. 253 (Acave) et Malacol. p. 460. — Sect. Helicis ex typo Hel. nemoralis L.

Achatina Lamarck. Vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XXI.

Achatinella Swains. Vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XX.

Achatinus Montf. Conch. syst. II. p. 418. — Genus ab Achatina sejunctum, excluso Liguo et Polyphemo. Typus: Bulla zebra Chemn.

Acicula Risso hist. IV. (1826.) p. 84. — Genus Helicidarum pro Bucc. acicula Müll. institutum, a Cl. Herrmannsen (Ind. gen. Mal. I. p. 11. adnot.) adoptatum, a Beck et Gray inter subgenera Achatinae enumeratum.

Actinota Hartm. Syst. Uebers. (1840.) — Subgen. Helicis ex typo non designato.

Aegopis Fitzinger syst. Verz. (1833.) p. 99. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. verticilli Fér. — (Subgenus Agopis Hartm. syst. Übers. errore typogr. ortum, idemque designare videtur.)

Alaea Jeffreys in Linn. Trans. XIII. (1820.) — Genus a Pupa segregatum e typis diversis.

= Vertigo Auctt.

Alaea Beck ind. p. 85. — Subgenus Pupae e typo P. antivertiginis Drap., aliisque.

= Vertigo Müll. et Pupae sp.

Ampelita Beck ind. p. 30. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium.

Amphibina Hartm. in Neue Alpina I. p. 208. — Gen. unic. Cochlearum amphibiarum.

= Succinea Drap.

Amphibulima Lamarck in Ann. du Mus. VI. p. 304.

= Succinea Drap.

Amphibulima Blainv. Malac. p. 455. — Subgenus Succineae pro speciebus apertura permagna praeditis institutum (ex typo Bulimi patuli Br.), in eodem sensu a Beck (ind. p. 98.) adoptatum.
= Succineae spec.

Amphibulimus Montf. Conch. syst. II. p. 90.
= Succinea Drap.

Amphibulina Hartm. in Sturm Fauna VI. H. 5. p. 42. (Nomen ab auctore serius in Amphibina mutatum, quia nomen genericum *Succineae* minus aptum ei videbatur.)
= Succinea Drap.

Anastoma Jan catal. p. 2. — Subgenus Helicis, pro Hel. ringente L. institutum, a Swainson in El. of Conch. (1835.) adoptatum, serius huic auctori subgenus Lucernae, a Sowerby (Conch. Man.) et Catlow (Conch. Nom.) inter genera Colimaceorum adoptatum.
= Anostoma Fischer.

Andraea Hartm. mss. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. dubiae Drap., testibus auctoris litteris et speciminibus.

Angystoma Schum. essai p. 229. — Genus ex typo Hel. ringentis L. institutum.
= Anostoma Fischer.

Anostoma Fischer Vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XVII.

Aplodon Rafin. in Journ. phys. tom. 88. (1819.) p. 425. — Genus ex typo dubio ab Helice separatum.

Apoma Beck ind. p. 189. — Subgenus Clausiliae ex typo Turbinis elongati Chemn.
= Cylindrella §. 5.

Arianta Leach moll. brit. p. 86 teste Turt. — Genus pro H. arbustorum L. institutum, a Beck, Hartm. et Gray inter subgenera Helicis adoptatum.

Ariophanta Desmoulins in Act. Soc. Linn. Bord. III. (1833.) p. 227. — Subgenus Helicis ex observatione animalis Hel. laevipedis Müll. formatum (assentiente Féruss. in Bull. zool. 1835. p. 108.), a Beck (ind. p. 5.) inter subgenera Naninae adoptatum.

Artemon Beck ind. p. 48. — Genus Helicidorum non definitum, species plures ad Streptaxin referendas continens.
= Streptaxis Gray et Helix sp.?

Astrodonta Hartm. syst. Übers. — Subgenus Chondri ex typo non definito.

Auricula Swains. Malac. p. 180. 335. — Subgenus Bulimi, species a Lamarck Auriculae adnumeratas continens.

Auris Chemnitz Conch. Cab. XI. p. 287. — Genus haud definitum, species Bulimi complectens, a Spix in tabulis simili modo adoptatum.

Azeca Leach moll. p. 122 teste Turton. — Novum genus ex typo Turbinis tridentis Pult., tamquam genus a Fleming inter Pupadas, a Gray inter Helicina, a me (Symb. I. et II.) inter Helicea, tamquam subgenus Bulimi ab Hartmann, subg. Achatinae a Beck adoptatum.
= Achatina §. 7.

Balaea Leach moll. p. 116 teste Turton. — Genus pro Turbine perverso L. institutum, pari modo ab Alder, Gray et Thompson adoptatum.
= Balea § 1.

Balea Prideaux. Vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XXIV.

Balea Villa disp. syst. p. 25. — Genus Conchyliorum terrestrium, praeter Baleae §. 1 Cylindrellas nonnullas complectens.

Balia Swainson Malacol. p. 334. — Subgenus Clausiliae.
= Balea §. 1.

Belonis Hartmann syst. Übers. — Subgenus Bulimi ex typo non designato.

Bombyx Humphrey Mus. Calonn. — Genus ad Helicea pertinens teste Férussac prodr. p. 78.

Bostryx Troschel in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 49. — Subgenus Bulimi ex typo novo.
= Bulimus §. 26. (sp.)

Brachypodella Beck ind. p. 89. — Subg. Pupae ex typo Claus. collaris Lam.
= Cylindrella §. 3. 4.

Brachypodisca Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Brachypodella.

Brachypus Guilding in Zool. Journ. IV. (1828.) p. 167. — Genus Helicidarum ex typo Clausiliae collari Lam. affini.
= Cylindrella §. 4.

Bradybaena Beck ind. p. 18. — Subg. Helicis e sectione intusmarginatarum, ex typo Hel. incarnatae Müll. etc.

Brephulus Beck ind. p. 72. — Subg. Bulimi e sectione tenuilabrium ex typo Bul. fasciolati Oliv.

Bulimina Ehrenberg Symb. phys. (1831.) — Subgenus Chilodontis ex typo Bulimi labrosi Oliv.

Buliminus Beck ind. p. 68. — Subg. Bulimi e sectione tenuilabrium, charactere non definito.

Bulimulus Leach Zool. Misc. I. (1814.) p. 41. ed. Chenu p. 11. — Genus a Bulimo sejunctum pro Hel. exili Gmel., simili sensu a Guilding in Bulimidis et a Gray in Helicidis, tamquam subgenus Bulimi a Blainville, Beck et Swainson adoptatum.

Bulimulus Risso hist. IV. p. 78. — Genus Helicidarum ex typo Hel. detritae Müll. institutum, inter subgenera Bulimi a Charpentier admissum.

Bulimus Scopoli. Vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XIX.

Bulimus Charpentier catal. (1837.) p. 13. — Genus molluscorum terrestrium in subgeneribus: Polyphemo, Folliculo et Bulimulo Achatinas et Bulimos complectens, simili sensu a d'Orbigny 1841 (moll. cub. I. p. 137.) in Colimacidis adoptatum.

Bulimus Beck ind. p. 51. — Subgenus Bulimi, praecipue species typo Scopoliano affines complectens.

Bulimus Swainson Malac. p. 335. — Subgenus Bulimi. Typus: B. melanostomus.

Bulinus Studer syst. Verz. p. 17. — Subg. Glischri. Nomen novum Bulimo male substitutum, ab Hartmann, Charpentier, Broderip et Sowerby etiam usitatum.

Caecilioides Herrmannsen ind. gen. Mal. I. p. 150: vid. Cecilioides.

Callicochlias Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Calocochlea.

Calocochlea Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 163. — Subgenus Helicis ex typo Hel. pulcherrimae Sow.

Campylaea Beck ind. p. 24. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium, e typis Hel. planospirae Lam., Raspailii Payr. etc.

Cantareus Risso hist. IV. p. 64. — Genus Helicidarum ex typo Hel. apertae Born.

Canthareus Agassiz Nom zool. Ind. univ. vid. Cantareus.

Caprella Guilding olim in Linn. Trans. XIV. vid. Plekocheilus Guild.

Caprinus Montfort Conch. syst. II. p. 142. — Genus ab Helice separatum ex typo Helicis lucernae Müll.

Caracolina Ehrenb. Symb. phys. — Subgenus Chilodontis ex typo H. lenticulae F.

Caracolla Broderip in Proc. Zool. Soc. 1832.
= Carocolla Lam.

Caracolla Beck ind. p. 31. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium. Typi: Hel. carocolla, lampas etc.

Caracolla Swains. Malac. p. 328. — Subgenus Lucernae. Typi: H. lapicida et tectiformis.

Caracolla Ehrenb. Symb. phys. — Subgenus Chilogymni.

Caracollina Beck ind. p. 28. — Subg. Helicis e sectione reflexilabrium e typis variis.

Caracolus Montf. Conch. syst. II. p. 138. — Gen. pro Hel. Carocolla L. institutum.

Carocolla Schum. essai p. 192. — Genus Helices carinatas complectens, a Lamarck et aliis eodem sensu, a Blainville, Cuvier, Charpentier tamquam subgenus Helicis adoptatum.

Carychium Leach Zool. Misc. I. p. 84. Ed. Chenu p. 10. — Genus a cognomini Mülleriano diversum, Bulimos auriculaceos complectens.

Cecilioides Féruss. teste Blainv. in Dict. sc. nat. v. 7. p. 332. — Genus pro Achatina acicula propositum, tamquam subgenus Bulimi a Beck in Amtl Bericht 1846. p. 122 adoptatum.

Cepaea Held in Isis 1837. p. 910. — Genus Helicum ex typo Hel. nemoralis L.

Cepolis et

Cepolum Montf. Conch. syst. II. p. 150. — Genus ab Helice disjunctum ex typo Hel. cepae Müll.

Chersina Humphr. Mus. Calonn. — Genus Bulimos et Achatinas complectens teste Férussac prodr. p. 78.

Chersina Beck ind. p. 74. — Subgenus Achatinae. Typi: A. fasciata et virginea.

Chilodon et

Chilogymnus Ehrenb. symb. phys. — Genera primaria Heliceorum, e dentium existentia vel absentia constituta. Chilogymni subgenera: Helix, Carocolla, Bulimus, Pupa; Chilodontis subgenera: Helicodon, Caracolina, Bulimina, Pupina, Clausilina.

Chilonopsis Fisch. de Waldheim 1848. Bull. Mosc. XXI. P. 1. — Novum genus testarum e familia Helicum. Conf. Addenda p. 534.

Chilostoma Fitzinger syst. Verz. p. 98. — Genus Helicoideorum e typis Hel. corneae Drap. et pulchellae Müll., simili latitudine a Charpentier inter subgenera Helicis adoptatum.

Chilotrema Leach moll. p. 106 teste Turton. — Genus ex typo Hel. lapicidae L., a Gray in Synopsi Mus. Brit. inter genera Helicidarum sect. f. enumeratum, Beckio (ind. p. 28.) subg. Helicis e sectione reflexilabrium.

Chimotrema Rafin. in Journ. de phys. tom. 88. p. 425. — Genus ab Helice separatum ex typo ignoto (teste Herrm. ind. I. p. 225.).

Chloritis Beck ind. p. 29. — Subgenus Helicis e sectione tenuilabrium. Typi: H. ungulina L. et nautiliformis Porro.

Chondrium Herrmannsen vid. Chondrula Beck.

Chondrula Beck ind. p. 87. — Subgenus Pupae ex typo Hel. tridentis Müll.

Chondrus Cuvier règne anim. II. p. 408. — Subgenus Helicis e typis variis, partim ad Bulimum, partim ad Pupam referendis, eadem latitudine a Cristofori et Jan inter genera Cochloideorum adoptatum.

Chondrus Hartm. in Neue Alpina I. p. 206. 218. — Genus Geophilorum depuratum ex typo Pupae frumenti Drap., eodem sensu Charpentiero subgenus Pupae.

Chondrus Krynicki in Bull. Soc. Mosc. VI. p. 395. — Genus Cuvierianum emissis Pupis depuratum, ex typo Hel. tridentis Müll.

Chromatocochlias Agassiz Nom. zool. Ind. univ. v. Chromococlea.

Chromococlea Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. II. 5. p. 137. — Subgenus Helicis ex typo Hel. turbinoidis Brod.

Cingulifera Held in Isis 1837. p. 911. — Genus Helicum e typo Hel. cingulatae Stud.

Cionella Jeffreys in Linn. trans. XVI. — Genus pro Achat. lubrica et acicula institutum.

Cionella Beck ind. p. 79. — Subgenus Achatinae ex typis Achatinae folliculi et lubricae, ex sententia Herrmannseni ad Bulimos referendum.

Circinaria Beck ind. p. 23. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium Typi: Hel. planorboides et pulchella.

Clausilia Drap. Vide Monogr. I. Introd. p. XXV.

Clausilia Beck ind. p. 89. — Genus Bulimidorum, includens subgenera: Baleam, Apoma et Clausiliam.
= Balea §. 1, Cylindrella §. 5, et Clausilia.

Clausilia Anton Verz. p. 45. — Genus Heliceorum, complectens subgenera: Clausiliam, Strobilum, Vertiginem et Pupam.
= Clausilia, Tornatellina et Pupa.

Clausilia Swainson Malac. p. 334. — Genus Achatinarum, in subgeneribus: Pupella, Eruca, Balia, Clausilia, Macrodonte typos diversissimos confundens.

Clausilina Ehrenb. Symp. phys. — Subgenus Chilodontis.
= Clausilia.

Cobresia Hübner monogr. verm. testac. teste Féruss. prodr.
= Vitrina.

Cochlicella Férussac prodr. p. 52. — Subgenus Helicis e typis valde diversis conflatum.

Cochlicella Risso hist. IV. p. 77. — Genus Helicidarum ex typo Bul. acuti Drap. (emendato subgenere Ferussaciano) constitutum.

Cochlicellus Beck ind. p. 62. — Subgenus Bulimi ex typo eodem, additis pluribus alienis.

Cochlicopa Férussac prodr. p. 50. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum, species diversas confundens.
= Achatinae pars.

Cochlicopa Risso hist. IV. p. 79. — Genus Helicidarum, solam Achat. lubricam continens.

Cochlicopa L. Pfeiffer Symb. I. p. 6. — Genus Heliceorum.
= Achatina §. 8—12.

Cochlitoma Férussac prodr. p. 48. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum.
= Achatinae pars.

Cochlocopa Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Cochlicopa.

Cochlodina Férussac prodr. p. 61. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum e typis diversis.
= Cylindrella, Balea, Clausilia.

Cochlodon Lowe Faun. Mader. 1833 et Orbigny in Guérin Mag. 1835. N. 61. — Subgenus Helicis, Cochlodontae Fér. analogum.
= Pupa.

Cochlodonta Férussac prodr. p. 58. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum.
= Pupa.

Cochlogena Férussac prodr. p. 53. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum, e typis diversissimis.
= Bulimus. (pars.)

Cochlohydra Férussac prodr. p. 26. — Subgenus Helicis.
= Succinea.

Cochlostyla Férussac prodr. p. 47. — Subgenus Helicis e sectione cochloidearum, e typis variis.
= Helicis et Bulimi sp.

Cochlotoma Agassiz Nom. zool. ind. univ. vid. Cochlitoma.

Cochlycopa Swainson Malac. p. 335. — Subgenus Achatinae ex typo Ach. glandis Chemn.

Coenatoria Held in Isis 1837. p. 910. — Genus Helicum ex typo H. pomatiae.

Columna Perry Conchology. — Genus pro Buccino columna Müll. institutum, eodem sensu a Schumacher et Schmidt adoptatum, Beckio subgenus Achatinae.

Columna Spix test. bras. t. 10. — Genus e typis variis constitutum, similiter a Villa (disp. syst. p. 20.) adoptatum.
= Bulimus §. 21. 24, et Achatina §. 5.

Columna Cristofori et Jan catal. p. 4. — Genus Cochloideorum e typis Ach. octonae, aciculae, folliculi et lubricae compositum.

Columplica Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 187. — Subgenus Helicis ex typo Hel. unidentatae Chemn.

Conulus Fitzinger syst. Verz. p. 94. — Genus Helicoideorum ex typis Hel. fulvae et Cobresianae, eadem latitudine a Charpentier et Hartmann inter subgenera Helicis adoptatum.

Corneola Held in Isis 1837. p. 912. — Genus Helicum ex typo Hel. corneae Drap. (Hoc genus et Cingulifera formant Campylaeam Beck.)

Crenea Risso hist. IV. p. 83. — Genus Helicidarum dubium.

Cryptomphalus Agass. mss. teste Charpentier. — Genus ab Helice separatum, Charpentiero (cat. moll. Suisse p. 5.) subgenus Helicis ex typis H. nemoralis et arbustorum.

Cyclodontina Beck ind. p. 88. — Subgenus Pupae, praeter Bulimos nonnullos dentatos species continens mihi incognitas.

Cylindrella L. Pfeiffer. Vid. Monogr. I. Introd. pag. XXIII.

Cylindrus Fitzinger. syst. Verz. p. 107. — Genus Helicoideorum ex typo Pupae obtusae Drap.

Daedalochila Beck ind. p. 21. — Subgenus Helicis e sectione planilabrium. ex typo H. auriculatae Say.

Daudebardia Hartmann. Vid. Monogr. I. Introd. pag. XII.

Daudebartia Beck ind. p. 5. — Genus Helicidorum.
= Daudebardia.

Delima Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 156. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. laevissimae Ziegl.
= Clausilia §. 13.

Delomphalus Agassiz teste Charp. — Genus ab Helice separatum, Charpentiero (cat. p. 12.) subgenus Helicis ex typis Hel. rotundatae et pygmaeae, in Gray Syn. Brit. Mus. inter genera Helicidarum sect. f enumeratum (typo non designato).

Delomphalus Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 120. — Subgenus Helicis a praecedente diversum, ex typo H. rupestris Drap.

Deloplecta Agassiz Nom. zool. et Herrmannsen ind. I. p. 374. (nec in Charp. cat. 1837.) — Subgenus Pupae? — Typus mihi ignotus.

Dentellaria Schumacher essai p. 230. — Genus ab Helice separatum ex typis Hel. fuligineae Fér. (teste Beck) et sinuatae Müll., a Gray (Syn. Br. Mus.) inter genera Helicidarum enumeratum typo non designato.

Dentellaria Beck ind. p. 34. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium, a praecedente emisso typo H. sinuatae (Pleurodonta Fisch.) discrepans.

Discodoma Swainson Malac. p. 329. — Subgenus Lucernae, ex speciebus Carocollae Lam. variis compositum.

Discus Fitzinger syst. Verz. p. 99. — Genus Helicoideorum ex typis Helicis rotundatae et crystallinae.

Dontostoma Hartmann syst. Übers. — Subgenus Pupae typo non designato.

Dorcasia Gray ined. in Mus. Brit.! — Subgenus Helicis (vel genus?) ex typo Hel. Alexandri.

Drepanostoma Porro in Guér. mag. 1836. t. 71. — Genus ab Helice separatum ex typo Hel. nautiliformis, ab Anton et Hartmann inter subgenera Helicis adoptatum.

Dyodonta Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 155. — Subgenus Clausiliae ex typo Claus. laminatae Turt.

Elasmatina Petit in Proc. Zool. Soc. Lond. 1843. p. 2. — Genus Helicidarum. = Tornatellina.

Elisma Leach moll. p. 109. test. Turt. et Gray. — Genus a Bulimis sejunctum ex typo Hel. acutae Müll., a Gray inter subgenera Bulimi adoptatum.

Ena Leach moll. p. 112. test. Turt. et Gray. — Genus a Bulimis segregatum ex typo Bul. montani Dr., a Gray et Hartmann subgeneribus Bulimi adnumeratum, a Beck (Amtl. Bericht Kiel 1846. p. 122.) pro Bul. obscuro adoptatum.

Endostropha Agassiz Nom. zool. et Herrmannsen ind. I. p. 421. (Nec in Charp. cat. 1837.) — Genus vel subgenus Pulmonatorum, an huc pertinens?

Epistyla Swainson Malac. p. 331. et

Epistylia Swainson Malac. p. 165. — Subgenus Helicis ex typo Trochi australis Chemn.

Epistylium Gray Syn. Brit. Mus. — Genus Helicidarum sect. f, typo non designato. An idem ac praecedens?

Eruca Swainson Malac. p. 334. — Subgenus Clausiliae, species Pupae et (err. typ.?) Balcae includens.

Eucore Agassiz teste Charp. — Subgenus Pupae ex typo Hel. tridentis Müll., a Charpentier (cat. moll. Suiss. p. 15.) et Hartmann eodem sensu adoptatum.

Euglypta Agassiz Nom. zool. (Cl. Herrmannsen ind. I. p. 431.) nec in Charp. cat. 1837. — Subgenus Heliceorum?

Eulota Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 179. — Subgenus Helicis ex typo Hel. fruticum Müll.

Euparypha Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 204. — Subgenus Helicis ex typo Hel. pisanae Müll.

Euparyphia Hartmann syst. Übers. vid. Euparypha.

Euphemia (Leach teste) Beck in Amtl. Bericht v. Kiel (1846.) p. 122. Subgenus Helicis ex typo Hel. obvolutae Müll. (a Gray nusquam memoratum).

Eurycratera Beck ind. p. 45. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium ex typis diversissimis.

Euryomphala Beck ind. p. 8. — Subgenus Helicis e sectione tenuilabrium, e typis diversis.

Eustropha Agassiz et

Eutragus Agassiz Nom. zool. nec in Charp. cat. 1837. (Conf. Herrmannsen ind. I. p. 437.) — Genera vel subgenera Pulmonatorum, mihi incognita.

Eyryomphala Beck ind. p. 8. vid. Euryomphala.

Fascelis Agassiz Nom. zool. nec in Charp. cat. 1837. (Conf. Herrm. ind. I. p. 439.) Pulmonatorum genus vel subgenus mihi incognitum.

Ferrusacia Risso hist. IV. p. 80. — Genus Helicidarum ex typo Hel. folliculi Gronov.

Folliculus Agassiz mss. teste Charp. — Genus ex typo Hel. folliculi Gron. institutum, a Charpentier (cat. p. 14.) et Hartmann (syst. Übers.) inter subgenera Bulimi adoptatum.

Fruticicola Held in Isis 1837. p. 944. — Genus Helicum ex typo Hel. fruticum Müll.

Fusulus Fitzinger syst. Verz. p. 105. — Genus Helicoideorum ex typo Pupae fragilis et Claus. interruptae.
= Balea §. 1. et Claus. §. 10 spec.

Galaxias Beck ind. p. 42. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium ex typis variis.

Gallina Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 197. — Subgenus Helicis ex typo Carocollae rotae Brod.

Geomitra Swainson Malac. p. 332. — Subgenus Geotrochi ex typo Hel. thiarellae Webb.

Geotrochus van Hasselt in Fér. Bull. 1824. (vid. Ag. Nom.) — Subgenus Helicis ex typo Hel. pilei Müll., simili modo a Beck (ind. p. 47.) in sectione crassilabrium et a Swainson (Malac. p. 332.) inter subgenera Geotrochi adoptatum.

Geotrochus Swainson Malac. p. 331. — Genus Helicinarum, subgenera: Hemitrochum, Geotrochum, Pythohelicem, Geomitram et Gonidomum includens.

Gibbulina Beck ind. p. 81. — Subgenus Pupae, ex typis variis.
= Pupae sp. et Gibbus.

Gibbus Montfort. Vid. Monogr. I. Introd. pag. XXII.

Glandina Schumacher essai p. 202. — Novum genus ex typo Bullae volutae Chemn. institutum, a pluribus auctoribus adoptatum, ab aliis (Beck ind. p. 77.) subgeneribus Achatinae adnumeratum.
= Achatina §. 8—12.

Glischrus Studer syst. Verz. p. 11. — Genus Gasteropodum. Subgenera: Limax, Hyalina, Tapada, Helix, Bulinus, Pupa, Torquilla, Clausilia.
= Helicea et Limax.

Gonidomus Swainson Malac. p. 332. — Subgenus Geotrochi ex typo Pupae pagodae Fér.

Goniogyra Agassiz Nom. zool. Nec in Charp. cat. 1837. (Conf. Herrm. ind. I. p. 486.) — Pulmonatorum genus vel subgenus mihi incognitum.

Goniostoma Swainson Malac. p. 335. — Subgenus Bulimi ex typo Bul. goniostomi Sow.

Gonodomus Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Gonidomus.

Gonodon Held in Isis 1837. p. 918. — Genus Puparum ex typo Hel. tridentis Müller.

Gonospira Swainson Malac. p. 333. — Subgenus Pupae ex typo Pupae palangae Less.

Gonostoma Held in Isis 1837. p. 915. — Genus Helicum ex typo Hel. obvolutae Müll.

Gonydiscus Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Gonyodiscus.

Gonyodiscus Fitzinger syst. Verz. p. 98. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. solariae Menke.

Gonyostomus Beck ind. p. 53. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium ex typis Bul. goniostomi et multicoloris.

Granaria Held in Isis 1837. p. 918. — Genus Puparum ex typo Pupae frumenti Drap.

Haplodon Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Aplodon.

Helicarion Férussac tabl. p. XXXI. — Primum genus Cochlearum, a Latreille Geocochlidibus, a Menke Heliceis, a Beck Vitrinidis, a Gray Arionidis adnumeratum, a Blainville, Rang, Deshayes etc. tamquam subgenus Helicolimacis vel Vitrinae adoptatum, ab aliis Vitrinae insertum.
= Vitrinae spec.

Helicarium Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Helicarion.

Helicella Lamarck Extr. du Cours 1812. — Genus Heliceorum, serius Helici iterum injunctum.

Helicella Férussac prodr. p. 37. — Subgenus Helicis e sectione inclusarum volutatarum. Typi subsectionem diversissimi.

Helicella Blainville in Dict. sc. nat. tom. 32. p. 254. — Sectio Helicis ex typo Hel. obvolutae Müll.

Helicella Risso hist. IV. p. 67. — Genus Helicidarum ex typis diversissimis: Hel. algirae, elegantis, rupestris etc.

Helicella Fitzinger syst. Verz. p. 95. — Genus Helicoideorum ex typis Hel. fruticum, hispidae etc.

Helicella Charpentier cat. moll. Suisse p. 10. — Subgenus Helicis ex typis variis.

Helicella Beck ind. p. 6. — Subgenus Helicis e sectione tenuilabrium ex typis Hel. cellariae etc.

Helicella Swainson Malac. p. 333. — Genus Helicinarum ex typo Hel. pellis serpentis Chemn.

Helicella Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 143. — Subgenus Helicis ex typo Hel. ericetorum.

Helicigona Férussac prodr. p. 36. — Subgenus Helicis e sectione inclusarum volutatarum, typos includens diversissimos.

Helicigona Risso hist. IV. p. 66. — Genus Helicidarum ex typo Hel. lapicidae et corneae?

Helicobulinus Broderip in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 123. — Subgenus Helicis pro Hel. sarcinosa Fér. propositum.

Helicodon Ehrenberg Symb. phys. — Subgenus Chilodontis.

Helicodonta Férussac prodr. p. 33. — Subgenus Helicis e sectione inclusarum volutatarum, e typis subsectionum diversissimis constitutum, a Cuvier et Krynicki simili sensu adoptatum.

Helicodonta Risso hist. IV. p. 65. — Genus Helicidarum ex typo Hel. obvolutae Müll., adoptatum a Gray in eadem familia, typo non designato.

Helicogena Férussac prodr. p. 27. — Subgenus Helicis e sectione inclusarum volutatarum, typis diversissimis, simili sensu a Cuvier adoptatum.

Helicogena Risso hist. IV. p. 59. — Genus Helicidarum e typis Hel. pomatiae, nemoralis etc.

Helicogena Beck ind. p. 37. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium, ex typis Hel. lacteae, nemoralis etc.

Helicogona C. Pfeiffer Nat. III. p. 57. — Sectio subgeneris Helicis, ex typo Hel. lapicidae, pariter a Krynicki adoptata.

Helicolimax Férussac pat. essai (1807.) — Genus ab Helice separatum, a Blainville et Lowe adoptatum.

= Vitrina.

Helicolimax Férussac fil. prodr. p. 21. — Secundum genus Cochlearum, a Gray (Syn. Br. Mus.) in Helicidarum sect. c. adoptatum.

= Vitrina.

Helicophanta Férussac prodr. p. 25. — Subgenus Helicis e sectione redundantium volutatarum, in subsectiones divisum: Vitrinoides et Vesicales; eadem latitudine a Cristofori et Jan (catal. p. 1.) inter genera Helicoideorum adoptatum.

= Daudebardia et Helix §. 2.

Helicophanta C. Pfeiffer Nat. III. p. 3. 55. — Genus Cochlearum, e cognominis subgeneris Ferussaciani sectione priore formatum, e typo Hel. rufae Drap. — eodem sensu a Deshayes, Rossmässler, Hartmann, L. Pfeiffer etc. adoptatum.

= Daudebardia.

Helicophanta Beck ind. p. 46. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium, ex typo Hel. cornu gigantei Chemn. aliisque.

= Helix §. 2.

Helicophanta Gray Syn. Br. Mus. ed. 1842. p. 90. — Genus Helicidarum sect. f., typo non indicato. An idem ac praecedens?

Helicopsis Fitzinger syst. Verz. p. 101. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. striatae Drap.?

Helicopsis Beck ind. p. 2. — Genus Vitrinidorum ex typis novis.

= Helix §. 7, spec.

Helicostyla Férussac prodr. p. 46. — Subgenus Helicis e sectione inclusarum volutatarum e typis valde diversis.

Helicostyla Beck ind. p. 36. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium, ex typis Hel. alaudae et Roissyanae.

Helicteres Férussac prodr. p. 56. — Subdivisio subgeneris Cochlogenae ex typo Turbinis lugubris Chemn., a Beck (ind. p. 51) inter subgenera Bulimi in sectione crassilabrium, adoptata.
= Achatinella.

Helisiga Lesson voy. de la Coq. p. 316. — Genus a Succinea sejunctum ex typo novo.
= Succineae spec.

Helix Lamarck emend. Vid. Monogr. I. Introd. pag. XV.

Helix Férussac prodr. p. 23. — Tertium genus Cochlearum.
= Helicea.

Helix Cuvier règne animal. — Genus Pulmonatorum, subgenera: Helicem, Vitrinam, Bulimum, Pupam, Scarabum, Chondrum et Succineam continens, eliminato serius Scarabo.
= Helicea (et Scarabus).

Helix Schweigger Nat. p. 741. — Genus Coelopnoorum terrestrium ex iisdem subgeneribus compositum.
= Helicea.

Helix C. Pfeiffer Nat. III. p. 3. 56. — Genus Cochlearum, subgenera amplectens: Helicem, Bulimum, Pupam, Clausiliam.
= Helix, Achatina, Bulimus, Pupa, Balea, Clausilia.

Helix Fitzinger syst. Verz. p. 92. — Genus Helicoideorum ex typis Helicis pomatiae, arbustorum et hortensis.

Helix Risso hist. IV. p. 63. — Genus Helicidarum e typis Hel. aspersae et vermiculatae.

Helix Charpentier cat. d. moll. de la Suisse p. 5. — Genus molluscorum terrestrium, subgenera continens: Helicem, Cryptomphalum, Chilostoma, Trigonostoma, Carocollam, Conulum, Helicellam, Delomphalum, Hyaliniam.

Helix Charpentier cat. moll. Suisse p. 5. — Subgenus Helicis ex typo Hel. pomatiae.

Helix Swainson Malac. p. 330. — Genus Helicinarum, in subgeneribus: Hemicycla, Helice, Zonite, Epistyla (et Streptaxi) partem generis Mülleriani emendati complectens. Conf. singula subgenera.

Helix Swainson Malac. p. 331. — Subgenus Helicis e typis Hel. pomatiae, lacteae et haemastomae.

Helix Gray Syn. Brit. Mus. (1842.) p. 90. — Genus Helicidarum sect. f., emissis multis aliis arcte circumscriptum, typo non indicato.

Helixarion Férussac prodr. p. 20: vid. Helicarion.

Hemicrypta Agassiz Nom. zool. Nec in Charp. cat. 1837. (Conf. Herrmannsen ind. I. p. 525.) — Genus vel subgenus Pulmonatorum mihi incognitum. An huc pertinens?

Hemicycla Swainson Malac. p. 331. — Subgenus Helicis e typo Hel. plicariae Enc. méth.

Hemiloma Rafinesque vid. Isis 1821. p. 361. — Genus Helicidarum ex typo non indicato.

Hemitrochus Swainson Malac. p. 331. — Subgenus Geotrochi ex typo Hel. haemastomae Swains. (Hel. variant. Menke?)

Hercodonta Agass. Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) et Herrmannsen ind. I. p. 528. — Genus a Pupa separatum, typo non indicato.

Heterostoma Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 177. — Subgenus Helicis (an potius Cyclostomati affine?) ex typo Hel. paupérculae Lowe.

Homalonyx Agassiz Nom. zool. Ind. univ. vid. Omalonyx.

Homogyra Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Cf. Herrm. ind. I. p. 540. — Genus vel subgenus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Hyalina Studer Verz. p. 11. — Subgenus Glischri.
= Vitrina.

Hyalina Gray Syn. Brit. Mus. ed. 1842. p. 90. — Genus Helicidarum sect. f., typo non indicato. An = seq.?

Hyalinia Agassiz mss. in Charpentier cat. p. 13. — Subgenus Helicis e typis Hel. nitidulae, lucidae, crystallinae.

Hybogyra Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. I. p. 544. — Genus vel subgenus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Hybopleura Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. I. p. 545. — Genus vel subgenus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Hygromia Risso hist. IV. p. 66. — Genus Helicidarum ex typo Hel. cinctellae Drap.

Hypacria Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. I. p. 547. — Genus vel subgenus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Jaminia Risso hist. IV. p. 88. — Genus Helicidarum e typis diversis.
= Bulimi et Pupae sp.

Iberus Montfort Conch. syst. II. p. 146. — Genus pro Hel. Gualteriana L. institutum, a Gray (Syn. Br. Mus. p. 90.) in familia Helicidarum sect. f. adoptatum (typo non indicato), Beckio (ind. p. 27.) subgenus Helicis e sectione reflexilabrium.

Iphigenia Gray in Lond. Med. Repos. 1821. p. 182. — Subgenus Clausiliae ex typis Cl. biplicatae, plicatulae et nigricantis.

Isognomostoma Fitzinger syst. Verz. p. 97. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. personatae, Beckio sectio subgeneris Tridopsis, ab Hartmann inter subgenera Helicis adoptatum.

Isognostoma Hartmann syst. Übers. vid. Isognomostoma.

Isthmia Gray Man. p. 199. — Subgenus Vertiginis ex typis Vert. edentulae, cylindricae, pygmaeae etc.

Labyrinthus Beck ind. p. 33. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium, ex typo Hel. labyrinthi Chemn.

Laciniaria Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 173. 216. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. plicatae.

Latomus Fitzinger syst. Verz. p. 97. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. lapicidae.

Lauria Gray Man. p. 193. — Subgenus Pupae ex typis P. umbilicatae et anglicae.

Lecanomphalus Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. I. p. 579. — Genus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Leiostoma Swainson Malac. p. 328. — Genus Lucerninarum ex typis Hel. cornu militaris et jamaicensis.

Lendix Humphrey in Mus. Calonn. teste Fér. prodr. p. 78. — Genus Molluscorum terrestrium?

Lenticula Held in Isis 1837. p. 913. — Genus Helicum pro Hel. lapicida institutum.

Leptinaria Beck ind. p. 79. — Subgenus Achatinae ex typo Hel. unilamellatae Fér.
= Tornatellina?

Leptospira Swainson Malac. p. 335. — Subgenus Bulimi ex typis Hel. obtusatae Gmel. et Bul. cylindrici Gray.

Leucochroa Beck ind. p. 16. — Subgenus Helicis e sectione intusmarginatarum, e typis diversissimis.

Liguus Montfort Conch. syst. II. p. 422. — Genus ab Achatinis sejunctum, ex typo Ach. virgineae L., a Gray (Proc. Zool. Soc. 1834. p. 66.) eodem sensu adoptatum.

Limicolaria Schumacher essai p. 200. — Genus pro Bul. flammeo Müll. institutum. Conf. II. p. 182.

Limicolarius Beck ind. p. 60. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium ex typo Bul. flammei Müll., exarati Müll. et Achat. tenuis Gray.

Lomastoma Hartmann syst. Übers. — Subgenus Helicis ex typo non indicato.

Longaeva Mühlfeldt ined. teste Menke syn. — Genus pro Bul. acuto Müll. constitutum.

Loxota Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. I. p. 627. — Genus Pulmonatorum. An huc pertinens?

Lucena Oken Lehrb. d. Nat. III. et Hartmann in Sturm Fauna VI. H. 5. p. 27. 40. — Genus Geophilorum.
= Succinea.

Lucena Hartmann in Neue Alpina I. p. 208. 245. — Subgenus Helicis ex typo Hel. apertae Born.

Lucerna Humphrey Mus. Calonn. Conf. Fér. prodr. p. 77. — Genus molluscorum terrestrium, a Swainson (Malac. p. 328.) familiae Lucerninarum insertum et in subgenera 5: Caracollam, Discodomam, Lucernam, Anastoma et Lucidulam divisum. Conf. subg. singula.

Lucerna Swains. Malac. p. 329. — Subgenus Lucernae ex typis Hel. acutissimae, lancis, lychnuchi, fulguratae.

Lucernella Swainson Malac. p. 329. — Genus Lucerninarum in subgenera: Polydontem, Lyrostoma, Lucernellam, Polygyram, Lucidellam (ad Helicinam referendam) divisum. Conf. subg. singula.

Lucernella Swainson Malac. p. 330. — Subgenus Lucernellae ex typo Hel. punctatae Born.

Lucidula Swainson Malac. p. 329. — Subgenus Lucernae ex typo Carocollae barbadensis Lam.

Lycta Hartmann syst. Übers. — Subgenus Bulimi ex typo non indicato.

Lyrostoma Swainson Malac. p. 329. — Subgenus Lucernellae ex typo Hel. labyrinthi Chemn.

Macroceramus Guilding in Zool. Journ. IV. p. 168. — Genus Bulimidarum ex typo Bul. cylindrici Gray, a Beckio (ind. p. 73.) inter subgenera Bulimi, sectionis tenuilabrium, adoptatum.

Macrocyclis Beck ind. p. 24. — Subgenus Helicis, e sectione reflexilabrium, ex typis Hel. laxatae Fér. et Cunninghami Gray.

Macrodontes Swainson Malac. p. 334. — Subgenus Clausiliae, ex typo Bul. odontostomi Sow., a L. Pfeiffer olim (Symb. I. p. 6. II. p. 5.) inter genera Heliceorum adoptatum.

Macrospira Guilding ined. (?) teste Swains. Mal. p. 335. — Subgenus Achatinae ex typo Ach. octonae, a Gray (Syn. Brit. Mus. p. 94.) inter genera Helicidarum sect. h. adoptatum, typo non indicato.

Macrota Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. II. p. 5. — Genus Pulmonatorum. An huc referendum?

Marpessa Gray Man. p. 212. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. laminatae Turt.

Mastus Beck ind. p. 73. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium, ex typo Bul. pupae L. et aliorum.

Megaspira Lea obs. II. p. 21. — Genus pro Pupa elatiore Spix constitutum, a Jay et L. Pfeiffer olim in Heliceis adoptatum, Swainsonio (Mal. p. 333.) subgenus Pupae, a Gray (Syn. Br. Mus. p. 90.) inter genera Helicidarum sect. g. enumeratum.
= Balea §. 3.

Merdigera Held in Isis 1837. p. 917. — Genus Bulimorum ex typo Bul. obscuri Müll.

Mesodon Rafinesque 1831. vid. Fér. Bull. zool. 1835. p. 93. — Genus ab

Helice separatum ex typo Hel. thyroidae Say, Beckio (ind. p. 22.) subdivisio Tridopsis.

Mesomphix Rafinesque in Journ. de phys. tom. 88. p. 425. — Genus ab Helice disjunctum ex typo Hel. laevigatae Rafin., a Beck inter subgenera Helicis, e sectione tenuilabrium adoptatum.

Mesomphyx Gray Syn. Br. Mus. 1842. p. 90. — Genus Helicidarum sect. f., typo non indicato. An idem ac praecedens?

Microcystis Beck ind. p. 2. — Subgenus Naninae, ex typis novis.

Monacha Fitzinger syst. Übers. p. 95. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. sericeae, incarnatae et carthusianellae, ab Hartmann (syst. Übers.) inter subgenera Helicis adoptatum.

Nanina Gray in Proc. Zool. Soc. 1834. p. 58. — Genus ab Helice sejunctum ex typo Hel. citrinae L., a Benson (Zool. Journ. V. p. 458.) et L. Pfeiffer (Symb. I. p. 5. II. p. 4.) in Heliceis adoptatum, Beckio (ind. p. 2.) genus Vitrinidorum in subgenera: Naninam, Microcystem et Ariophantam divisum.

Navicula Spix test. bras. t. 15. — Genus pro Bul. navicula Wagn. constitutum, a Villa (disp. syst. p. 18.) adoptatum.

Notoptycha Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. II. p. 124. — Genus Pulmonatorum? An huc referendum?

Obba Beck ind. p. 30. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium ex typo Hel. planulatae Lam. et mammillae Fér.

Obeliscus Beck ind. p. 61. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium, ex typis Bul. obtusati, decollati et Goodallii.

Obelus Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 158. — Subgenus Helicis ex typis Hel. polymorphae, Despreauxii, etc.

Ochthephila Beck ind. p. 17. — Subgenus Helicis e sectione intusmarginatarum, ex typis Hel. bicarinatae Sow., polymorphae, pauperculae.

Odomphium Rafinesque enum. 1831. teste Agass. Nom. — Genus Helicidarum mihi incognitum.

Odontomphalum Agassiz Nom. zool. ind. univ. vid. Odomphium.

Odontostoma Orbigny moll. cub. I. p. 237. — Genus Cyclostomidarum, a L. Pfeiffer (Monogr. I. p. 11.) inter Helicea adoptatum.
= Proserpina.

Odontostomus Beck ind. p. 54. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium, ex typis Bul. odontostomi, bahiensis, exesi.

Odontostylus Gray Syn. Brit. Mus. 1840 et 1842. p. 90. — Genus Helicidarum sect. f., ex typo non indicato.

Odontotropis Agassiz Nom. Zool. ind. univ. vid. Odotropis.

Odotropis Rafinesque in Journ. de phys. tom. 88. p. 425. — Genus ab Helice separatum, a Férussac (tabl. p. XXXII.) inter synonyma Helicodontae enumeratum. Typus non indicatus.

Omalonyx Orbigny voy. Amér. Zool. p. 230. — Novum genus a Succinea separatum, ex typo Hel. unguis Fér., a Gray (Syn. Br. Mus. 1842. p. 90.) inter genera Helicidarum sect. c. enumeratum.
= Succinea.

Omphalina Rafinesque enum. teste Fér. in Bull. zool. 1835. p. 93. — Genus Helicidarum ex typo non designato.

Omphaloploce Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm ind. II. p. 146. — Genus Pulmonatorum. An huc referendum?

Ophidermis Agassiz olim vid. seq.

Ophiodermis Agassiz Nom. zool. Ind. un. — Genus Pulmonatorum. (= Solaropsis Beck? Herrm. ind. II. p. 153.)

Orbitina Risso hist. IV. p. 82. — Genus Helicidarum male constitutum pro pullis Bulimi decollati.

Orcula Held in Isis 1837. p. 919. — Genus Puparum ex typo Pupae dolii Drap.

Orthalicus Beck ind. p. 59. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium, e typis Bul. zebrae Müll. et gallinaesultanae Chemn. et Achatinae reginae Fér., adoptatum a Troschel pro Bul. gallinasultana.

Orthostylus Beck ind. p. 49. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium ex typis Hel. viridis, metaformis, sarcinosae, Bulimi ventricosi, perversi et aliis.

Otala Schumacher essai p. 191. — Genus ex typis diversissimis, nempe Hel. haemastomae, lacteae et Pupae sulcatae male conflatum.

Otala Beck ind. p. 35. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium ex typis Hel. auricomae, limae, plicatulae, Adansoni etc.

Otostomus Beck ind. p. 55. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium, ex typis Bul. signati et auris leporis.

Oxychilus Fitzinger syst. Verz. p. 100. — Genus Helicoideorum ex typis Hel. cellariae et ericetorum.

Oxylopha Hartmann syst. Übers. — Subgenus Helicis ex typo non indicato.

Oxynota Hartmann syst. Übers. — Subgenus Helicis ex typo non designato.

Pacherium Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. II. p. 185. — Genus Pulmonatorum. An huc referendum?

Pachyota Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. II. p. 187. — Genus Pulmonatorum. An idem ac sequens?

Pachyotus Beck ind. p. 56. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium e typis Bul. bilabiati, melanostomi, iostomi.

Pagoda Agassiz Nom. zool. (nec in Charp. cat. 1837.) Conf. Herrm. ind. II. p. 189. — Genus Pulmonatorum. An huc referendum?

Papillifera Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 156. — Subgenus Clausiliae ex typo Claus. bidentis L.

Partula Férussac prodr. p. 65. — Genus Cochlearum a Bulimo separatum ex typis Bul. pudici Müll. et fabae Mart., a Broderip, Sowerby, Lesson, Reeve et aliis pro speciebus Bul. fabae affinibus adoptatum, apud Blainville (Dict. sc. nat. tom. 32. p. 251.) subgenus Puppae, apud Anton (Verz. p. 40.) subgenus Bulimi.

Partulus Beck ind. p. 57. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium, emissis alienis species Bul. fabae affines modo complectens.

Patula Held in Isis 1837. p. 916. — Genus Helicum ex typis Hel. rotundatae, pygmaeae, rupestris.

Pectella Gray Syn. Brit. Mus. p. 90. — Genus Helicidarum sect. c. ex typo non indicato. An potius ad Limacea referendum?

Pegea Risso hist. IV. p. 88. — Genus Helicidarum dubium, ad Achatinas forte referendum?

Pelekocheilus Beck ind. p. 54. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium ex typis Bul. angulati Wagn. et distorti Chemn.

Pelta Beck ind. p. 100. — Subgenus Succineae ex typo novo.
= Succinea?

Peristoma Krynicki in Bull. Mosc. VI. p. 421. — Genus novum a Bulimo disjunctum.

Petasia Beck ind. p. 21. — Subgenus Helicis e sectione planilabrium, ex typis Hel. trochiformis Mont., leucozonae et bidentis Chemn.

Pitys Beck ind. p. 9. — Subgenus Helicis e sectione tenuilabrium, ex typo novo mihi incognito.

Placostylus Beck ind. p. 57. — Subgenus Bulimi e sectione crassilabrium, ex typo Bul. fibrati Mart.

Planispira Beck ind. p. 29. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium, ex typis Hel. exceptiunculae, zonariae, bigoniae.

Platycloster van Hasselt. — Genus non designatum, a Beck (ind. p. 2.) cum dubio inter synonyma Helicopsis relatum.

Plecochilus Agass. Nom. zool. et Herrm. ind. II. p. 289: vid. Plekocheilus.

Plectostylus Beck ind. p. 58. — Subgenus Bulimi e sectione tenuilabrium ex typis Bul. peruviani, coquimbensis, cactivori.

Plekocheilus Guilding in Zool. Journ. III. p. 532. — Genus Pupadarum, auctori antea Caprella, ex typo Bul. auris Sileni Born.

Pleocheilus M. E. Gray fig. moll. anim. t. 74. vid. Plekocheilus.

Pleurodonta Fischer Mus. Demid. III. — Genus pro Hel. lychnucho et sinuata Müll. constitutum, a Gray (Syn. Br. Mus.) inter genera Helicidarum sect. f. enumeratum, Beckio (ind. p. 33.) subgenus Helicis e sectione reflexilabrium.

Plicadomus Swainson Mal. p. 332. — Subgenus Pupae ex typo Pupae sulcatae Müll.

Plicaphora Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 216. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. plicatulae.

Plicaria Hartmann syst. Üb. — Subgenus Helicis ex typo non designato.

Poligyra Say vid. Polygyra.

Polita Held in Isis p. 916. — Genus Helicum ex typis Hel. cellariae, crystallinae, fulvae etc.

Polydontes Montfort Conch. syst. II. p. 154. — Novum genus pro Hel. imperatore Mtf. constitutum, a Gray (Syn. Br. Mus.) inter genera Helicidarum sect. f. enumeratum, a Beck (ind. p. 32.) inter subgenera Helicis e sectione reflexilabrium, a Swainson (Malac. p. 329.) inter subgenera Lucernellae adoptatum.

Polygyra Say in Nichols. Enc. — Genus Gasteropodum terrestrium ex typo Hel. septemvolvae et avarae Say, simili sensu a Lea (obs. II.) adoptatum, a Beck (ind. p. 23.) sensu strictiore inter subgenera Helicis e sectione planilabrium, a Swainson (Mal. p. 330.) inter subgenera Lucernellae adoptatum.

Polymita Beck ind. p. 44. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium ex typis Hel. pictae Born et carnicoloris Fér.

Polyphemus Montfort Conch. syst. II. p. 415. — Genus pro Bulla voluta Chemn. institutum, a Gray (Syn. Br. Mus.) inter genera Helicidarum sect. h. adoptatum, Charpentiero (cat. moll. Suiss. p. 13.) subgenus Bulimi. = Achatina §. 8—12.

Polyphemus Villa disp. syst. p. 19. — Genus Conchyliorum terrestrium praeter Polyphemos Montf. etiam Ach. aciculam continens.

Pomatia Gesner, Bolten, Leach moll. p. 89 teste Gray. — Genus pro Hel. pomatia Linn. institutum, inter subgenera Helicis a Beck (ind. p. 43. in sectione crassilabrium) et Gray (Man. p. 135.) adoptatum.

Proserpina Guilding? Gray? Vid. Monogr. I. Introd. pag. XVIII.

Proteusia Hartmann syst. Übers. — Subgenus Helicis ex typo non indicato.

Psilochylus Agass. Nom. — Genus Pulmonatorum mihi ignotum.

Pupa Humphrey Mus. Calonn. vid. Fér. prodr. p. 78. — Genus Heliceorum (?) typis incognitis.

Pupa Draparnaud. Vid. Monogr. I. Introd. pag. XXII.

Pupa Cuvier règne animal II. p. 407. — Subgenus Helicis, a Draparnaudiano omisso Chondro differens, a Studer in subgeneribus Glischri adoptatum

Pupa Charpentier cat. moll. Suisse p. 15. — Genus molluscorum terrestrium cujus subgenera sunt: Eucore, Sphyradium, Chondrus.

Pupa Beck ind. p. 81. — Genus Bulimidorum. Subgenera: Gibbulina, Pupa, Urocoptis, Pupilla, Vertigo, Alaea, Torquilla, Chondrula, Cyclodontina, Pyrgelix, Brachypodella.

Pupa Beck ind. p. 82. — Subgenus Pupae ex typis P. uvae, decumanae etc., pari modo a Swainson adoptatum.

Pupa Gray Man. p. 192. — Genus Helicidarum, e subgeneribus Lauria, Pupilla, Abida compositum.

Pupa Swainson Malac. p. 332. — Genus Helicinarum cujus subgenera sunt: Plicadomus, Pupa, Gonospira, Megaspira, Siphonostoma.

Pupella Swainson Malac. p. 334. — Subgenus Clausiliae ex typis Pupae frumenti, variabilis et vertiginis.

Pupilla Leach moll. p. 127. teste Gray. — Genus a Pupa segregatum ex typo Pupae muscorum L., similiter a Beck (ind. p. 83.), Hartmann (syst. Üb.) et Gray (Man. p. 196.) inter subgenera Pupae adoptatum.

Pupina Ehrenberg Symb. phys. — Subgenus Chilodontis.

Puppa Blainville in Dict. sc. nat. tom. 32. p. 251. — Genus Limacineorum. Subgenera: Pupa, Chondrus, Gibbus, Vertigo, Partula.

Pusiodon Swainson Malac. p. 330. — Genus Lucerninarum ex typis Hel. zonariae et planulatae Lam.

Pyramidula Fitzinger syst. Verz. p. 95. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. rupestris Drap.

Pyrgelix Beck ind. p. 88. — Subgenus Pupae ex typo Pupae elatioris Spix.
= Balea §. 3.

Pythohelix Swainson Mal. p. 332. — Subgenus Geotrochi ex typo Bul. pithogastri Fér.?

Rumina Risso hist. IV. p. 79. — Genus Helicidarum ex typo Bulimi decollati Müll., ab Hartmann (Syst. Übers.) inter subgenera Bulimi enumeratum.

Rupicola Hartmann Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 173. 216. — Subgenus Clausiliae ex typo Cl. parvulae Stud.

Sagda Beck ind. p. 9. — Subgenus Helicis, e sectione tenuilabrium, ex typo Trochi australis Chemn.

Saraphia Risso hist. IV. p. 83. — Genus Helicidarum incertum. An Pupae adnumerandum?

Simpulopsis Beck ind. p. 100. — Subgenus Succineae ex typo Helicis sulculosae Fér.
= Vitrina §. 9.

Siphonostoma Guild. mss. teste Swains. Malacol. p. 168. — Genus Helicidarum, antea auctori Brachypus dictum, a Swainson tanquam subgenus Pupae adoptatum. (Nomen jam pluries in Zoologia usitatum.)
= Cylindrella.

Solarium Schumacher essai p. 195. — Novum genus pro Trocho turcico Chemn. propositum.

Solarium Spix test. brasil. t. 17. — Novum genus ex typis diversissimis conflatum.
= Helicis sp.

Solaropsis Beck ind. p. 27. — Subgenus Helicis, e sectione reflexilabrium, ex typo Helicis pellis serpentis Chemn.

Stenopus Guilding in Zool. Journ. III. p. 527. — Novum genus Helicidarum, a Beck in Vitrinidis, a Swainson in Limacinis, a Gray in Arionidis adoptatum, in hoc opere (cf. vol. I. p. XII.) Helici injunctum.

Stenostoma Rafin. Enum. and acc. teste Fér. in Bull. zool. 1835. p. 93. — Novum genus Helicidarum ex typo non designato. An idem ac sequens?

Stenotrema Rafin. in Journ. de Phys. 1819. tom. 88. p. 425. — Genus ab Helice disjunctum ex typo Hel. convexae Raf., a Beck tamquam divisio Tridopsis adoptatum.

Stenotrema Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. p. 84. — Subgenus Helicis ex typo Helicis avarae Say constitutum.

Stomodonta Mermet moll. pyr. p. 45. — Genus incongruum, includens Clausiliam, Baleam, Pupam et Vertiginem.

Streptaxis Gray vid. Monogr. I. Introd. p. XVIII. (Genus a Sowerby in Conch. Man. inter Colimacea, a Gray Brit. Mus. p. 90 inter Helicidas adoptatum, Swainsonio subgenus Helicis.)

Strobilus Mühlf. ined. teste Anton Verz. p. 46. — Subgenus Clausiliae.
= Tornatellina Beck.

Strophocheilus Spix test. bras. t. 11. — Novum genus pro Bulimis nonnullis typicis, ovato et pudico propositum.

Stylodon Beck ind. p. 46. — Subgenus Helicis e sectione crassilabrium.
= Stylodonta Jan.

Stylodonta Jan catal. p. 2. — Sectio Helicodontae ex typo Hel. unidentatae Chemn.

Styloides Fér. prodr. p. 51. — Subdivisio Cochlicopae, Achatinas diversissimas subcylindraceas complectens.

Styloides Fitzinger Verz. p. 105. — Genus Helicoideorum, pro Ach. acicula et lubrica constitutum.

Subulina Beck ind. p. 76. — Subgenus Achatinae.
= Achatina §. 5.

Succinea Drap. vid. Monogr. I. Introd. p. XIV.

Sylvicola Hübener epist. 1810 teste Fér. pr. p. 87. — Genus testaceorum terrestrium ignotum.

Tachea Leach syn. brit. Moll. p. 84 teste Turt. et Gray. — Subgenus Helicis e typo Hel. hortensis L., eodem sensu a Hartmann adoptatum.

Tanychlamys Bens. Journ. As. Soc. Beng. 1834 etc.
= Nanina Gray

Tapada Studer Verz. p. 11. — Subgenus Glischri.
= Succinea Drap.

Tapada Gray Manual p. 127. — Subgenus Helicis e typo H. apertae Born.

Teba Leach syn. brit. Moll. p. 92 test. Turt. et Gray. — Genus ab Helice separatum. Typi: Helix caperata et aculeata.

Theba Risso hist. IV. p. 73. — Genus Helicidarum. Typi: Hel. carthusiana, pisana etc.

Theba Beck ind. p. 10. — Subgenus Helicis e sectione intusmarginatarum. Typi: Helix ericetorum ejusque affines.

Thelidomus Swains. Malac. p. 194. 330 err. typ. pro Thelidonta.

Thelidonta Swains. Malac. p. 194. 418. — Gen. Lucerninarum.

Tomigeres Leach Zool. Misc. (Ed. Chenu p. 16.)
= Anostoma Fisch.

Tomigerus Spix vid. Monogr. I. Introd. p. XVII.

Tomogeres Montf. Conch. syst. II. p. 359 et L. Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1846. p. 7. — Genus Heliceorum.
= Anostoma Fisch.

Tomogerus Blainv. in Dict. sc. nat. 1824. v. 32. p. 252 et Malac. p. 458. — L. Pfr. Symb. II. p. 5.
= Anostoma Fisch.

Tornatellina Beck vid. Monogr. I. Introd. p. XXV.

Torquatella Held in Isis 1837. p. 919. — Genus Puparum e typis P. muscorum et triplicatae.

Torquilla Stud. Verz. p. 19. — Subgenus Glischri, simili sensu a Fitzinger et Beck inter subgenera Pupae adoptatum.

Torquilla Villa disp. syst. p. 24. — Genus Conchyliarum terrestrium, diversissima complectens.
= Bulimi, Pupae et Cylindrellae sp.

Toxostoma Rafin. Enum. et Acc. teste Fér. in Bull. zool. 1835. p. 93. — Gen. Helicidarum ex typo non designato. An idem ac sequens?

Toxotrema Rafin. in Journ. phys. 1819. v. 88. p. 425. — Genus Helicidarum minus cognitum.

Tragomma Held in Isis 1837. p. 916. — Genus Helicum ex typo Hel. algirae L.

Trichia Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. — Subgenus Helicis. Typus: H. hispida.

Tridopsis Beck ind. p. 22. — Subgenus Helicis e sectione planilabrium. Subsectiones: Tridopsis, Isognomostoma, Stenotrema, Mesodon.

Trigonostoma Fitz. Syst. Verz. p. 97. — Genus Helicoideorum ex typo Hel. obvolutae, a Charpentier, Hartmann et Gray inter subgenera Helicis adoptatum.

Triodopsis Rafin. in Journ. de phys. 1819. v. 88. p. 425. — Novum genus Helicidarum. Typus: Hel. clausa Raf. teste Fér.

Trochiscus Held in Isis 1837. p. 915. — Genus Helicum ex typo Hel. bidentis.

Turricula Beck ind. p. 10. — Subg. Helicis e sectione intusmarginatarum. Typi: Hel. elegans, thiarella etc.

Urocoptis Beck ind. p. 83. — Subgenus Pupae.
= Cylindrellae sp.

Vallonia Risso hist. IV. p. 101. — Genus Paludinidarum, quod ex Helice pulchella Müll. formatum videtur.

Vediantius Risso hist. IV. p. 81. — Genus Helicidarum, perperam pro pullis Achatinae folliculi formatum.

Vertigo Müller vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XXIII.

Vitrea Fitzinger Verz. p. 99. — Genus Helicoideorum. Typus: H. hyalina.

Vitrina Drap. Tabl. p. 33. 98; vid. Monogr. vol. I. Introd. p. XIII.

Vitrinus Montf. Conch. syst. II. p. 238.
= Vitrina Drap.

Vortex Beck ind. p. 29. — Subgenus Helicis e sectione reflexilabrium.

Xerophila Held in Isis 1837. p. 913. — Genus Helicum ex typis Hel. pisanae, ericetorum etc.

Xolotrema Rafin. in Journ. de phys. 1819. v. 88. p. 425. — Genus ab Helice disjunctum ex typo Hel. lunulae Raf.

Zebrina Held in Isis 1837. p. 917. — Genus Bulimorum e typis Bul. detriti, fasciolati etc.

Zonites Montf. Conch. syst. II. p. 282. — Genus ab Helice separatum, a Beck inter subgenera Helicis adoptatum. Typus: Hel. algira L.

Zonites Leach moll. brit. p. 103, teste Gray. — Genus pro H. ericetorum constitutum.

Zonites Gray Manual p. 110. 164. — Genus Helicinorum latius definitum. Typi: Hel. cellaria, pymaeà, rotundata etc.

Zonites Swains. Malac. p. 331. — Subgenus Helicis ex typo Hel. citrinae.

Zua Leach moll. brit. p. 114, teste Turt. et Gray. — Genus novum ex typo Helicis lubricae Müll. constitutum, a Gray inter genera Helicinorum adoptatum.

Zurama Leach moll. brit. p. 108, test. Turt. et Gray. — Genus ex typo Hel. pulchellae Müll. formatum, a Gray inter subgenera Helicis adoptatum.

INDEX VOLUMINIS SECUNDI.

	Pag.
Abida secale Leach	341
Achatina Lam.	243
—— aberrans P.	270
—— accincta Migh.	271
—— acicula Müll.	274
—— aciculoides Jan.	274
—— acuta Lam.	251
—— Adamsii P.	268
—— adusta Gould	233
—— alabaster Rang	247
—— alba Brown.	275
—— albolineata Lam.	280
—— algira Dh.	288
—— —— var. Phil.	289
—— amphora Jay.	249
—— Anais Less.	246
—— anomala P.	270
—— Antoniana P.	285
—— aperta Guild.	297
—— arcuata P.	261
—— australis Mich.	297
—— bacilliformis Jonas	264
—— bacterionides Orb.	156
—— bicarinata Lam.	248
—— bicolor Jay	233
—— boholensis P.	13
—— Boreti Gray	288
—— Borniana B.	297
—— Bruguierea F.	297
—— bulimoides P.	271
—— Byronii Gray	237
—— californica P.	266
—— Calista P.	12
—— camelopardalis P.	12
—— cantheriata F.	297
—— carinata P.	248
—— carinulata B.	297
—— castanea Lam.	254
—— ceylanica P.	258
—— Chemnitziana P.	250
—— chiliensis Less.	167
—— cincinniformis P.	9
Achatina cincinnus P.	9
—— clavata Gray	260
—— clavulus Sow.	158
—— clavus P.	260
—— columna Müll.	268
—— columnaris Blainv.	269
—— concinna P.	15
—— consobrina Orb.	285
—— cornea Brum.	289
—— coronata P.	293
—— costulata Ad.	267
—— —— P.	286
—— Coulteri Gray	297
—— Couroupa Less.	254
—— crassilabris Bens.	261
—— crenata Swains.	246
—— crenulata Sow.	285
—— crotallaria Schum.	297
—— cubaniana Orb.	282
—— curvilabris P.	258
—— cyanostoma Rüpp.	259
—— cylindracea P.	269
—— dactylus Brod.	287
—— decora Gray	238
—— dentiens Rm.	277
—— diaphana King	295
—— dilatata Z.	289
—— dominicensis Gm.	289
—— Donellii King	295
—— Downesii P.	15
—— Dysoni P.	270
—— elongata Swns.	180
—— emarginata Swns.	256
—— erecta Bens.	265
—— exarata Gray	16
—— exilis P.	268
—— fasciata Müll.	245
—— fimbriata B.	297
—— flammea Oken	179
—— flammigera F.	245
—— floccosa Spix	16
—— flogera Pot. et Mich.	145

	Pag.
Achatina follicula Pot. et Mich.	283
—— folliculus Gronov.	283
—— —— WB.	165
—— —— var. Terv.	274
—— Fraseri P.	263
—— fulgens Mus. Berol.	280
—— fulica F.	254
—— fulminea F.	293
—— fulva Brug.	251
—— fulvescens Gray	251
—— Funcki P.	271
—— funiculata Val.	535
—— fusco-lineata Lam.	289
—— fusiformis P.	292
—— glabra P.	281
—— glabrata Mlf.	273
—— glandula F.	297
—— glans Lam.	279
—— Goodallii Rm.	277
—— Gossei P.	267
—— gracilis Lowe	284
—— —— Bens.	157
—— —— B.	297
—— gracillima P.	160
—— Griffithsii Ad.	290
—— Hochenwarthii Schmidt	274
—— Hohenwarti Rm.	274
—— Hügeli P.	259
—— hyalina Rang	258
—— —— Anton	285
—— immaculata Lam.	251
—— imperialis B.	297
—— ? incompta P.	534
—— integra B.	297
—— intermedia Z.	273
—— involuta Gould	263
—— iota Ad.	295
—— isabellina P.	286
—— jamaicensis P.	290
—— Kercadonis Grat.	245
—— Knorrii Jonas	250
—— Kransii Reeve	250
—— Kraussi Reeve	250
—— lacryma B.	297
—— lactea Reeve	252
—— Lamarckiana P.	253
—— lamellata Pot. et Mich.	272
—— Largillierti P.	295
—— Lattrei P.	269
—— Leaiana Grat.	15
—— leucozonias Walch	280
—— Liebmanni P.	293
—— Lindoni P.	281
—— lineata Val.	246
—— lubrica Müll.	272

	Pag.
Achatina lubricella Z.	273
—— lubricoides B.	273
—— lugubris Gray	239
—— lutea Mus. Berol.	246
—— maculata Dh.	251
—— —— Swains.	279
—— magnifica P.	255
—— Malaguettana Rang	257
—— marginata Swns.	249
—— Marminii Dh.	288
—— marmorea Perry	297
—— mauritiana Lam.	254
—— —— var. B.	251
—— melanocheila P.	535
—— melanostoma Gray	244
—— melastoma Swns.	244
—— —— Spix	244
—— Michaudiana Orb.	268
—— miliaris Jan	276
—— minuta Anton	392
—— ? modesta P.	533
—— monilifera P.	290
—— monoceros B.	297
—— Müller Dh.	287
—— nebulosa P.	14
—— nigricans P.	280
—— nitens Gray	260
—— —— Kok.	273
—— nitidissima Forb.	284
—— —— Kryn.	284
—— novenaria Ant.	266
—— Nympha P.	13
—— Oahuensis Green	233
—— obsoleta Mus. Vindob.	297
—— obtusa P.	281
—— octona Ch.	266
—— —— Turt.	263
—— oleacea F.	280
—— ornata P.	286
—— orysacea Orb.	283
—— Ottonis P.	286
—— ovata P.	394
—— ovuliformis Lowe	278
—— pallida Swns.	246
—— paludinoides O.	285
—— panamensis Mlf.	266
—— panthera F.	252
—— papyracea P.	254
—— Paroliniana WB.	278
—— pavonina Spix	146
—— pellucens Ad.	295
—— pellucida P.	392
—— perdix Lam.	249
—— Perrotteti P.	260
—— peruviana Lam.	294

Pag.

Achatina perversa Swns. 244
—— Pfeifferi Dkr. 259
—— Philippiana P. 291
—— Phillipsii Ad. 264
—— phlogera P. 145
—— Phoenix Val. 535
—— picta Reeve 256
—— Poireti Rm. 288
—— polita Mlf. 273
—— portoricensis P. 258
—— Priamus Meusch. 278
—— propinqua Ad. 265
—— —— B. 297
—— pulchella Spix 144
—— pulchra Jay 297
—— pupaeformis Cantr. 277
—— —— B. 297
—— purpurea Ch. 253
—— pusilla P. 276
—— —— Scac. 275
—— pygmaea P. 275
—— ? pyramidalis P. 533
—— Rangiana P. 261
—— Reeveana P. 247
—— regina F. 244
—— reticulata P. 252
—— Richii Reeve 245
—— Risso Dh. 283
—— rosea F. 294
—— —— Dh. 287
—— sandwicensis P. 271
—— Saulcydi Joann. 243
—— Sayea Risso 296
—— Sellovii King 296
—— semidecussata Mke. 257
—— semisculpta P. 255
—— semisulcata Dh. 290
—— semitarum Rang 263
—— sericata B. 297
—— sericina Jonas 292
—— serpentina B. 297
—— shorgum B. 297
—— sinistrorsa Ch. 248
—— solida Say 246
—— solidula P. 282
—— soluta B. 297
—— sordida King 296
—— Sowerbyana P. 292
—— splendida Ant. 271
—— Stewartii Green 237
—— streptostyla P. 269
—— striata Müll. 287
—— —— Dh. 287
—— —— Lea 296
—— striatella Rang 263

Pag.

Achatina strigata King 296
—— subcylindrica Ant. 273
—— subula P. 158
—— subulata P. 282
—— subulatoides O. 267
—— succinealis B. 297
—— sulcata Gray 267
—— sultana Swns. 146
—— suturalis P. 284
—— sylvatica Spix 262
—— tenuis Gray 247
—— tenuispira Bens. 262
—— terebraster F. 262
—— tetrao Val. 535
—— tiarella F. 297
—— tigrina Cum. 297
—— tincta Reeve 252
—— tornatellina Lowe 277
—— tortillana P. 291
—— tridens Pult. 276
—— triticea Lowe 278
—— trochlea P. 266
—— truncata Gm. 286
—— tumida Parr. 535
—— turbinata Lea 296
—— turricula Migh. 261
—— turris P. 288
—— turritellata Dh. 259
—— undata P. 535
—— undulata Guild. 245
—— unilamellata Mke. 394
—— unizonata Jan 248
—— ustulata Lam. 257
—— Vanuxemensis Lea 294
—— variegata Roissy 249
—— venusta P. 291
—— vexillum Lam. 246
—— vicina Ad. 265
—— virginea L. 255
—— Virginiae Blainv. 256
—— vitrea WB. 274
—— vittata Swns. 256
—— vivipara Sow. 264
—— voluta Ch. 279
—— yucatanensis P. 291
—— zebra Lam. 250
—— —— Blainv. 249
—— —— P. 144
Achatinella Swns. 233
—— acuta Swns. 235
—— alba Nutt. 242
—— baetica Migh. 235
—— bicolor Jay 233
—— brevis P. 241
—— bulimoides Swns. 236

Pag.

Achatinella bulimoides var. Swns. 236
—— cingula Migh. 242
—— citrina Migh. 234
—— clara P. 242
—— corneola P. 241
—— decora F. 238
—— fuliginosa Gould 240
—— gravida F. 238
—— inornata Migh. 234
—— insignis Migh. 74
—— leucozonalis B. 242
—— livida Swns. 237
—— lorata F. 236
—— lugubris Ch. 239
—— luteola F. 234
—— microstoma Gould 241
—— Mighelsiana P. 238
—— mustelina Migh. 236
—— nubilosa Migh. 236
—— nucleola Gould 241
—— pallida Nutt. 242
—— perversa Swns. 238
—— pica Swns. 239
—— picta Migh. 234
—— plicata Migh. 235
—— pulcherrima Swns. 237
—— pyramis P. 241
—— radiata Gould 74
—— —— P. 240
—— Rohri P. 74
—— rosea Swns. 236
—— rubens Gould 240
—— spirizona F. 235
—— Stewartii Nutt. 242
—— striatula Gould 242
—— sulphurata B. 242
—— taeniolata P. 239
—— textilis F. 240
—— tristis F. 240
—— turbinata Nutt. 242
—— turritella F. 233
—— ventulus F. 241
—— venusta Migh. 234
—— vestita Migh. 238
—— viridans Migh. 240
—— vulpina F. 237
Achatinus zebra Montf. 250
Acicula acicula B. 275
—— eburnea Risso 275
—— miliaris B. 276
Alaea Annaaensis B. 355
—— antivertigo B. 362
—— cylindrica Jeffr. 306
—— edentula B. 305
—— inornata B. 304

Pag.

Alaea marginata Jeffr. 312
—— millium B. 367
—— minutissima B. 307
—— nitida Jeffr. 305
—— palustris Jeffr. 362
—— Paredesii B. 310
—— Pitcairnensis B. 367
—— pygmaea B. 363
—— substriata Jeffr. 363
—— vulgaris Jeffr. 363
Amphibina oblonga Htm. 516
—— putris Htm. 514
Amphibulima cucullata Lam. 532
—— Gayana B. 528
—— macrostoma B. 518
—— patula B. 532
—— rubescens B. 531
—— tigrina B. 530
—— unguis B. 527
Amphibulimus cucullatus Montf. . 532
Amphibulina oblonga Htm. 516
—— putris Htm. 515
Ampullaria rosea Spix 22. 49
Andraea dubia Htm. 476
Apoma elongata B. 381
Auricula aurantiaca Schum. 139
—— auris leporis Swns. 98
—— bovina Lam. 139
—— caprella Lam. 88
—— fuscagula Lea 84
—— leporis Lam. 98
—— Malchi B. 228
—— owaihiensis Cham. 75
—— signata Wagn. 90
—— Sileni Lam. 89
—— sinistrorsa Cham. 76
Auris melastoma Spix 92
—— Midae Chemn. 139
—— —— distorta Ch. 88
—— —— fasciata Ch. 73
—— signata Spix 90
—— virginea Ch. 53
—— vittata Spix 90
—— vulpina Ch. 93
Azeca Goodallii Ald. 277
—— Matoni Turt. 277
—— pupaeformis P. 277
—— tridens Leach 276

Balaea fragilis Leach 388
—— perversa Gray 388
Balea Prid. 387
—— Chemnitziana Villa 381
—— elatior Spix 390
—— fragilis Gray 388

Pag.

Balea Funcki P. 389
—— livida Rm. 389
—— lucifuga Leach 388
—— perversa Linn. 387
—— Sarsi Phil. 388
—— tristensis Leach 388
—— truncatula Villa 375
—— turrita P. 391
—— ventricosa Leach 389
Balia fragilis Swns. 388
—— ventricosa Swns. 389
Bostryx solutus Trosch. 161
Brachypodella antiperversa B. ... 376
—— collaris B. 376
—— perplicata B. 377
—— subula B. 375
Brachypus costatus Guild. 379
—— pallidus Guild. 379
Brephulus clausiliaeformis B. 138
—— fasciolatus B. 123
—— fuscostrigatus B. 138
—— illibatus B. 123
—— obvolutus B. 231
—— tauricus B. 226
—— Tournefortii B. 136
—— zebrinus B. 138
—— zebrula B. 137
Buccinum achatinum Müll. 250
—— acicula Müll. 274
—— columna Müll. 268
—— exaratum Müll. 16
—— fasciatum Müll. 245
—— ficus Martyn 279
—— stercus pulicum Ch. 279
—— striatulum Müll. 181
—— striatum Müll. 287
—— —— Ch. 287
—— strigatum Müll. 181
—— terrestre Mont. 275
—— variegatum Fab. Col. ... 249
—— virgineum Müll. 256
—— zebra Müll. 143
Bulimina labrosa Ehrenb. 65
Buliminus affinis B. 207
—— Alepi B. 66
—— alpinus B. 231
—— assimilis B. 121
—— avellana B. 231
—— badiosus B. 79
—— bilineatus B. 211
—— cactorum B. 198
—— calvus B. 225
—— Collini B. 120
—— Cora B. 57
—— corneus B. 219

Pag.

Buliminus coturnix B. 150
—— crepundius B. 173
—— culmineus B. 221
—— dealbatus B. 188
—— derelictus B. 63
—— detritus B. 223
—— erosus B. 225
—— Forskalii B. 63
—— fragrosus B. 64
—— gastrum B. 122
—— graecus B. 121
—— habessinicus B. 110
—— insularum B. 231
—— Jacobi B. 98
—— labiosus B. 67
—— labrosus B. 65
—— Lakhamensis B. 120
—— Laurentii B. 218
—— Lyelliae B. 231
—— Maugeri B. 385
—— modestus B. 208
—— montivagus B. 112
—— mutabilis B. 62
—— nux B 183
—— obscurus B. 125
—— Proteus B. 61
—— pustulosus B. 217
—— revolutus B. 119
—— scalariformis B. 217
—— scutulatus B. 214
—— Sidonensis B. 308
—— sordidus B. 535
—— striatellus B. 209
—— styliger B. 193
—— tener B. 120
—— thamnoicus B. 185
—— trichodes B. 112
—— unicolor B. 219
—— ustulatus B. 218
—— versicolor B. 61
Bulimulus abyssorum B. 46
—— acutus Leach 224
—— albicans B. 191
—— albus B. 190
—— alternans B. 207
—— angulosus B. 108
—— apicatus B. 231
—— apodemetes B. 173
—— Assumptionis B. 231
—— bengalensis B. 194
—— bivittatus B. 62
—— Bolivarii B. 55
—— Bontia B. 194
—— Capueira B. 97
—— Caraibaeorum B. 202

	Pag.
Bulimulus Chiriguanus B.	231
—— chrysotrema B.	231
—— citrinovitreus B.	149
—— conspersus B.	191
—— debilis B.	173
—— discrepans B.	176
—— erythrostoma B.	190
—— figulinus B.	231
—— fluctuatus B.	95
—— fraterculus B.	220
—— fuscus Guild.	229
—— Gouadaloupensis B.	224
—— graniger B.	167
—— guttatus B.	177
—— heloicus B.	204
—— heterogrammus B.	106
—— hygrohylaeus B.	60
—— inflatus B.	189
—— linostoma B.	35
—— lithoicus B.	168
—— litus B.	103
—— lophoicus B.	60
—— marmarinus B.	59
—— melo B.	188
—— mexicanus B.	102
—— multifasciatus B.	109
—— nitidulus B.	177
—— ochraceus B.	231
—— onager B.	107
—— oreades B.	203
—— pallidior B.	61
—— Panamensis B.	207
—— papyraceus B.	103
—— Pazianus B.	111
—— perlucidus B.	204
—— plicatus Guild.	170
—— poecilus B.	200
—— polygrammus B.	106
—— pruinosus B.	198
—— pseudosuccineus B.	148
—— pugio B.	231
—— pulcher B.	210
—— radiatus Risso	223
—— Rocayanus B.	36
—— rubellus B.	205
—— rufescens B.	229
—— Schröteri B.	232
—— simplex B.	224
—— sporadicus B.	202
—— stramineus Guild.	204
—— tenuissimus B.	218
—— Thoreyi B.	219
—— tigris B.	205
—— Torallii B.	201
—— translucens B.	196

	Pag.
Bulimulus trifasciatus Leach	224
—— turritellatus B.	208
—— undulatus Guild.	95
—— unifasciatus B.	195
—— varians B.	205
—— venustus B.	232
—— vexillum B.	205
—— vimineus B.	96
—— vitreus B.	534
—— vittatus B.	105
—— xanthostoma B.	58
—— zographicus B.	104
Bulimus Scop.	1
—— abbreviatus Jan	223
—— abyssinicus Rüpp.	110
—— —— Coll.	180
—— abyssorum O.	46
—— achatinaceus P.	156
—— achatinoides Z.	179
—— achatinus Brg.	249
—— acicula Brg.	275
—— acuminatus Sow.	14
—— acuticostatus O.	157
—— acutulus Z.	215
—— acutus Brg.	214
—— —— ♂ Drap.	215
—— Adansoni P.	179
—— adustus Sow.	78
—— Aegle Brod.	27
—— aegotis Mke.	89
—— affinis Z.	207
—— agnatus Z.	535
—— albatus F.	213
—— Alberti Brod.	3
—— albicans Brod.	191
—— albinus Grat.	10
—— albolimbatus P.	129
—— albus Sow.	190
—— algirus Brg.	288
—— alpinus Z.	231
—— alternans B.	207
—— alternatus Say	221
—— alumnus Parr.	133
—— Alvarezii Orb.	139
—— amabilis P.	71
—— ambiguus Z.	215
—— amoenus P.	172
—— andicola P.	214
—— angiostomus Wagn.	97
—— angosturensis Grun.	110
—— angulatilis F.	231
—— angulatus Wagn.	94
—— Antiguensis Guild.	224
—— antipodarum Gray	227
—— Antoni P.	221

	Pag.
Bulimus apenninus Jan	121
—— apicatus B.	231
—— —— Mlf.	208
—— apicinus Mke.	227
—— apiculatus Gray	209
—— aplomorphus Jonas	31
—— apodemetes O.	173
—— appendiculatus Jan	138
—— aratus Sow.	77
—— —— Küst.	64
—— arcuatus Hutt.	118
—— armatus Migh.	76
—— articulatus Lam.	215
—— —— Turt.	80
—— aspersus Grat.	76. 77
—— assimilis Z.	121
—— —— Pot. et Mich.	121
—— Assumptionis Val.	231
—— astrapoides Jonas	36
—— athensis Friv.	128
—— atomatus Gray	171
—— atricallosus Gould	39
—— aurantius Perry	231
—— auratus P.	172
—— aureus Swns.	39
—— auricula F.	75
—— auriculatus P.	72
—— auris cervina F.	231
—— —— leporis Brg.	98
—— —— Malchi Brg.	228
—— —— muris Moric.	99
—— —— Sileni Brg.	87
—— —— vulpina Ch.	93
—— auritus Sow.	25
—— Aurora Jay	199
—— australis Brg.	73
—— avellana B.	231
—— avenaceus Brg.	347
—— Babauchii Ant.	128
—— Babel F.	231
—— baboucha Pot. et Mich.	163
—— bacillaris Mke	227
—— bacillus F.	535
—— bacterionides O.	156
—— badiosus F.	79
—— badius Sow.	189
—— baeticatus F.	79
—— bahiensis Moric.	96
—— balanoides Jon.	33
—— Bamboucha WB.	163
—— barbarus L.	124
—— Bataviae Grat.	40
—— Beckianus P.	164
—— bellulus Jonas	25
—— bengalensis Lam.	194
Bulimus benguelensis P.	210
—— Bergeri Roth.	134
—— Bertheloti P.	64
—— bicallosus Friv.	136
—— bicarinatus Brg.	248
—— bicinctus Récl.	213
—— bicolor Sow.	198
—— bicoloratus Lea	4
—— bidens Brg.	397
—— —— Kryn.	138
—— bifasciatus Phil.	199
—— bilabiatus Brod.	91
—— bilineatus Sow.	211
—— bitaeniatus Nyst	199
—— bivittatus Sow.	62
—— —— Phil.	199
—— Blainvilleanus P.	45
—— boeticatus Orb.	79
—— Boholensis Brod.	13
—— Boissieri Moric.	149
—— Bolivarii Orb.	55
—— bolivianus P.	105
—— Bontiae Chemn.	194
—— bootis Mke	139
—— —— var. Mke	182
—— Botterianus Phil.	134
—— bovinus Brg.	139
—— brachyodon Sow.	77
—— brachysoma O.	46
—— brephoides O.	143
—— brephos B.	231
—— breviculus P.	35
—— brevis Jay	231
—— Bridgesi P.	47
—— Broderipii Sow.	146
—— Bronni P.	22
—— bulla Mke	189
—— bullula Brod.	10
—— Burchellii Gray	162
—— Buschi P.	148
—— cactivorus Brod.	175
—— caffer Krauss	192
—— calcareus Born	151
—— —— Brg.	151
—— —— Parr.	137
—— caledonicus Petit	140
—— Calista Brod.	12
—— callosus P.	222
—— calobaptus Jonas	42
—— calvus Sow.	225
—— Calypso Brod.	11
—— camba O.	115
—— camelopardalis Brod.	12
—— canaliculatus P.	93
—— candelaris P.	127

		Pag.
Bulimus	candidatus Z.	123
——	candidissimus Nyst	187
——	canimarensis P.	81
——	cantagallanus Rang.	20
——	Cantorii Phil.	66
——	Capueira Dh.	97
——	Caribaeorum Lam.	202
——	carinatus Perry	535
——	—— Lea	32
——	carinula P.	216
——	carneolus Grat.	10
——	carneus P.	66
——	carteriensis Quoy	68
——	castaneus P.	52
——	castrensis P.	213
——	castus P.	47
——	caucasius Z.	121
——	centiquadrus Val.	231
——	ceylanicus P.	59
——	Chemnitzii Küst.	191
——	chersonesicus Sow.	231
——	chilensis Less.	167
——	—— B.	53
——	chiriguanus O.	231
——	Christiani B.	231
——	chrysalidiformis Sow.	76
——	chrysalis P.	108
——	chrysotrema B.	231
——	ciliatus Gould	174
——	cincinniformis Sow.	9
——	cincinnus Sow.	9
——	cinctus Jay	185
——	cinnamomeo-lineatus Moric.	109
——	citrino-vitreus Moric.	149
——	citrinus Brg.	37. 38
——	clausiliaeformis Mke.	138
——	clausinus Migh.	228
——	clavator Petit	142
——	clavulinus Pot. et Mich.	159
——	clavulus Turt.	159
——	coarctatus P.	90
——	cochliodes P.	152
——	coelebs Bens.	119
——	Collini Mich.	121
——	coloratus Nyst	48
——	columba Brg.	90
——	columbianus Lea	201
——	columella Phil.	155
——	columna Brg.	269
——	columnaris Z.	535
——	columnella Klett	231
——	compactus Friv.	137
——	compressus B.	231
——	concinnus Sow.	15
Bulimus	concolor B.	231
——	coniformis P.	178
——	connivens P.	63
——	conoideus Jan.	216
——	consentaneus Z.	121
——	conspersus Sow.	190
——	—— Pot. et Mich.	191
——	constrictus P.	110
——	contrarius Dh.	38
——	coquimbensis Brod.	147
——	Cora O.	57
——	corneus Sow.	219
——	—— Dh.	121
——	—— Mke	79
——	—— Pot. et Mich.	219
——	—— Lea	219
——	coronatus P.	168
——	corrugatus Brg.	483
——	—— King	228
——	—— Wagn.	20
——	costatus P.	114
——	Costerii Eyd.	33
——	costulatus Pot. et Mich.	189
——	—— Ad.	268
——	coturnix Sow.	150
——	Coxeiranus Dh.	105
——	Coxiranus Pot. et Mich.	110
——	crassilabris Gray	185
——	crenulatus P.	53
——	crepundia O.	173
——	cretensis P.	117
——	Crichtoni Brod.	28
——	culmineus O.	221
——	Cumingi P.	11
——	curtus Koch	63
——	cuyoensis P.	43
——	cylindraceus Calc.	161
——	cylindricus Gray	80
——	—— Péron	231
——	—— Mke	226
——	—— Hutt.	118
——	cylindrus Gray	80
——	dactylus Brod.	32
——	Daphnis Brod.	4
——	dardanus Friv.	126
——	Darwini P.	199
——	dealbatus Say	187
——	debilis B.	173
——	decapitatus Spix	154
——	decollatus L.	152
——	decoloratus Sow.	211
——	decoratus Gray	30
——	—— Lea	182
——	decorus Ant.	239
——	dentatus Wood	86

Pag.

Bulimus dentatus King 87
—— denticulatus Oliv. 477
—— derelictus Brod. 63
—— Deshayesi P. 200
—— detritus Müll. 222
—— Diana Brod. 32
—— dilatatus P. 8
—— discrepans Sow. 176
—— distortus Brg. 88
—— doliolum Brg. 326
—— Dombeyanus F. 57
—— Downesii Gray 15
—— Draparnaudi P. 174
—— Dryas Brod. 41
—— dubiosus Jay 94
—— Dufresnii Leach 168
—— Dunkeri P. 101
—— durus Spix 104
—— Dysoni P. 183
—— eburneus P. 179
—— effusus P. 27
—— egregius P. 50
—— Ehrenbergi P. 127
—— elegans P. 148
—— elobatus Gould 184
—— elongatulus P. 154
—— emarginatus Dh. 128
—— Emeus Say 221
—— erosus Brod. 225
—— erubescens P. 44
—— erythrostoma Sow. 190
—— eschariferus Sow. 115
—— euryomphalus Jonas. 88
—— euryzonus P. 34
—— evanescens Brod. 10
—— exaratus Brg. 16
—— exesus Spix 83
—— exilis Gm. 223
—— —— Gray 224
—— eximius Reeve 56
—— expansus P. 60
—— faba Martyn 73
—— fallax Z. 121
—— fasciatus Turt. 535
—— fasciolatus Oliv. 122
—— Faunus Brod. 5
—— —— Parr. 231
—— faux nigra Parr. 123
—— Favannii Lam. 184
—— fenestratus P. 101
—— Ferussaci Dkr. 212
—— feuilleanus Mol. 231
—— fibratus Martyn 139
—— fictilis Brod. 43
—— figulinus B. 231

Pag.

Bulimus flammeus Müll. 180
—— —— Z. 138
—— flammulatus P. 181
—— flavescens King 75
—— flavidus Mke 203
—— floccosus Wagn. 16
—— folliculus P. 81
—— —— Morelet 283
—— Fontainii O. 220
—— formosus Wood 80
—— Forskalii B. 63
—— Fourmiersii O. 196
—— fragilis Lam. 228
—— —— F. 74
—— —— Spix 142
—— —— Parr. 120
—— fragosus F. 64
—— frater F. 30
—— fraterculus F. 220
—— Frivaldskyi P. 123
—— fulgetrum Brod. 31
—— fulguratus Jay 55
—— —— Val. 19
—— fulminans Nyst 25
—— fulvicans P. 99
—— fulvus Brg. 251
—— Funckii Nyst 36
—— funeralis Brg. 169
—— fuscagula O. 84
—— fuscus Guild. 228
—— —— Friv. 124
—— fusiformis Rang 94
—— —— Mke 226
—— fusoides O. 51
—— fusus Brg. 316. 318
—— Galeotti Nyst 187
—— gallinasultana Ch. 145
—— Ganymedes P. 72
—— gastrum Ehrenb. 122
—— geometricus P. 59
—— gibber Kryn. 118
—— Gibbonius Lea 51
—— gibbus F. 69
—— gilvus Sow. 7
—— glaber Gm. 89
—— glandiformis Lea 49
—— glans Brg. 279
—— gnomon B. 231
—— goniostomus F. 50
—— gonochilus P. 69
—— Goodallii Mill. 159
—— Gossei P. 81
—— Goudoti Petit 167
—— Gouldi P. 74
—— gracilis Hutt. 157

	Pag.
Bulimus gracilis Lea ..... 9.	104
—— gracillimus P.	160
—— —— B.	231
—— graecus B.	121
—— granadensis P.	197
—— granulosus Rang	22
—— —— Pot. et Mich.	167
—— Grateloupi P.	169
—— gravidus P.	238
—— Grayanus P.	82
—— Griffithii Ad.	290
—— griseus Less.	68
—— grossus B.	231
—— Gruneri P.	213
—— guadeloupensis Brg.	224
—— guamensis P.	73
—— Guarani O.	206
—— Guerini P.	27
—— Guildingii P.	80
—— Guimarasensis Brod.	30
—— guineensis Jonas	178
—— guttatus Brod.	177
—— haemastomus Scop.	21
—— —— Swains. ..	19
—— —— Less.	23
—— halepensis P.	65
—— Hanleyi P.	171
—— hannensis Rang	160
—— haplostylus P.	152
—— harpa P.	150
—— Hartwegi P.	140
—— Hebe P.	68
—— Hegewischi P.	172
—— helena Quoy	198
—— heloicus O.	204
—— helvolus WB.	116
—— Hennahi Gray	197
—— heterogrammus Moric. ..	106
—— heterotrichus Moric.	116
—— Hilairii Gray	84
—— Hindsi P.	11
—— hirtus B.	100
—— Hohenackeri Kryn.	223
—— holostomus P.	161
—— hondurasanus P.	209
—— hordeaceus Brg.	125
—— Huttoni P.	118
—— hyalinus Brod.	67
—— —— Wagn.	142
—— hybridus Gould	51
—— hygrohylaeus O.	59
—— Illheocola Moric.	92
—— illibatus Z.	123
—— imperator P.	533
—— Inca O.	142

	Pag.
Bulimus incomptus Sow.	15
—— inconstans Mlf.	73
—— indicus P.	157
—— indutus Mke	186
—— inflatus Lam	189
—— —— Spix	103
—— —— Oliv.	447
—— insularum B.	231
—— internicosta Partsch	138
—— interruptus Brg.	39
—— —— Lam.	38
—— interstinctus Gould	169
—— inversus Brg.	38
—— —— Küst.	37
—— iostomus Sow.	29
—— irregularis P.	183
—— isabellinus P.	70
—— Jacobi Sow.	98
—— janeirensis Sow.	96
—— Jayanus Lea	229
—— Jeannoti Terv.	124
—— Johnii F.	231
—— Jonasi P.	107
—— Jordani Charp.	65
—— juglans P.	7
—— junceus Gould	220
—— Jussieui Val.	186
—— Kambeul Brg.	179
—— —— Küst.	180
—— Kieneri P.	79
—— Kingii Gray	174
—— Knorri P.	95
—— Kochi P.	148
—— kordofanus Parr.	179
—— Kraussi P.	184
—— kremnoicus O.	19
—— Kutschigii Küst.	133
—— labeo Brod.	56
—— labiatus Z.	128
—— labiosus Brg.	67
—— labiozonalis Grat.	9
—— labropurpureus Grat. ...	32
—— labrosus Oliv.	64
—— —— Wood, Gray ..	66
—— —— Küst.	64
—— Lackhamensis Flem.	120
—— lactarius Mke	187
—— lacteus Lea	169
—— lacticolor Sow.	62
—— lacunosus O.	28
—— laevigatus Ad.	159
—— laevis Gray	59
—— laeviusculus Ad.	159
—— laevus Müll.	39
—— lagotis Mke	98

	Pag.
Bulimus Lamarckianus P.	45
—— Largillierti Phil.	166
—— larvatus Brod.	43
—— lateralis Mke	99
—— latilabris B.	231
—— Lattrei P.	56
—— Laurentii Sow.	218
—— Leai P.	9
—— lemniscatus Dh.	193
—— leopardus P.	26
—— leptochilus P.	534
—— leptocochlias Jonas	154
—— leucodon P.	136
—— leucophaeus Sow.	5
—— leucostomus Sow.	23
—— leuzonicus Jay	33
—— Liberianus Lea	116
—— lichenum (Orb.) B.	112
—— lichnorum O.	113
—— Liebmanni P.	106
—— lignarius P.	3
—— liliaceus F.	203
—— —— Pot. et Mich.	203
—— limnoides F.	224
—— limonoicus O.	111
—— linearis Krauss	157
—— lineatus Brug.	535
—— —— Spix	109
—— —— Perry	297
—— —— Less.	72
—— —— Rm.	226
—— linostoma O.	35
—— Listeri Gray	534
—— Lita Dh.	103
—— lithoicus O.	167
—— litoralis Brum.	215
—— litturatus Spix	103
—— livescens P.	175
—— Loewii Phil.	130
—— longiseta Moric.	196
—— lophoicus O.	60
—— loratus Ant.	236
—— Lorenzii O.	218
—— Lovéni P.	26
—— loxensis P.	203
—— lubanicus P.	78
—— lubricus Brg.	272
—— lugubris P.	239
—— luteolus F.	235
—— lutescens King	49
—— luteus Less.	229
—— —— Z.	223
—— luzonicus Sow.	33
—— lycicus P.	65
—— Lyelliae P.	231

	Pag.
Bulimus Lyonetianus Brg.	298
—— —— Küst.	99
—— macrostomus P.	24
—— maculatus Brg.	289
—— —— Lea	205
—— magnificus Grat.	165
—— magus Wagn.	103
—— Mahogani Sow.	24
—— malleatus Jay	55
—— Manoelii Moric.	110
—— maritimus Dh.	151
—— marmarinus O.	59
—— marmoratus Dkr.	36
—— martinicensis P.	120
—— Mathiusii O.	25
—— Matthewsii B.	25
—— Maugeri Gray	385
—— maximus Sow.	19
—— melania F.	231
—— melanocheilus Val.	144
—— —— Nyst	141
—— melanorhinus Jan	223
—— melanostomus Swns.	91
—— —— Sow. var.	92. 93
—— melastomus Swns.	91
—— melo Quoy	188
—— —— b Mke	174
—— melones Pot. et Mich.	188
—— membranaceus Phil.	102
—— Menkei Grun.	176
—— merduenianus Kryn.	119
—— meridanus P.	103
—— meridionalis P.	108
—— mexicanus Lam.	101
—— micra O.	165
—— microstomus Andrz.	133
—— microtragus Parr.	132
—— Miersii Reeve	43
—— Milleri Sow.	44
—— mimosarum O.	162
—— Mindoroensis Brod.	76
—— modestus Brod.	207
—— —— Jan	231
—— monozonus P.	533
—— Montacuti Jeffr.	120
—— Montagnei Orb.	111
—— montanus Drap.	120
—— montevidensis P.	202
—— montivagus O.	112
—— Moquinianus WB.	165
—— Moricandi P.	109
—— Moritzianus P.	23
—— morosus Gould	56
—— mozambicensis P.	177
—— Mülleri O.	535

Pag.

Bulimus multicolor Rang 42
—— multifasciatus Lam..... 108
—— multilatus Say..... 153
—— multilineatus Say 204
—— Mumia Brg. 321
—— Munsterii O. 109
—— mus Brod..... 7
—— muscorum Brg. ... 312. 329
—— mutabilis Brod..... 62
—— mutilatus Say 153
—— myosotis WB. 126
—— natalensis Krauss..... 48
—— navicula Wagn. 99
—— nebulosus P. 14
—— neglectus P. 113
—— nemoralis Z. 231
—— niger Dufo 168
—— nigrofasciatus P. 194
—— nilagiricus P. 119
—— nimbosus Brod. 30
—— Niso P. 132
—— nitens Schmidt 273
—— nitidissimus Kryn..... 284
—— nitidulus P. 117
—— nitidus Brod. 176
—— nivalis O. 170
—— niveus P. 231
—— noctivagus Parr. 123
—— novenarius Z. 535
—— nucifragus Parr. 135
—— nucleus O. 49
—— nux Brod. 183
—— Nympha P. 13
—— obeliscus Moric. 152
—— —— Pot. et Mich... 151
—— obesatus Webb 117
—— oblongus Müll. 21
—— —— P. 78
—— obscurus Drap. 124
—— obsoletus Z. 226
—— obtusatus Gm. 151
—— obtusus P. 163
—— obvolutus Z. 231
—— ochraceus B. 231
—— octonoides O. 158
—— —— Ad. 160
—— octonus Brg. 266
—— odontostomus Sow. 82
—— olivaceus P. 124
—— Olivieri P. 116
—— olorinus Ducl. 190
—— omphalodes Mke 105
—— onager B. 106
—— Onça O. 17
—— onyx Brod. 32

Pag.

Bulimus oomorphus Sow. 78
—— opalinus Sow. 107
—— oparanus P. 158
—— Orbignyi P. 208
—— oreades O. 202
—— orientalis Friv. 136
—— ornatus Dufo..... 101
—— oroboenus O. 143
—— oryza Brg..... 164
—— —— Dh. 164
—— oscillum F. 231
—— otaheitanus Brg..... 71
—— ovatus Brg. 19
—— ovoideus Brg. 45
—— —— Lam. 33
—— ovularis Oliv. 334
—— ovum F. 231
—— —— Dh. 535
—— owaihiensis P. 76
—— pachychilus P. 46
—— palaceus v. d. Busch ... 39
—— pallens Jonas 178
—— pallidior Sow. 61
—— pallidus Ad. 161
—— paludinoides Ant. 221
—— panamensis Brod. 206
—— panayensis P. 156
—— Pantagruelinus Moric. .. 83
—— papillaris Brg. 453
—— papyraceus Mawe 102
—— paradoxus P. 42
—— pardalis F. 36
—— Parolinianus O. 278
—— Parreyssi P. 134
—— partuloides Brod. 42
—— parvus Lea 170
—— patulus Brg. 532
—— Pazianus O. 111
—— Pealianus Lea 35
—— pellucidus P. 156
—— pemphigodes Jonas 192
—— Pentagruelinus Dh. 83
—— perdiceus Z. 138
—— perdix P. 89
—— perlucidus Spix..... 204
—— perspectivus P. 97
—— peruvianus Brg. 166
—— perversus L. 37
—— —— Brg. 536
—— —— Poir. 387
—— Petiti P. 185
—— phasianella Val. 29
—— phasianellus Dh. 29
—— Philippii P. 208
—— Philippinensis P. 6

	Pag.
Bulimus Phillipsii Ad.	265
—— phlogerus O.	145
—— pictor Brod.	31
—— pintadinus O.	17
—— piperitus Sow.	17
—— Pithogaster F.	4
—— planidens Mich.	54
—— plectostylus P.	48
—— plicatus Guild.	170
—— poecilus O.	200
—— Poireti C. Pfr.	288
—— polygrammus Mor.	106
—— polymorphus O.	47
—— ponderosus Jan.	189
—— Popelairianus Nyst	20
—— porphyrius P.	199
—— porraceus Jay.	41
—— Powisianus Petit	140
—— praecilus Ant.	200
—— Priamus Brg.	279
—— princeps Pot. et Mich.	146
—— procerus Ad.	158
—— prolatus Gould	170
—— Proteus Brod.	61
—— —— Guild.	202
—— proximus Sow.	20
—— pruinosus Sow.	198
—— pruninus Gould	222
—— Pseudosuccinea Moric.	148
—— pubescens Moric.	111
—— pudicus Müll.	53
—— pugio B.	231
—— pulchellus Spix	144
—— —— Dh.	205
—— —— P.	534
—— pulcher Gray	210
—— pulicarius B.	231
—— pullatus F.	231
—— pullus Gray	162
—— pulverulentus P.	100
—— pumicatus Migh.	170
—— pumilus P.	159
—— punctatissimus Less.	84
—— punctatus Anton	212
—— punctulifer Sow.	150
—— pupa Brg.	128
—— pupaeformis Cantr.	277
—— pupiformis Brod.	113
—— pupoides Spix	86
—— —— Anton	165
—— purpurascens Brg.	253
—— pusio Brod.	225
—— pustulosus Brod.	217
—— pyramidalis Sow.	14
—— Pythogaster Lam.	4

	Pag.
Bulimus quadricolor P.	18
—— quadridens Müll.	131
—— quinquedentatus Mlf.	129
—— quitensis P.	182
—— Quoyi P.	16
—— radiatus Brg.	222
—— radiolatus P.	69
—— Rawakensis F.	231
—— Reclusianus P.	172
—— Reevei Brod.	2
—— reflexus P.	147
—— regina O.	244
—— retusus Oliv.	418
—— revolutus Z.	119
—— rhodacme P.	211
—— rhodinostoma O.	96
—— rhodospirus Pot. et Mich.	92
—— rhodostomus Gray	186
—— Richii Lam.	245
—— rimatus P.	104
—— ringens Dkr.	85
—— Rivasii O.	155
—— Rocayanus O.	35
—— roccellicola WB.	126
—— Rohri P.	74
—— romblonensis P.	9
—— rosaceus King	52
—— —— var. Dh.	53
—— roseus Montf.	21
—— —— Brod.	70
—— Rossmässleri P.	127
—— rubellus Dh.	205
—— rubens Mlf.	74
—— rubicundus F.	232
—— rubidus Z.	232
—— rudis Ant.	197
—— Rüppellianus P.	180
—— rufescens Gray	229
—— rufogaster Less.	6
—— rufus Less.	229
—— rugiferus Sow.	115
—— rugulosus Sow.	113
—— rupestris Kryn.	121
—— —— Phil.	310
—— sandwicensis P.	114
—— Santa Cruzii O.	23
—— sarcodes P.	220
—— Satyrus Brod.	13
—— Sayi P.	176
—— scabiosus Sow.	210
—— scalariformis Brod.	217
—— sceptrum B.	232
—— Schiedeanus P.	187
—— Schröteri F.	232
—— scobinatus Wood	100

	Pag.
Bulimus sculpturatus P.	183
—— scutilus Migh.	165
—— scutulatus Brod.	213
—— seductilis Z.	131
—— seminiger Mke	239
—— Sennaariensis Parr.	180
—— septemdentatus Roth.	135
—— septemplicatus P.	84
—— septenarius Brg.	155
—— sericinus Jonas	209
—— serperastrus Say	102
—— sexdentatus Wagn.	85
—— Shongii Less.	140
—— sidoniensis Charp.	308
—— signatus Spix	90
—— similis Brg.	345
—— simplex Jonas	11
—— siquijorensis P.	12
—— smaragdinus Reeve	29
—— socotorensis P.	226
—— solidus P.	28
—— solitarius Poir.	216
—— solutus Trosch.	161
—— —— Bens.	212
—— sordidus Less.	188
—— —— Dh.	61
—— Sowerbyi P.	195
—— spadiceus Mke	192
—— speciosus Parr.	179
—— spirizona P.	235
—— Spixii Wagn.	142
—— —— Pot. et Mich.	191
—— spoliatus Parr.	138
—— sporadicus O.	201
—— Spratti P.	122
—— squamulatus Crist. et Jan	53
—— St. Crucis B.	23
—— stabilis Sow.	34
—— stramineus Guild.	203
—— striatellus Ad.	160
—— striatocostatus O.	160
—— striatulus Brg.	181
—— —— Dh.	208
—— striatus King	209
—— —— Brg.	287
—— strigatus Brg.	181
—— —— Sow.	60
—— strigilosus Dufo.	193
—— struthiolaris Mke	92
—— Studeri P.	107
—— styliger B.	193
—— stylus Parr.	135
—— —— B.	232
—— subantiquatus B.	232
—— subcarinatus P.	8

	Pag.
Bulimus subcylindricus Poir., Dupuy	273
—— subdiaphanus King	163
—— subglobosus Lea	7
—— subsemiclausus Petit	170
—— subtilis Rm.	123
—— subula P.	158
—— subulatus Rm.	227
—— subuliformis Moric.	155
—— succineus Brg.	513
—— succinoides Petit	18
—— sulcatus Brg.	301
—— sulcosus P.	196
—— sultanus Lam.	38
—— superbus Jonas	37
—— Swainsoni P.	92
—— Sylvanus P.	40
—— sylvaticus Wagn.	262
—— syriacus P.	66
—— taeniolus Nyst	200
—— Taunaisii F.	141
—— Taunaysii O.	142
—— tauricus Lang	226
—— tenellus B.	232
—— tener Z.	120
—— tenuis Ant.	177
—— tenuissimus F.	218
—— terebralis P.	114
—— terebraster Lam.	263
—— teres Oliv.	414
—— terrestris Spix	20
—— Terverianus WB.	82
—— Terverii Forb.	124
—— textilis P.	535
—— thamnoicus O.	185
—— Thersites P.	75
—— Thompsoni P.	141
—— Ticaonicus Brod.	6
—— tigris Brod.	204
—— tingitanus B.	232
—— Torallyi O.	201
—— torticollis Oliv.	463
—— Tournefortianus F.	135
—— translucens Brod.	195
—— tricallosus Mlf.	232
—— trichodes O.	112
—— tricingulatus Ant.	212
—— tricolor Mlf.	73
—— tricuspidatus Küst.	132
—— tricuspis P.	134
—— tridens Müll.	129
—— tridentatus Parr.	134
—— trifasciatus Brg.	58
—— trigonostomus Jon.	94
—— trilineatus Quoy	174

	Pag.
Bulimus tristis F.	240
—— trochoides Brg.	230
—— truncatus P.	154
—— Tschudii Trosch.	163
—— tuberculatus Turt.	128
—— Tuckeri P.	158
—— tumidulus P.	193
—— tumidus Parr.	232
—— Tupacii O.	52
—— turgens F.	232
—— turricula P.	81
—— turritella Ant.	234
—— —— Andrz.	215
—— —— O.	208
—— turritus Brod.	178
—— uber P.	26
—— umbilicaris Soul.	97
—— undatus Brg.	143
—— —— Wagn.	144
—— undulatus Guild.	95
—— unicallosus Kryn.	232
—— unicarinatus Lam.	80
—— unicolor Sow.	219
—— —— Andrz.	123
—— unidentatus Sow.	54
—— unifasciatus Sow.	195
—— unilamellatus O.	394
—— ustulatus Sow.	217
—— —— Jay	76
—— —— Menke	535
—— uva Brg.	317
—— Valenciennesi P.	18
—— vanikorensis Quoy	71
—— varians O.	205
—— —— Küst.	62
—— variatus WB.	125
—— variegatus P.	146
—— varius Brod.	70
—— varnensis Friv.	226
—— velatus Brod.	31
—— velutino-hispidus Mor.	100
—— velutinus P.	192
—— venezuelensis Nyst	36
—— ventricosus Brg.	30
—— —— Drap.	216
—— ventrosus F.	215
—— ventulus P.	241
—— venustus B.	232
—— Veranyi P.	49
—— vermiculatus B.	232
—— versicolor Brod.	61
—— —— Jan	47
—— vesiculosus Jonas	192
—— vexillum Brg.	246
—— —— Wood	205

	Pag.
Bulimus vexillum Dh.	207
—— vibex Hutt.	118
—— vimineus Moric.	95
—— vincentinus P.	103
—— virens P.	8
—— virgatus Jay	40
—— —— Spix	97
—— virgineus Brg. 29	54
—— —— Brg. 109	256
—— —— Lea	10
—— virgo Lea	206
—— virgulatus F.	202
—— vitreus Born	149
—— —— Spix	86
—— —— O.	274
—— —— Mlf.	164
—— vittatus Spix	105
—— —— Küst.	107
—— Voithianus P.	210
—— vulpinus Menke	237
—— Wagneri P.	85
—— —— Grat.	77
—— Webbii O.	165
—— Woodianus Lea	3
—— xantholinus Z.	179
—— xanthostomus O.	58
—— —— Wiegm.	187
—— —— Hohenack.	223
—— yostomus Villa	29
—— Yungasensis O.	57
—— zebra Müll.	143
—— —— Brg.	250
—— —— O.	246
—— —— Perry	297
—— —— Spix	107
—— —— Oliv.	137
—— zebrinus Z.	138
—— zebriolus F.	137
—— Ziegleri P.	175
—— zigzag Lam.	145
—— zonatus Swns.	58
—— zonulatus P.	194
—— zoographicus O.	104
Bulinus acicula Htm.	275
—— Adamsonii Gray	244
—— Aegle Brod.	27
—— affinis Brod.	207
—— Alberti Brod.	4
—— albicans Brod.	191
—— albus Sow.	190
—— apodemetes Sow.	173
—— arrosus Sow.	225
—— auritus Sow.	25
—— bacterionides Sow.	156
—— badius Sow.	190

	Pag.
Bulinus bicolor Sow.	198
—— bilabiatus Brod.	91
—— bilineatus Sow.	211
—— bivittatus Sow.	62
—— boholensis Brod.	13
—— Broderipii Sow.	146
—— bullula Brod.	10
—— cactivorus Brod.	175
—— Calista Brod.	12
—— calvus Sow.	225
—— Calypso Brod.	12
—— camelopardalis Brod.	12
—— chilensis Sow.	53
—— chrysalidiformis Sow.	76
—— conspersus Sow.	191
—— coquimbensis Brod.	147
—— corneus Sow.	219
—— corrugatus King	228
—— coturnix Sow.	150
—— Crichtoni Brod.	28
—— culmineus Sow.	221
—— dactylus Brod.	32
—— decollatus Htm.	153
—— decoloratus Sow.	211
—— derelictus Brod.	63
—— detritus Stud.	223
—— Diana Brod.	33
—— discrepans Sow.	176
—— Downesii Sow.	15
—— Dryas Brod.	41
—— erosus Brod.	225
—— erythrostoma Sow.	190
—— eschariferus Sow.	115
—— evanescens Brod.	10
—— fictilis Brod.	44
—— fulgetrum Brod.	31
—— —— var. Brod.	30
—— granulosus Brod.	167
—— Gravesii King	166
—— guadaloupensis Sow.	224
—— Guimarasensis Brod.	30
—— guttatus Brod.	177
—— haemastomus var. Sow.	21
—— hyalinus Sow.	68
—— hygrohylaeus Sow.	60
—— Inca Sow.	142
—— inflatus Brod.	193
—— Jacobi Sow.	98
—— janeirensis Sow.	96
—— javanicus Sow.	39
—— labeo Brod.	57
—— lacticolor Sow.	62
—— larvatus Brod.	43
—— Laurentii Sow.	218
—— leucostoma Sow.	23

	Pag.
Bulinus lophoicus Sow.	60
—— lubricus Htm.	273
—— lutescens King	49
—— luzonicus Sow.	33
—— lychnorum Sow.	197
—— Lyonetianus Sow.	298
—— maculiferus Sow.	38
—— Mahogani Sow.	24
—— maximus Sow.	19
—— melanostomus var. Sow.	92. 93
—— Miersii Sow.	43
—— Milleri Sow.	44
—— mindoroensis Brod.	76
—— modestus Brod.	207
—— montivagus Sow.	112
—— multicolor Sow.	43
—— mutabilis Brod.	62
—— —— Sow.	62
—— Myersii Sow.	54
—— nimbosus Brod.	30
—— nitidus Brod.	177
—— nucleus Sow.	49
—— nux Brod.	183
—— obscurus α Htm.	120
—— —— β Htm.	125
—— Onça Sow.	17
—— onyx Brod.	32
—— opalinus Sow.	108
—— ovoideus Sow.	33
—— —— var. Sow.	34
—— pallidior Sow.	61
—— panamensis Brod.	206
—— partuloides Brod.	42
—— perplexus Sow.	54
—— pictor Brod.	32
—— piperitus Sow.	17
—— poecilus Sow.	200
—— porraceus Sow.	41
—— princeps Brod.	144
—— Proteus Sow.	61
—— proximus Sow.	20
—— pruinosus Sow.	198
—— pulchellus Sow.	60
—— —— Brod.	205
—— punctulifer Sow.	150
—— pupiformis Brod.	113
—— pusio Brod.	225
—— pustulosus Brod.	217
—— rosaceus King	52
—— rubellus Brod.	205
—— rugiferus Sow.	115
—— rugulosus Sow.	113
—— scabiosus Sow.	211
—— scalariformis Brod.	217
—— scutulatus Brod.	214

Pag.

Bulinus sepium Htm. 223
—— signatus Sow. 80
—— sordidus King 142
—— sporadicus Sow. 201
—— —— var. Sow. . . . 203
—— striatulus Sow. 208
—— striatus King 209
—— strigatus Sow. 60
—— Sylvanus Brod. 41
—— thamnoicus Sow. 185
—— tigris Brod. 204
—— translucens Brod. 196
—— tridens Htm. 130
—— Tupacii Sow. 52
—— turritus Brod. 178
—— unicolor Sow. 219
—— unifasciatus Sow. 195
—— ustulatus Sow. 217
—— variabilis α Htm. 215
—— —— β Htm. 216
—— varians Brod. 205
—— variedentatus Htm. 130
—— velatus Brod. 31
—— versicolor Brod. 61
—— vexillum Brod. 207
—— virgatus Sow. 41
—— vittatus Brod. 193
Bulla achatina L. 249
—— —— sinistrorsa Ch. . . . 248
—— —— var. Dillw. 250
—— bicarinata Dillw. 248
—— dominicensis Gm. 289
—— exarata Gm. 16
—— fasciata Ch. 246
—— —— ε Gm. 30
—— flammea Ch. 180
—— oblonga Ch. 21
—— ovata Ch. 19
—— Priamus Dillw. 279
—— purpurea Ch. 253
—— stercus pulicum Gm. . . . 279
—— striatula Gm. 181
—— strigata Gm. 181
—— truncata Gm. 287
—— turrita Ch. 289
—— ventricosa Ch. 30
—— virginea L. 255
—— voluta Ch. 279
—— zebra Ch. 250
—— —— Gm. 143

Carychium costatum Hutt. 82
—— Menkeanum C. Pfr. 276
—— undulatum Leach 88
Cecilioides acicula B. 275

Pag.

Chersina Alabaster B. 247
—— crenata B. 246
—— fasciata B. 246
—— imperialis B. 297
—— ? integra B. 297
—— virginea B. 256
Chilonopsis sulcata Fisch. de Waldh. 534
Chondrula fusiformis B. 138
—— microstoma B. 133
—— quadridens B. 131
—— quinqueplicata B. 129
—— seductilis B. 132
—— tricallosa B. 232
—— tricuspis B. 134
—— tridens B. 130
Chondrus attenuatus Kryn. 138
—— avena Cuv. 348
—— avenaceus Guér. 348
—— cinereus Cuv. 345
—— clausiliaeformis Jan 138
—— concolor Kryn. 226
—— elatus Andrz. 130
—— frumentum Cuv. 338
—— fuscilabrus Kryn. 226
—— gastrodes Jan 367
—— granum Htm. 343
—— lineatus Kryn. 226
—— major Kryn. 129
—— megacheilos Jan 346
—— microstomus Kryn. 133
—— polyodon Cuv. 336
—— pupoides Kryn. 334
—— quadridens Cuv. 131
—— quinqueplicatus Jan 129
—— secale Cuv. 341
—— —— γ Htm. 348
—— tridens Cuv. 130
—— turgidus Kryn. 226
—— variabilis Cuv. 340
—— —— γ Htm. 338
—— —— δ Htm. 336
—— zebra Cuv. 137
Cionella acicula Jeffr. 275
—— folliculus B. 283
—— lubrica Jeffr. 273
—— lubricoides B. 273
—— tornatellina B. 277
—— triticea B. 278
Clausilia Drap. 395
—— abbreviata Villa 488
—— abrupta Küst. 422
—— acicula Cantr. 430
—— acridula Z. 411
—— aculus Bens. 460
—— adaucta Porro 447

	Pag.
Clausilia Adjaciensis Shuttl.	399
—— advena Z.	477
—— affinis Phil.	454
—— —— Z.	482
—— agnata Partsch	435
—— albescens Menke	436
—— —— Z.	436
—— albicilla Z.	477
—— albicincta Rm.	443
—— albida Parr.	455
—— albiguttata Mlf.	488
—— albocincta P.	443
—— —— Sandri	488
—— alboguttulata Wagn.	445
—— albolabris Parr.	450
—— albopustulata Jan	445
—— almissana Küst.	432
—— ambliostoma Parr.	479
—— amoena Küst.	448
—— ampla Htm.	398
—— anatolica Roth	464
—— anceps Z.	480
—— angistoma Coll.	420
—— annexa Z. 402.	446
—— antiperversa Dh.	376
—— antiquata Parr.	418
—— approximans Z.	488
—— aquila Parr.	433
—— Arbae Stentz	488
—— armata Kutsch.	421
—— asphaltina Z.	466
—— assimilis Z.	488
—— attenuata Z.	482
—— auricularis B.	488
—— badia Z.	426
—— banatica Friv.	460
—— basileensis Fitz.	481
—— bella Stentz.	460
—— bengalensis v. d. Busch	405
—— Bergeri Mayer	412
—— bicanaliculata Jay	396
—— bicarinata Z.	468
—— bicolor P.	474
—— bicristata Friv.	444
—— —— Z.	468
—— bidens L.	453
—— —— Drap.	398
—— —— var. C. Pfr.	399
—— —— var. Htm.	402
—— —— var. Menke, Scholtz	399
—— bigibbosa Charp.	436
—— bilabiata Wagn.	450
—— —— Friv.	400
—— binotata Z.	451
—— biplicata Mont.	469

	Pag.
Clausilia biplicata C. Pfr.	470
—— blanda Z.	448
—— Boissieri Charp.	414
—— Braunii Charp.	444
—— —— var. Rm.	445
—— brevis Cantr.	421
—— Brinierii Pot. et Mich.	452
—— brunnea Z.	440
—— bulla Parr.	439
—— Buschii Küst.	456
—— caerulea F.	415
—— Calcarae Phil.	453
—— callosa Mlf.	419
—— cana Held	472
—— canalifera Rm.	410
—— candidescens Z.	434
—— —— β Friv.	401
—— candidilabris Porro	446
—— capillacea Rm.	409
—— carinata Parr.	488
—— carissima Z.	460
—— cataphracta Parr.	430
—— catarvensis Dh.	438
—— cattaroensis Z.	437
—— Cecillii Phil.	413
—— cerata Rm.	399
—— cerea Mke	400
—— —— Coll.	411
—— Charlotia Risso	339
—— Chemnitziana Dh.	381
—— chersonensis Friv.	455
—— chondriformis Jan	483
—— chrysalis Gray	416
—— cincta Brum.	483
—— cinerascens Parr.	466
—— —— Cr. et Jan	470
—— cinerea Phil.	435
—— —— Risso	345
—— circumdata Friv.	475
—— clavata Rm.	473
—— cochinchinensis P.	422
—— coerulea Rm.	415
—— collaris Lam.	376
—— columellaris Mlf.	444
—— commutata Rm.	401
—— comta Mlf.	421
—— concolor Z.	449
—— consimilis Z.	480
—— consocia Z.	488
—— consors Z.	470
—— conspersa Parr.	456
—— conspurcata Jan	451
—— contaminata Z.	436
—— contracta Parr.	431
—— cordata Forst.	471

Pag.

Clausilia cornea Phil. 405
—— —— Mlf. 424
—— corpulenta Friv. 478
—— corrugata Ch. 483
—— —— Dr. 433
—— —— Mke 432. 433
—— —— Gärtn. 482
—— corticina v. d. Busch. 404
—— corynodes Held 484
—— costata Z. 407
—— —— var. Rm. 407
—— costicollis Parr. 431
—— costulata Jan 472
—— —— Lam. 396
—— —— Z. 488
—— crassilabris Mlf. 450
—— crassula P. et M. 476
—— —— Z. 482
—— crenata Mke 446
—— crenilabra Kryn. 488
—— crenulata Z. 459
—— —— Risso 484
—— cretensis Mlf. 415
—— crispa Lowe 484
—— crispula P. 377
—— cristata Z. 412
—— cruciata Stud. 476
—— cruda Z. 482
—— Cumingiana P. 406
—— curta Rm. 402
—— cuspidata Held 474
—— cylindrica Gray 428
—— dacica Friv. 442
—— dalmatina Ptsch 432
—— —— varr. Rossm., Schm. 431
—— decipiens Rm. 448
—— —— Z. 427
—— decisa Z. 472
—— decollata Stentz 464
—— decorata Z. 440
—— dedecora Z. 481
—— Deenia Cantr. 451. 452. 484
—— deltostoma Lowe 410
—— democletiana Stentz 400
—— denegabilis Parr. 420
—— densestriata Z. 481
—— denticulata Oliv. 477
—— deplana Stentz 455
—— derugata Jeffr. 398
—— Deshayesii Pot. et Mich. 485
—— detersa Z. 411
—— detrita Z. 399
—— diaphana Z. 409
—— didyma Parr. 411
—— diluta Z. 446

Pag.

Clausilia diminuta Parr. 461
—— diodon Stud. 402
—— —— Auctt. 401
—— discolor P. 416
—— distinguenda Z. 410
—— Draparnaldi B. 433
—— dubia Dr. 476
—— —— Htm. 482
—— elata Z. 458
—— elegans Cantr. 420
—— —— P. 374
—— elegantula Z. 448
—— elongata Cantr. 448. 485
—— episcopalis Jan 437
—— epistomium Küst. 397
—— exarata Z. 419
—— excisilabris Stentz 488
—— exesa Spix 83
—— —— Pot. et Mich. 84
—— exigua Lowe 485
—— exilis Z. 403
—— exsculpta Jan 411
—— fallax Rm. 427
—— —— Z. 488
—— filograna Z. 409
—— fimbriata Mlf. 399
—— —— Friv. 407
—— flammigera Parr. 471
—— foliacea F. 488
—— Forbesiana P. 428
—— formosa Z. 421
—— fragilis Stud. 388
—— fraudigera Parr. 468
—— Freyeri Küst. 449
—— fritillaria Friv. 471
—— Frivaldskyana Rm. 406
—— Friwaldskyi Villa 401
—— fulcrata Z. 466
—— funiculata B. 488
—— galeata Parr. 468
—— Gargantua Dh. 82
—— gastrolepta Z. 448
—— geophila Küst. 441
—— gibbula Z. 452
—— gigas B. 488
—— glabrata Kryn. 488
—— —— Mlf. 439
—— gracilicollis Dh. 377
—— gracilicosta Z. 411
—— —— Kryn. 488
—— gracilis C. Pfr. 461
—— —— Gray 384
—— granatina Z. 398
—— gravida Kryn. 488
—— gravidula Kryn. 488

	Pag.
Clausilia Grayana P.	406
—— Grimmeri Parr.	473
—— grisea Dh.	457
—— Grohemanni B.	464
—— Grohmanniana Ptsch	464
—— grossa Z.	398
—— —— Friv.	400
—— Heldii Küst.	406
—— hetaera Friv.	458
—— heterostropha Risso	486
—— Hübneri Rm.	473
—— inflata Oliv.	447
—— —— Delle Chiaje	429
—— —— Pot. et M.	429
—— infulaeformis Forst.	471
—— inserta Porro	486
—— insignis Gould	423
—— instabilis Ant.	477
—— interlapsa F.	488
—— intermedia Schmidt	407
—— interrupta Z.	422
—— intrusa Parr.	467
—— Iphigenia Rolphii Gray	482
—— irregularis Z.	429
—— —— Pot. et M.	430
—— isabellina P.	467
—— itala Mart.	444
—— javana P.	405
—— javanica v. Hass.	488
—— Junghuhni Phil.	405
—— Kokeilii Küst.	452
—— Kolenati Siem.	458
—— Küsteri Rm.	399
—— Kutschigii Küst.	431
—— —— Parr.	456
—— labiata Mont.	458
—— —— Sow.	396
—— labiocrassa Mlf.	450
—— labiosa Mlf.	429
—— lactea Z.	437
—— laevigata Z.	453
—— —— Jan	440
—— —— Mlf.	438
—— —— Mart.	436
—— laevis Blv.	436
—— laevissima Z.	439
—— laeviuscula Jan	488
—— lamellata Z.	424
—— —— Leach	398
—— lamellosa Wagn.	420
—— —— Villa	473
—— laminata Mont.	397
—— Largillierti Phil.	413
—— Laterradii Grat.	378
—— latilabris Wagn.	447
Clausilia latilabris Mlf.	446
—— Lerosiensis F.	419
—— lesinacensis Parr.	438
—— lesinensis Kutsch.	434
—— leucostigma Z.	446
—— lineolata Held	480
—— litigiosa Z.	480
—— livida Menke	390
—— Lopedusae Calc.	417
—— loxostoma Bens.	404
—— lubrica Scac.	435
—— lucida Mke	398
—— —— Z.	398
—— macarana Z.	431
—— Macarscarensis B.	432
—— Macascarensis Sow.	432
—— macedonica Rm.	400
—— macilenta Rm.	480
—— Macluriana Risso	486
—— macrosoma Cantr.	429
—— macrostoma Cantr.	429
—— maculata Z.	464
—— maculosa Dh.	457
—— —— min. B.	431
—— maesta F.	477
—— Marcelia Risso	486
—— marginata Z.	400
—— —— Held	487
—— marmorata Z.	433
—— —— Parr.	400
—— Massenae Pot. et Mich.	457
—— Maugei F.	488
—— maxima Stentz	488
—— mediterranea Gray	454
—— Megerlei B.	488
—— Meisneriana Shuttl.	425
—— Menkiana Jay	488
—— Michaudiana P.	408
—— microstoma Küst.	454
—— minima C. Pfr.	463
—— modesta Z.	418
—— moesta Rm.	478
—— monilifera Mlf.	449
—— Montagui Gray	470
—— montana Stentz	465
—— montenegrina Küst.	451
—— Moussoni Charp.	408
—— mucida Z.	482
—— multidentata Parr.	478
—— munda Z.	430
—— muscida B.	482
—— naevosa F.	430
—— nana Parr.	482
—— nebulosa F.	488
—— nectarina Friv.	427

Pag.

Clausilia nigricans Pult. 476
—— —— var. Gray 461
—— nitida Mlf. 455
—— —— Parr. 455
—— nitidescens Z. 448
—— nitidula Mlf. 455
—— nobilis P. 434
—— notha B. 488
—— obliqua Mlf. 437
—— obtusa C. Pfr. 477
—— —— Rm. 476
—— ochreata Z. 477
—— odontosa Z. 480
—— oleata Rm. 441
—— olivacea Cantr. 486
—— Olivieri Roth 417
—— olympica Friv. 473
—— ominosa Z. 435
—— opalina Z. 446
—— orientalis v. d. Busch ... 414
—— ornata Z. 445
—— orthostoma Mke 402
—— oscitans F. 488
—— oxystoma Rm. 479
—— pachygastra B. 439
—— pachygastris Ptsch 438
—— pachystoma Küst. 439
—— paestana Phil. 449
—— pagana Z. 469
—— pagodula Stentz 488
—— pallens Scac. 435
—— Pantagruellina Villa 534
—— papillaris Dr. 454
—— papillosa Z. 488
—— paradoxa Z. 480
—— Parreyssi Z. 400
—— Partschii Fitz. 474
—— parvula Stud. 462
—— —— Gärtn. 388
—— —— Turt. 461
—— paula Parr. 463
—— pellucida P. 456
—— perplicata Dh. 377
—— peruana Trosch. 483
—— perversa C. Pfr. 470
—— —— Fitz. 466
—— —— Dupuy 475
—— —— Charp. 388
—— Pfeifferi Schmidt 422
—— phalerata Z. 399
—— Philippiana P. 423
—— piceata Z. 447
—— planicollis Parr. 488
—— planilabris Rm. 450
—— plebea Z. 480

Pag.

Clausilia plicata Dr. 479
—— —— Gärtn. 470
—— —— γ Hartm. 466
—— plicatula Dr. 481
—— —— β Htm. 476
—— plumbea Rm. 401
—— pluviatilis Bens. 404
—— polita Risso 339
—— porcata Z. 441
—— Porroi P. 407
—— proboscidea Küst. 440
—— pulchella P. 403
—— pulverosa Parr. 480
—— pumila Z. 474
—— punctata Mich. 445
—— —— Scac. 449
—— —— Rm. 446
—— punctatissima Less. 84
—— pupoides Spix 86
—— pupula Küst. 456
—— pusilla Z. 475
—— pygmaea Z. 455
—— pyrenaica Boub. 343
—— quadrata Forst. 471
—— radicans Forst. 471
—— ragusensis Mlf. 429
—— ravida Z. 441
—— reflexa Z. 450
—— reflexilabris Cantr. 450
—— rejectilis Parr. 422
—— retusa Oliv. 418
—— rhaetica Mlf. 443
—— robusta Küst. 447
—— Rolphii Leach 482
—— roscida Stud. 476
—— Rossmässleri P. 443
—— —— Stentz 442
—— rostellum Held 442
—— rostrata Forst. 471
—— rubiginea Z. 446
—— rugicollis Z. 459
—— rugosa Dr. 475
—— —— C. Pfr. 476
—— —— γ Dr. 536
—— —— γ Nilss. 536
—— rugulosa Z. 477
—— rusiostoma Held 466
—— rustica Z. 470
—— Sandrii Küst. 397
—— sarda Villa 487
—— —— Porro 408
—— sativa Z. 477
—— satura Z. 441
—— saturalis Z. 448
—— saturata Z. 399

	Pag.
Clausilia saturata B.	441
—— saxatilis Parr.	419
—— —— Htm.	461
—— saxicola Parr.	443
—— Schmidti P.	462
—— Schuchii Voith	431
—— Schwerzenbachii Parr.	470
—— semifimbriata Mouss.	398
—— semilamellata Kryn.	488
—— semirugata Z.	454
—— senilis Z.	418
—— septemplicata Phil.	452
—— sericina Rm.	453
—— serrulata Mus. Petrop.	478
—— sexdentata Spix	86
—— Sieboldtii P.	465
—— similis Charp.	470
—— simplex Z.	426
—— simulans B.	448
—— sinuata Küst.	447
—— sionestana Faure-Big.	488
—— socialis Friv.	471
—— solida Dr.	459
—— somchetica P.	458
—— sordida Z.	470
—— Spratti P.	416
—— stabilis Z.	467
—— Stentziana Pot. et M.	424
—— Stentzii Rm.	424
—— —— var. Rm.	443
—— stigmatica Z.	424
—— strangulata F.	467
—— striata Spix	85
—— strigata Mlf.	449
—— strigillata Mlf.	420
—— —— Z.	409
—— strigosa Htm.	488
—— striolaris Z.	421
—— striolata Parr.	488
—— —— Schmidt.	482
—— strumosa Friv.	428
—— Sturmii Küst.	425
—— subcristata Küst.	438
—— subcylindrica Z.	441
—— sublaevis Z.	452
—— sublevis Jay	452
—— subrugata Z.	445
—— substriata Küst.	399
—— subula Dh.	375
—— —— P.	374
—— subulata P.	442
—— succinea Z.	403
—— sulcosa Wagn.	429
—— —— Mlf.	420
—— sulcosula Z.	421

	Pag.
Clausilia sulculosa Mke	421
—— superflua Mlf.	488
—— suturalis Mlf.	448
—— syracusana Phil.	429
—— taburnensis Scac.	435
—— taeniata Z.	403
—— taurica Kryn.	412
—— tenerrima Z.	388
—— tenuilabris Rm.	423
—— teres Oliv.	414
—— —— Delle Chiaje	435
—— Tettelbachiana Rm.	461
—— thessalonica Friv.	478
—— Thomasiana Charp.	488
—— torquata Held	487
—— torticollis Oliv.	463
—— —— Crouch	371
—— translucida Z.	425
—— transparens Friv.	442
—— transylvanica Stentz	398
—— tridens Chemn.	396
—— triplicata Mlf.	470
—— —— Hartm.	475
—— tristis Cantr.	401
—— trivia Parr.	488
—— truncatula Lam.	377
—— tuba paradisi Ehrenb.	487
—— tumens B.	417
—— tumida Z.	466
—— turgida Z.	427
—— undulata Parr.	476
—— —— Mlf.	488
—— ungulata Z.	398
—— uniplicata Calc.	388
—— varians Z.	409
—— —— min. Friv.	460
—— varicolor Z.	488
—— variegata Z.	488
—— varnensis P.	469
—— ventricosa Dr.	465
—— —— C. Pfr.	470
—— —— var. Rm.	481
—— ventriculosa Villa	466
—— —— Z.	481
—— venusta B.	472
—— vetusta Z.	472
—— vibex Rm.	455
—— vicina F.	488
—— Vidovichii Parr.	450
—— viduata Costa	435
—— Villae Mlf.	482
—— virens Mlf.	399
—— virgata Jan	454
—— virginea P.	416
—— viridana Z.	426

	Pag.
Clausilia vitrea Stentz	454
—— vivipara Held	470
—— Voithii Rm.	413
—— vulcana Stentz	472
—— vulnerata Forst.	471
—— Webbiana Charp.	488
—— zebriola Jay	137
—— Ziegleri Küst.	440
—— Ziegleriana Jay	488
Clausilina tuba paradisi Ehrenb.	487
Cobresia helicoides Hübn.	493
—— limacoides Hübn.	494
Cochlicella meridionalis Risso	215
—— turricula Risso	215
—— ventrosa Risso	216
Cochlicellus acutus B.	215
—— agnatus B.	216
—— articulatus B.	215
—— barbarus B.	124
—— lichenum B.	113
—— lineatus B.	535
—— Maroccanus B.	215
—— ? pupiformis B.	113
—— rugifer B.	115
—— rupestris B.	310
—— scabiosus B.	211
—— subantiquatus B.	232
—— tenellus B.	232
—— ventricosus B.	216
Cochlicopa algira Phil.	289
—— lubrica Risso	273
—— Ottonis P.	286
—— venusta P.	292
Cochlycopa glans Swns.	279
Columna acicula Jan	275
—— aciculoides Jan	274
—— bulimea Spix	142
—— clavula Villa	159
—— columna B.	269
—— dentiens B.	277
—— flammea Schum.	269
—— folliculus Jan	283
—— grisea Perry	269
—— lubrica Jan	273
—— maritima Spix	151
—— marmorea Perry	269
—— miliaris Jan	276
—— obeliscus Villa	152
—— octogyrata Spix	151
—— octona Jan	266
—— sylvatica Spix	262
Crenea vitrea Risso	275
Cyclodontina brasiliensis B.	367
—— ? canistrum B.	367
—— cassida B.	344
Cyclodontina Draparnaldi B.	386
—— Guarani B.	206
—— ? guineensis B.	367
—— Listeri B.	86
—— ovularis B.	334
—— patagonica B.	87
—— pupoides B.	86
—— Sowerbyana B.	87
—— striata B.	85
Cyclostoma fasciata Lam.	369
—— marginata Say	309
Cylindrella P.	368
—— acus P.	383
—— alabastrina P.	375
—— Auberiana O.	376
—— Binneyana Ad.	373
—— Blainvilliana F.	386
—— brevis P.	371
—— Chemnitziana P.	384
—— collaris F.	375
—— costata Guild.	379
—— crispula P.	377
—— Cumingiana P.	385
—— Cumingii Ad.	384
—— cylindrus Chemn.	370
—— —— Ad.	384
—— decollata Nyst	368
—— Draparnaldi F.	386
—— Dunkeriana P.	383
—— elegans P.	374
—— elongata Chemn.	380
—— fasciata Chemn.	369
—— flexistriata F.	386
—— Goldfussi Menke	383
—— Gossei P.	384
—— gracilicollis F.	376
—— gracilis Wood	384
—— Gruneri Dkr.	370
—— Hanleyana P.	378
—— Humboldtiana P.	373
—— hyalina P.	369
—— Laterradii Grat.	378
—— Lavalleana O.	372
—— leucopleura Mke	379
—— Liebmanni P.	370
—— Maugeri Wood	384
—— nobilis Stentz	374
—— Oviedoiana O.	380
—— pallida Guild.	379
—— perplicata F.	377
—— —— P.	378
—— Petitiana O.	385
—— Petiveriana F.	386
—— Pfeifferi Mke	382
—— Philippiana P.	378

	Pag.
Cylindrella Pilocerei P.	382
—— Poeyana O.	380
—— porrecta Gould	372
—— pygmaea Ad.	386
—— recticosta P.	369
—— Roemeri P.	382
—— rosata F.	386
—— rosea P.	374
—— Sagraiana P.	378
—— sanguinea P.	371
—— seminuda Ad.	380
—— Sloanii F.	386
—— Sowerbyana P.	373
—— speciosa Dkr.	369
—— subula F.	375
—— teres Menke	381
—— tricolor P.	384
—— variegata P.	374
Cylindrus inornatus Htm.	304
—— obtusus Fitz.	163
Daudebardia Htm.	490
—— brevipes Htm.	490
—— Langi P.	491
—— rufa Htm.	490
Daudebartia brevipes B.	490
—— rufa B.	490
Dyodonta fimbriata Htm.	399
—— viridana Htm.	426
Elasmatina Cumingiana Petit	392
—— globosa Petit	393
—— Reclusiana Petit	393
—— subulata Petit	391
Elisma fasciata Leach	215
Ena montana Leach	120
—— obscura Leach	125
Eruca dolium Swns.	325
—— fragilis Swns.	388
—— muscorum Swns.	307
—— umbilicata Swns.	330
Eucore quadridens Ag.	131
Ferrusacia Gronoviana Risso	283
—— Sayea Risso	296
Fusulus fragilis Fitz.	388
—— interruptus Fitz.	422
Gibbulina filosa B.	367
—— inflata B.	367
—— infundibuliformis B.	331
—— iulus B.	367
—— Lyonetiana B.	298
—— modiolina B.	328
—— modiolus B.	319

	Pag.
Gibbulina pagoda B.	320
—— palanga B.	318
—— palangula B.	367
—— sulcata B.	302
—— versipolis B.	319
Gibbus Montf.	298
—— Antoni P.	298
—— Lyonetianus Pall.	298
—— Lyonnettii Montf.	298
Glandina Algira B.	289
—— arcuata P.	261
—— Bruguierii B.	297
—— Coulteri B.	297
—— crenulata P.	285
—— cubana P.	282
—— Cumingii B.	294
—— curvilabris P.	258
—— cyanostoma P.	259
—— dilatata B.	289
—— dominicensis P.	290
—— fimbriata B.	297
—— folliculus P.	283
—— fulminea B.	293
—— glabra P.	284
—— glandula B.	297
—— glans B.	279
—— gracilis B.	297
—— Griffithii P.	290
—— Hügeli P.	259
—— isabellina P.	286
—— jamaicensis P.	291
—— Largillierti P.	295
—— leucozonias B.	280
—— maculata B.	290
—— Marminii B.	288
—— monilifera P.	290
—— nigricans P.	280
—— nitens P.	535
—— nitidissima Küst.	284
—— obtusa P.	281
—— oleacea B.	284
—— olivacea Schum.	279
—— Ottonis P.	286
—— paludinoides P.	285
—— Perrotteti P.	260
—— peruviana B.	294
—— Philippiana P.	291
—— Phillipsii P.	265
—— Poiretii B.	289
—— rosea P.	294
—— semisulcata B.	290
—— sericina Jon.	292
—— solidula P.	282
—— Sowerbyana P.	293
—— striata B.	288

Pag.

Glandina subulata P. 282
—— suturalis P. 285
—— tornatellina P. 277
—— tortillana P. 291
—— triticea P. 278
—— truncata Say 287
—— turris P. 288
—— Vanuxemensis P. 294
—— venusta P. 292
—— voluta P. 279
—— yucatanensis P. 291
Gonidomus pagodus Swns. 320
Goniostoma erubescens Swns. . . . 50
Gonodon quadridens Held 131
—— quinquedentata Held . . . 129
—— seductilis Held 132
—— tridens Held 130
Gonospira polanga Swns. 318
Gonyostomus centiquadrus B. . . . 231
—— concolor B. 231
—— gonyostoma B. 50
—— multicolor B. 43
Granaria avena Held 348
—— bigoriensis Held 337
—— frumentum Held 339
—— hordeum Held 348
—— Moricandi Held 367
—— polyodon Held 336
—— secale Held 342
—— variabilis Held 341

Halia stercus pulicum Herrm. . . 279
Helicarion cassida Hutt. 497
—— Cuvieri B. 508
—— Freycineti F. 508
Helicolimax annularis F. 493
—— Audebardi F. 494
—— australasia Blainv. 508
—— brevis F. 495
—— elongata F. 495
—— fasciolata F. 506
—— Lamarckii F. 506
—— major F. 494
—— pellicula F. 505
—— pellucida F. 493
—— —— Blainv. 494
—— pyrenaica F. 495
—— vitrea F. 495
Helicophanta brevipes C. Pfr. . . . 490
—— formosa Jonas 504
—— Langi P. 491
—— rufa C. Pfr. 490
Helicteres Byronensis B. 237
—— decorus B. 239
—— leucozonalis B. 242

Pag.

Helicteres lividus B. 237
—— loratus B. 236
—— lugubris B. 239
—— spirizona B. 235
—— sulphuratus B. 242
—— textilis B. 241
—— turritellus B. 234
—— ventulus B. 241
—— vulpinus B. 237
Helisiga St. Helenae Less. 518
Helix abyssorum O. 46
—— achatina F. 249
—— acicula Stud. 275
—— acinus F. 367
—— acuminata Sow. 14
—— acuta Müll. 214
—— —— Chemn. 224
—— —— F. 251
—— —— WB. 215
—— adusta Sow. 78
—— aedilis F. 179
—— agnata Z. 216
—— alabaster Rang 247
—— albata F. 213
—— albicans O. 191
—— Alepi F. 66
—— Alvarezii O. 139
—— alvearia F. 315
—— amphora F. 249
—— anconostoma Lowe 314
—— angularis F. 512
—— angulatilis F. 231
—— angulosa F. 108
—— angusta Stud. 515
—— antiperversa F. 376
—— apodemetes O. 173
—— arabica Nieb. 67
—— arata Sow. 77
—— atrovirens Moric. 511
—— aurantia F. 231
—— aurea Dillw. 37
—— —— F. 38
—— auris bovina F. 139
—— —— caprina F. 89
—— —— cervina F. 231
—— —— leporis F. 98
—— —— —— α F. 99
—— —— Malchi Müll. 228
—— —— muris Moric. 99
—— —— Sileni F. 88
—— —— vulpina F. 93
—— australis F. 519
—— avena F. 348
—— Babel F. 231
—— bacillus F. 535

Pag.

Helix bacterionides O. 156
—— badiosa F. 79
—— baeticata F. 79
—— bahiensis Mor. 96
—— Bamboucha F. 163
—— barbara L. 124
—— bicanaliculata F. 396
—— bicarinata F. 248
—— bidens Müll. 397
—— —— Brook. 453
—— bifasciata Pult. 214
—— Blainvilleana F. 386
—— Bolivarii O. 55
—— Bontia Chemn. 194
—— borbonica F. 254
—— brachyodon Sow. 77
—— brachysoma O. 46
—— brasiliensis F. 367
—— —— Moric. 511
—— brephoides O. 143
—— brevipes Dr. 490
—— —— Sow. 490
—— brevis F. 371
—— Broderipii O. 146
—— Bruguierea F. 297
—— buccinata Alt. 120
—— buccinum Schrank 516
—— bullina F. 516
—— Byronii Wood. 237
—— cactorum O. 197
—— caerulea F. 415
—— caffra F. 506
—— calathiscus Lowe 345
—— calcarea Born 151
—— —— Chemn. 151
—— calcaria Dillw. 151
—— campestris F. 524
—— cancellata F. 367
—— cantagallana Rang 20
—— cantheriata F. 297
—— carinula Gm. 216
—— carteriensis Quoy 68
—— cassida Lowe 344
—— caxapregana Mor. 151
—— cheilogona Lowe 328
—— Chemnitziana F. 381
—— christiana F. 19
—— Chrysalis F. 315
—— —— var. F. . . 321. 324
—— cincinniformis Sow. 9
—— cincinnus Sow. 9
—— cinerea F. 345
—— cinerosa F. 367
—— cinnamomeo-lineata Mor. 110
—— citrino-vitrea Mor. 149

Pag.

Helix clausiliaeformis F. 138
—— clavulus F. 159
—— collaris F. 376
—— columba F. 534
—— columna Ch. 268
—— columnella F. 373
—— concamerata Wood 320
—— concinna Sow. 15
—— conoidea Dr. 216
—— conspersa O. 191
—— contraria Müll. 38
—— coquimbensis O. 147
—— Cora O. 57
—— coronata Stud. 327
—— corrugata F. 483
—— Costerii Eyd. 33
—— costulata F. 189
—— coturnix F. 150
—— coxeirana Mor. 105
—— crenata Val. 15
—— —— F. 445
—— crepundia O. 173
—— cretacea Ch. 214. 216
—— crispa Lowe 484
—— cruciata F. 476
—— cucullata Schweigg. 532
—— culminea O. 221
—— cylindracea Ch. 67
—— cylindrica F. 230
—— —— Stud. 341
—— —— Gray. 363
—— cylindrus F. 370
—— Daphnis Brod. 4
—— dealbata Say 187
—— —— F. 223
—— decollata Müll. 152
—— —— β Gm. 535
—— —— γ Gm. 536
—— decora F. 238
—— decorata F. 30
—— decumanus F. 320
—— deltostoma Lowe 410
—— dentata Wood. 87
—— denticulata F. 477
—— derelicta O. 63
—— derugata F. 397
—— detrita Müll. 222
—— —— Chemn. 202
—— —— Mont. 224
—— dextra Müll. 38
—— diaphana Poir. 494
—— diodon F. 402
—— distorta F. 88
—— distortus Burr. 298
—— doliolum F. 327

Pag.

Helix dolium F. 325
—— Dombeyana F. 57
—— domestica Ström. 510
—— dominicensis F. 289
—— Draparnaldi Cuv. 494
—— —— F. 386
—— dubia F. 536
—— Dufourii F. 337
—— Dufresnii F. 168
—— elatior O. 390
—— elliptica Brown. 494
—— elongata F. 516
—— —— β F. 530
—— —— γ F. 528
—— erubescens Sol. 53
—— exarata F. 16
—— exesa F. 84
—— —— Moric. 84
—— exigua Stud. 305
—— —— Lowe 484
—— exilis Gm. 224
—— —— γ Gm. 202
—— faba Gm. 73
—— fasciata Ch., F. 369
—— fasciolata F. 122
—— —— var. F. 127
—— Faunus Brod. 5
—— Favannii F. 185
—— fibula Wood 218
—— flammata F. 179. 181
—— flammea Müll. 180
—— —— Ch. 38
—— flammigera F. 245
—— flexistriata F. 386
—— foliacea F. 488
—— folliculus Gron. 283
—— fragilis Mont. 229
—— —— F. 173
—— fragosa F. 64
—— frater F. 30
—— fraterculus F. 220
—— frumentum F. 338
—— fulica F. 254
—— fulminea F. 293
—— fulvescens F. 251
—— funeralis F. 169
—— funicula Val. 303
—— funiculata Val. 535
—— fuscescens Wood 505
—— fusiformis Rang. 94
—— fusoides O. 51
—— fusulus Müll. 303
—— fusus Müll. 318
—— gallinasultana Ch. 145
—— Gargantua F. 82

Pag.

Helix Gayana O. 528
—— gibba Quoy 69
—— glandula F. 297
—— glans F. 279
—— goniostoma F. 50
—— Goodallii Müll. 159
—— —— F. 276
—— gracilicollis F. 377
—— gracilis Lowe 284
—— granulosa Rang 22
—— granum F. 536
—— gravida F. 238
—— guadaloupensis Dillw. .. 224
—— Guarani O. 206
—— hannensis Rang 160
—— harpa Say? 150
—— helena Quoy 198
—— Helicarion Voigt 508
—— heloica O. 204
—— helvola F. 535
—— heterogramma Mor. 106
—— heterotricha Mor. 116
—— hordeum F. 348
—— hyalina Rang. 258
—— hygrobylaea O. 60
—— ignifera F. 385
—— immaculata F. 251
—— Inca O. 142
—— incompta Sow. 15
—— incumbens Dillw. 287
—— inflata F. 417
—— infundibuliformis O. 331
—— interlapsa F. 488
—— interrupta Müll. 39
—— —— Ch. 38
—— intertexta F. 535
—— inversa Müll. 38
—— Johnii Ch. 231
—— Kambeul F. 179
—— Kingii Wood 174
—— kremnoica O. 19
—— labiosa Müll. 67
—— labrosa F. 65
—— —— Wood 66
—— Lackhamensis Mont. ... 120
—— lacunosa O. 28
—— laeva Müll. 40
—— laevis Wood 59
—— Lerosiensis F. 419
—— leucophaea Sow. 5
—— leucozonias F. 280
—— lichnorum O. 113
—— liliacea F. 203
—— —— F. var. 204
—— limacina Alt. 495

Helix limacoides Alt. 493
—— limnoides F. 224
—— —— β F. 108
—— limonoica O. 111
—— limosa Dillw. 513
—— linostoma O. 35
—— Listeri F. 86
—— —— Wood 534
—— Lita F. 103
—— lithoica O. 168
—— longiseta Mor. 196
—— lophoica O. 60
—— lorata F. 236
—— Lorenzii O. 218
—— lubrica Müll. 272
—— —— Lowe 273
—— lubricoides F. 273
—— Ludovica Rang 202
—— lugubris F. 239
—— luteola F. 235
—— Lyonetiana Pall. 298
—— maesta F. 478
—— Malaguettana Rang 257
—— Manoelii Mor. 110
—— marginata Rang 249
—— marmarina O. 59
—— marmorea F. 297
—— Mathiusii O. 25
—— Maugei F. 488
—— Maugeri Wood 385
—— mauritiana Quoy 254
—— Maximiliana F. 91
—— Megerlei F. 488
—— melampoides Lowe 277
—— melania F. 231
—— melastoma F. 92
—— melo Quoy 188
—— melones F. 188
—— Menkeana F. 96
—— micra O. 165
—— miliola O. 355
—— mimosarum O. 162
—— minuta Müll. 536
—— modesta Sow. 11
—— modiolinus F. 328
—— modiolus F. 319
—— monogramma Val. 534
—— montana F. 535
—— monticola Lowe 335
—— montivaga O. 112
—— Moricandi F. 353
—— Mülleri F. 287
—— multicolor Rang 43
—— Mumia F. 321
—— muralis Stud. 480

Helix muscorum Müll. 312
—— muscosa Stud. 466
—— mutabilis F. 340
—— naevosa F. 430
—— navicula Wagn. 99
—— nebulosa F. 488
—— nivalis O. 170
—— nodosaria O. 354
—— nucleus O. 49
—— obeliscus Mor. 152
—— obesata F. 117
—— oblonga Müll. 21
—— —— Sow. 78
—— —— F. 22
—— obscura Müll. 124
—— —— Schrank 120
—— obtusa F. 163. 511
—— obtusata Gm. 151
—— octona Ch. 266
—— —— Gm. 275
—— odontostoma F. 82
—— oleacea F. 280
—— olorinus O. 190
—— Onça O. 17
—— oomorpha Sow. 78
—— oreades O. 203
—— oroboena O. 143
—— orysaca Rang 283
—— oryza F. 535
—— —— Moric. 231
—— oscillum F. 231
—— oscitans F. 488
—— otaheitana Dillw. 71
—— ovalis Gm. 19
—— —— F. 525
—— ovata Müll. 19
—— —— var. F. 22
—— ovipara Portl. 534
—— ovoidea F. 534
—— ovuliformis Lowe 278
—— ovum F. 231
—— pagoda F. 320
—— palanga F. 318
—— palangula F. 367
—— palliata Htm. 495
—— pantagruelina Mor. 83
—— panthera F. 252
—— papillaris Müll. 453
—— papillata F. 445
—— papyracea Mawe 102
—— pardalis F. 36
—— Paredesii O. 310
—— parvula Stud. 463
—— pastorella Val. 532
—— patagonica O. 87

	Pag.
Helix patula F.	532
—— Paziana O.	111
—— pellucida Müll.	492
—— —— Fabr.	510
—— pentadina O.	17
—— peregrina Gm.	535
—— perplicata F.	377
—— perturbata F.	367
—— peruviana F.	166
—— perversa L.	37
—— —— Chemn.	71
—— —— Müll.	470
—— —— ζ Gm.	40
—— —— Sturm	466
—— —— Stud.	482
—— —— F.	387
—— Petiveriana F.	386
—— phasianella F.	29
—— phlogera O.	145
—— Phoenix Val.	535
—— picturata F.	109
—— pithogaster F.	4
—— planidens Rang	534
—— plicatula F.	482
—— plicosa F.	480
—— poecila O.	200
—— Poireti F.	288
—— polygramma Mor.	106
—— polymorpha O.	47
—— polyodon F.	336
—— pretiosa F.	294
—— Priamus Meusch.	278
—— Priapus Gm.	279
—— princeps O.	144
—— progastor O.	527
—— Protea O.	534
—— pseudosuccinea Mor.	148
—— pudica Müll.	53
—— pulchra Wood	210
—— pullata F.	231
—— pupa L.	128
—— pupiformis F.	80
—— pupoides Mor.	86
—— purpurea F.	253
—— pusilla Scac.	274
—— putris L.	513
—— —— O.	527
—— —— ε F.	522
—— —— ϰ F.	515
—— pyramidalis Sow.	14
—— pyrum Gm.	269
—— quadridens Müll.	131
—— —— Schrank	482
—— radiata F.	222
—— Rawacensis F.	367

	Pag.
Helix rawakensis F.	231
—— recta Müll.	39
—— Reevii Brod.	3
—— regina F.	244
—— —— β F.	145
—— retusa F.	418
—— rhodinostoma O.	96
—— rhodospira Mor.	92
—— —— var. Mor.	93
—— Rocayana O.	36
—— rosacea O.	53
—— rosata F.	386
—— roscida Stud.	476
—— rosea F.	294
—— —— var. F.	289
—— rubescens F.	531
—— rubicunda F.	232
—— rufa Dr.	490
—— rufogaster Less.	6
—— rugosa F.	475
—— Santa Cruzii O.	23
—— Satyrus Brod.	14
—— scabiosa O.	211
—— scalariformis O.	217
—— Schröteri F.	232
—— scobinata F.	535
—— —— Wood	100
—— scutulata O.	214
—— secale F.	341
—— Semilimax F.	495
—— semilineata Mke	22
—— semitarum Rang	263
—— sepium Gm.	222
—— septenaria F.	535
—— serpentina Mol.	21
—— sidoniensis F.	308
—— signata Mor.	90
—— similis F.	470
—— sinistra Müll.	37
—— sionestana F.	488
—— Sloanii F.	386
—— solida F.	459
—— solitaria Poir.	218
—— sordida Less.	188
—— Sowerbyana F.	87
—— sphinctostoma Lowe	335
—— spinosa F.	327
—— spirizona F.	235
—— Spixii O.	85
—— splendidula Gm.	272
—— sporadica O.	201
—— stabilis Sow.	34
—— stagnorum Pult.	535
—— strangulata F.	468
—— striatella F.	324

	Pag.
Helix striatella Rang	264
—— striatula F.	181
—— strigilosa F.	193
—— subcylindrica Ch.	272
—— substriata Gm.	534
—— subula F.	375
—— subuliformis Mor.	155
—— succinea Müll.	513
—— sulcata Müll.	301
—— —— Chemn. 1231	64
—— sulculosa F.	512
—— sultana Dillw.	146
—— sylvatica Mor.	262
—— sylvestris Stud.	120
—— Taunaisii F.	141
—— tenera Gm.	287
—— tenuissima F.	218
—— terebraster F.	263
—— teres F.	414
—— tetrao Val.	535
—— textilis F.	240
—— thamnoica O.	185
—— tiarella F.	297
—— Ticaonica Brod.	6
—— tigrina Les.	530
—— Torallii O.	201
—— tornatellina Lowe	277
—— torticollis F.	463
—— Tournefortiana F.	136
—— translucida Quoy	16
—— trichodes O.	112
—— tridens Müll.	130
—— trifasciata Ch.	58
—— trilineata Quoy	174
—— triplicata F.	354
—— tristis F.	240
—— triticea Lowe	278
—— trizonalis F.	58
—— trochoides contraria Ch.	192
—— trochulus Müll.	125
—— truncata Dillw.	369
—— tumida Gm.	116
—— Tupacii O.	52
—— turbida Küst.	218
—— turgens F.	232
—— turritella F.	233
—— —— O.	208
—— umbilicata F.	329
—— undata F.	144
—— unguis F.	527
—— uniangulata F.	535
—— unicolor O.	219
—— unilamellata F.	394
—— ustulata F.	257
—— uva F.	317
Helix vanikorensis Quoy	71
—— varians O.	205
—— velutino-hispida Mor.	100
—— ventricosa Müll.	125
—— —— F.	30
—— ventriculosa F.	466
—— ventrosa F.	215
—— ventulus F.	241
—— versicolor O.	61
—— versipolis F.	319
—— vertigo Gm.	364
—— vexillum F.	246
—— —— Wood	205
—— vicina F.	488
—— viminea Mor.	95
—— virescens Stud.	495
—— virginea F.	256
—— virgulata F.	202
—— vitrea Born	149
—— vittata F.	102
—— vulpina F.	237
—— xanthostoma O.	58
—— zebra F.	250
—— —— Mor.	107
—— zebrina F.	254
—— zebriola F.	137
—— zebrula F.	137
—— zographica O.	104
Helixarion Cuvieri F.	507
—— Freycineti F.	508
Hyalina annularis Stud.	493
—— elongata Stud.	495
—— pellucida Stud.	493
—— vitrea Stud.	494
Jaminia edentula Risso	305
—— granum R.	343
—— heptodonta R.	366
—— heterostropha R.	131
—— marginata R.	312
—— multidentata R.	366
—— muscorum R.	306
—— Niso R.	132
—— quinquelamellata R.	366
—— secale R.	341
—— septemdentata R.	348
—— sulculata R.	365
—— tridens R.	130
—— trilamillata R.	366
Isthmia cylindrica Gray	363
Laciniaria semiplicata Htm.	480
—— similis Htm.	470
Leptinaria lacryma B.	297
—— shorgum B.	297

Pag.

Leptinaria soluta B. 297
—— succinealis B. 297
—— unilamellata B. 536
Leptospira signata Swns. 80
—— striata Swns. 151
Liguus tenuis Gray 247
—— virgineus Montf. 256
Limacina annularis Htm. 493
—— elongata Htm. 495
—— pellucida Htm. 493
—— —— β Htm. 494
—— vitrea α Htm. 494
—— —— β Htm. 495
Limax aureus Martyn 37
—— faba Mart. 73
—— fibratus Mart. 139
—— flammeus Mart. 268
Limicolaria flammea Schum. 180
Limicolarius Babel B. 231
—— exaratus B. 16
—— flammeus B. 180
—— flammiger B. 245
—— Kambeul B. 179
—— striatulus B. 181
—— strigatus B. 181
—— tenuis B. 247
Limnea succinea Flem. 514
Longaeva turrita Mlf. 215
Lymnea columnaris Lam. 269
—— rugosa Val. 57

Macroceramus signatus Guild. .. 80
Macrodontes Gargantua P. 82
—— Sowerbyi Swns. 82
Macrospira aperta Guild. 297
—— octona Swns. 266
Mastus Canthraini B. 277
—— emarginatus B. 128
—— insularis B. 307
—— niveus B. 231
—— obesus B. 117
—— ? obtusus B. 163
—— pupa B. 128
—— tingitanus B. 232
—— tuberculatus B. 128
—— turgens B. 232
Megaspira elatior P. 390
—— Ruschenbergiana Lea ... 390
Melania Nonpareil Perry 93
Merdigera assimilis Held 121
—— montana Held 120
—— obscura Held 125
Microcystis pellicula B. 505
Monodonta seminigra Lam. 239

Pag.

Navicula fasciata Spix 99
Nerita doliolum Schrank 305
Neritostoma vetula Klein 513

Obeliscus Annaaensis B. 164
—— bacterionides B. 156
—— brephos B. 231
—— calcareus B. 151
—— clavulus B. 159
—— decollatus B. 153
—— gnomon B. 231
—— Goodallii B. 159
—— gracillimus B. 231
—— micra B. 165
—— mimosarum B. 162
—— obeliscus B. 152
—— obtusatus B. 151
—— oryza B. 164
—— sceptrum B. 232
—— septenarius B. 155
—— stylus B. 232
—— subuliformis B. 155
—— sylvaticus B. 262
Obelus conoideus B. 216
Odontostomus Bahiensis B. 96
—— exesus B. 84
—— fuscagulus B. 84
—— Gargantula B. 82
—— leucotrema B. 83
—— Pantagruelinus B. 83
—— vermiculatus B. 232
Odostomia biplicata Flem. 470
—— corticaria Say 328
—— laminata Flem. 398
—— muscorum Flem. 329
—— nigricans Flem. 476
—— perversa Flem. 388
Omalonyx Gayana O. 528
—— unguis O. 527
Orbitina incomparabilis Risso ... 153
—— truncatella Risso 153
Orcula conica Held 326
—— doliolum Held 327
—— dolium Held 325
—— gularis Held 326
Orthalicus Adamsonii B. 145
—— livens B. 144
—— phlogerus B. 145
—— princeps B. 144
—— pulchellus B. 145
—— rex B. 244
—— sultan B. 146
—— undatus B. 144
—— zebra B. 144
—— zigzag B. 145

	Pag.
Orthostylus aureus B.	39
—— contrarius B.	38
—— decoratus B.	30
—— Dufresnii B.	168
—— interruptus B.	39
—— inversus a B.	38
—— —— b B.	39
—— laevus B.	40
—— latilabris B.	231
—— ovoideus B.	534
—— perversus B.	37
—— pythogaster B.	4
—— rufogaster B.	6
—— ? trifasciatus B.	58
—— ventricosus B.	30
Otala sulcata Schum.	302
Otostomus lagotis B.	98
—— lateralis B.	99
—— myotis B.	99
—— navicula B.	99
—— signatus B.	90
Pachyotus alopecotis B.	93
—— bilabiatus B.	91
—— iostoma B.	29
—— melanostomus B.	92
—— rhodospira B.	93
Partula auricula F.	75
—— auriculata Brod.	72
—— australis F.	73
—— —— Bowd.	54
—— Bataviae Grat.	40
—— bulimoides Less.	73
—— Dumartroyi Soul.	75
—— faba Sow.	73
—— flavescens King	75
—— fragilis F.	74
—— gibba F.	69
—— grisea Less.	68
—— hyalina Brod.	68
—— inflata Reeve	75
—— labrella Grat.	41
—— lineata Less.	72
—— lutea Less.	229
—— maura Mlf.	72
—— Maximiliana Pot. et Mich.	91
—— otaheitana F.	71
—— —— Reeve	71
—— pudica F.	54
—— rosea Brod.	70
—— rufa Less.	229
—— tahulana Ant.	72
—— unidentata Sow.	54
—— varia Brod.	70
—— virgulata Migh.	74
Partulus auriculatus B.	72
—— australis B.	73
—— carteriensis B.	68
—— gibbus B.	69
—— hyalinus B.	68
—— otaheitanus B.	72
—— roseus B.	70
—— rufus B.	229
—— torosus B.	72
—— vanikorensis B.	71
Pegea carnea Risso	274
Pelekocheilus caprinus B.	89
—— distortus B.	88
—— Paru B.	94
—— Sileni B.	88
—— undulatus B.	89
Pelta Cumingii B.	529
Peristoma merduenianum Kryn.	119
Physa scaturiginum Dr.	284
Placostylus bootis B.	139
Plectostylus Broderipii B.	146
—— cactivorus B.	175
—— coquimbensis B.	147
—— Onça B.	17
—— Peruvianus B.	166
—— pulicarius B.	230
Plekocheilus gracilis Brod.	56
—— undulatus Guild.	88
Plicadomus sulcata Swns.	302
Plicaphora plicatula Htm.	482
Polyphemus acicula Villa	275
—— aciculoides Villa	274
—— algirus Jan	288
—— Bruguiereus Bowd.	289
—— dilatatus Jan	289
—— folliculus Villa	285
—— glans Montf.	279
—— —— Say	287
—— leucozonias Jan	280
—— oleaceus P.	281
—— solidulus P.	282
—— striatus Montf.	288
—— subulatus P.	282
—— suturalis P.	285
—— tumidus Villa	289
Priamus stercus pulicum B.	279
Pupa Drap.	300
—— acina F.	367
—— adjuncta Z.	339
—— admodesta Migh.	302
—— affinis Rm.	342
—— —— Arad.	334
—— albolabris Ward	309
—— alpicola Charp.	305
—— alumnus Parr.	133

Pag.

Pupa alvearia Dillw. 315
—— anconostoma Lowe 344
—— anglica F. 351
—— annaaensis P. 355
—— antivertigo Dr. 361
—— apicata Mlf. 535
—— appenina Charp. 338
—— arata Récl. 64
—— aridula Held 342
—— armifera Say 357
—— armigera Pot. et Mich. . . 358
—— Auberiana O. 376
—— auris bovina Gray 139
—— —— cervina Gray 231
—— —— leporis Gray 98
—— —— Malachi Gray 228
—— —— Sileni Gray 89
—— —— vulpina Gray 93
—— avena Dr. 347
—— —— min. Rm. 332
—— avenacea Brg. 347
—— badia Ad. 342
—— Bergeri Roth 134
—— bicolor Hutt. 352
—— bidens Dr. 398
—— bidentata C. Pfr. 342
—— bigoriensis Rm. 337
—— bigorrensis Charp. . 346. 347
—— bigranata Rm. 354
—— Binneyana Ad. 373
—— binotata Stentz 367
—— biplicata Mich. 332
—— —— Rm. 333
—— brasiliensis F. 367
—— Braunii Rm. 334
—— brevis O. 372
—— britannica Kenyon 276
—— bulimoides P. 308
—— calathiscus Lowe 344
—— calcarea P. 345
—— Callicratis Scac. 307
—— cancellata F. 367
—— candida Lam. 64
—— —— Küst. 65
—— canistrum B. 367
—— capensis Kurr 331
—— capillaris B. 367
—— Caprearum Phil. 350
—— caprella Gray 88
—— carinata Gould 359
—— cassida Lowe 344
—— cerealis Z. 367
—— cereana Mlf. 348
—— cheilogona Lowe 327
—— Chemnitziana Gray 381

Pag.

Pupa Chrysalis F. 314
—— cinerea Dr. 345
—— cinerosa F. 367
—— clathrata Humphr. 367
—— clausilioides Boub. 342
—— clavulata Lam. 328
—— coenopicta Hutt. 82
—— columella Benz 304
—— concolor Z. 367
—— conica Rm. 325
—— conspersa Pot. et Mich. . 85
—— contorta Calc. 344
—— contracta Say 356
—— conus B. 367
—— corcyrensis Parr. 367
—— corrugata Dr. 433
—— corticaria Say 328
—— —— P. 357
—— costata Z. 367
—— costulata Nilss. 343
—— crassilabris Parr. 134
—— crispula Gould 377
—— cupa Jan 327
—— curta Anton 355
—— —— Pot. et Mich. 338
—— curvidens Gould 359
—— cyclostoma Küst. 346
—— cylindra Gray 370
—— cylindracea Z. 339
—— cylindrica Mich. 337
—— —— Hutt. 162
—— cylindrus Dh. 371
—— —— Mus. Berol. . . . 130
—— dealbata WB. 302
—— decollata Nyst. 368
—— decumana F. 320
—— dentata Gray 534
—— dilucida Z. 304
—— dimidiata P. 346
—— distorta Gray 88
—— doliolum Dr. 326
—— dolium Dr. 325
—— duplicata Küst. 348
—— edentula Dr. 305
—— egregia Jay 91
—— elatior Spix 390
—— elegans B. 367
—— —— Gould. 375
—— elegantula P. 351
—— erythrostoma Mke. 82
—— exesa Wagn. 84
—— exigua Say 366
—— fallax Say 309
—— Farnesii Jay 308
—— Farinesii Desm. 308

	Pag.
Pupa farinosa Mus. Berol.	319
—— fasciata Pot. et Mich.	86
—— fasciolata Lam.	123
—— Ferrari Porro	333
—— filosa Val.	367
—— fontana Krauss	355
—— formosa Parr.	304
—— fragilis Dr.	387
—— frumentum Dr.	338
—— —— var. Cantr.	336
—— funicula Val.	303
—— fusiformis Dh.	138
—— —— Küst.	340
—— —— Ad.	385
—— fusulus Müll.	303
—— fusus Lam.	317
—— gastrodes Z.	367
—— germanica Lam.	163
—— gibbosa Say	356
—— glans Küst.	316
—— goniostoma Gray	50
—— —— Küst.	345
—— Goodallii Mich.	276
—— Gouldii Binn.	358
—— gracilis Sow.	381
—— gracillima B.	367
—— grandis P.	301
—— granum Dr.	343
—— Gruneri P.	322
—— guineensis B.	367
—— gularis Rm.	326
—— guttula Porro	333
—— hassiaca P.	334
—— heptodonta Risso	366
—— Hoppii Möll.	328
—— hordeum Charp.	342
—— —— Cantr.	348
—— idolum Menke	320
—— inflata Val.	367
—— —— Wagn.	86
—— infundibuliformis O.	331
—— inornata Mich.	304
—— insularis Ehrenb.	307
—— Jehennei Récl.	67
—— julus B.	367
—— Juniperi Flem.	341
—— Kokeilii Rm.	353
—— Kurrii Krauss	331
—— Kutschigii Küst.	133
—— labidens Parr.	133
—— labrosa Lam.	65
—— labyrinthus Mus. Berol.	87
—— lactaria Gould	374
—— laeviuscula Küst.	307
—— Lamarckii Aud.	302

	Pag.
Pupa Largillierti Phil.	352
—— Lavalleana O.	372
—— Lindermeyeri Parr.	326
—— Listeri Gray	86. 367
—— lituus Gould	375
—— Löwii Küst.	131
—— lucana Brig.	348
—— lucida Jan	306
—— lunatica Jan	132
—— lusitanica Rm.	347
—— Lyonetiana Pot. et Mich.	298
—— —— Küst.	299
—— maculosa Lam.	365
—— manica Dh.	321
—— marginalba P.	356
—— marginata Dr.	312
—— maritima P.	322
—— marmorata P.	323
—— Martiniana Küst.	324
—— Maugeri Sow.	385
—— megacheilos Jan	346
—— —— Moq.	346
—— melanastoma Gray	92
—— meledana Stentz	349
—— Menkeana C. Pfr.	276
—— Michaudi Terv.	349
—— Micheli Terv.	340
—— microstoma Andrz.	133
—— microtragus Parr.	132
—— miliola O.	355
—— milium Gould	362
—— millium B.	367
—— miniata Krauss	353
—— minuta Say	356
—— —— Charp.	306
—— minutissima Htm.	306
—— modesta Say	361
—— modiolina P.	328
—— modiolinus Bowd.	298
—— modiolus F.	319
—— —— Pot. et Mich.	319
—— monodon Held	314
—— monticola Lowe	335
—— Moquiniana Küst.	347
—— Moricandi Held	367
—— Mühlfeldtii Küst.	332
—— multicosta Küst.	323
—— multidentata Risso	366
—— Mumia Brg.	321
—— —— Sow.	321
—— Mumiola P.	324
—— muscorum L.	311
—— —— Dr.	306
—— —— var. Htm.	305
—— nana Mich.	329

	Pag.
Pupa nana Mlf.	350
—— Neumeyeri Küst.	312
—— nitida Ant.	335
—— nobilior Ad.	373
—— nodosaria O.	354
—— normalis Menke	128
—— nucifraga Parr.	135
—— obesa Parr.	129
—— —— Ad.	372
—— oblongata Rm.	338
—— obscura Mlf.	332
—— obtorta Menke	375
—— obtusa Dr.	163
—— —— Flem.	306
—— occulta Parr.	349
—— octodentata Htm.	361
—— odontostoma Gray	82
—— ovalaris Dh.	334
—— ovata Say	360
—— Oviedoiana O.	380
—— ovularis Oliv.	333
—— —— Kurr	331
—— ovulum P.	361
—— pachygastra Z.	337
—— pacifica P.	309
—— pagoda Fér.	320
—— pagodula Desm.	310
—— pagodus Dh.	320
—— palanga Dh.	318
—— palangula F.	367
—— pallida Phil.	308
—— papillaris Dr.	453
—— Paredesii O.	309
—— Parraiana O.	307
—— Parreyssi Friv.	311
—— patula Menke	339
—— pellucida P.	360
—— pentodon Say	359
—— perturbata F.	367
—— Petitiana O.	386
—— Pfeifferi Krauss	352
—— Philippii Cantr.	350
—— pinguis Humph.	320
—— Pitcairnensis B.	367
—— placida Say	309
—— plicata Dr.	479
—— plicatula Dr.	482
—— Poeyana O.	380
—— polyodon Dr.	336
—— porrecta Gould	372
—— Pottebergensis Krauss	331
—— primitiva Menke	128
—— procera Gould	360
—— proxima Rm.	367
—— pulchella Hutt.	367

	Pag.
Pupa purpurea Gray	371
—— pusilla Müll.	364
—— —— Biv.	362
—— pusillima Z.	367
—— pygmaea Dr.	362
—— pygmea Htm.	362
—— pyrenaearia Mich.	342
—— pyrenaica Far.	346
—— quadridens Dr.	131
—— quinquedentata Born	345
—— —— Mlf.	129
—— —— Htm.	362
—— quinquelamellata Risso	366
—— quinqueplicata Mlf.	332
—— —— Pot. et Mich.	129
—— Rawacensis F.	367
—— rhodia Roth	350
—— ringens Mich.	337
—— —— Jeffr.	351
—— —— Jay	84
—— ringicula Mich.	336
—— Rossmässleri Schmidt	353
—— rubella Ad.	371
—— rubicunda Menke	316
—— rubra Humphr.	367
—— rufescens Wood	367
—— rugosa Dr.	475
—— rupestris Phil.	310
—— —— Küst.	311
—— rupicola Say	358
—— Sagraiana P.	322
—— sardoa Cantr.	350
—— Savi Charp.	350
—— Schmidtii Küst.	327
—— Schultzii Phil.	359
—— scyphus Friv.	326
—— secale Dr.	341
—— —— ? Phil.	343
—— seductilis Z.	132
—— Sempronii Charp.	330
—— septemdentata Roth	135
—— —— Risso	366
—— septemplicata Mlf.	84
—— servilis Gould	360
—— sexdentata Flem.	361
—— —— Wagn.	86
—— Shuttleworthiana Charp.	355
—— simplex Gould	302
—— —— Binn.	309
—— Sowerbyana O.	87
—— sphinctostoma Lowe	335
—— Spixii O.	85
—— splendens Menke	385
—— splendidula Costa	283
—— spreta Z.	130

	Pag.
Pupa squalina Rm.	357
—— Steerii Küst.	343
—— Stenbuckii Möll.	367
—— Sterrii Voith	343
—— striata Schum.	321
—— —— Wagn.	85
—— striatella F.	323
—— —— Humphr.	367
—— strobilus B.	367
—— stylus Parr.	135
—— subdiaphana King	163
—— substriata Jeffr.	363
—— subulata Biv.	343
—— sulcata Müll.	301
—— —— Sow. Reeve	321
—— sulculata Risso	365
—— Tappiana Ward	359
—— tenuidens Ad.	356
—— Tournefortiana Pot. et M.	136
—— tricuspidata Küst.	132
—— tricuspis Rm.	134
—— tridens Dr.	130
—— —— Gray	276
—— tridentalis Mich.	354
—— tridentata Lam.	136
—— —— Brard	130
—— —— Anton	134
—— trilamillata Risso	366
—— triplicata Stud.	354
—— tristensis Gray	388
—— triticum Z.	367
—— truncata Gray	369
—— Truncatella P.	303
—— —— var. Rm.	341
—— truncatula Sow.	376
—— turgida Parr.	367
—— turrita Ant.	85
—— umbilicata Dr.	329
—— umbilicus Roth	330
—— unicarinata Lam.	81
—— —— Pot. et Mich.	340
—— unidentata C. Pfr.	342
—— —— Mlf.	367
—— uniplicata Pot. et Mich.	325
—— utriculus Menke	347
—— uva Lam.	347
—— —— var. F.	347
—— variabilis Dr.	340
—— —— C. Pfr.	342
—— variegata Z.	324
—— variegella Z.	345
—— Venetzii Charp.	364
—— ventricosa Dr.	465
—— —— Gray	389
—— Vergnesiana Küst.	342
Pupa versipolis F.	319
—— vertigo Dr.	364
—— —— α, γ Htm.	361
—— Villae Charp.	330
—— vulcanica Küst.	311
—— Wahlbergi Krauss	352
—— zebra Lam.	137
Pupella frumentum Swns.	339
—— variabilis Swns.	341
Pupilla conica B.	326
—— corcyrensis B.	367
—— cupa B.	327
—— cylindrica B.	337
—— dilucida B.	304
—— doliolum B.	327
—— dolium B.	325
—— Draparnaudii Leach	329
—— gularis B.	326
—— marginata Leach	342
—— muscorum B.	342
—— pagodula B.	341
—— Stenbuckii B.	367
—— triplicata B.	354
—— umbilicata B.	330
Puppa Lyonettianus Blainv.	298
—— mumia Blainv.	322
Pyrgelix elata B.	390
Rumina decollata Risso	153
—— minima Htm.	463
—— parvula Htm.	463
—— saxatilis Htm.	464
Scarabus labrosus Menke	83
Simpulopsis angularis B.	512
—— atrovirens B.	511
—— obtusa B.	511
—— sulculosa B.	512
Siphonostoma costata Swns.	379
—— fasciata Swns.	370
Sphyradium Ferrari Htm.	333
—— guttula Htm.	333
Stenostoma auritum Spix	98
—— Capueira Spix	97
—— Puru Spix	94
Stomodonta antivertigo Merm.	362
—— avena Merm.	348
—— edentula Merm.	306
—— Farinesii Merm.	309
—— fragilis Merm.	388
—— granum Merm.	343
—— marginata Merm.	342
—— megacheilos Merm.	346
—— muscorum Merm.	307

Pag.

Stomodonta parvula Merm. 463
—— plicatula Merm. 482
—— pygmaea Merm. 363
—— pyrenaearia Merm. 343
—— ringens Merm. 337
—— rugosa Merm. 475
—— secale Merm. 342
—— umbilicata Merm. 330
—— ventricosa Merm. 466
Strobilus bilamellatus Ant. 393
—— conicus Ant. 392
—— fissidens Mlf. 392
—— oblongus Ant. 221
—— ovatus Ant. 394
—— pellucidus Mlf. 394
—— turritus Ant. 391
Strophocheilus Almeida Sp. 54
—— haemastomus Sp. 20
Styloides acicula Fitz. 275
—— lubricus Fitz. 273
Subulina carinulata B 297
—— Crotalariae B. 297
—— cyanostoma B. 259
—— Malaguetana B. 257
—— monoceros B. 297
—— octona B. 266
—— propinqua B. 297
—— pupaeformis B. 297
—— ? sericata B. 297
—— striatella B. 264
—— terebraster B. 263
—— turritellata B. 260
Succinea Drap. 513
—— abbreviata Mor. 517
—— aegyptiaca Ehr. 518
—— aequinoctialis O. 527
—— amphibia Dr. 514
—— —— β Nilss. 515
—— —— Aud. 518
—— angularis P. 512
—— aperta Lea 524
—— appendiculata P. 531
—— arenaria Bouch. 517
—— aurea Lea 525
—— australis F. 518
—— avara Say 525
—— barbadensis Guild. 530
—— Broderipi P. 146
—— brunnea Stentz 515
—— bulimoides P. 18
—— bullina F. 516
—— —— Z. 515
—— Buschii P. 148
—— caduca Migh. 519
—— calycina Menke 515

Pag.

Succinea campestris Say 524
—— Candeana Lea 531
—— canella Gould 519
—— cepulla Gould 519
—— chiloensis Phil. 527
—— contorta Ad. 529
—— coquimbensis P. 147
—— corsica Shuttl. 517
—— crassiuscula Bens. 518
—— crocata Gould 520
—— cucullata Lam. 532
—— Cuvierii Guild. 530
—— depressa Rang 531
—— elegans Risso 514
—— —— P. 148
—— exarata Krauss 518
—— fragilis King 528
—— fulgens Lea 529
—— gallinasultana P. 146
—— Gayana O. 528
—— Georgiana B. 523
—— gracilis Ald. 515
—— —— Lea 518
—— groenlandica B. 529
—— haliotidea Mittre 530
—— humerosa Gould 520
—— inflata Lea 526
—— infundibuliformis Gould. 520
—— intermedia Bean 515
—— italica Jan 517
—— laevis B. 523
—— levantina Dh. 515
—— longiscata Morelet 515
—— lumbalis Gould 520
—— macrostoma B. 518
—— magellanica Gould 528
—— major Risso 514
—— mamillata B. 528
—— manuana Gould 520
—— membranacea Mich. 512
—— modesta Gould 521
—— Moricandi P. 148
—— Müller Leach. 514
—— Nuttalliana Lea 523
—— oblonga Dr. 516
—— —— Turt. 515
—— obtusa Sow. 511
—— Oregonensis Lea 523
—— ovalis Say 524
—— pacifica B. 522
—— pallida P. 521
—— patula Brg. 532
—— —— King 528
—— —— Migh. 521
—— Petitii B. 529

Pag.

Succinea Pfeifferi Rm. 514
—— pinguis P. 529
—— procera Gould 521
—— progastor O. 527
—— pudorina Gould 522
—— putamen Gould 522
—— putris L. 513
—— reflexa P. 147
—— retusa Lea 525
—— rotundata Gould 522
—— rubescens Dh. 531
—— rufovirens Moric. 511
—— rugosa P. 517
—— rusticana Gould 523
—— Sagra O. 529
—— sardoa Mlf. 517
—— St. Helenae Less. 518
—— semiglobosa P. 528
—— sulculosa Gray 512
—— tahitensis P. 522
—— taurica Z. 517
—— texasiana P. 526
—— tigrina Les. 530
—— Totteniana Lea 526
—— tranquebarica B. 518
—— undulata Say 526
—— unguis F. 527
—— variegata P. 147
—— venusta Gould 523
—— vermeta Say 525
—— vesicalis Gould 523
—— virescens Morelet 515
—— Wardiana Lea 525
—— yncarum B. 527
—— zephyrina B. 518

Tapada oblonga Stud. 516
—— putris Stud. 514
—— succinea Stud. 515
Testacella Germaniae Oken 495
Theba conoidea B. 216
Tornatellina Beck 391
—— Archimedis B. 391
—— bilamellata Ant. 393
—— clausa B. 393
—— cubensis P. 391
—— ? Ferussaci P. 394
—— globosa Petit 393
—— minuta Ant. 392
—— ovata Ant. 394
—— ? owaihiensis P. 75
—— Petitiana P. 391
—— Reclusiana Petit 393
—— trochiformis B. 392
—— trochlearis B. 393

Pag.

Tornatellina turrita Ant. 391
Torquatella muscorum Held 312
—— triplicata Held 355
Torquilla avena Stud. 348
—— bigorriensis Villa 337
—— callosa Z. 339
—— cinerea B. 345
—— conica Villa 326
—— curta B. 338
—— cylindracea B. 339
—— Farinesii B. 309
—— frumentum Fitz. 338
—— gastrodes B. 367
—— gracillima B. 367
—— granum Stud. 343
—— hordeum Stud. 348
—— Hornbeckii Villa 385
—— humilis B. 350
—— Kokeilii B. 353
—— megacheilos B. 346
—— Michaudi Villa 349
—— occulta Villa 349
—— pachygastra B. 338
—— polyplicata Mlf. 338
—— proxima Villa 367
—— pyrenaica B. 343
—— quadridens Villa. 131
—— quinquedentata Villa ... 129
—— quinqueplicata Villa.... 332
—— ringens B. 337
—— secale Stud. 341
—— seductilis Villa 132
—— similis Htm. 341
—— spelta B. 332
—— spreta Villa. 130
—— tricolor Villa 346
—— tridens Villa 130
—— triticum Villa. 367
—— variabilis Stud. 340
—— zebra Villa 137
Trochus distortus Gm. 298
—— Lyonetianus Ch. 298
Turbo alveare Wood 322. 367
—— alvearia Dillw. 315
—— anglicus Wood 351
—— bidens L. 453
—— —— Chemn. 397
—— —— Mont. 476
—— —— γ Gm. 483
—— biplicatus Mont. 470
—— Callicratis Scac. 307
—— chrysalis Wood 416
—— conversus Alt. 482
—— corrugatus Ch. 483
—— costulatus Wood... ... 396

Pag.

Turbo crustatus Htm. 463
— cylindraceus Da C. 329
— cylindricus Htm. 341
— cylindrus Ch. 370
— elongatus Ch. 381
— Everetti Mill. 477
— fasciatus Penn. 214
— formosus Wood 80
— fusulus Gm. 303
— fusus Gm. 318
— gracilis Wood. 381
— haemastomus Gm. 21
— Juniperi Mont. 341
— labiatus Mont. 459
— —— Dillw. 396
— laminatus Mont. 397
— lugubris Ch. 239
— —— sinistr. Ch. 239
— mediterraneus Wood . . . 453
— mumia Dillw. 321
— muscorum L. 312
— nigricans Pult. 476
— —— Dillw. 387
— Offtonensis Shepp. 305
— papillaris Ch. 453
— perversus L. 387
— quadridens Gm. 131
— —— Alt.. 130
— quinquedentatus Born . . 345
— rufescens Wood 367
— rupium Da Costa 125
— sexdentatus Mat. 351
— —— Mont. 361
— sulcatus Gm. 302
— torticollis Wood 463
— trianfractus Da C. 513
— tridens Ch. 396
— —— Gm. 130
— —— Pult. 276
— turricula Ch. 215
— uva Z. 317
— vertigo Mont. 365

Urocoptis abbreviata B. 386
— Blainvilliana B. 386
— coarctata B. 386
— cylindrus B. 371
— glandula B. 386
— Petiverana B. 386
— rosata B. 386
— ? soluta B. 386
— ? tortuosa B. 386
— truncatula B. 377

Vediantius eristalius Risso 284
Vertigo alpestris F. 363

Pag.

Vertigo anglica F. 351
— angustior Jeffr. 365
— antivertigo Mich. 362
— curta Held 363
— cylindrica F. 306
— Dupotetii Terv. 310
— edentula Stud. 305
— hamata Held. 365
— lepidula Held 305
— lucida Jan 306
— minutissima Graells 306
— monodon Held 314
— muscorum Mich. 306
— nana Mich. 329
— nitida F. 305
— octodentata Stud. 361
— ovata Say 361
— ovularis F. 334
— palustris Leach. 362
— pentodon Say 359
— plicata Müll. 365
— pupula Held 306
— pusilla Müll. 364
— pygmaea F. 363
— quadridentata Stud. 363
— quinquedentata Stud. . . . 363
— secale Turt. 341
— septemdentata F. 361
— sexdentata C. Pfr. 361
— substriata Gray. 363
— Venetzii Charp. 364
— vulgaris Leach 363

Vitrina Drap. 492
— abyssinica Rüpp. 505
— albina Z. 495
— Angelicae B. 509
— angularis F. 512
— annularis Stud. 493
— aperta B. 502
— atrovirens Moric. 511
— Audebardi C. Pfr. 494
— Australasiae Blnv. 507
— Beckiana P. 499
— Bensoni P. 497
— beryllina C. Pfr. 493
— bicolor B. 499
— birmanica Phil. 498
— brasiliensis P. 511
— brevis Gray 495
— caperata Gould 509
— cassida Hutt. 497
— ceylanica B. 503
— cornea P. 505
— crenularis B. 501
— Cumingi B. 498

	Pag.
Vitrina Cuvieri F.	507
—— —— Sow.	506. 508. 510
—— depressa Jeffr.	494
—— —— B.	502
—— diaphana Dr.	494
—— —— Jeffr.	494
—— Dillwynii Jeffr.	493
—— Draparnaldi Cuv.	493
—— elongata Dr.	495
—— fasciolata F.	506
—— Freycineti F.	508
—— fumosa P.	510
—— gigas Bens.	496
—— glacialis Forb.	496
—— grandis B.	504
—— Gruneri P.	498
—— guimarasensis B.	499
—— gutta P.	500
—— habyssinica B.	506
—— hians Rüpp.	503
—— Lamarckii F.	506
—— leytensis B.	500
—— major C. Pfr.	494
—— Maravignae Mandral.	496
—— marcida Gould	507
—— margarita B.	500
—— mexicana B.	510
—— monticola Bens.	497
—— Müller Jeffr.	493
—— Musignani Mandr.	496
—— natalensis Krauss	505
—— nigra Quoy	509
—— nitida Gould	507
—— obtusa Sow.	511
—— papillata P.	502
—— pellicula F.	505
—— pellucida Müll.	492
—— —— Drap.	494
—— —— Voith	494
—— peraffinis B.	499
Vitrina planulata P.	502
—— Poeppigii Menke	504
—— politissima B.	499
—— praestans Gould	497
—— pyrenaica F.	495
—— resiliens B.	501
—— robusta Gould	508
—— Rüppelliana P.	503
—— rufescens P.	501
—— rufovirens Moric	511
—— Ruivensis Couth.	507
—— sigaretina Recl.	504
—— smaragdulus B.	501
—— Sowerbyana P.	503
—— subclathrata B.	501
—— subglobosa Mich.	493
—— sulculosa F.	512
—— tenella Gould	509
—— Teneriffae Quoy	506
—— virens P.	510
—— zebra Guill.	509
Vitrinus pellucidus Montf.	493
Voluta auris Malchi Gm.	228
—— —— —— β Gm.	139
—— —— —— γ Gm.	73
—— —— Sileni Born	87
—— —— virginis Dillw.	54
—— australis Dillw.	139
—— —— var. Dillw.	88
—— fasciata Dillw.	73
—— glabra Gm.	89
—— leucozonias Walch.	280
Zebra Mülleri Chemn.	143
Zebrina dealbata Held	188
—— fasciolata Held	123
—— illibata Held	123
—— radiata Held	223
Zua lubrica Leach	273

Lipsiae, typis F. A. Brockhausii.

3 2044 107 208 183